成熟および幼若ラットにおける β -galactosidase の 消化吸収に関する研究

西内 偉格, 甲斐 包子, 成田 昌子, 江幡 光雄, 高岸 靖

塩野義製薬株式会社研究所 〒553 大阪市福島区鷺洲5-12-4

山田 秀雄

北里大学薬学部 〒108 東京都港区白金5丁目9-1

山内 晃, 藤島 雅代, 河野 昌雄

塩野義製薬株式会社研究所 神崎川分室 〒561 大阪府豊中市二葉町3丁目1-1

Key words : tilactase, β -galactosidase, neonatal rat, adult rat,
intestinal absorption, distribution, metabolism, excretion

Studies on intestinal absorption of β -galactosidase in neonatal and young adult rats

Masanori NISHIUCHI, Kaneko KAI, Masako NARITA, Mitsuo EBATA and Yasushi TAKAGISHI

Shionogi Research Laboratories, Shionogi & Co., Ltd.,

Fukushima-Ku, Osaka 553, Japan

Hideo YAMADA

Kitasato University, School of Pharmaceutical Sciences

Minato-Ku, Tokyo 108, Japan

Akira YAMAUCHI, Masayo FUJISHIMA and Masao KOUNO

Kanzakigawa Laboratory, Shionogi Research Laboratories, Shionogi & Co., Ltd.,

Toyonaka-Shi, Osaka 561, Japan

Summary

The intestinal absorption of tilactase (containing 6.7% β -galactosidase, 10,000 ONPG unit/g) was studied following oral administration to rats of different age (1-, 7-, 14-, 17-, 21- and 49-days old). Concentrations of β -galactosidase in plasma, tissues and other body fluids were detected by radioimmunoassay (RIA) and/or o-Nitrophenyl- β -D-galactopyranoside (ONPG) methods.

1. After oral administration of tilactase at a dose of 4g/kg (β -galactosidase : 268mg/kg) to 49-days old rats, β -galactosidase was not detected in the plasma, liver and urine.

2. After oral administration of tilactase at a dose of 0.04 and 0.4g/kg to 7-days old rats, traces of β -galactosidase were detected in the liver.

3. After oral administration of tilactase at a dose of 4g/kg to 7-days old rats, the absorption of β -galactosidase from small intestine was observed with an estimated absorption ratio of 0.2%.

4. After intravenous injection of β -galactosidase (1.15mg/kg) to 7-days old rats, high level was especially observed in the liver and spleen. In the case of high dose (β -galactosidase : 11.5mg/kg), hepatic uptake was saturated.

5. β -galactosidase-like immunoreactive substance, which was absorbed from small intestine of 7-days old rats, was found to have similar enzymatic activity and molecular size as that of administered β -galactosidase.

6. After intravenous injection to 7-days old rats, β -galactosidase was not excreted into bile and urine.

7. After intravenous injection of ^{125}I - β -galactosidase, a low molecular weight degradation products were observed in plasma as revealed by gel filtration radio-chromatography.

緒 言

チラクターゼ (ミルラクト®) は、 β -galactosidase を含む薬剤であり、乳糖不耐症の人が牛乳や調製ミルクを摂取する場合に、乳糖を分解することを目的として投与されるものである。この β -galactosidase は、*penicillium multicolor* により産生される糖タンパク質で、その分子量は測定法により若干異なるが、約130,000といわれており¹⁾、また、従来から乳糖不耐症の人に用いられてきた *Aspergillus oryzae* の産生する β -galactosidase に比べて、酸性 pH 領域での安定性が高いことが報告されている¹⁾。チラクターゼのマウス、ラットおよびイヌにおける毒性試験では、本剤に基因すると思われる毒性は認められていない²⁻⁵⁾。さらに、健常成人にチラクターゼ製剤を投与した際に行った血液学的・生化学的諸検査および尿検査の結果は、いずれも本剤に基因すると思われる異常値を示さなかったこと⁶⁾、また、本剤の臨床試験の結果も、安全性の高い薬剤であるといわれていること⁷⁻⁹⁾ などからも、本剤は比較的安全な薬剤とされている。

チラクターゼは消化管内で作用を発揮することが確かめられており^{10,11)}、その酵素本体である β -galactosidase は、消化管から吸収される必要はない。しかし、幼若動物¹²⁾ のみならず、成熟動物¹³⁻¹⁸⁾ においても、種々のタンパク質の消化管吸収が報告されているため、著者らはチラクターゼを成熟および幼若ラットに投与し、そこに含まれる β -galactosidase の消化管吸収について検討を行った。また、体内動態を知る目的で、 β -galactosidase を幼若ラットに静脈内投与した場合の血漿、肝、腎、心、肺、脾の組織内濃度ならびに経口投与した場合の血漿中および肝組織内濃度を測定し、さらに、この β -galactosidase を¹²⁵Iで標識した検体を静脈内投与した後の肝および血漿中の代謝物について、高速液体クロマトグラフィー (HPLC) ゲル濾過法による検討を行った。

実験法

1. 実験動物

ラットは SD 系ラットを日本 SLC(株)より購

入して用いた。成熟ラットとしては、生後7週齢の雄性ラット (230~260 g) を絶食せずに用いた。また、幼若ラットについては、妊娠12~14日目のラットを購入し、出産後、母獣1匹に哺乳仔8~10匹を哺乳させて飼育した。ラットの日齢は、前日の午前9時から当日午前9時の間に出生したものを1日齢とした。経口投与の実験には1日齢 (4.4~6.2 g)、7日齢 (9.6~14 g)、14日齢 (17.5~23.7 g)、17日齢 (24~33 g)、21日齢 (34~44 g) のラットを、また、静脈内投与の実験には7日齢 (9.5~14.9 g) のラットを、いずれも絶食させることなく用いた。生後1日齢、7日齢のラットは雌雄の区別なく、14日齢以降は雄性ラットを用いた。

2. 検 体

1) チラクターゼ

チラクターゼはケイ・アイ化成株式会社より提供された酵素活性10,000 ONPG 単位/g^{脚注1)} を示すものを用いた。ここで用いたチラクターゼには、その酵素本体である β -galactosidase (T- β -galactosidase)^{脚注2)} が6.7%、マンニトールが約60%含まれていた。

2) T- β -galactosidase 標準溶液

Penicillium multicolor を発酵タンクで培養し、アセトン沈澱により精製された粉末を、NaCl の濃度勾配をもたせた酢酸緩衝液 (pH 4.5) を用い、phosphocellulose のカラムクロマトグラフィーによりさらに分離、精製した。得られた活性画分を同じ系で再度クロマトグラフィーにより分離、精製し、0.05Mリン酸緩衝液 (pH6.5) を加え限外濾過により濃縮、脱塩を繰り返して T- β -galactosidase 標準溶液を調製した。その標準溶液の T- β -galactosidase 濃度は

脚注1) 30℃で1分間に1 μ mol のo-nitrophenyl 1- β -D-galactopyranoside (ONPG) が加水分解されるとき酵素活性を1ONPG 単位とする。

脚注2) β -galactosidase には種々の起源のものがあり、チラクターゼ (tilactase) 中の β -galactosidase を、他に由来するものと区別するため、本報では T- β -galactosidase と略称する。この T- β -galactosidase は糖タンパク質 (中性糖を13.9%含む) であり、その分子量は約130,000、等電点は約5.7である。

酵素活性測定法により測定した結果11.5mg/mlであり、ポリアクリルアミド・ディスクゲル電気泳動および SDS-ポリアクリルアミド・スラブゲル電気泳動により不純物を含まないことを確認した。

3) ^{125}I -標識 T- β -galactosidase 溶液

^{125}I -T- β -galactosidase は、T- β -galactosidase に Na^{125}I (IMS-30, Amersham 社) を用い、クロラミンT法により標識し、Sephadex G-50を用いたゲル濾過により分離、精製した。HPLC ゲル濾過法で検定した純度は95%以上であり、比放射能は1.79MBq/ μg (48.3 $\mu\text{Ci}/\mu\text{g}$) であった。合成、精製された ^{125}I -T- β -galactosidase は、標識する前の T- β -galactosidase と同様の免疫活性を有し、分子量も同等であることを確認した。

3. 投与検液

チラクターゼ2gを秤取し、蒸留水を加え乳鉢中で練合して40%水性懸濁液を調製した後、そのまま、または蒸留水で4%もしくは0.4%に希釈することにより経口投与用検液とした。T- β -galactosidase の注射用検液は T- β -galactosidase 標準溶液をそのまま、または生理食塩水で10倍および100倍に希釈して用いた。また、 ^{125}I -T- β -galactosidaseの注射用検液は、作製直後の ^{125}I -T- β -galactosidase (比活性; 1.787MBq/ μg) 溶液に非標識の T- β -galactosidase 溶液を加えその濃度を1.15mg/ml および5.47mg/ml とし、それらの放射能濃度は1.44MBq/ml および2.26MBq/ml であった。さらに、放射性ヨードで標識したウシ血清アルブミン (^{125}I -BSA) の注射用検液は、DU PONT 社より購入した比活性85.3KBq/ μg (62.1MBq/ml) のものを生理食塩水で100倍に希釈して用いた。

4. 投与方法

経口投与の場合は、投与直前に個体毎の体重を測り、それぞれにつき投与液量 (10ml/kg) を算定し、その量を無麻酔下でゾンデを用いて胃内投与した。静脈内注射の場合は、生後7日齢の幼若ラットに1ml/kg の容量で尾静脈内に投与した。十二指腸内投与はウレタン麻酔下、7日齢

の幼若ラットを保温板 (38℃) 上で開腹し、十二指腸内に0.04g/kg のチラクターゼを投与した。投与液量は、投与直前に個体毎の体重を測り算定した。

5. 生体試料採取法

1) 血漿

検液を投与して所定時間が経過した後、ラットをエーテルで麻酔し、ヘパリン溶液 (1,000unit/ml 日局) を付着させた注射筒を用い、1日齢から21日齢のラットでは心臓から採血し、7週齢のラットでは下大静脈から採血した。幼若ラットでは採血量が少ないため、ヘパリン溶液の量を採血量に対して3%以下にした。採取した血液は冷却下 (4℃)、遠心分離 (3,000rpm, 10min) し血漿を得た。幼若ラットでは1匹から得られる血漿量が少ないため、経口投与実験では数匹のラットを1群としてその血漿を合わせ、濃度測定用試料とした。静脈注射後の血漿試料については、その濃度が十分高いためラット1匹ずつの血漿を用いた。得られた血漿は、氷冷または凍結状態で保存し、氷冷状態で保存した場合は24時間以内に測定に供した。

2) 消化管腔内容物

7日齢の幼若ラットに4g/kg のチラクターゼを経口投与した後4時間に胃と腸をそれぞれ摘出し、氷冷下、ガラス製ホモジナイザーにより生理食塩水5mlを用いてホモジナイズを行った。その一部を希釈して、後述するONPG法による酵素活性の測定に供した。なお、測定用試料は氷冷下で保存し、2時間以内に測定に供した。

7日齢の幼若ラットをウレタン麻酔下、保温板 (38℃) 上で開腹し、十二指腸内に0.04g/kg のチラクターゼを投与した。投与後1時間および2時間に小腸を全摘出し、氷冷下、ガラス製ホモジナイザーによりホモジナイズを行い、消化管内に残存する T- β -galactosidase をRIA法により測定した。

3) 臓器

a) 摘出臓器内残留血漿量

^{125}I -BSA を7日齢の幼若ラット (n=6) にエーテル麻酔下、静注し、静注後2分に心臓より採血を行った後、肝、腎、心、肺および脾を摘出し

た。血液は遠心分離し血漿を分取した。各臓器中の放射能を測定し放射能濃度を求め、血漿中放射能濃度から各臓器中に残留する血漿の割合(w/w%)を算出した。その結果、本実験で摘出した肝、腎、心、肺および脾内に、それぞれ 10.5 ± 0.9 , 6.0 ± 0.6 , 7.4 ± 0.5 , 8.6 ± 0.3 および 4.2 ± 0.4 (mean $\pm$ SD) w/w %の血漿が残留していた。

b) 臓器内濃度

肝、腎、心、肺および脾は重量を測定したのち、一定量の蒸留水を加えて氷冷下ホモジナイズした。得られた試料は氷冷または凍結状態で保存し、氷冷状態で保存した場合は24時間以内にRIA法による濃度測定に供した。なお、上述したように、摘出した各臓器内には血漿が残留していたことから、各臓器内のT- β -galactosidase濃度は血漿中のそれを差し引いて算出した。

4) 胆汁および尿 (7日齢ラット)

7日齢の幼若ラットをウレタン麻酔下、 37.5°C の保温板上で腹部を切開し、総胆管にポリエチレンチューブを挿入したのち注射用検液を尾静脈内に投与した。 0.115mg/kg または 1.15mg/kg のT- β -galactosidaseを静注後、尿道口を外科用接着剤で閉じて膀胱内に尿を貯留させ、所定時間経過後、ポリエチレンチューブより流出する胆汁および膀胱内にたまった尿を採取して氷冷下で保存し、RIA法による測定に供した。

5) 尿 (7週齢ラット)

7週齢の成熟ラット ($n=3$) にチラクターゼ 4g/kg を経口投与し、投与後直ちに尿道口を外科用接着剤で閉じ、投与後2時間後にエーテル麻酔下、腹部を切開して膀胱から0~2時間尿を採取した。投与後2~4時間尿は、経口投与して2時間後にエーテルを嗅がせて排尿させた後、尿道口を外科用接着剤で閉じ、投与後4時間後にエーテル麻酔下、腹部を切開して膀胱から2~4時間尿を採取した。採取した尿は凍結し、RIA法による測定に供した。

6. 測定法

1) Radioimmunoassay (RIA) 法

試料 0.1ml に1%ウシ血清アルブミン (BSA, Sigma社) を含む 0.1M リン酸緩衝液 0.5ml お

よび第1抗体溶液 (T- β -galactosidase をウサギに皮下注射して作製した抗 β -galactosidase 血清を1% BSA を含む 0.1M リン酸緩衝液で60000倍に希釈した溶液) 0.1ml を加えて 4°C で22時間インキュベートしたのち、 ^{125}I -T- β -galactosidase溶液を 0.1ml 加え、さらに 4°C で22時間インキュベートした。ついで、第2抗体懸濁液 (抗ウサギ IgG 抗体: Immunobead) 0.1ml を加え、室温で90分間インキュベートしたのち遠心分離 ($3,000\text{rpm}$, 10min) を行い、その上清を吸引除去し、沈澱 (bound form) の放射能を計測した。なお、血漿、尿、または胆汁試料が 0.1ml に満たない場合は、1% BSA を含む 0.1M リン酸緩衝液で 0.25ml に希釈し、その 0.1ml を用いた。

T- β -galactosidase 標準溶液についても同様に処理し、T- β -galactosidase が存在しない標準溶液 (0 pg/ml) のカウント数 (B_0) に対する各濃度の標準溶液のカウント数 (B) の比 ($B/B_0 \times 100$) を計算し、この値を標準溶液の濃度に対してプロットし、標準曲線を作成して試料中のT- β -galactosidase 濃度を求めた。

生体試料中のT- β -galactosidaseの定量に先立ち、生体試料にT- β -galactosidaseを添加してその回収実験を実施し、添加量に対する回収率 (肝; $102.8 \pm 5.6\%$, 肺; $98.5 \pm 2.1\%$, 心; $98.4 \pm 3.0\%$, 脾; $102.3 \pm 3.6\%$, 腎; $99.1 \pm 5.7\%$, 脳; $100.2 \pm 6.9\%$) は良好で、生体成分の影響の少ないことを確認した。また、 ^{125}I -T- β -galactosidaseを投与して得られた生体試料は、放射能濃度の測定のほかRIA法による測定を行った。この場合、RIA法での測定に投与された検体に由来する放射能の影響が考えられるが、投与検液は ^{125}I -T- β -galactosidaseに非標識のT- β -galactosidaseを約1400倍量加えて調製するため、それに含まれる ^{125}I 標識物の割合は非標識物の0.07%と少ないことから、RIA法における投与検体由来の放射能の影響は無視しうるものであった。

2) 酵素活性測定法

o-Nitrophenyl- β -D-galactopyranoside (ONPG) 法¹⁹⁾を生体試料に適用した。

a) 血漿

血漿試料0.1ml に、20mM の ONPG (Sigma 社) を溶解した McIlvaine 緩衝液 (pH 3.5) 0.1ml を混和して (混合時 pH 4.5) 37℃ で50分間インキュベートしたのち、遠心分離 (3,000rpm, 10min) した。その上清0.1ml に 1M Na_2CO_3 溶液0.1ml を加えて反応を停止した後、蒸留水0.8ml を加え、分光光度計により 420nm での吸光度を測定した。

b) 消化管腔内容物および肝

測定試料をよく振盪して均一にしたのち、そのまま、あるいは McIlvaine 緩衝液 (pH 4.5) で1000倍に希釈した溶液0.5ml に、同緩衝液で溶解した ONPG 液 (20mM) 0.5ml を混和して、37℃で15分間インキュベートしたのち、1M Na_2CO_3 溶液1.0ml を加えて反応を停止し、蒸留水8.0ml を加え、分光光度計により420nm での吸光度を測定した。

3) 血漿中免疫活性物質の分子量の推定

血漿試料を4℃でゲル濾過し、経口投与後の血漿中の免疫活性物質の分子量を推定した。溶出液 (0.3M NaCl および0.01% NaN_3 を含む0.05M リン酸緩衝液, pH 7.4) で平衡状態にした Sephacryl S-200 カラム (1.5cm ID×68cm) を用いて血漿試料0.3～0.5ml を流速 3 ml/min で展開し、溶出する液をフラクションコレクターで 1.0ml ずつ分取した。各フラクションの免疫活性を RIA 法により測定した。

4) 放射能測定

放射能の測定はオートウェル・ガンマカウンタ (アロカ ARC-600, 計数効率80%) を用いた。

5) 高速液体クロマトグラフィー (HPLC) ゲル濾過法による代謝物の分離

^{125}I -T- β -galactosidase 静注後の血漿および肝ホモジネート0.1～0.5ml をミリポアフィルター (Millipore, 0.45 μm) で濾過した後、10～250 μl を GPC モードのHPLC ゲル濾過システムに注入して分離を行い、溶出する液を0.5ml 毎フラクションコレクターで分取し、各フラクションの放射能を測定した。なお、HPLC 装置の本体は島津LC-3A を、カラムは TSK-GEL (G3000SW) を充填したもの (7.5mm ID×60

cm) を用いた。また、移動相には0.1M リン酸緩衝液 (pH7.1) を用い、流速は0.5ml/min とした。

7. 薬物速度論的解析法

血漿中および肝、脾組織内濃度の解析は、非線形最小二乗法プログラム NONLIN 74²⁰⁾ を用いて行った。なお、有意差検定は t 検定を用いて行った。

結 果

1. 成熟ラット

1) 消化管吸収

7週齢のラットにチラクターゼ (4g/kg, T- β -galactosidase として268mg/kg) を経口投与したときの血漿中濃度を RIA 法により測定した結果は、いずれも定量下限 (1 ng/ml) 以下であった。また、経口投与後2時間および2～4時間の尿中濃度を RIA 法により測定した結果は、いずれも定量下限 (2 ng/ml) 以下であり、本実験の範囲内では、成熟ラットの消化管からの吸収は認められなかった。

2. 幼若ラット

1) 消化管吸収

a) 日齢の影響

1, 7, 14, 17および21日齢のラットに4g/kg のチラクターゼを経口投与し、RIA 法により血漿中濃度を測定した。その結果は Fig. 1 に示すように、1日齢および7日齢では最高血漿中濃度が200ng/ml 程度にまで上昇し、14日齢、17日齢ではやや低くなり、21日齢では全く血漿中に検出されなかった。

b) 投与量の影響

チラクターゼ0.04g/kg, 0.4g/kg および4g/kg を7日齢のラットに経口投与し、その血漿中濃度を RIA 法により測定し、その結果を Table I に示した。投与量が0.04g/kg および0.4g/kg の場合、血漿中にはどの時点においても検出されないのに対し、4g/kg の場合には、かなり高い血漿中濃度を示した。投与量が4g/kg の場合にピークを示す4時間値は200ng/ml 以上の濃度であるのに対して、0.4g/kg の場合の4時

Fig. 1 Plasma concentrations of β -galactosidase following oral administration of tilactase to rats of various ages at a dose of 4g/kg (β -galactosidase : 268 mg/kg).
Each point represents a mean $\pm$ SD
Measurement : RIA method

Table I Plasma concentrations of β -galactosidase following oral administration of tilactase to new born rats (age : 7 days) at doses of 4, 0.4 and 0.04 g/kg (β -galactosidase : 268, 26.8 and 2.68mg/kg)
[RIA method]

Dose of tilactase (g/kg)	Concn. of test soln. (w/v%)	Plasma concentration (ng/ml)				
		Time after administration (hr)				
		1	2	4	8	24
4	40	4.9	N.T.*	296	59	N.D.**
		6.5		221	70	N.D.
		5.2		237	103	N.D.
		7.1		200	96	N.D.
		5.8		299	127	N.D.
	Mean $\pm$ SD	5.9 $\pm$ 0.9		251 $\pm$ 45	91 $\pm$ 27	
0.4	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
	40	N.D.	N.T.	N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
0.04	0.4	N.D.	N.T.	N.D.	N.D.	N.T.
		N.D.		N.D.	N.D.	
		N.D.		N.D.	N.D.	

*N.T. : not tested
**N.D. : less than 1.0 ng/ml

Fig. 2 Gel filtration chromatogram of plasma added β -galactosidase (Standard) and plasma collected at 4 hr after oral administration of tilactase to new born rats (age : 7 days) at a dose of 4g/kg (β -galactosidase : 268mg/kg) (Sample).

間値はすべて定量下限以下, すなわち, ここでは 0.5ng/ml 以下であり, 投与量を10倍にすると血漿中濃度は400倍以上に上昇したことを示している. また, 0.4g/kg を経口投与する場合, 検液濃度を4 w/v %から40w/v %に上げ, 投与液量を1/10にする実験も行ったが, 検液の濃度による差は認められなかった. このことは, 4 g/kg の場合の血漿中濃度の上昇が, 検液濃度の違いに由来するものではないことを示している.

c) 小腸腔内での分解

ウレタン麻酔下, 7日齢の幼若ラットの十二指腸内に0.04g/kg のチラクターゼを投与し, 投与後1時間および2時間の小腸腔内に残存する T- β -galactosidase をRIA 法により測定したところ, それぞれ投与量の102.8 $\pm$ 1.2%および101.0 $\pm$ 4.9%が回収され, 小腸腔内での分解は無視しうるものと思われた.

d) 消化管吸収後の血漿中免疫活性物質

① 分子量

経口投与されたチラクターゼ中の T- β -galactosidase が吸収されて循環血漿中に存在するときの状態を検討した. RIA 法においては, T- β -

Fig. 3 Comparison of dilution curves of plasma sample and β -galactosidase-like immunoreactivity fraction after gel filtration with standard curve of β -galactosidase.

a) Plasma at 4 hrs after oral administration to rat of 7 days old.

b) β -Galactosidase-like immunoreactivity fraction after gel filtration of sample 1.

c) β -Galactosidase

d) The radioactivity of ^{125}I - β -galactosidase bound to Immunobead[®] in zero concentration of standard [Bo] and each concentration of standard or sample [B]

galactosidase が代謝をうけて分解したもので, 免疫活性があれば測定される. そこで, 7日齢の幼若ラットにチラクターゼ4 g/kg を経口投与後4時間の血漿についてゲル濾過を行い, 免疫活性物質の分子量分布を調べた. その結果, 免疫活性物質は Fig. 2 に示すように, ほぼ単一のピークを示し, その分子量は, もとのチラクターゼ中の T- β -galactosidase と同程度のものであることがわかった.

② 酵素活性

チラクターゼ4 g/kg を7日齢の幼若ラットに経口投与し, 血漿中濃度が十分高い値を示す投与後4時間および8時間の血漿試料を2分し, 一方

Table II Residual % of β -galactosidase in stomach and intestine at 4hr following oral administration of tilactase to new born rats (age : 7 days) at a dose of 4 g/kg (β -galactosidase : 268 mg/kg)

Rat No. (BW, g)	[ONPG method]		
	% of dose		
	Stomach	Intestine	Total
1 (12)	13.0	88.2	101.2
2 (12)	18.5	83.5	102.0
3 (12)	16.6	94.7	111.3
4 (12)	16.2	79.0	95.2
Mean $\pm$ SD	16.1 $\pm$ 2.3	86.4 $\pm$ 6.7	102.4 $\pm$ 6.6

Fig. 4 Plasma concentrations following intravenous injection of β -galactosidase in new born rats (age : 7 days) at doses of 11.5, 1.15, 0.115 mg/kg.

Each point represents a mean $\pm$ SD (n = 3~5).

Measurement : RIA method

を RIA 法による濃度測定に、他方を ONPG 法による酵素活性の測定に供した。その結果、投与後 4 時間の血漿中濃度を RIA 法および ONPG 法により測定した結果は $130 \pm 29 \text{ ng/ml}$ および $111 \pm 32 \text{ ng/ml}$ 、投与後 8 時間ではそれぞれ 127

$\pm 65 \text{ ng/ml}$ および $101 \pm 47 \text{ ng/ml}$ であり、各時間において両測定法間に有意な差は認められなかったことから、血漿中の免疫活性物質の大部分は β -galactosidase 活性を有していると思われる。

③ 血漿の希釈曲線

チラクターゼ 4 g/kg を 7 日齢の幼若ラットに経口投与後 4 時間の血漿試料、およびこの血漿試料をゲル濾過して得られた β -galactosidase 様免疫活性物質画分について RIA 法による希釈曲線を求め、これらを T- β -galactosidase の標準曲線と比較したところ、Fig. 3 に示すようによい平行性が認められた。

これら①～③に見られた結果から、血漿中に RIA 法で測定された免疫活性物質は、投与された T- β -galactosidase に近い状態にあるように思われた。

e) 吸収率

血漿中濃度の上昇が認められた場合の T- β -galactosidase の吸収率について検討を試みた。7 日齢の幼若ラットに 4 g/kg の用量でチラクターゼを経口投与し、血漿中濃度がピークに達した投与後 4 時間の時点で、消化管内に残存する T- β -galactosidase の酵素活性を求めたところ、Table II に示したように、消化管からほぼ全量が回収された。なお、vehicleのみを投与し、同様に測定した内因性の β -galactosidase 活性は定量下限 (30 ng/ml) 以下であった。また、後述するように、血漿中の T- β -galactosidase

Table M Liver concentrations of β -galactosidase following oral administration of tilactase to rats of 7 days and 7 weeks at doses of 4, 0.4 and 0.04 g/kg (β -galactosidase : 268, 26.8 and 2.68 mg/kg)

[RIA method]

Age	Dose (g/kg)	Liver concentration (ng/g)									
		Time after administration (hr)									
		1	2	3	4	6	8	10	12	24	48
7 days	4		209		1997	4890	5594, 12418	5082	2826	860, 480	86, 53
			133		1609	6203	6946, 13878	6221	2569	715	75
			286		1845	5483	10747, 12943	5415	2379	1005	54
		Mean $\pm$ SD	209 $\pm$ 77		1817 $\pm$ 196	5525 $\pm$ 658	10421 $\pm$ 3399	5573 $\pm$ 586	2591 $\pm$ 224	765 $\pm$ 224	67 $\pm$ 16
	0.4		N.D.*		N.D.		N.D.			N.D.	
			N.D.		85		N.D.			N.D.	
			N.D.		60		56			N.D.	
					64		104			N.D.	
	0.04						N.D.			N.D.	
			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.	
			N.D.		86		N.D.			N.D.	
7 weeks	4	N.D.		N.D.		N.D.					
		N.D.		N.D.		N.D.					
		N.D.		N.D.		N.D.					

*N.D. : less than 30 ng/g

Fig. 6 Plasma concentrations and liver concentrations of radioactivity, β -galactosidase-like immunoreactivity and enzyme activity following intravenous injection in new born rats (age : 7 days) at a dose of ^{125}I - β -galactosidase, 1.15 mg/kg. Each point represents a mean $\pm$ SD (n=3~5)
a) Radioactivity was converted to equivalent of β -galactosidase

Fig. 7 Liver concentrations of β -galactosidase following oral administration of β -galactosidase (268 mg/kg) with (●) or without (○) mannitol (2.4 g/kg) in new born rats (age : 7 days).

Each point represents a mean $\pm$ SD (n=4)

* $P < 0.05$ in β -galactosidase with mannitol vs. β -galactosidase alone.

Measurement : RIA method

Fig. 9 HPLC-Gel filtration chromatogram of plasma and liver following intravenous injection in new born rats (age : 7 days) at a dose of ^{125}I - β -galactosidase, 5.47 mg/kg.

Column : TSK-GEL G3000 SW, 7.5mm Φ ×60cm

Elute : 0.1M-Phosphate Buffer (pH7.1)

$$* \frac{\text{Radioactivity of each fraction}}{\text{Total radioactivity}} \times 100$$

血漿および最も高濃度に移行する肝について、RIA 法、酵素活性測定法により、濃度推移を求め、その結果を、Fig. 5における放射能から算出した濃度推移と比較して、Fig. 6に示した。肝では放射能から算出した濃度と、RIA 法および酵素活性測定法で求めた濃度とが、類似のパターンを示すのに対し、血漿では放射能から求めた血漿中濃度は、静注後1時間以降減少せず、48時間後でもほぼ同じ値を示した。すなわち、肝に取り込まれた T- β -galactosidase は、大部分が RIA 活性および酵素活性を有する状態で存在し、血漿中では時間の経過とともに、RIA 活性、酵素活性をもたない代謝物、または遊離した ^{125}I の割合が増加するように思われた。

3) 経口投与後の肝組織内濃度

a) 成熟および幼若ラット

上述のごとく、T- β -galactosidase は肝に速やかに取り込まれることが明らかとなった。したがって、経口投与の場合、0.4g/kg および0.04g/kg の投与量では、初回通過効果を受けて肝に取り込まれ、その結果として血漿中に検出されないという可能性も考えられる。そこで、再度、経口投与と実験を行い、肝組織内濃度を RIA 法に

より測定した。7週齢のラットには4g/kg を、7日齢のラットには4g/kg、0.4g/kg および0.04g/kg を経口投与した場合の肝組織内濃度を Table N に示す。その結果は、7日齢のラットに4g/kg を投与した場合にのみ高い肝組織内濃度を示し、その AUC は79,801ng・hr/ml であった。このことは、0.4g/kg および0.04g/kg 投与の場合に T- β -galactosidase が血漿中に検出されなかったのは、肝に取り込まれたため循環血中に到達しなかったというよりは、吸収そのものが起きていない可能性があることを示している。

b) マンニトールの影響

チラクターゼ中にはマンニトールが約60%含まれることから、4g/kg (T- β -galactosidase として268mg/kg) の投与量におけるマンニトールの用量は2.4g/kg となる。そこで、マンニトールを含まない T- β -galactosidase 検液、およびそれにマンニトールの用量が2.4g/kgとなるよう添加した T- β -galactosidase 検液を作製し、両者を7日齢のラットに経口投与した後の肝組織内濃度を RIA 法により測定した。その結果は、Fig. 7に示すように単独投与に比べ、マンニ

ツールと共に経口投与した場合の方が、高い濃度推移を示す傾向が認められるものの、マニトールのない場合にも、T- β -galactosidase は消化管から吸収されることを示した。

4) 尿中および胆汁中排泄

次に、T- β -galactosidase を7日齢のラットに静注し、血漿中濃度が十分低くなる時間まで尿と胆汁を採取し、RIA 法により測定した。その結果、尿中および胆汁中の T- β -galactosidase はともに定量下限(1 ng/ml) 以下であった。これらの結果から、血中に移行した T- β -galactosidase は、そのままの形では尿にも胆汁にも排泄されないか、されても極めて微量であり、大部分は体内で代謝されていくものと推定された。

5) 静注後5分の血漿中および肝組織内濃度

T- β -galactosidase を7日齢のラットに静注した結果 (Fig. 4), 血中からの消失過程に non-linear な過程が関与していることが示唆され、また、静注後 T- β -galactosidase は肝、脾に高濃度に移行する (Fig. 5) ことが認められた。そこで、臓器の中でも大きな容積を占める肝に着目して血漿中濃度と肝組織内濃度の関係を調べることとし、7日齢の幼若ラットに T- β -galactosidase を0.115, 0.575, 1.15, 4.5, 7.5および11.5 mg/kg の用量で静注して、5分後の血漿中および肝組織内濃度を RIA 法で測定した。その結果、Fig. 8に示すように、肝組織内濃度は投与量の増加に伴い頭打ちの傾向が認められた。

6) HPLC ゲル濾過法による代謝物の分離

Fig. 6において、肝に取り込まれた T- β -galactosidase は、大部分が RIA 活性および酵素活性を有する状態で存在し、血漿中では時間の経過とともに、RIA 活性も酵素活性ももたない代謝物または遊離した¹²⁵Iとなることが示唆された。そこで7日齢の幼若ラットに¹²⁵I-T- β -galactosidase を5.47 mg/kg (2.26 MBq/ml) の用量で静注した後の肝および血漿中代謝物を HPLC ゲル濾過法により分離した。その結果は、Fig. 9にみられるように、肝では T- β -galactosidase の画分に単一のピークを示しているのに対し、血漿では時間の経過につれて低分子量の画分および遊離した¹²⁵Iと思われる画分にピークが認められた。この代謝物の化学構造は明らかでないが、

Fig. 6の血漿に見られる両測定法間の差は、これら代謝物または遊離した¹²⁵Iによるものと思われる。

考 察

成熟ラットにおける酵素タンパク質の消化管吸収についてはキモトリプシン^{13,14)}、ペルオキシダーゼ(horse raddish peroxidase, HRP)¹⁵⁾、チトクローム-C¹⁶⁾、エラスターゼ¹⁷⁾、リゾチーム¹⁸⁾などについて研究がなされ、酵素活性を保持したまま消化管壁を通して吸収されることが報告されている。Yuzuriha ら¹⁸⁾はリゾチームを用いて、Warshaw らは HRP¹⁵⁾ および BSA²¹⁾を用いて、それらの消化管からの吸収がリンパ系および血管系の両方を介しているものであることを明らかにした。また、消化管からの吸収率についてはウシ免疫グロブリン²²⁾、フェリチン²²⁾、BSA²¹⁾、エラスターゼ¹⁷⁾でそれぞれ0.2%, 0.7%, 2%, 0.05~0.15%程度といずれも低い値が報告されている。佐藤ら²³⁾は *aspergillus oryzae* 産生の β -galactosidase について、成熟したウサギの腸管から吸収を認めているが、*penicillium multicolor* により産生された β -galactosidase を用いた今回の実験では、チラクターゼの大量を経口投与したが、成熟ラットに関する限り、吸収は認められなかった。

一方、幼若動物において、免疫グロブリンなどのタンパク質が消化管から吸収されることについては古くから知られており¹²⁾、初乳中の抗体を吸収することは受動免疫の有効な手段であると考えられている。また、その免疫を獲得する期間は動物の種類により異なることが、Brambell ら²⁴⁾や Butler²⁵⁾により報告されており、Brambell ら²⁴⁾によればラットで生後20日間、マウスで16日間、イヌで10日間、ウマ、ブタ、ウシ、ヤギおよびヒツジでは36時間以内に初乳を介して免疫グロブリンが腸管から吸収されるが、胎盤を通して抗原を胎仔に運ぶヒト、ウサギ、モルモットでは初乳中の免疫グロブリンは腸管から吸収されない。同様のことは、Kraehenbuhl ら²⁶⁾によっても報告されている。Stradley ら²⁷⁾は HRPを10日齢のラットの十二指腸内(100 mg/kg)および心臓内(0.25 mg/kg)に投与し、両投与法に

における血漿中濃度の AUC を比較して吸収率を求め、投与量の1.3%が小腸から吸収されることを認めている。幼若ラットにチラクターゼの大量を経口投与した今回の実験では、明らかに吸収が認められてはいるものの、その吸収率は極めて低いものであって、この現象は幼若動物においてタンパク質一般の消化管吸収にみられる現象と類似している。新生動物におけるタンパク質の吸収は、Clark²⁸⁾の形態学的観察によって腸粘膜上皮細胞の pinocytosis の機構による transcellular の経路であることが知られているが、Warshaw¹⁵⁾は細胞間隙による intercellular な経路によっても吸収されると報告している。また、Comline²⁹⁾および Balfour³⁰⁾によって、幼若動物(ウシ)における免疫グロブリンの消化管吸収はリンパ系であることが明らかにされている。T- β -galactosidase の幼若ラットにおける消化管吸収がリンパ系によるものか、否かについては、動物が小さいため実験的に明らかにすることはできなかった。

チラクターゼから分離、精製した T- β -galactosidase を、7日齢のラットに静注して血漿を採取し、RIA 法により濃度を測定した結果(Fig. 4)、血漿中からの消失には non-linear な過程が関与していることが示唆された。そこで、T- β -galactosidase が高濃度に移行する組織で、しかも種々の臓器の中で比較的大きな容積を占める肝を取り上げ、さまざまな投与量における血漿中濃度と肝組織内濃度の関係を調べた(Fig. 8)。この場合、実験中の肝における代謝の進行を考慮しなければならないが、T- β -galactosidase の肝からの消失半減期が $t_{1/2}=4.5$ 時間と長く、静注後5分における肝での代謝の寄与はほとんど影響はないと考えられる。T- β -galactosidase を静注したのち5分の肝組織内濃度は、投与量の増加に伴い頭打ちの傾向を示している。もしも、取り込みに飽和がなく、肝での代謝に飽和現象があるとすれば、投与量の多いときほど肝内の T- β -galactosidase は多く残存しているものと思われるが、Fig. 8の結果はその逆である。このことは、肝での代謝に飽和があるのではなく、肝の取り込み過程に飽和があると見るほうがよいことを示唆しているように思われる。このような投与

量の増加に伴い、肝への取り込みが飽和に近づく現象は、EGF を用いた Kim³¹⁾らの報告にもみられるところである。以上のような考察の結果、Fig. 4に見られる血漿中からの消失が高濃度域で遅いのは、肝への取り込みが飽和に近づいたことによりみられた現象と思われる。

幼若ラットにチラクターゼを経口投与した場合の血漿中濃度および肝組織内濃度には投与量に対する比例性が見られず(Table I, N)、何らかの non-linear な過程が介在することが示唆された。ここに見られた non-linear な現象は、検液の濃度に基づく粘度などの物理的性状の違いによる影響ではないこと(Table I)、投与検液中に含まれるマンニトールの影響が必須の条件でないことが示された(Fig. 7)。また、先に述べたように、静注後のデータ(Fig. 8)によれば、肝における代謝ではなく、むしろ肝への取り込みに飽和現象があるものと考えられる。したがって、4 g/kg 経口投与の場合の高い肝組織内濃度(Table N)が、高投与量による肝内代謝過程の飽和によってそこに残っていると考えるには無理があり、0.4g/kg および0.04g/kg の経口投与の場合に、血漿中および肝組織中にはほとんど検出されないことは吸収に何らかの non-linear な過程が介在することを示唆しているものと考えられる。タンパク質の投与量と消化管からの吸収量に関する non-linear な現象として、Megel³²⁾は成熟ラットにトリプシンを経口投与した場合の血漿中濃度は125mg/kg、250mg/kg の投与量ではほとんど上昇せず、500mg/kg を投与した場合において有意な上昇を認めている。そして彼らはその理由にトリプシンが消化管腔内の酵素により不活化されることをあげている。しかし、T- β -galactosidase の場合には、7日齢のラットに4 g/kg の用量で経口投与した後、4時間の消化管からはほぼ全量が回収されており(Table II)、また、ウレタン麻酔下、7日齢のラットに0.04g/kg の用量で十二指腸内に投与し、1時間後および2時間後の小腸からはほぼ全量が回収されたことから、小腸での分解はほとんどないものと思われる。したがって、本剤の場合には、消化管腔内での不活化により吸収に非線形がみられたと考えることにも無理があるように思われる。現在

のところ、幼若ラットでの T- β -galactosidase の吸収に見られる non-linear な現象の理由は一般に認められる carrier mediated transport のパターンと逆であることから常法に従った取り込み阻害実験などによりこの理由を解明することは困難と思われ、今後に残された問題といわなければならない。

チラクターゼを7日齢のラットに4 g/kg の用量で経口投与した場合について、吸収率の算出を試みた。T- β -galactosidase の血漿中からの速やかな消失は、Fig. 6 に示すように肝、脾に高濃度に取り込まれることは明らかであり、肝からの消失は緩慢で、長時間にわたり肝、脾に認められた。したがって、血漿中濃度の AUC の代わりに肝組織内濃度の AUC を用いて比例計算によりその吸収率の算出を試みた。経口投与後および静注後の肝組織内濃度の AUC は、それぞれ 79,801 ng·hr/ml および 171,968 ng·hr/ml であった。すなわち、経口投与の場合は、静注に比べ投与量が200倍以上であるにもかかわらず、AUC は約1/2である。したがって、チラクターゼを7日齢のラットに4 g/kg の用量で経口投与した場合の吸収率は0.2%程度であり、経口投与された T- β -galactosidase のうち吸収されて循環血中に達したものはごく僅かな部分にすぎず、これは消化管腔内からの回収実験のデータからその吸収率は非常に低いと考えられたことと一致す

る。しかしながら、経口投与 (Table I, M) および静注 (Fig. 4) した場合に、投与量と血漿中濃度または肝組織内濃度の間に non-linear な現象が認められたことから、その点を考慮すると、T- β -galactosidase の吸収率を数値的に推定することは単純にはできないと思われる。

タンパク質の消化管からの吸収を認めている種々の実験のほとんどが臨床用量をはるかに越える大量投与の場合である。チラクターゼ製剤 (ミルラクト®) の乳児における1回の臨床用量は0.25~0.5 g (1,250~2,500 ONPG単位) とされ、8 kg の乳児では150~300 ONPG単位/kgを投与することになり、300 ONPG単位/kg は、本実験に用いたチラクターゼ0.03 g/kg に相当する。したがって、動物実験における経口投与量0.04 g/kg は臨床用量付近であり、4 g/kg (チラクターゼ4 g/kg は T- β -galactosidase として268 mg/kg) は臨床用量に比して約100倍と高い投与量であることを考えると、臨床用量レベルではヒトの消化管から吸収される可能性は極めて低いものと思われる。しかし、トリブシンがヒト (成人患者) の消化管から吸収されるという報告³³⁾ や、新生児の腸管から抗体が免疫活性を失わない状態で吸収される^{34,35)} ことなどが明らかにされていることから、臨床上の使用に当たって、特に新生児については、吸収の可能性に配慮することが望ましい。

文 献

- 1) 江幡光雄, 三宅幸雄, 成田昌子, 小泉謙三, 続木博茂, 藤原孝司, 森原和之: Penicillium multicolor の β -galactosidase について. 最新医学, **39**: 192-201 (1984).
- 2) 村岡義博, 伊藤文男, 吉崎敏夫, 原田喜男: チラクターゼの幼若動物における急性および亜急性毒性試験. 基礎と臨床, **18**: 2349-2362 (1984).
- 3) 長谷川隆司, 松田文子, 中沢政雄, 原田喜男: チラクターゼの急性および亜急性毒性試験. 基礎と臨床, **18**: 2331-2348 (1984).
- 4) 村岡義博, 矢原 功, 吉崎敏夫, 原田喜男: チラクターゼのラットにおける慢性毒性試験. 基礎と臨床, **18**: 2386-2404 (1984).
- 5) 村岡義博, 吉崎敏夫, 西山 進, 上田元彦, 原田喜男: チラクターゼのイヌにおける亜急性毒性試験. 基礎と臨床, **18**: 2363-2385 (1984).
- 6) 神木照雄: S-2107の臨床第一相試験. 基礎と臨床, **17**: 432-446 (1983).
- 7) 三河春樹, 四宮敬介, 臼井朋包, 桜井 実, 伊藤 忠, 鳥居昭三, 浜本虎太, 赤石強司, 水江日出成, 末広文彦, 林寺 忠, 小川暢也: 乳児下痢症に対する S-2107 の薬効評価. 小児科診療, **47**: 412-421 (1984).
- 8) 本永正光, 谷口恭治, 佐々木 聖: 乳糖不耐症におけるチラクターゼの臨床評価. 基礎と臨床, **18**: 597-602 (1984).
- 9) Togari, H., Watanabe, I., Kamiya, K., Kito, H., and Sugiyama, K.: Clinical and in vitro experimental studies of β -galactosidase (S-2107) for in

- fantile diarrhea. *Nagoya Med. J.*, **29** : 53-62 (1984).
- 10) 江幡光雄, 成田昌子, 小泉謙三: Tilactase の乳糖分解酵素作用 (その I). 最新医学, **39** : 2415-2422 (1984).
 - 11) 棚野義博, 金谷 尚: チャクターゼの乳糖分解酵素作用 (その II). 最新医学, **39** : 2423-2430 (1984).
 - 12) Wilson, T.H.: "Intestinal Absorption" W. B. Saunders Co., Philadelphia London, pp. 212-219 (1962).
 - 13) Moriya, H., Moriwaki, C., Akimoto, S., Yamaguchi, K., and Iwadare, M.: Studies on the Passage of α -Chymotrypsin across the Intestine. *Chem. Pharm. Bull.*, **15** : 1662-1668 (1967).
 - 14) Kabacoff, B.L., Wohlman, A., Umhey, M., and Avakian, S.: Absorption of Chymotrypsin from the Intestinal Tract. *Nature*, **199** : 815 (1963).
 - 15) Warshaw, A.L., Walker, W.A., Cornell, R., and Isselbacher, K.J.: Small intestinal permeability to macromolecules, transmission of horseradish peroxidase into mesenteric lymph and portal blood. *Lab. Invest.*, **25** : 675-684 (1974).
 - 16) 小川信久, 田島英男, 樹下高明, 田島喜久子: チトクローム C の腸管吸収に関する免疫化学的研究. 生化学, **42** : 718-725 (1970).
 - 17) Katayama, K., and Fujita, T.: Studies on biotransformation of elastase. *Biochim. Biophys. Acta*, **288** : 181-189 (1972).
 - 18) Yuzuriha, T., Katayama, K., and Fujita, T.: Studies on biotransformation of lysozyme. *Chem. Pharm. Bull.*, **23** : 1309-1314 (1975).
 - 19) Watanabe, Y., Kibesaki, Y., Takenishi, S., Sakai, K., and Tsujisaka, Y.: Purification and properties of β -galactosidase from penicillium citrinum. *Agric. Biol. Chem.*, **43** : 943-950 (1979).
 - 20) Metzler, C.L., Elfring, G.L., and McEwen, A.J.: A users manual for NONLIN and associated programs. The Upjohn Co., Kalamazoo, Mich., 1974.
 - 21) Warshaw, A.L., Walker, W.A., and Isselbacher, K.J.: Protein uptake by the intestine: evidence for absorption of intact macromolecules. *Gastroenterology*, **66** : 987-992 (1974).
 - 22) Williams, E.W., and Hemmings, W.A.: Intestinal uptake and transport of proteins in the adult rat. *Proc. R. Soc. Lond. B.*, **203** : 177-189 (1978).
 - 23) 佐藤重夫, 折居忠夫, 中尾 亨, 室谷 浩: β -galactosidase 製剤の腸管からの吸収と GM₁-gangliosidosis への投与の試み. 医学のあゆみ, **91** : 111-112 (1974).
 - 24) Brambell, F.W.R.: The passive immunity of the young mammal. *Biol. Rev.*, **33** : 488-531 (1958).
 - 25) Butler, J.E.: Synthesis and distribution of immunoglobulins. *J. Am. Vet. Med. Assoc.*, **163** : 795-798 (1973).
 - 26) Kraehenbuhl, J.P., and Campiche, M.A.: Early stages of intestinal absorption of specific antibodies in the newborn. *J. Cell. Biol.*, **42** : 345-365 (1969).
 - 27) Stradley, R.P., and Yeary, R.A.: Site of horseradish peroxidase transport by the small intestine of the neonatal rat. *Biol. Neonate*, **31** : 167-172 (1977).
 - 28) Clark, S.L.: The ingestion of proteins and colloidal materials by columnar absorptive cells of the small intestine in suckling rats and mice. *J. Biophysic. Biochem. Cytol.*, **5** : 41-65 (1959).
 - 29) Comline, R.S., Roberts, H.E. and Titchen, D.A.: Route of colostrum globulin in the newborn animal. *Nature, Lond.*, **167** : 561-562 (1951).
 - 30) Balfour, W.E., and Comline, R.S.: Acceleration of the absorption of unchanged globulin in the new-born calf by factors in colostrum. *J. Physiol.*, **160** : 234-257 (1962).
 - 31) Kim, D.C., Sugiyama, Y., Sato, H., Fuwa, T., Iga, T. and Hanano, M.: Kinetic analysis of in vivo receptor-dependent binding of human epidermal growth factor by rat tissues. *J. Pharm. Sci.*, **77** : 200-207 (1988).
 - 32) Megel, H., Strauss, R., Ho, R., and Beiler, M.: Detection of trypsin-like

- activity in the plasma of rats after oral administration of trypsin. *Arch. Biochem. Biophys.*, **108** : 193-199 (1964).
- 33) Miller, J.M., Williard, R.F., and Polachek, A.A. : An investigation of trypsin ^{131}I in patients. *Exp. Med. Surg.*, **18** : 352-370 (1960).
- 34) Leissring, J.C., Anderson, J.W., and Smith, D.W. : Uptake of antibodies by the intestine of the newborn infant. *Amer. J. Dis. Child.*, **103** : 160-165 (1962).
- 35) Boorman, K.E., Dodd, B.E., and Gunther, M. : A consideration of colostrum and milk as sources of antibody which may be transferred to the newborn baby. *Arch. Dis. Childh.*, **33** : 24-29 (1958).