論 講

カロチノイドの生化学 V

T. W. Goodwin

果物のキサントフィル

果物のキサントフィルについては葉のキサントフィルと次の三点で異なっている。(a) 大部分エステル化されている。(b) 葉の場合と異なつた量的分布を示している。(c) 多くの果物はその果物自体特異のキサントフィルを含んでいる。

Cryptoxanthin³⁷⁾ は葉に根跡しか存在していないが、タンバホーズキ *physalis alkekengi* L. (P franc-hetti Hort)¹⁶⁹⁾ の漿果から初めて分離され、総カロチノイドの 1/3 を構成している。即ち Karrer, Schlientz¹⁷⁰⁾ はバンクワジュ、*carica papaya* およびポンカン、*Citrus poonensis* から分離された色素を *caricaxanthin* と命名し、*cryptoxanthin palmitate* であると認めた。

スペイン産オレンジの果皮には β -carotene より cryptoxanthin¹⁷¹⁾¹⁷²⁾ が多く存在し、この色素は印度産オレンジ¹⁵⁷⁾ の果肉では総カロチノイドの約30%を占めているが、果皮では僅かに少ない(25%)。タンバホーズキの成熟漿果の深紅色素 *physalien*¹⁷³⁾ は *zeaxanthin dipalmitate*⁴⁰⁾ である。未熟の萼片に *zeaxanthin*¹⁷⁴⁾ は存在しない。*zeaxanthin* は明らかに *palm Cycar revoluta*¹⁷⁵⁾ の果物では主要なカロチノイドである。またカキ¹⁷⁶⁾ *Diospyros kaki* にも分布している。*violaxanthin* と *flavoxanthin* はシャリンタウ属 *Cotoneaster occ-identalis*⁹⁵⁾ および *Prycanthe coccinea* の漿果に夫々認められている。多数の品種の特異性をもっているキサントフィルが分離されている。イチキ、Gew (*Taxus baccata*) から *rbodoxanthin*¹⁷⁷⁾、バラの実 *Rosa rabiginosa* から *rubixanthin*¹⁷⁸⁾、イヌホボズキ *Solanum dulcamara* から *lycoxanthin* および *lycophyll*¹⁷⁹⁾、赤色胡椒、*Capsicum annuum* から *capsorubin* および *Capsanthin*¹⁸⁰⁾、ツルウメドキ *Celastrus scandens* から *celaxanthin*¹⁸¹⁾、オレンジから *citroxanthin*¹⁸²⁾、キイチゴ *Euonymus europaeus* から *antheraxanthin*¹⁸³⁾ 等。*Citroxanthin* は最近 *mutatochrome*¹⁸⁴⁾ として証明されている。

次表に掲載されている果物のキサントフィルの最も重要な特色は二つの新しい型のカロチノイドである。(a) Carboxyl 基を含むもの、即ち *Rhodoxanthin*、*Capsorubin*、および *Capsanthin* (b) 酸素原子が furan 環 (5:8-epoxide) に結合しているもの、*mutatochrome*。*rbodoxanthin* に関しては、ハナルチャ属 *Haworthia coarctata* v. *Krausii*¹⁸⁵⁾ および *Ceratozamia mexicana* の葉に分布していることは注目すべきである。

果物のカロチノイドについての化学および分光学的データは第4表に記載され、また多数の品種に於ける定性的な分布は第5表に記載されている。

果物の成熟

果物のカロチノイド含量は成熟とともに増加することは多数の研究者により認められている。例えば赤色胡椒のカロチン含量は緑色胡椒の30倍以上である。同様な結果がオレンジの果皮、果肉、オレンジ汁、タウナス、野バラの実 *R. Spaldingii*¹⁸⁶⁾¹⁸⁷⁾、*R. Cinnamomea*¹⁸⁸⁾¹⁹⁰⁾、*R. rugosa*¹¹¹⁾、トマト¹⁴⁵⁾、マンゴー¹⁹³⁻¹⁹⁶⁾、および多数の蜜柑類

..... Citroxinanthin (mutatochrome)
(エタノール)

— Rhodoxanthin (ヘキサン)

図11. Citroxinanthin(Mutatochrome)(: Karrer, P., and Jucker, E. (1947)Helv. chim. Acta, 30 (536.)

Rhodoxanthin(: Kuhn, R., and Brockmann, H. (1933)Ber. deutch. Chem. Ges, 66. 828)

— Capsanthin (ベンゼン)

..... Eschscholtzanthin (エタノール)

図12. Capsanthin (Zechmeister, L (1944) Chem. Rev., 34, 267)

Eschscholtzanthin(:Strain, H. H. (1938) J. biol. chem., 123, 425)

表4 果物のカロチノイド

色 素	融 点	吸 収 ス ペ ク ト ル 極大 (m μ)				
		二硫化炭素	クロロホルム	石油エーテル (b. p. 60~80°)	ヘ キ サ ン	ベンゼン
Pro- α -Carotene ¹⁶³	118-119°	493.5, 460.5	473, 444	464, 435		477, 447.5
δ -Carotene ^{120,147}	—	526, 490, 457	503, 470, 440	488, 456, 430 $\times$	490, 458, 428	
ζ -Carotene ¹⁵¹	—				425, 400, 378	
Lycopene ¹²⁵	175°	547, 507	520, 485, 456	506, 474		
Prolycopene	111°	500.5, 469.5	484, 453.5	470, 443.5		485.455.5
Poly-cis-lycopene I ¹⁶⁵	93-95°				444—445	
Poly-cis-lycopene II ¹⁶⁵	85-87°				441—442	
Poly-cis-lycopene III ¹⁶⁵	105-106°				443—446	
Poly-cis-lycopene IV ¹⁶⁵	—				426	
Poly-cis-lycopene IV ¹⁶⁵	—				431—432	
Poly-cis-lycopene VI ¹⁶⁵	—				433	
Tetrahydrolycopene (? neurosporene) ¹⁴⁶	124°				433, 410+	
Protetrahydrolycopene ¹⁴⁵	—				430, 407+	
Phytofluene ¹⁶⁰	—				332, 348, 367—8	338, 355, 374
Phytoene ¹⁴⁵	—				275, 285, 296 $\times$	
Tetrahydrophytoene ¹⁴⁶					2, 220	
Unknown II ¹⁴³					453, 428+	
Rhodoxanthin ¹⁷⁷	219°	564, 525, 491	546, 510, 482	521, 487, 454	524, 489, 458	542, 503.5, 474
Rubixanthin ¹⁷⁸	160°	533, 494, 461	509, 474, 439	495.5, 463, 432	494, 462, 432	
Lycoxanthin ¹⁹⁷	168°	547, 507, 473		503, 472, 443		521, 487, 456
Lycophyll ¹⁷⁹	179°	546, 506, 472		504, 473, 444		505, 474, 444
Capsorubin ¹⁸⁰	198-201°	543, 503.5, 470		507, 474, 444	502, 470, 471	524, 489, 455
Capsanthin ¹⁸⁰	175-176	542, 503		504, 474.5		520, 486
Celaxanthin ¹⁸¹	209-210	562, 521, 487		520, 486.5, 456		
Citroxanthin ^{182,183} (Mutatochrome)	167°	489.5, 459		456, 427		

+ 報告された曲線から得たもの, $\times$ iso-octane で測定された。

¹⁹⁷⁾の果物について認められている。然しながら初期の報告によればバナナの皮は熟成中、一定のカロチノイド含¹⁹³⁾量を保持している。果物の果皮は屢々カロチノイドの最も高濃度の部位のものである。例へばリンゴの果皮は新鮮物の5倍の濃度をもっており、一方オレンジの総カロチノイドの50~75%が果皮に存在している。¹⁹⁷⁾成熟果物のカロチノイド蓄積が同程度の葉緑素消失を伴うことは葉緑素がカロチノイドへの転移の可能性について可成りの推測を与えている。この場合は成熟中のカロチノイドの分布に生ずる質的变化を考慮することが重要である。一般的には総カロチノイドの増加と carotene : xanthophyll の比率の増加(カロチンの優先的な生成、特にマンゴーに顕著である)¹⁰³⁾およびエステルとして存在するキサントフィル量の増加とが指示を与えている。

¹⁷⁶⁾Kuhn および Brockmann はタンバホーツキの緑色の萼片のカロチノイド分布は緑葉(xanthophylls : carotene, 3 : 1)と全く同様である。成熟につれて人工的に酸素の存在で lutein (キサントフィル) が消*

表5 果物及び種子のカロチノイド分布

	α -Carotene	β -Carotene	γ -Carotene	Lycopene	δ -Carotene	ϵ -Carotene	Lutein	Rhodoxanthin	Cryptoxanthin	Zeaxanthin	Lycophyll	Lycoxanthin	Violaxanthin	Rubixanthin	Taraxanthin	Mutatochrome	Capsanthin	Celaxanthin	Antheraxanthin	文 献
<i>Actinophloeus angustifolia</i> ...				+																2
<i>A. macarthuri</i>				+																2
<i>Aglaonema nitidūm</i> } <i>A. oblongifoliūm</i> } <i>A. simplex</i> }				+																2
<i>Auamas sativus</i>		+					+													14
<i>Arbutus unedo</i>	+	+		+			+		+	+			+							49
<i>Archontophoemix alexandrae</i>				+																2
<i>Areca alicae</i>				+																2
<i>Arūm italicūm</i>				+																2
<i>A. maculatūm</i>				+																12
<i>A. orientale</i>		+		+			+													12
<i>Asparagus officinalis</i>									+											15
<i>Attalea gomphococca</i>		+																		6
<i>Bryonia dioica</i>				+																2, 15.
<i>Butia capitata*</i>																				13
<i>Calyptrocalyx spicatus</i>				+																2
<i>Capsicūm annoūm</i>																+	+			18, 47, 76
<i>C. frutescens</i>		+															+			50, 59
<i>C. Japomcūm</i>		+																		70
<i>Carica papaya</i>									+				+							46, 47
<i>Celastrūs scandens</i>		+																+		66
<i>Citrus aurantiūm</i>	+			+			+		+	+			+			+				32, 35, 77
<i>C. grandis</i>	+			+																36
<i>C. madurensis</i>				+			+		+	?			+							38
<i>C. ponensis</i>		+					+		+				?							39
<i>Citrullus vūlgaris</i>	+	+	+	+																59, 60
<i>Convallaria majalis</i>	+	+	+	+			+													15, 16
<i>Cotoneaster occidentalis</i>							+						+							21
<i>Cūcūmis citrullus</i>				+																67, 68
<i>Cucūrbita maxima</i>	+	+					+						+							61
<i>Cuscuta subinclusa</i>															+					} 72, 73
<i>C. salina</i>														+						
<i>Cycas revoluta</i>										+										69
<i>Diospyros costata</i>	+	+		+					+											52
<i>D. Kaki</i>				+					+											53
<i>Elaeis gūineensis</i>		+		+																7, 8
<i>Elaeis melanococca</i>		+		+																7

	α -Carotene	β -Carotene	γ -Carotene	Lycopene	δ -Carotene	ξ -Carotene	Lutein	Rhodoxanthin	Cryptoxanthin	Zeaxanthin	Lycophyll	Lycoxanthin	Violaxanthin	Rubixanthin	Taraxanthin	Mutatochrome	Capsanthin	Celaxanthin	Antheraxanthin	文 献
Erythroxyton coca				+																2
E. novogranatense				+																30, 31
Euonymus europacus				+						+								+		42, 75, 78
E. japonicus				+																13
Gonocaryum obovatum	+	+	+	+																} 15, 16
G. pyriforme	+	+	+	+	?															
Gossypium spp.		+					+													43, 44
Hippophae rhamnoides									+											12
Iris pseudacorus													+							74
Lathyrus sativus			+																	83
Luffa spp.		+					+													62
Lycium barbaratum										+										15
L. hamimifolium										+										54
Lycopersicum esculentum		+	+	+		+														55, 56, 71
L. hirsutum		+	+	+		+														} 26, 71
L. peruvianum		+	+	+		+														
Mangifera indica	+	+					+													79, 80
Momordica balsamina				+			+													40, 41
M. charantia		+		+																63, 64
Musa paradisiaca		+					+													64
Nenga polycephalus			+																	19
Pandanus polycephalus			+																	2
Passiflora coerulea			+																	2
Physalis alkekengi									+	+										45
Prunus armeniaca		+	+	+																57
P. persica			+				+		+	+										21
Ptychandra elegans				+																22
P. glanca				+																2
Pyracantha angustifolia		+																		2
Pyrus aucuparia		+																		20, 81, 82
Rosa canina		+	+	+		+			+					+	+					71
R. damascena		+	+	+		+			+					+	+					24, 25
R. rubiginosa		+	+	+		+			+					+	+					25
R. rugosa	+	+	+	+										+	+					26
Rubus chamaemorus	+	+	?	+						+				+	+					27
Sabal serrulatum			+																	9
Seaforita elegans				+																68
Solanum balbisii				+																2
S. decasepalum				+																10
S. dulcamara											+	+								18
S. esculentum				+							+									13
S. hendersonii										+										15
S. lycopersicum		+		+			+													58
Sorbus aucuparia	+	+																		28, 29
Synaspadix petrichiana				+																2
Tabernaemontana pentasticta				+																2
Tamus communis				+							+	+								17, 18
Taxus baccata								+												1
Trichosanthes spp.				+																65
Triticum vulgare		+					+													3
Vaccinium vitis-idaea		?		+			+			+										48
Vigna sinensis		+					+													30
Zea mays	+		+			+	+		+	+										4, 5, 54

表 5 の 参 考 文 献

- 1) Kuhn, R., and Brockmann, H. (1933), Ber. deutsch. chem. Ges., 66, 828
- 2) Llubimeko, V. IV. (1914), Rev. gen. Bot., 25, 475.
- 3) Palmer, L. S. (1922), Caroténoids and related pigments, New York. Chem. Catalog. Co
- 4) Karrer, P., Salomon, H., and W Ehrli, H. (1929), Helv. chim. Acta, 12, 790.
- 5) Kuhn, R., and Grundmann, C. (1934), Ber. deutsch. Chem. Ges., 67, 596.
- 6) Blackie, W. J., and Cow Gill, G. R. (1939), Food Res., 4, 129.
- 7) Gill, A. H. (1917, 1918), F. Ind. Eng. Chem., 9, 136; 10, 612.
- 8) Brash, W. (1926), F. Soc. Chem. Ind. 9, 136.
- 9) Griebel, C., and Bames, E. (1916), Z. Unter. Nahrgrs. Genüssmittel, 31, 282.
- 10) Lubimenko, V. N. (1920), Mem. Acad. Sci. Petrograd, 33, No. 8.
- 11) Kylin, H (1929), Hoppe-Seyl. Z., 163, 229.
- 12) Karrer, P., and Wehrli, H. (1930), Helv. Chim. Acta, 13, 1104.
- 13) Zechmeister, L., and Schroeder, W. A. (1942), J. Biol. Chem., 144, 315.
- 14) Magistad, O. C. (1935), Plant Physiol., 10, 187.
- 15) Winterstein, A., and Ehrenberg, U. (1932), Hoppe-Seyl. Z., 207, 25.
- 16) Winterstein, A. (1933), Hoppe-Seyl. Z., 215, 51; 219, 249.
- 17) Zechmeister, L., and Cholnoky, L. (1930), Ber. deutsch. chem. Ges., 63, 422.
- 18) Zechmeister, L., and Cholnoky, L. (1936), Ber. deutsch. Chem Ges., 69, 422.
- 19) Loesecke, H. V. (1929), F. Amer. Chem. Soc., 51, 2439.
- 20) Karrer, P., & Rutschmann, J. (1945), Helv. Chim. Acta, 28, 1528.
- 21) Brockmann, H. (1933), Hoppe-Seyl. Z., 216, 45.
- 22) Mackinney, G. (1935), Plant Physiol., 10, 365.
- 23) Escher, H. H. (1928), Helv. chim. Acta, 11, 752.
- 24) Karrer, P., and Widmer, R. (1928), Helv. Chim. Acta 11, 751.
- 25) Kuhn, R., and Guundmann, C. (1934), Ber. deutsch. chem. Ges., 67, 339.
- 26) Willstaedt, H. (1935), Svensk. Kem. Tidsky., 47, 112.
- 27) Willstaedt, H. (1936), Skand, Arch. Physiol., 75, 155.
- 28) Kuhn, R., and Lederer, E. (1931), Ber. deutsch. Chem. Ges., 64, 1349.
- 29) Euler, H. V. (1933), Ark. chem. Mineral Geol., 1933, 11B, No. 18.
- 30) Hilbert, G. E., and Jansen, E. F. (1934), J. Biol. Chem, 106, 97.
- 31) Zimmermann, J. (1932), Rec. trav. chim. Pays. Bas., 51, 1001.
- 32) Zechmeister, L., and Tuzosn, P. (1934) Naturwiss, 19, 307.
- 33) Vermast, P. G. F. (1931), Naturwiss, 19, 442.
- 34) Zechmeister, L., and Tuzson, P. (1936, 1937), Ber. deutsch. chem. Ges., 69, 1878; 76, 1988.
- 35) Karrer, P., and Jucker, E. (1944, 1947), Helv. Chim. Acta, 27, 1695; 36, 536.
- 36) Matlack, M. B. (1935), J. Biol. Chem, 110, 249.

- 37) Matak, M. B. (1934), *Proc. Nat. Acad. Sci. Wash.*, 24, 385.
- 38) Zechmeister, L., and Tuzson, P. (1933, 1936) *Hoppe-Seyl. Z.*, 221; 278; 240, 191.
- 39) Yamamoto, R. and Tin, S. (1933) *Sci. Pap. Inst. phys. chem. Res. Tokyo*, 20, No. 411.
- 40) Yamamoto and Osima. Y., and Goma, T. (1933). *Sci. Dull. Inst. Phys. Chem.*
Res. 19, 122.
- 41) Ramasarma, G. B., Rao, S. D., and Hakim, D. N. (1936), *Biochem. J.*, 40, 657.
- 42) Zechmeister, L., and Szilard, K. (1930). *Hoppe-Seyl. Z.*, 190, 67.
- 43) Gill, A. H., and Grcenup, J. (1929), *Dil. Fat. Ind.*, 5, 288.
- 44) Jamieson, G. S., and Baudhman, W. F. (1924). *Cotton Oil. press*, 7, 29.
- 45) Karrer, P., Rubel, F., and Strongf. M. (1935). *Helv. Chim. Acta.* 19, 28.
- 46) Yamaoto, R., and Tin, S. (1933), *Pap. Inst. phys. Chem. Res.*, 12, Bull, 354.
- 47) Karrer, P., and Schlientz, W. (1934). *Helv. Chim. Acta*, 17, 7.
- 48) Willstaedt, H. (1936) *Svensr, Kem. Tidskr.*, 48, 212.
- 49) Schon, K. (1935). *Biochem. J.* 29. 1782.
- 50) Zechmeister, L., and Cholnoky, L. W. (1931), *Liebigs. Ann.*, 489, 1.
- 51) Brown, W. M. (1935), *J. Biol. Chem*, 110, 91.
- 52) Schon, K. (1935), *Biochem. J.*, 29, 1779.
- 53) Karrer, P., Morf, R., Krauss, E. V., and Zubrys, A. (1932), *Helv. Chim. Acta*, 15, 490
- 54) Zechmeiser, L., and Cholonoky, L. V. (1930), *Liebigs Ann.*, 481, 42.
- 55) Willstatter, and Escher, H. H. (1910), *Hoppe-Seyl, Z.*, 64, 47.
- 56) Matlack, M. B., and Sando. E. (1934). *J. Biol. Chem*, 104, 407.
- 57) Kuhn, R., and Grundmann. (1933), *Ber. deutsch. Chem. Ges.*, 66, 1746.
- 58) Brass, K., Beyrodt, A., and Mattausch, J. (1937) *Naturwiss.*, 25, 60.
- 59) Zechmeister, L., and Tuzon, P. (1930), *Ber. sentsch. Chem. Ges.*, 63. 2881.
- 60) Zechmeister, L., and Poldar, A. (1941), *J. Biol. Chem.*, 139, 193.
- 61) Zechmeister, L., and Tuzon, P. (1934), *Ber. deutsch. chem. Ges.*, 67, 824.
- 62) Codnew, T. N., and Korschenewsky. K. (1930), *Planta*, 10, 811.
- 63) Tobler, G., and F. (1910), *Ber. dtsch. bot. Ges.*, 28, 365, 496.
- 64) Duggar, B. M. (1913), *Washington Univ. Studies*, 1. 22.
- 65) Monteverde, N. A., and Lubimenko, V. N. (1913), *Bull. Acad. Sci. Petrograd*,
II, 1105.
- 66) Le Rosen, A. L., and Zechmeister, L. (1942), *Arch. Biochem.*, 1, 17.
- 67) Winterstein, A., and Ehrenberg, U. L. (1933), *Hoppe-Seyl. Z.*, 207, 25.
- 68) Zechmeister, L. (1950), *Progressin Chromatography* (1938—1947), London, Chapman &
Hall.
- 69) Manunta, C. (1939), *Helv. Chim. Acta.* 22, 1153.
- 70) Zechmeister, L., and Cholnoky, L. V. (1934), *Liebigs Ann*, 509, 269.

要でないことを指示している。然しながら光の適確な役割についての知識は乏しく、時には反論もある。トマト生産品種について、暗所で袋に入れ、蔓とともに成熟したトマトではそのカロチノイドは、明所で生育したものより少いという観察は光化学的因子がカロチン生合成 (carotenogenesis) に関与することを指示している。然しながらこの盛んな合成力は白色 Clark's albino および黄色トマト Ruby Gold およびモモ Elberta peaches, スパイモモ Humbolt nectarines およびアンズ Rorotal apricots の場合に暗所でも明らかに存在している。これは変種および種の相違によるかも知れぬが、温度のような他の不定の因子が作用しているかも知れぬ。光と温度の化学的効果を別々に取扱うことは困難であり、温度的な因子はカロチノイドの生合成に重要なものである。生合成にとつてもう一つの未だ充分に探究されていない因子は光の最適の強さであり、またその最適の強さは各カロチノイド構成成分に対して変化する可能性がある。例へば正常の日光中の成熟トマトでは lycopene が β -Carotene の生合成よりも速やかに進行するが、強い光では lycopene の生合成は緩慢になり、 β -Carotene の生合成は速くなる。

lycopene は明らかにトマトの主な色素であるから、強い光それ自体の影響は合成されるカロチノイドの総量を相当減少せしめるであろう。

また日蔭のトマトはたとえ生理的に未熟であるけれども陽に充分曝されたものより更に多くのカロチノイドを含むという証明もある。此処で重要な表現は“充分”という意味である（恐らく高温をも兼指する）。即ち同じ木の同じ時期のオレンジのカロチノイド含量はオレンジの日向によつて変化する。日光に面しているものは面していないものより多くのカロチノイドを含んでいる。この変化は同じ品種についても観察されうる。カロチンの生成に紫外線も一役演ずることは、トマトが温室で成熟すると戸外のものより紫外線に曝されないから、カロチノイド含量が少いという報告により暗示されている。可視光線の場合と同様紫外線は黄色変種に於いてはカロチン生合成を妨げる。然しながら市販緑色品種のトマトに直接紫外線を照射すると葉緑素の消失をおくらせカロチンの出現をも妨げるが、一方摘取したマンゴでは紫外線は生成されるカロチノイド量を明らかに増加する。

(iii) 温度

1913年頃、Daggar は未熟のトマトが 30°C で貯えられた場合に、カロチノイドの生成が行われなことを認めた。これは最近 Went, Le Rosen および Zechmeister, Me Collum および Ellis, Hamner, および Sadana, Ahmad によつて確かめられた。Ellis および Hammer 等は緑色のトマトを $70\sim 80^{\circ}\text{F}$ に貯えると赤くならぬが黄桃色になるのを認めた。Wet および Sadana, Ahmad は未熟のトマトが 30°C 以上に貯えられると他のカロチノイドの生成が妨げられないが、lycopene が生成されないことを認めた。

然しながら温度が低いと lycopene がすぐ現われるから、lycopene 生成の機構は影響されなかつた。lycopene 生成には適温 19°C が認められた。Mc Collum は高温が lycopene 生成を妨げることを確かめ、また Sadana, Ahmad はカロチンの生成には 38°C より 34°C の方が適温であると認めた。

摘みとられた未熟のマンゴのカロチノイド含量は貯蔵中の熟成につれて増加する。これ等のカロチノイド生成率は高い貯蔵温度では促進されるが、合成される最終含量は温度変化によつて影響されないことを銘記すべきである。

(iv) 他の因子

土壌の鉱物質栄養素の変化はトマトのカロチノイド含量に何等効果を与えないという報告がある。同様に β -naphthoxyacetic acid の処理はカロチン含量に何等変化を生ぜしめない。