各種カルシウム鹽類の生体内利用に関する 實驗的研究 (その 4)

飼料中のカルシウム含有量の多寡のカルシウム利用率に及ぼす影響。

Experimental study on the availability of various calcium sources *in vivo*. (Part. 4)

Effects of increasing the calcium content of a diet to the availability of calcium.

国立栄養研究所 速 水 決 吉 村 喜 久 子
H. Hayami K. Yoshimura

池 内 賢 江 佐 藤 春 恵
Y. Ikeuchi H. Sato

緒言 吾々は^{1) 2)} Ca の給源を探究し、その成績の一部を既に發表したが、かきがら粉末、骨粉等もその飼料中の Ca 含有量及び磷との比率を考慮して用いれば、何れも Ca 源として充分利用出来ることを確めた。然し實際問題としてはそれ等を用う場合の量的關係、即ちそれ等の Ca 源は一體どの程度迄使用しても差支えないものか、或は飼料中にどの程度含まれた時に最もよく利用され、最もよい効果を収めるものか等をはつきりして置く必要がある。

飼料中の Ca 含有量と白鼠の体内に沈着する Ca 量との關係については、Sherman,³⁾ Booher;⁴⁾ Sherman, Campbell;⁵⁾ Whitcher, Booher, Sherman;⁶⁾ Toepfer, Sherman;⁷⁾ Cox, Imboden;⁸⁾ Landford, Sherman;⁹⁾ Duyne, Landford, Toepfer, Sherman 等既に澤山の報告がある。

これ等の成績を概括して見れば飼料中の Ca 含有率 0.2% は白鼠に對し至適域の最低であり、含有量をその 2, 3, 4 倍と増加したところ、成長、授乳、生活力、死亡率等の點から見て何れもよい結果が得られた。又体内に沈着する Ca 量も略々それに従つて少しずつ増加するが、0.53% 以上では殆んど差は認められず、結局その含有量が 0.49%, 0.64% あたりが最もよい成績であつた。尙 0.8% でも何等の悪影響も認められなかつたが、更に増加して 2.45% にすると、Ca/P の如何に關係なくその結果は不良であつたという。⁷⁾

これ等の報告は主として Ca の沈着量について論ぜられているが、その利用率については觸れていない。しかし實生活に應用する場合には經濟のことも考慮しなければならないので、吾々は飼料中の Ca 含有量の多寡によるその体内沈着状況と同時にその利用率をも併せて考察することにした。

I 低 Ca 實驗 吾々はボレー末 (かきがら粉末の一種で主として炭酸 Ca) の實驗に於て、¹⁰⁾

飼料中の Ca 含有量を對照群（標準鹽類使用）と略々等しくするために、標準鹽類中の乳酸 Ca 37 g の代りにボレー末 12 g 加えた混合鹽類を飼料 100 g 中に 3% の割に加えた所、Ca の利用率に於て、乳酸 Ca に比して決して遜色ないのみか、寧ろそれを凌駕する様な成績を得たので、今回はこのボレー末鹽類を對照群の混合鹽類として用いることにした。

混合鹽類及び飼料の調製 對照群の混合鹽

第 1 表

類の Ca と磷との比 (Ca:P) は略々 1:1.5 であるが、低 Ca 群に於ては計算上 Ca が P の $\frac{1}{7}$ 程度になる様、對照群の 12 g に對し 2.6 g のボレー末を加えて混合鹽類を作つた。尙それ等の鹽類の出來上り量から計算して混合鹽類の配合割合を、對照群の 3% に對し、低 Ca 群では 2.4% とすればカルシウム以外の鹽類は略々同一程度含まれることになる。

各群の飼料の配合及び飼料中の Ca, 磷の實測値並にその比率を示せば第 1 表の如くなる。

	對 照 群	低 Ca 群
デキストリン	66	66.6
カゼイン	18	18
大豆油	7	7
混合鹽類	3	2.4
酵母	3	3
肝油	3	3
カルシウム(%)	0.259	0.158
磷 (%)	0.415	0.415
Ca/P	1:1.6	1:2.6

(酵母はビタミンB群、肝油はビタミンA及びDの給源として加える)

實驗成績 實驗は前後 2 回行い、實驗開始は第 1 回は昭和 24 年 7 月 6 日、第 2 回は同年 8 月 9 日、その實驗方法はすべて前回と同様で、何れも生後 3 週乃至 25 日位の同腹の白鼠を用いた。成績は第 2~5 表に示す如くであり、前後 2 回の數値の間に幾分の隔りはあるが、これは實驗期間中に於ける動物の發育の差異によるものでその傾向は殆ど一致している。

即ち何れの調査項目を見ても對照群の方がよく、成長に於ても、餌及び Ca の利用率に就ても亦終了時の眞體重に對する Ca 量の比率に於ても低 Ca 群は對照群に及ばないことが分る。

第 2 表 (第 1 回實驗)

群 別	動物番號	性 別	體 重(g)		飼 料		骨の長さ及び灰分 (cm) (g)			總灰分 (g)	總Ca/ 總灰 (%)	Ca/ 眞體 重
			開始時	増加	總攝取量 (g)	利 用 率 (%)	大腿骨	脛 骨	灰 分			
標準群	159	♂	43	110	317.5	34.7	2.58	3.13	0.1969	3.6956	26.37	0.686
	160	♀	36	53	203	26.1	2.30	2.80	0.1241	2.4617	27.77	0.888
低石灰群	161	♂	42	63	219.5	28.7	2.38	2.92	0.0916	2.0912	22.54	0.486
	162	♀	40	65	245.5	26.5	2.30	2.87	0.0863	2.0501	23.13	0.499
	163	♂	42	65	251.5	25.9	2.40	2.94	0.0928	2.2700	22.19	0.509

第 3 表 (第1回實驗)

群別	動物番號	性別	Ca 含有率 %		Ca 量 (g)						Ca 利用率 (%)
			脚灰分	片脚除いた體灰分	片 脚	其の他	總Ca量	開始時	沈 着	飼料中	
標準群	159	♂	36.68	25.79	0.0722	0.9024	0.9746	0.2700	0.7046	0.8223	85.69
	160	♀	37.43	27.25	0.0465	0.6370	0.6835	0.2468	0.4378	0.5258	83.26
低石灰群	161	♂	34.51	21.99	0.0316	0.4398	0.4714	0.2638	0.2076	0.3468	59.88
	162	♀	36.37	22.55	0.0314	0.4428	0.4742	0.2731	0.2011	0.3879	51.84
	163	♂	34.81	21.66	0.0323	0.4715	0.5038	0.2638	0.2400	0.3974	60.39

第 4 表 (第2回實驗)

群別	動物番號	性別	體 重(g)		飼 料		大腿骨及脛骨			灰分 / 脫脂骨 灰分 (%)	佝僂病係數 A/R
			開始時	增 加	總攝取量 (g)	利 用 率 (%)	乾燥脫脂骨(g)	脂肪以外的有機物 (g)	有 R		
標準群	181	♂	35	60	213.5	28.1	0.2401	0.1135	0.1266	52.7	1.1
	182	♂	33	44	190.0	23.2	0.1986	0.0965	0.1022	51.5	1.1
	183	♂	32	40	161.5	24.8	0.1994	0.0999	0.0995	49.9	1.0
低石灰群	184	♀	35	32	153.0	20.9	0.1575	0.0887	0.0688	43.7	0.8
	185	♂	34	36	159.5	22.6	0.1556	0.0901	0.0655	42.1	0.7
	186	♂	30	35	152.5	23.0	0.1423	0.0845	0.0578	40.6	0.7

第 5 表 (第2回實驗)

群別	動物番號	性別	カルシウム 量 (g)				カルシウム 利用率 (%)	Ca (%)		眞體重(g)
			終了時	開始時	沈 着	飼料中		眞體重		
標準群	181	♂	0.6428	0.2196	0.4232	0.5530	76.22	0.719		89.4
	182	♂	0.5188	0.2067	0.3121	0.4921	63.43	0.714		72.7
	183	♂	0.5050	0.2006	0.3044	0.4183	72.77	0.735		68.7
低石灰群	184	♀	0.3789	0.2390	0.1399	0.2417	57.88	0.620		61.0
	185	♂	0.3490	0.2135	0.1355	0.2520	53.77	0.533		65.6
	186	♂	0.3078	0.1877	0.1201	0.2410	49.83	0.509		60.5

II Ca 増加試験 (短期試験) 鹽類及び飼料の調製 わが研究所に於てさきに佐伯・藤本によつて行われた搗粉の害作用の實驗に於て、結石の出来たという飼料で一番 Ca 含有量の低いものは吾々の用いている標準飼料(その 100 g 中には乳酸 Ca を含んだ混合鹽類を 4 g

含む)中のデキストリンを1g減じその代りに搗粉(炭酸Ca)を1g加えたものである。

吾々は前述の低Ca実験に於ける對照群と同様に乳酸Caの代りにボレー末を用いた混合鹽類を3g加えたものを今回の對照群(第Ⅲ群)の飼料とした。尙結石の實驗との関連性をも考

第 6 表

群別	動物番號	性別	體重(g)		飼料		骨の長さ(cm)及び灰分(g)				灰分	佝僂病係數
			開始時	増加	總攝取量(g)	利用率(%)	大腿骨	脛骨	乾燥脱脂骨	灰分	乾燥脱脂骨(%)	
第Ⅰ群	187	♂	37	69	248	27.8	2.40	2.89	0.2930	0.1702	58.08	1.38
	188	♂	33	55	244	22.5	2.28	2.73	0.2616	0.1531	58.52	1.41
	189	♀	34	31	182	17.0	2.11	2.60	0.2163	0.1266	58.53	1.41
	平均		34.7	51.7	224.6	22.4	2.26	2.73	0.2569	0.1500	58.38	1.40
第Ⅱ群	190	♂	42	83	296.5	28.0	2.51	3.00	0.3385	0.1997	58.99	1.46
	191	♂	31	64	244	26.2	2.32	2.82	0.2652	0.1542	58.14	1.39
	192	♀	33	53	224.5	23.6	2.23	2.71	0.2471	0.1454	58.88	1.43
	平均		35.3	66.7	255	25.9	2.35	2.84	0.2836	0.1664	58.67	1.43
第Ⅲ群	193	♂	35	71	231	30.7	2.35	2.84	0.2707	0.1565	57.81	1.37
	194	♀	38	60	242	24.8	2.34	2.81	0.2839	0.1641	57.83	1.37
	195	♀	33	49	212	23.6	2.19	2.70	0.2310	0.1315	56.92	1.32
	平均		35.3	60.0	238.3	26.4	2.29	2.78	0.2619	0.1507	57.52	1.35

第 7 表

群別	動物番號	性別	片脚灰分(g)	總灰分(g)	總Ca(g)	カルシウム量(g)			カルシウム利用率(%)	眞體重(g)	總灰(%)眞體重
						開始時	沈着	飼料中			
第Ⅰ群	187	♂	0.1702	3.040	0.8976	0.2319	0.6657	2.4155	27.56	100	3.04
	188	♂	0.1531	2.734	0.8129	0.2067	0.6062	2.3765	25.51	83	3.29
	189	♀	0.1266	2.261	0.6906	0.2324	0.4582	1.7727	25.85	57	3.97
	平均		0.1500	2.678	0.8004	0.2237	0.5767	2.1882	26.31	80	3.43
第Ⅱ群	190	♂	0.1997	3.566	1.0603	0.2634	0.7969	1.7553	45.40	118	3.02
	191	♂	0.1542	2.754	0.8188	0.1938	0.6250	1.4444	43.27	88	3.13
	192	♀	0.1454	2.596	0.7931	0.2250	0.5681	1.3290	42.75	81	3.21
	平均		0.1664	2.972	0.8907	0.2274	0.6633	1.5096	43.82	96	3.12
第Ⅲ群	193	♂	0.1565	2.795	0.8310	0.2196	0.6114	0.7253	84.30	96	2.91
	194	♀	0.1641	2.930	0.8953	0.2597	0.6356	0.7599	83.64	91	3.22
	195	♀	0.1315	2.348	0.7173	0.2250	0.4923	0.6657	73.95	77	3.05
	平均		0.1507	2.691	0.8145	0.2348	0.5798	0.7170	80.63	88	3.06

慮し、混合鹽類の外に更にボレー末 1.5 g 及び 0.5 g を加えたものを夫々第Ⅰ群及び第Ⅱ群の飼料とした。それらの飼料中の Ca 並に燐の實測値を示せば第8表の如くなり、Ca/P は何れも至適値を示している。これ等の Ca 増加飼料による長期試験は目下實驗中であるから後日觸れることとし、茲には從來通りの1ヶ月間の觀察の結果を報告する。

實驗成績 3 群とも體重の増加、骨の長さ、大腿骨及び脛骨の灰分量、或は佝僂病係數(第6表)などを見ても殆んど大した差は認められない。

僅かにボレー末 0.5 g 追加の第Ⅱ群が勝っている程度である。飼料の利用率は Ca の含有量の多い方が悪い様で、特に第Ⅰ群(1.5 g 増加)は對照群及び第Ⅱ群に比して少しく劣る様である。總灰分は第Ⅱ群が最も多いが、眞體重に對する比率は、Ca の増加につれて幾分ずつ高い値を示している。總 Ca 量及び沈着 Ca 量は總灰分と同じく第Ⅱ群が最も多いが、その利用率になると對照群が最もよく、第Ⅱ群、第Ⅰ群と Ca の増加につれて 80.6%, 43.8%, 26.3% と低下する。(第7表)

考察 Boelter, Greenberg¹²⁾等は Ca 含有率 0.01% の飼料を用い、成長期の白鼠に激しい Ca 缺乏の症狀を起させ、成長の遅延、飼料消費の減少、活動力及び感受性の減退、血清中の Ca 濃度の急激な減少、骨のはげしい脱灰等を記載しているが、吾々の低 Ca 群の Ca 含有量は 0.158% であるので、勿論上述の様な激しい症狀は現われなかつた。即ち骨の長さ等には餘り差は認められなかつたが、飼料の攝取量は少く従つて體重の増加も少い。骨の灰分及び Ca 量は正常の白鼠の $\frac{1}{2}$ と云う Boelter 等¹⁰⁾の成績程ではないが、吾々の實驗に於てもそれらの値は勿論低く、灰分/脱脂骨も佝僂病係數も共に正常以下で對照群に比して 70~80% にすぎない。

飼料の利用率及び Ca の利用率に於て第1回の成績が第2回の成績に比して幾分高い値を示したのは、實驗期間中の動物の發育の割合が第2回より第1回の方が少しく良好であつた爲である。白鼠の發育特に攝取飼料と發育と關係は季節によつて可なり影響される様で、冬季は著しく不良である。その他親鼠の生活力、同腹の仔鼠の數なども影響するものと思われる。

この2回の實驗に於ては季節の關係や仔鼠の數は略々似た様なものであるが、實驗開始迄の發育が第1回の群の方が第2回のもよりも速かであつたのである。即ち第1回のは生後21日で既に平均體重 40.6 g を示したのに對し、第2回のは25日でも平均體重 33 g にすぎなかつた。この哺乳期間の發育速度の相違が實驗期間中に迄影響を及ぼしたものと考える。

Ca 増加實驗に於ては、發育、骨の長さ、Ca 沈着などの點では3群の間に大した差異は認められないが、強いて求めれば第Ⅱ群(0.592%)が最もよい様に思われる。

Whitcher 等の成績では飼料中の燐の含有量を 0.42~0.43% とし、Ca を 0.53%, 0.70%, 0.84%, 1.04% と増しても Ca の沈着には増加に認められなかつたという。しかし燐の含有量を 0.42% から 0.73% に上げれば、Ca を増加するに従つて極めて僅かではあるが Ca の

沈着量も増すというのである。

これは磷の含有量が 0.42% では Ca/P が過大であつたものが (即ち Ca 含有量が 0.84%, 1.04% では Ca/P は夫々 2.0, 2.4 である), 磷を 0.73 % に増すことによつてその比率が大部は正されて (即ち Ca が 0.84% で 1.15, 1.04% で 1.4 となる) Ca 含有量に對するその至適値に近くなつたためと考える。何れにしても Ca 含有量が 0.75% 以上ではその Ca 沈着量にも餘り差はない様で、吾々の成績も、0.64% が最もよかつたという從來の報告に略々一致するもので、第 I 群の 0.974% は少々過剰ではないかと考える。

次に飼料の利用率及び Ca の利用率を見ると、飼料の利用率は第 I 群が僅かに劣る程度であるが、Ca の利用率になると著しい差異を示し、對照群は 80.6% で甚しく優秀であるが、他は 43.8%, 26.3% と Ca の増加するにつれて急に低下する。

第 1 報¹⁾の成績 (0.233% の Ca 含有率で、その利用率は 72%) 及び低 Ca 實驗成績をも併せ考えれば、(第 8 表) 飼料中の Ca 含有率 0.158% は明らかに Ca 不足の域にあり、骨への沈着も悪く、Ca の利用率も劣る。Ca の至適含有率の最低は 0.2% と云う報告と概ね似た成

第 8 表

	飼 料			體重増加率 終了時 開始時	飼料利用率 (%)	カルシウム 利用率(%)	總灰分 眞體重 (%)	Ca 眞體重 (%)
	Ca%	P%	Ca/P					
第 I 群	0.974	0.513	1.90	2.5	22.4	26.3	3.43	0.979
第 II 群	0.592	0.509	1.16	2.9	25.9	43.8	3.12	0.936
對 照 群	0.318	0.505	0.63	2.7	26.3	81.0	3.06	0.930
對 照 群	0.259	0.431	0.60	* 1) 3.0	30.4	84.5	2.90	0.787
				2) 2.4	25.7	70.8	2.74	0.723
低 石 灰 群	0.158	0.415	0.38	1) 2.6	27.0	57.4	2.20	0.498
				2) 2.0	22.2	53.8	2.44	0.554

(* 数字は實驗回数を示す)

績であると考え。

結局骨への Ca の沈着という觀點からすれば飼料中の含有量 0.2~1.0% が大體用いゝる限界であり、就中 0.6% 前後が最もよい結果が得られる様である。更にその利用率を考慮に入れる時は 0.2~0.35% あたりが最も能率の高いところと考える。

Ca 増加飼料による長期連用實驗は 8 月末現在 (昭和 25 年) で滿 11 ケ月になるが、實驗動物は何れも良好な發育を示し、今迄のところ何等の異常も認められない。

結論 發育途上の同腹の白鼠を用い、Ca 含有量が夫々 0.158, 0.259, 0.318, 0.592 及び 0.974% と階段的に増加する飼料にて飼育し Ca の骨への沈着或は Ca 利用率等を比較検討したところ次の様な成績が得られた。

1) 白鼠の成長, 骨の發育, 骨組織への Ca の沈着などを見ると大體に於て飼料中の Ca 含有量の多くなる程それ等の値は昇る。しかし 0.6 % 以上の場合には必ずしも増加すると云う譯ではない。1 % 以上になると寧ろ成長その他の點から見てよくなく, 飼料中の Ca 含有率の上の限界はせいぜい 1 % と考える。

2) 0.158% は明らかに不足で第1報の 0.233% の成績をも併せ考えれば Ca 含有量の至適域の最低は 0.2% 程度と推定する。

3) Ca の利用率と云う觀點からすれば, Ca 含有量 0.2~0.35% の範圍が最も能率的であり, 他の種々の角度から見た數値も決して悪くはない。

文 献

- 1) 速水, 吉村, 池内: 各種 Ca 給源の生体内利用に関する實驗的研究(その1) 栄養學雜誌 8 (昭 25)
- 2) 速水, 吉村, 池内, 佐藤: 同題(その3) 同誌 8 (昭 25)
- 3) Sherman, Booher: Calcium content of the body in relation to that of food. J. Biol. Chem. 93 (1931)
- 4) Sherman, Campbell: Effects of increasing the calcium content of a diet in which calcium is one of the limiting factors J. of Nutr. 10 363 (1935)
- 5) Whitcher, Booher, Sherman: Further studies on the calcium content of the body in relation to the calcium and phosphorus content of the food. J. Biol. Chem. 115. 679 (1936)
- 6) Toepfer, Sherman, : The effect of liberal intakes of calcium or calcium and phosphorus on growth and body calcium. J. Biol. Chem. 115 685 (1936)
- 7) Cox, Imboden. : The role of calcium and phosphorus in determining reproductive success. J. of Nutr. 11 147 (1936)
- 8) Landford, Sherman. : Further studies of calcium content of the body as influenced by that of the food. J. Biol. chem. 126 381 (1938)
- 9) Duynne, Landford, Toepfer, Sherman. : Life-time experiments upon the problem of optimal calcium intake. J. of Nutr. 21 221 (1941)
- 10) 速水, 吉村, 池内, 佐藤: 第3回栄養食糧學會研究會發表(昭 24.12.4)
- 11) 佐伯, 藤本: 米麥精白用搗粉の害作用に関する實驗的研究(その5) 栄養研究所報告 8 (昭11)
- 12) Boelter, Greenberg. : Severe calcium deficiency in growing rats. (1) Symptoms and pathology. J. of Nutr. 21 61. (1941)
- (2) Changes in chemical composition J. of Nutr. 21. 75 (1941)