甲狀腺物質ノ血管有毒性ニ就テ

第三報 甲狀腺上皮細胞エキス並ニ膠樣質エキスニ因ル

實驗的動脈硬變ノ發生ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻內科教室

大學院學生 醫學士 新開 喜代 太

目 次

第一章 緒 言	第二項 大動脈ノ病理解剖學的變化
第二章 實驗材料並ニ實驗方法	第四章 總括並ニ考案
第三章 實驗成績	第五章 粘 論
等一項 體重變化	主要文獻並ニ附圖說明

第一章 緒 言

甲狀腺物質ノ過給ニ因ル實驗的動脈硬變ノ發生ニ關シ曩ニ余ハ前後二回ニ互リテ報告シ、甲狀腺物質中ノ血管有毒性物質ハ甲狀腺ホルモン其物タル可キヲ信ズルニ至リタリ。玆ニ甲狀腺ハ組織學上特種ノ構造ヲ有シ其ノ上皮細胞機能ト膠樣質ノ存在意義ニ關シ吾人ノ注意ト興味ヲ喚起スルモノアリ。曾テ辻教授ハ種々甲狀腺ノ組織學的態度ヨリ比較考究セラレテ膠樣質ハホルモンノ準備狀態トシテ貯藏サレ居ルモノニシテ、上皮細胞ハ膠樣質ノ形成貯藏及ビ膠樣質

甲狀腺物質ノ血管有毒性ニ就テ……(新開)

ヨリホルモンノ形成分泌ノ二様ノ機能ヲ具備スルモノナルベシトセラレタリ。其ノ後最近ニ至リ千野、西川、松井、宗、田中等ハ甲狀腺ヲタータム氏法ニヨリ上皮細胞物質ト膠樣物質トニ分離シ、兩物質ニ就キ種々其ノ作用ヲ相次イデ檢索シ、上皮細胞物質ハ強キ甲狀腺ホルモン作用ヲ有シ膠樣物質ハ反對ニ甲狀腺ホルモンニ對シ寧ロ抑制的作用ヲ有スル事ヲ明トセリ。サレド此等兩物質ノ投與ニ因ル實驗的動脈硬變ノ發生ニ就キ比較檢索セラレタルハ未ダ報告ニ接セザル所ニシテ余ガ本實驗ヲ試ミタル所以ナリ。之レ單ニ此ノ點ニ於テ興味トスル所タルノミナラズ甲狀腺中ニ於ケル血管有毒性物質ノ性質ニ就テ再吟味シ合セテ前記諸氏等ノ業績ニ補足スルノ機會ヲ得タルヲ以テ茲ニ其ノ成績ヲ報告スベシ。

第二章 實驗材料並ニ實驗方法

一、甲狀腺上皮細胞エキス並ニ膠樣質エキス

タータム氏法ニ準ジ千野ガ實施セル方法ニ則リ兩物質ヲ其エキストシテ分離セリ。即チ新鮮牛甲狀腺ヲトリ之ニ附着セル脂肪結締組織等ヲ可及的ニ除キ、ソノ一定量ヲ秤量シ凍結ミクロトームヲ用ヒテ二五—三〇ミクロンノ厚サニ切り、之ヲ使用セル甲狀腺重量ノ五位量ノ生理的食鹽水ニ浮游セシメ截片ヲ靜ニ伸張セシムル時ハ、濾胞内ノ膠樣質ハ食鹽水中ニ移行シ液ハ次第二褐色ヲ帶ブルニ到ル、之ヲ一〇%膠樣質原液トナス。次ニ截片ヲ可及的上皮細胞ノ脱落ヲ防ギツ、第二第三ノ食鹽水ヲ通過セシメテ附着殘存セル膠樣質ヲ除キ、最後ニ前ト同量ノ食鹽水中ニ入レ二十四時間氷室中ニ放置浸出セシメタルモノヲ遠心沈澱シ得タル上層液ヲ一〇%上皮細胞エキス原液トセリ。之等ノ操作ハ可及

の無菌のニ行ヒ又膠樣質原液内ニ脫落セル切片ノ一部ハ可及的速ニ重オタル脫脂綿ヲ以テ濾過シ更ニ遠心沈澱ニヨリテ之ヲ除去シ其ノ有效成分ノ膠樣質エキス内ニ混入スルヲサケタリ。

二、實驗動物並ニ實驗方法

體重二阬内外ノ健康雄性家兔二〇頭ヲ選ビ一〇頭宛甲乙兩群ニ分チ兩群ヨリ體重略々相等シキ各二頭宛ヲ以テ一組トシ、兩群ニ就キソレゾレ前記兩エキスヲ其ノ含有沃度量相等シキ割ニ皮下注射セリ。千野ガ牛甲狀腺上皮細胞及ビ膠樣質兩エキスノ沃度量ヲ Baumann-Auten 氏法ニ依リ測定セル結果膠樣質エキス原液ノ沃度含有量ハ上皮細胞エキス原液ノ夫ノ略五倍ニ相當セルモノナル事ヲ知レリ。即チ前者ノ五倍稀釋液（二％膠樣質エキス）ト稀釋セザル上皮細胞エキス原液（一〇％上皮細胞エキス）ノ同量ハ其ノ含有沃度量ニ於テ相等シ。依ツテ甲群屬家兔ニ對シテハ上皮細胞エキス原液一回量一〇蚝宛皮下注射シ、乙群屬家兔ニハ各頭膠樣質エキス原液ノ五倍稀釋液ヲ前者ト同量宛皮下注射シ、注射間隔ハ兩群對照的ニ三乃至四日毎トシ、各組ノ一方斃死セル時ハ同組ノ他方ヲ頸動脈ニ於テ放血致死セシメ、斯クシテ斃死又ハ致死セシメタル家兔ノ大動脈ヲ剔離シ、先ヅ肉眼的ニ檢シ次デ一〇％ホルマリン液ニ固定シ顯微鏡的檢索ノ用トセリ。

第三章 實驗成績

第一項 體重ノ變化

甲狀腺物質ノ血管有毒性ニ就テ……（新開）

第一表 處置及ビ體重ノ變化

家 兔			注 射			體 重		平均一日體重減少率	生存日數	轉 歸
群 別	組	番 號 及 性	一回量 (耗)	回 數	全 量 (耗)	實 驗 開始時 (瓦)	實 驗 終了時 (瓦)	(%)		
甲、上皮細胞エキス注射群	I	1 ♂	10	7	70	1980	1000	2.3	22	死
	II	2 ♂	10	7	70	1880	1010	2.1	22	〃
	III	3 ♂	10	3	30	1720	1410	2.3	8	〃
	IV	4 ♂	10	3	30	1790	1160	4.4	8	〃
	V	5 ♂	10	3	30	1700	1170	4.5	7	〃
	VI	6 ♂	10	3	30	1740	1230	4.2	7	〃
	VII	7 ♂	10	3	30	2080	1530	3.3	8	〃
	VIII	8 ♂	10	7	70	1950	1210	1.6	24	殺
	IX	9 ♂	10	3	30	1730	1190	3.9	8	死
	X	10 ♂	10	3	30	1870	1290	4.4	7	〃
平 均			3.3%							
乙、膠樣質エキス注射群	I	11 ♂	10	7	70	1990	1650	0.8	23	殺
	II	12 ♂	10	7	70	1800	1330	1.2	22	〃
	III	13 ♂	10	3	30	1730	1550	1.3	8	〃
	IV	14 ♂	10	3	30	1860	1470	2.7	8	〃
	V	15 ♂	10	3	30	1710	1500	1.7	7	〃
	VI	16 ♂	10	3	30	1710	1590	1.0	7	〃
	VII	17 ♂	10	3	30	2070	1750	1.9	8	〃
	VIII	18 ♂	10	7	70	1960	1290	1.4	24	死
	IX	19 ♂	10	3	30	1780	1570	1.5	8	殺
	X	20 ♂	10	3	30	1970	1760	1.5	7	殺
平 均			1.5%							

一一二四

第一表ニ示スガ如ク實驗家兔ハ總テ實驗終了時ニ於テ實驗開始時ニ比シ體重減少セリ。而シテ甲乙兩群ニ就キ其ノ體重減少度ヲ比較スルニ甲群ニ於テハ平均一日體重減少率ハ最小一・六%、最大四・五%、平均三・三%ニシテ實驗家兔ノ大半ハ三%以上ノ該體重減少率ヲ示セリ。乙群ノ其ハ最小〇・八%、最大二・七〇%、平均一・五%ニシテ甲群ニ比シ體重減少度ハ遙ニ輕度ナリ而シテ甲群家兔ノ大部分ハ對照乙群家兔ニ先立チテ死

亡セリ。

第二項 大動脈ノ病理解剖學的變化

甲群ニ四例、乙群ニ一例ニ於テ大動脈病變ヲ認メ得タリ。何レモ中膜ノ病變ヲ主トスルアドレナリン型動脈硬變ニ屬ス。甲狀腺物質投與ニ因ル大動脈ノ病變所見ハ先人ノ詳シク報告セル所ナルヲ以テ茲ニハ各個ノ所見ニ就テ簡單ナル記載ヲ以テ其ノ病變ノ程度ヲ示シ尙全成績ヲ一括シテ表示シ（第二表）、以ツテ兩群ニ於ケル大動脈病變ノ發生頻度並ニ程度比較ノ便ニ供セリ。

甲、上皮細胞エキス注射群

實驗家兎一〇頭中大動脈ニ動脈硬變ノ發生ヲ認メタルモノ肉眼的ニ三例、顯微鏡的ニ四例ヲ得タリ。

第一號家兎 肉學的所見。左頸動脈分岐部ヨリ下方胸部大動脈全般ニ互リ小豆大ヨリ粟粒大ニ到ル種々ノ大サノ陷沒病竈十數個散在シ、病竈ハ總テ血管軸ノ方向ニ長形ヲナシ孤立セルアリ、或ハ二個連リテ瓢箪形ヲナセルアリ、大多數ハ血管背側部ニ存在シ該部ノ血管壁ハ菲薄トナリ内面滑澤ナリ。

顯微鏡的所見。血管周圍ノ二分ノ一ニ互リ外面ニ向ヒ波狀ニ突出ス。該突出部ノ血管壁ハ他部ニ比シ菲薄ナリ全。周圍ニ互リ内膜内被細胞ノ増殖セルヲ認ム、殊ニ管壁菲薄部ニ著シ。中膜ニ於テハ筋纖維ハ一般ニビクノーゼ、カリオリーゼ等退行變性ノ像ヲ示シ、特ニ血管壁ノ菲薄部中膜ノ三分ノ二内方部ノ筋纖維ハ強ク萎縮シ筋核認メ難キ所アリ。該部ノ彈力纖維ハ密ニ接近直行シ其他ノ部ニ於テモ彈力纖維ノ走行ハ一般ニ不整ナリ。萎縮セル筋纖維ニ沿ヒテ石灰

甲狀腺物質ノ血管有毒性ニ就テ……（新開）

一一六

[illegible]

[illegible]

第四號家兎　肉眼の所見。胸部大動脈上部、左頸動脈分岐部ト第一肋間動脈分岐部トノ間ニ於テ約二糧ノ長サニ互リテ稍々菲薄トナレル部アリテ内面ハ稍々粗造トナレリ。胸部大動脈下部、第七乃至第八肋間動脈分岐部間ニ互リテ無數ノ微小陷没ノ集合ヲ以テナル病竈アリ、該部ノ血管壁ハ稍々菲薄ナリ。顯微鏡の所見(胸部大動脈下部病竈切片)。内膜ハ所々健常部ヲ殘シテ一般ニ内被細胞増殖セリ。類脂肪體ノ沈着ナシ。中膜ニ於テハ種々ノ程度ノ筋纖維ノ退行變性ヲ認メ、病變ノ主タル部ハ血管周圍ノ三分ノ二ニ互リ内方三分ノ一乃至二分ノ一ニシテ其ノ彈力纖維ハ密ニ接近直行ス。石灰ノ沈着ヲ認メズ。外膜ノ病變ヲ認メズ。

第八號家兎 肉眼の所見。胸部大動脈ノ上部及下部ニ稍々内面粗造ナルガ如キ部アルモ明カナル變化ヲ示サズ。顯微鏡の所見（胸部大動脈末梢部切片）。内膜變化ナシ。中膜ニ於テハ内膜ニ接スル部ニ於テ數條ノ筋纖維輕度ノ退行變性ヲ示シ、彈力纖維ハ稍々伸展直行セリ。石灰ノ沈着、類脂肪體ノ沈着ナシ、外膜ニ變化ヲ認メズ。

第九號家兔 肉眼の所見。胸部大動脈ノ末梢部第七肋間動脈分岐部高ニ於テ長サ約七糎ノ長形ノ菲薄部アリテ内面ハ粗造トナル。顯微鏡の所見。血管周圍ノ約二分ノ一ハ管壁菲薄ナリ。主ナル變化ハ該菲薄部ニアリ、即チ該部ハ内膜ニ於テハ一部分極輕度ノ内被細胞ノ増殖ヲ認ム。中膜ニ於テハ筋纖維ノ退行變性ヲ認め、二分ノ一乃至三分ノ一内

方ノ彈力纖維ハ互ニ接近直行或ハ伸展ス。石灰ノ沈着、類脂肪體ノ沈着ナシ。外膜ニ著變ナシ。

乙、膠樣質エキス注射群

實驗家兎一〇頭中大動脈ニ硬變性變化ヲ認メ得シモノ一例ニ過ギズ。而モ其ノ病變程度ハ極メテ輕微ニシテ所見次ノ如シ。

第十八號家兎 肉眼のニ胸部大動脈ノ下部ニ米粒大ノ輕度ノ菲薄部アリテ内面ハ粗造トナレリ。該部ノ顯微鏡的所見ハ、病變ハ血管周圍ノ一小部分ニ限極サレ、内膜ニ於テハ内被細胞ノ増殖ナク中膜ハ輕度ノ筋纖維ノ退行變性ヲ認メ彈力纖維ノ走行ハ稍々不整伸展狀ヲナス。其ノ他石灰沈着、類脂肪體ノ沈着等ヲ認メズ、外膜ニ變化ナシ。

第四章 總括並ニ考按

以上實驗成績ノ示ス如ク牛甲狀腺上皮細胞エキスト膠樣質エキストヲ其含有沃度量同一ノ割ニ於テ家兎ニ皮下注射セル結果、上皮細胞エキス注射群ニ於テハ膠樣質エキス注射群ニ比シ著明ノ體重減少度並ニ早期死亡ヲ來シ、其ノ大動脈ノ病理解剖學的變化ヲ觀察スルニ、上皮細胞エキス注射群ニ於テハ肉眼のニ三〇%顯微鏡的ニ四〇%ノ大動脈硬變發生頻度ヲ示シ可ナリ著明ノ病變ヲ來セルモノアルニ反シ、膠樣質エキス注射群ニ於テハ實驗家兎一〇頭中只一例ニ於テ極ク輕度ノ大動脈硬變ヲ來セルニ過ギズ。而シテ本實驗ニ於テ得タル大動脈ノ硬變ハ何レモ中膜ノ病變ヲ主トスル所謂アドレナリン型ニ屬スベキモノナリ。一般ニ甲狀腺紛末試食ニ因リアドレナリン型動脈硬變ノ發生スベキハ村田以來阪井、村田及比桂、松岡、今井、小出等ノ等シク認ムル所ニシテ余モ亦之ヲ經驗セルハ曩ニ報告セルガ如シ

即チ甲狀腺内ニ存在スベキ動脈硬變發生作用物質ハ主トシテ上皮細胞エキス中ニ含有セラレ膠樣質エキス中ニハ之ニ乏シキヲ知り得タリ。

扱凍結載片法ニヨリ甲狀腺ヲ上皮細胞物質ト膠樣物質トニ分離スル事ヲ考按セルハ Tatum (1920) ニシテ、氏ハ牛、豚、羊ニ就キ、次デ Dyke ハ犬、人間ニ於テ上皮細胞及ビ膠樣兩物質ノ沃度ヲ測定シ、同種動物ニアリテハ兩者ノ比ハ略々一定セルモノニシテ犬ニ於テハ〇・一五四ナリトセリ。西川ハ家兎ニ於テ其比ハ略々一對五ナル事ヲ知レリ。而シテ之等兩物質ノ各生理的作用ニ關スル實驗ハ久シク試ミラレタルモノ無カリシモ最近當教室ノ千野及ビ西川ニヨリ此等兩物質ノ作用ニ就キ種々檢索セラレ更ニ松井、宗、田中、勝木等ノ之ニ關スル業績相次イデ報告セラレタリ。今此等諸氏ノ上皮細胞及ビ膠樣質兩エキスノ作用ニ就キ檢索シ得タル業績ヲ列舉スレバ次ノ如シ。(一)前者ヲ白鼠ニ投與スル時ハ體重ハ凡テ減少シ其ノ甲狀腺ハ組織學的ニ實質性甲狀腺腫ノ像ヲ呈スルニ反シ、後者ヲ投與セル場合ハ體重ハ増加シ其ノ甲狀腺ハ膠樣甲狀腺腫ノ像ヲ呈ス(千野)。(二)前者ヲ家兎ニ投與スル時ハ其甲狀腺重量ハ稍々増加シ該甲狀腺ノ上皮細胞並ニ膠樣質沃度ハ共ニ著シク増加スルモ上皮細胞沃度ノ増加率甚大ニシテ此沃度ノ分布狀態ハ甲狀腺物質投與ノ場合ニ酷似ス。後者ヲ投與スル時ハ甲狀腺重量ハ稍々減少シ上皮細胞沃度ハ著シク減少スルモ膠樣質沃度ハ著明ナル増加ヲ來ス(西川)。(三)前者ハ蝌蚪變態ヲ著明ニ促進シ成長抑制ハ著シカラズ、後者ハ其變態進歩ハ不完全ニシテ成長ヲ著明ニ抑制ス(千野及ビ西川)。(四)前者ハ摘出家兎子宮運動ヲ著明ニ亢進シ、其ノ運動亢進ハアトロピンニヨリ抑制サレズ、又摘出子宮運動ニ於テモアドレナリン增強作用ヲ認ムルニ反シ、後者ハ摘出家兎子宮運動ヲ亢進スルモ其ノ度ハ輕微ニシテ、其ノ運動亢進ハアトロピンニヨリ抑制サル、又アドレナリンノ摘出子宮運動

亢進作用ヲ増強セズ(千野、松井)。(五)硫酸アンモンヲ以テ處置シテ得タル上皮細胞蛋白及ビ膠樣質蛋白モ(四)ト同様ノ關係ニアリ(松井)。(六)前者ハ蛙摘出心臟運動ニ對シ *Positiv-inotrope Wirkung* 及ビ輕度ノ *Positiv-chronotrope Wirkung* ヲ有シ之ノ作用ハジネルゲンニヨリ抑制セラレ、後者ハ *Negativ-inotrope Wirkung* 及ビ輕度ノ *Negativ-chronotrope Wirkung* ヲ有シ之ノ作用ハアトロピンニヨリ阻止サル(千野)。(七)前者ハ白鼠瓦斯新陳代謝ヲ促進セシメ、後者ハ之ヲ抑制ス(松井)。(八)前者ハ白鼠臟器組織呼吸ヲ著明ニ促進セシメ、後者ハ之ヲ抑制ス(宗)。(九)前者ハ體外組織培養發育作用ハ強度ナルモ、後者ハ其ノ作用輕微ナリ(勝木)。(十)家兔尿中沃度排泄ニ對シ前者ハ初期沃度排泄量増加シ排泄時間ヲ短縮セシムルモ後者ハ初期沃度排泄量ヲ減少シ排泄時間ヲ稍々延長セシム(田中)。(十一)前者ハ家兔空腹時血糖ヲ上昇セシメアドレナリン過血糖作用ヲ増強シ、インシュリン低血糖作用ヲ抑制シ後者ハ血糖ヲ低下セシメアドレナリン過血糖作用ヲ抑制シインシュリン低血糖作用ヲ増強ス(松井)。(十二)前者ハ白鼠窒素新陳代謝ヲ亢進セシメ尿中總窒素排泄及ビ尿素、クレアチン窒素排泄ヲ著明ニ増加セシメ、後者ハ窒素新陳代謝ヲ低下セシメ尿中總窒素排泄及ビ尿素、クレアチン窒素排泄ヲ低下セシム(松井)。

即チ上皮細胞中ニハ沃度含有量少キモ其ノ沃度ハ著シキ活動狀態ノ化合物即チ甲狀腺ホルモントシテ存在シ膠樣質中ニハ沃度含有量多量ナルモ其沃度ハ非活動性又ハ單ナル沃度化合物トシテ存在シ且 *Antihormon* 樣作用ヲ有スルモノ、存在スベキモノタルヲ知ル。以上ノ事實ト今余ノ得タル實驗成績トヲ合セ考フルニ甲狀腺上皮細胞及ビ膠樣質兩エキスニ於ケル諸種ノ活動性生理的作用ヲ有スルホルモン物質ノ消長ト血管有毒性物質ノ消長トハ略々一致セルノ結果ニ到達セリ。余ハ曩ニアルカリ加水分解甲狀腺末試食ニ因リテハ動脈硬變ヲ發生セザル事、甲狀腺剔出家兔ガ正常

家兔ニ比シ甲狀腺未投與ニ因ル動脈硬變ノ發生ノ頻度及ビ程度ガ稍々劣ル事、サイロキシン注射ニ因リテモ亦動脈硬變ヲ發生シ得ベキモ甲狀腺エキスを注射ヨリ稍々輕度ナル事等ノ事實ヨリ甲狀腺物質ノ血管有毒性ハ其ホルモン作用ニ歸スベキモノトセリ。即チ上皮細胞エキスをニ強キ血管毒含有セラレ膠樣質エキスをニ乏シキハ蓋シ理論ト成績ノ一致セルモノト謂フベシ。

但シコ、ニ注意スベキハ膠樣質エキスを注射ニ因リ輕微ナガラ一例ニ於テ動脈硬變ヲ惹起セルモノアルヲ認メタル事ニシテ一考ヲ要スベシ。一般ニ沃度體ガ多量使用セラレタル時ハ沃度加里ノ如キ無機沃度ニ於テモ動脈硬變ヲ惹起シ得ベキハ Hedinger u. Loeb ノ報告スル所ナルモ、松岡モ述ベタル如ク實際ニハ多量ノ沃度加里ヲ要シ本實驗ニ於テ投與セル含有沃度量ハ氏等ノ實驗セル沃度加里量ニ比シ遙ニ少量ニシテカ、ル成績ヲ來セルハ膠樣質沃度體ガ無機沃度ニ比シ甲狀腺ニ於ケルホルモン形成ニ容易ナル爲メナルベシ。猶又甲狀腺ノ上皮細胞膠樣質兩物質分離法ニ於テタ・タム氏法ハ兩物質ノ溶解速度ヲ利用セルモノニシテ化學的作用ヲ受ケズ自然ノ狀態ニ於テ比較的良ク分離シ得ベク現在吾人ノ知レル最も優レタル方法タルベキモ而モ尙多少各兩物質ノ互ニ相混入スルハ免ヘ得ザル所ニシテ、膠樣質エキスを中ニ例ヘ少量タリトモ強キ作用ヲ有スル上皮細胞成分ガ混入移行セル場合成績ノ上ニ於テ輕度ノ勵性作用ヲ來ス事アルベク、宗ハ膠樣質エキスをハ臟器組織呼吸ヲ抑制スルモ高濃度ニ於テハソノ抑制作用ハ減弱スト云ヒ、又田中ハ膠樣質エキスをノ少量注射ハ一般ニ家兔尿中沃度排泄ヲ緩慢ナラシムルモ大量注射ハカ、ル抑制的作用ヲ示サズ時ニ稍々促進的傾向ヲ見ルト云ヘリ。余ハ比較的多量ノエキスを注射實驗セルモノニシテ從ツテ混入セル上皮細胞成分ノ作用ガ稍々認ムベキニ致リタルハ想像スルニ難カラズ。

第五章 結 論

余ハ家兎ニ就キ甲狀腺上皮細胞エキスを並ニ膠樣質エキスを其含有沃度同量ノ割ニ對照的ニ皮下注射シ次ノ結論ヲ得タリ。

一、上皮細胞エキスを注射家兎群ニ於テハ著明ノ體重ノ減少、高度ノ死亡率ヲ示シ、アドレナリン型動脈硬變ノ發生ハ頗且ツ高度ナリ。

二、膠樣質エキスを注射家兎群ニ於テハ體重ノ減少、死亡率共ニ輕度ニシテ、アドレナリン型動脈硬變ヲ發生シ難シ。

拙筆スルニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ賜リタル恩師辻教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

本論文ノ要旨ハ第七回日本内分泌學會總會席上ニ於テ發表セリ。

出 要 文 獻

- 1) 千野：日本内分泌學會雜誌 第6卷，第5號，685頁；第7號，923頁；第8號，1040頁；第10號，1269頁(昭和5—6年)。
- 2) 千野、西川：日本内分泌學會雜誌 第6卷，第6號，785頁(昭和5年)。
- 3) Dyke: J. of Biol. Chem. Vol. 45, No. 2, p. 325 (1921).
- 4) Hedinger u. Loeb: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 56, S. 314 (1907).
- 5) 勝木：日本微生物學病理學雜誌 第27卷，第2號，139頁(昭和8年)。
- 6) 松岡：甲狀腺論文集第1卷，醫學中央雜誌第21卷，241頁，321頁。
- 7) 松井：日本内分泌學會雜誌 第8卷，第8號，836頁；第9卷，第4號，429頁；第10卷，第5號，569頁，584頁(昭和8—9年)。
- 8) 泉：日本内分泌學會雜誌 第9卷，第5號，565頁(昭和8年)。
- 9) 西川：日本内分泌學會雜誌 第6卷，第7號，901頁(昭和5年)；第7卷，第6號，825頁(昭和6年)。
- 10) 新開：日本内分泌學會雜誌第10卷，第9號，1087頁，1103頁(昭和9年)。

11) Tatum: J. of Biol. Chem. Vol. 42, p. 47 (1920).
號, 1069頁, 大正11年, 甲狀腺論文集, 第1卷.

12) 註: 第19回日本內科學會總會活題報告 實驗醫報, 第904
田中: 日本內分泌學會雜誌 第9卷, 第6號, 717頁 (昭和8年).

附圖說明

第一圖 家兔大動脈

- (1) 第一號家兔 (甲群) 上皮細胞エキス 一回量一〇珉宛七回皮下注射實驗日數二十二日
 - (2) 第六號家兔 (甲群) 上皮細胞エキス 一回量一〇珉宛三回皮下注射實驗日數七日
 - (3) 第十一號家兔 (乙群) 五倍稀釋膠樣質エキス 一回量一〇珉宛七回皮下注射實驗日數二十三日
 - (4) 第十八號家兔 (乙群) 五倍稀釋膠樣質エキス 一回量一〇珉宛七回皮下注射實驗日數二十四日
- 第二圖 第一號家兔 (甲群) ノ大動脈橫斷切片、ワイゲルト氏彈力纖維染色法、弱擴大
- 第三圖 第十八號家兔 (乙群) ノ大動脈橫斷切片、染色法及ビ擴大、同上

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Kaninchenaorten.

- (1) Kn. Nr. 1 (A-Gruppe). Subcutane Injektion von Schilddrüsenepithelextrakt. Einmalige Menge; 10 cem. Anzahl der Injektionen; 7. Versuchsdauer: 22 Tage.
- (2) Kn. Nr. 6 (A-Gruppe). Subcutane Injektion von Schilddrüsenepithelextrakt. Einmalige Menge; 10 cem Anzahl der Injektionen; 3. Versuchsdauer: 7 Tage
- (3) Kn. Nr. 11 (B-Gruppe). Subcutane Injektion von aufs 5 fache verdünntem Schilddrüsenkolloidextrakt, dessen Jodgehalt gleich dem des Epithelextrakts war. Einmalige Menge; 10 cem. Anzahl der Injektion: 7. Versuchsdauer: 23 Tage.
- (4) Kn. Nr. 18 (B-Gruppe): Subcutane Injektion von aufs 5 fache verdünntem Schilddrüsenkolloidextrakt. Einmalige Menge; 10 cem. Anzahl der Injektion: 7. Versuchsdauer: 24 Tage.

甲狀腺物質ノ血管有毒性ニ就テ……(新開)

- Fig. 2. Querschnitt der Aorta von Kn. Nr. 1 (A-Gruppe). Färbung nach Weigert. Schwache Vergrößerung.
Fig. 3. Querschnitt der Aorta von Kn. Nr. 18 (G-Gruppe). Färbungsmethode und Vergrößerung: Wie oben.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

(1) (2) (3) (4)

E-Gruppe: Subcutane Injektion von 0.1% iger Thyroxinlösung, täglich 0.25 ccm ungefähr 25 Tage lang.

Jedesmal wurde der Jodgehalt der einmaligen Dosis der Schilddrüsenpräparate bestimmt und stets gleich befunden.

Die Resultate bei verschiedenen Gruppen waren die folgenden:

- 1) Bei der A-Gruppe: Ziemlich deutliche Körpergewichtsabnahme, Entstehung der Arterionekrose zu 40%
- 2) Bei der B-Gruppe: Keine nennenswerte Körpergewichtsabnahme, keine Arterioveränderungen.
- 3) Bei der C-Gruppe: Geringere Körpergewichtsabnahme und geringerer Prozentsatz der Arterionekrose als bei der A-Gruppe. Entstehung der Nekrose zu 30%.
- 4) Bei der D-Gruppe: Deutliche Körpergewichtsabnahme, Prozentsatz der Arterionekrose 50%.
- 5) Bei der E-Gruppe: Die Körpergewichtsabnahme und der Prozentsatz der Arterioveränderung waren wie der A-Gruppe.

Aus den obigen Resultaten geht nach Meinung des Verfassers hervor, dass es durch die Fütterung mit Schilddrüsenpulver infolge der Wirkung von Schilddrüsenhormon zu Arterioveränderungen kommt.

(Autoreferat)

Über die Giftwirkung der Schilddrüsensubstanz auf die Arterien.

III. Mitt. Über den Einfluss der Epithelzellen- u. Kolloidsubstanz der Schilddrüse auf die Arterien.

Von

Dr. K. Shinkai.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser isolierte mittels der Tatum'schen Gefrier-mikrotommethode die Epithelzellensubstanz aus der Kolloidsubstanz

der Rinderschilddrüse und stellte mit Ringer-Lösung den Extrakt der Epithelzellensubstanz und den der Kolloidsubstanz her. Darauf untersuchte er die pathologisch-histologischen Veränderungen, zu denen es durch wiederholte Injektion von Mengen beider Extrakte von gleichem Jodgehalte gekommen war.

Die Resultate waren die folgenden:

1) Nach der wiederholten Injektion von Epithelzellensubstanz zeigen sich hochgradige Körpergewichtsabnahme, häufige und hochgradige Arterioneurose.

2) Nach der wiederholten Injektion von Kolloidsubstanz finden sich geringere Körpergewichtsabnahme und keine nennenswerte arteriell-nekrotische Veränderungen.

(Autoreferat)

Über den Gaswechsel der mit Gelatine, Tyrosin, und Tryptophan gefütterten weissen Ratten.

Von

Dr. M. Shimasaki.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser untersuchte den Gaswechsel bei weissen Ratten, indem er die Tiere mit eiweissfreier und gelatinehaltiger, oder mit eiweissfreier und gelatine-plus tyrosinhaltiger, oder mit eiweissfreier und gelatine-plus tryptophanhaltiger Nahrung fütterte.

Die Resultate waren wie folgt:

1. Bei mit eiweissfreier und gelatinehaltiger, oder mit eiweissfreier und gelatine-plus tyrosinhaltiger Nahrung gefütterten weissen Ratten:

Das Körpergewicht nimmt rasch ab. Der Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureproduktion nimmt im Anfang rasch und später langsam ab. Der Sauerstoffverbrauch pro Kilo Körpergewicht ist im Beginn herabgesetzt, im Spätstadium aber normal oder erhöht.