臨床及實驗

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス

各種内分泌腺臟器ノ影響

第一篇 副腎剔出及ビ副腎皮質物質投與ノ影響

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士

内 野 幸 作

目 次

- 第一章 緒 言
- 第二章 實驗材料及ビ實驗方法
- 第三章 實驗成績
- 第四章 總括及ビ考按
- 第五章 結 論
- 主要文獻

第一章 緒 言

古ク一八七〇年ニ ⁽¹⁾ H. Heidenhain ガ犬及ビ家兎ノ胃底腺ニ於テ Chrom 親和性ヲ有スル一種ノ特殊細胞ヲ發見セシヨリ該細胞ニ關スル研究澎湃トシテ起リタリ。

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス各種内分泌腺臟器ノ影響……(内野)

カクテ該細胞ガ一種ノ腺細胞タルハ諸家ノ說一致シタレドモ其ノ發生由來ニ關シテハ或ハ内胚葉說、中胚葉說或ハ外胚葉說等唱ヘラレ且其ノ機能ニ至リテモ内外兩分泌說ニ分レ、特ニ分泌物質ニ就キテハ諸說紛々タル狀態ナリ。

爰ニ於テ余ハ該細胞ト内分泌諸臟器トノ關係ヲ系統的ニ檢索スベク實驗ニ着手シ、聊カ知見ヲ得タルヲ以テ茲ニ報告シ以テ諸賢ノ御批正ヲ仰グ次第ナリ。本篇ニ於テハ副腎剔除ノ該細胞ニ及ボス影響並ニ副腎皮質物質投與ノ影響ニ就キテ述ブル所アラントス。

第二章 實驗材料及ビ實驗方法

消化管内ニ廣ク存在セル Chrom⁽²⁾ 親和細胞ハ研究者ニ依リ夫

ル。

々異レル名稱ヲ付セラレタルモ就中 *chromit* ノ黃色細胞 (*yellow Zelle*) ナル名稱最モ一般的ニ用ヒラレ、且本細胞ノ固有有色ヲ現ハスヲ以テ余ハ以下本名稱ヲ使用セントス。實驗動物トシテハ體重三〇—四〇〇瓦ノ健康ナル海猿ヲ選ビ、一定食餌 (オカラ) ヲ以テ飼育シ、體重ノ略々一定セルヲ待チテ實驗ニ着手セリ。雌海猿中妊娠セル者ハ悉ク之ヲ除去シタリ。

實驗動物ハ之ヲ四群ニ分テリ、即チ第一群ハ雌雄各五匹トシ之ヲ對照トナシ第二群ハ副腎兩側剔除ヲナセル雌雄合計五匹、第三群ハ牛副腎皮質粉末ヲ投與セル雌雄合計五匹、第四群ハ一〇%牛副腎皮質食鹽水エキスを注射セル、雌雄合計五匹ヨリ成

副腎剔除手術ハ總テ脊部ヨリウレタン麻醉或ハ麻醉ナクシテ行ヒタリ。即チ空腹時ニ於テ海猿ヲ側臥位ニ手術臺上ニ緊縛固

定シ、肋骨弓下側脊部ヲ剪毛シ、沃度丁幾、アルコールヲ以テ充分消毒シ、肋骨弓下脊腹兩筋間ニ概當スル部ニ切開ヲ加ヘ、脊腹筋間ヲ剝離シテ副腎ニ達シ、副腎ヲ周圍組織ヨリ充分剝離セル後ピンセツトヲ以テ極メテ徐々ニ剔除セリ、而シテ更ニ一週後同様ノ方法ヲ以テ殘側副腎ヲ剔出セリ。海猿ハ一側剔出後一時食欲不振、運動不活潑等ノ症狀ヲ呈スルモ常ニ數日ニシテ回復セシガ、殘側剔出後ニ於テハ食欲不振甚シク一隅ニ躊躇シ次第ニ羸瘦ノ傾向ヲ現ハセリ。

牛副腎皮質粉末及ビ同食鹽水エキスノ製法ハ當教室ノ製法ニ準據セリ。但シ該エキスハ乾燥皮質粉末ヨリ作りタリ。而シテ其ノ濃度ハ一〇%ニシテ混入セルアドナレリノ充分破壞セシハ勿論ナリ。注射部位ハ腹側皮下ニシテ注射速度ハ出來得ル限り一定ヲ保テリ。實驗動物ハ總テ撲殺シ速カニ Präparieren シ Orthische Lösung ニテ固定シ、更ニ三・五%重クロム酸加里液ニテ Nachtrimieren セリ、而シテ 8—10 μ. Paraffin 切片 トシ Haematoxylin-Eosin 重染色ヲナセリ。

抑々腸管黃色細胞ノ増減ヲ云々スルハ實ニ至難ノ事ナリ。是蓋シ凸凹不平ナル腸粘膜ニ或ル一定ノ單位面積ヲ定ムル事ノ殆ド不可能ナルニ基因セルト他ハ黃色細胞ガ全腸管ニ平等ニ分布セズ、部位ニヨリ大イニ其ノ數ヲ異ニセル點及ビ該細胞數ノ個性ニヨリ動搖甚シキニ由ルナリ。Folvet⁽³⁾ ハ家畜胃腸ニ就キ厚サ 6 μ. 長サ 5 cm ノ粘膜切片中ノ黃色細胞ノ總數ヲ計算シ、各部分及ビ各動物間ノ比較ヲ試ミタリ。鄭ハ顯微鏡下ノ目分量

第三章 實驗成績

即チ卅、廿、十、土等ノ記號ヲ以テ其ノ概數ヲ現ハセリ。⁽⁵⁾ 中井川ハ人、家兎蟲様突起ニ於テ十枚ノ切片ヲ選ビ、各切片ニ存スル腺横斷面ノ全數(數百—數千)ト其ノ内ニ見ラル、黃色細胞トヲ計算シ、此等ノ總和ヨリ腺横斷面百ニ對スル平均數ヲ算出シ、以テ其ノ増減ノ判定ニ供セリ。G. Kallan⁽⁶⁾ ハ海獺ノ全腸管即チ胃、十二指腸、空腸、迴腸、盲腸、上部大腸及ビ下部大腸ニ於テ夫々數個ノ切片ヲ作り腺横斷面百中ニ含マル、黃色細胞總數ヲ以テ腸各部分ノ黃色細胞數トセリ。余ハ G. Kallan⁽⁶⁾ 氏法ニ從ヒタリ。然レドモ海獺ニ於テハ盲腸及ビ大腸ニ於テハ黃色細胞非常ニ少ク時ニハ發見困難ノ事アリ、從ツテ其ノ増減ヲ知ルハ至難ニシテ且意義少キヲ以テ之ヲ省略セリ。切片ハ腸各部分ニ於テ夫々四—五個作製シ、記方法ニテ算出シ其ノ平均値ヲ求メタリ。而シテ切片ハ腸腺ガ出來得ル限り Langschmitt⁽⁴⁾ ニナル如ク努メタリ。

海獺ニ於テハ黃色細胞ハ鄭⁽⁴⁾、G. Kallan⁽⁶⁾ 等ノ記載セル如ク、十二指腸特ニ其ノ上部ニ多ク急速ニ其ノ數ヲ減ジ、空腸ニ至レバ二分ノ一以下トナリ、迴腸ニ至レバ更ニ其ノ二分ノ一以下ノ數トナル。且下部ニ至ル程顆粒ニ乏シキ傾向

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス各種内分泌腺臟器ノ影響……(内野)

アリ。細胞形狀ハ腺固有膜ニ接シタル細胞基底部ハ隣接上皮細胞ヨリ其ノ幅廣ク、腺腔ニ向ヘル上部ハ漸次狹小ナリフラスコ形、或ハヒラミツド狀ヲ呈シ、核ハ圓形、或ハ橢圓形ニシテ顆粒ハ僅少ナル時ハ基底部ノミヲ占メ其ノ數ヲ増加スルニ從ヒ基底全體ヲ密ニ滿タシ次第第二上方ヲモ滿タスモノナリ。

(イ) 對 照

雌雄合計十例ノ黃色細胞數ヲ調べシニ個性ノ動搖比較的甚シク、十二指腸ニ於テハ最大ハ八號ノ一二五、最少ハ二號ノ七五、其ノ差ハ五〇ニシテ十例ノ平均ハ九一ナリキ。空腸ニ於テハ最大ハ二號及ビ八號ノ四三ニシテ最少ハ四號ノ二八、其ノ差一五ニシテ十例ノ平均三七、廻腸ニ於テハ最大ハ六號ノ一九、最少ハ四號ノ七ニシテ其ノ差一二、即チ三倍弱ノ動搖アリ、十例ノ平均ハ一三ナリキ。十二指腸、空腸及ビ廻腸ノ黃色細胞數ノ總和ヲ以テ余ハ海獺ノ腸管内ノ該細胞ノ全數ヲ想像セシムル目標トセシニ最大ハ八號ノ一八六、最少ハ四號ノ一一三其ノ差七三、即チ海獺ノ個性ニヨリ此ノ如キ大ナル黃色細胞數ノ動搖アルヲ知レリ。十例ノ總和平均ハ一四一、余ハ之ヲ以テ正常健康海獺腸管黃色細胞數ト假定セリ。(第一表)

余ノ對照ヲ全ク同様ノ方法ヲ以テ算出シタル C. Kallan⁽⁶⁾ ノ對照ト比較センニ氏ノ表(第二表)ニ於テハ十二指腸ニ於テ最大ハ四二號ノ一三八最少ハ四一號ノ八〇其ノ差五八、五例ノ平均ハ一〇五ニシテ、余ノ對照九一ヨリ稍々多シ。空腸ニ於テハ最大ハ一號ノ六三最少ハ四八號ノ一八ニシテ其ノ差四五、即チ非常ニ大ナル動搖アリ、五例ノ平均ハ四一ニシテ余ノ對照ト殆ト一致セリ。廻腸ニ於テハ最大ハ四六號ノ三〇ニシテ最少ハ一號ノ一一ニシテ其ノ差一九

第一表 對 照

動物 番號	體 重	性 別	腺横斷面百中ノ黃色細胞數			總 和
			十二指腸	空 腸	廻 腸	
1	430	♂	98	39	10	147
2	510	♂	75	43	12	130
3	330	♂	78	35	10	123
4	330	♂	78	28	7	113
5	340	♂	90	33	10	133
6	360	♀	94	33	19	146
7	350	♀	85	39	17	141
8	280	♀	125	43	18	186
9	400	♀	90	37	13	141
10	310	♀	93	35	17	145
10 例ノ平均			91	37	13	141

第二表 G. Kahlau 氏ノ對照

動 物 番 號	體 重	腺横斷面百中ノ黃色細胞數			總 和
		十二指腸	空 腸	廻 腸	
1	210	135	63	11	209
46	210	86	33	30	149
42	200	138	44	29	211
48	180	84	18	19	121
41	220	80	48	28	156
平 均		105	41	23	169

方法ノ差異等種々ノ原因アランモ一面該細胞數ガ個性ニヨリ動搖甚シキモノナルヲ物語ルモノナリ、

(ロ) 副腎剥出試驗

十二指腸ニ於テハ最大ハ四號ノ一四四、最少ハ三號ノ一〇三ニシテ五例ノ平均一二八ニテ對照ニ比シ四〇・七%ノ増加率ヲ示ス。空腸ニ於テハ最大ハ四號ノ五八、最少ハ五號ノ三四、平均四三ニシテ一六・二%ノ増加率ヲ示ス。廻

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス各種内分泌腺臟器ノ影響……(内野)

之モ非常ニ大ナル動搖アリ、其ノ平均ハ二三ニシテ余ノ廻腸平均數ノ二倍弱ナリ。腸各部ノ黃色細胞ノ總和ハ、最大ハ一號ノ二〇九ニシテ最少ハ四八號ノ一二二ニシテ其ノ差八八ナル個性的動搖アリ。總和ノ平均數ハ一六九ニシテ、余ノ對照一四一ニ比シ稍々多シ。此ノ如ク氏ノ對照ト余ノ對照ト全ク一致セザルハ飼育

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス各種内分泌腺臟器ノ影響……(内野)

第三表 副腎剔出試驗

動物 番號	體 重	性 別	一側 剔出	經過 日數	殘側 剔出	經過 日數	最終日 體 重	轉 機	腺横斷面百中ノ黃色細胞數			總 和
									十二指腸	空 腸	廻 腸	
1	340	♂	右側	7	左側	2	220	撲殺	140	46	28	214
2	400	♂	〃	7	〃	5	300	〃	133	41	20	194
3	310	♀	左側	7	右側	1	215	〃	103	36	19	158
4	500	♀	右側	7	左側	5	380	〃	144	58	21	223
5	370	♂	〃	7	〃	7	250	〃	118	34	24	176
平 均									128	43	22	193
對 照 ト ノ 差 (增加率)									+40.7%	+16.2%	+69.2%	+36.9%

第四表 牛副腎皮質粉末投與試驗

動物 番號	體 重	性 別	皮 粉 一 日 量	質 末 量	飼育 日數	最終日 體重	轉 機	腺橫斷面百中ノ黃色細胞數			總 和
								十二指腸	空 腸	廻 腸	
1	300	♂	0.2		11	290	撲殺	110	33	19	162
2	370	♂	0.2		11	325	//	81	33	8	122
3	340	♀	0.2		10	320	//	100	26	16	142
4	360	♀	0.2		15	300	//	101	44	11	156
5	410	♂	0.2		20	310	//	125	48	23	196
平 均								103	37	15	155
對照トノ差(增加率)								+13.2%	0%	+15.4%	+9.9%

腸ニ於テハ最大一號ノ二八、最少三號ノ一九、平均二二、即チ六九・二％ノ増加率ヲ示ス。總和ノ最大ハ四號ノ二二三、最少ハ三號ノ一五八、平均一九三ニシテ三六・九％ノ増加率ヲ示セリ。(第三表)

(ハ) 牛副腎皮質粉末投與試驗

十二指腸ニ於テハ最大ハ五號ノ一二五、最少ハ二號ノ八一、平均一〇三對照ニ比シ一三・二％ノ増加率ヲ示ス。空腸ニ於テハ最大ハ五號ノ四八、最少ハ三號ノ二六、平均三七ニシテ對照ニ比シ増減ナシ。廻腸ニ於テハ最大ハ五號ノ二三、最少ハ二號ノ八、平均一五ニシテ、一五・四％ノ

第五表 牛副腎皮質食鹽水エキスを注射試験

動物 番號	體 重	性 別	注射量 (10.0%)	經過 時間	轉 機	腺横斷面百中ノ黃色細胞數			總 和
						十二指腸	空 腸	廻 腸	
1	330	♂	1.0	2	撲殺	118	39	18	175
2	350	♀	1.5	2	〃	132	35	15	182
3	330	♂	1.0	3	〃	79	26	8	113
4	340	♀	2.0	3	〃	108	42	24	174
5	330	♂	1.5	4	〃	121	35	17	173
平 均						112	35	16	163
對照トノ差 (増加及ビ減少率)						+23.0%	-5.7%	+23.1%	+15.6%

増加率ヲ示ス。總和ニ於テハ最大ハ五號ノ一九六、最少ハ二號ノ一二二、平均一五五ニシテ僅カ九・九%ノ増加率ヲ示スノミ。即チ黃色細胞ハ副腎皮質粉末投與ニヨリ輕微ナル増加傾向ヲ示スモ對照ニ比シ著シキ差異ヲ認ムル能ハズ。

(二) 牛副腎皮質食鹽水えきす注射試験

一〇%エキスを一・〇—一・五—二・〇㏄ヲ腹側皮下ニ注射シ、二—三—四時間後撲殺固定シテ檢セリ。十二指腸ニ於テハ最大ハ二號ノ一三二、最少ハ三號ノ七九、平均一一二ニシテ對照ニ比シ二三・〇%ノ増加ヲ示ス。空腸ニ於テハ最大ハ四號ノ四二ニシテ最少ハ三號ノ二六、平均三五ニシテ對照ニ比スルニ逆ニ五・七%ノ減少率ヲ示ス。廻腸ニ於テハ最大ハ四號ノ二四、最少ハ三號ノ八ニシテ平均ハ一六、即チ二三・一%ノ増加ナリ。總和ニ於テハ最大ハ二號ノ一八二、最少ハ三號ノ一一三、平均一六三ニテ對照ヨリ僅カ一五・六%ノ増加ヲ示ス。

第四章 總括及ビ考按

黃色細胞ノ發生由來ニ關シ Parat Clara Tever Hamperl 及 中井川等

ハ内胚葉說ヲ唱ヘ Dias-Amado 等ハ中胚葉說 Schmidt Ciaccio Danisch Kull 鄭等ハ外胚葉說ヲ唱ヘタリ。

内胚葉發生說ヲ唱フル者ノ多クハ胎生ノ或ル一定時期ニ黃色細胞ガ上皮細胞間ニ於テ始メテ發見セラル、事ヲ唯一ノ根據トナシ或ハ又、單ニ該細胞ノ形態學的所見ヲソノ根據トナシタリ。然レドモ余ハ腸上皮細胞間ニ發見セラル、細胞成分ヲ悉ク内胚葉ニ其ノ起源ヲ求ムルハ聊カ早計ナリト信ズ。且細胞ハ周圍ノ狀況ニ適合スルモノナレバ、單ニ形態學的所見ヲ以テ内胚葉性ナリト斷定モ根據薄弱ナリトス。又 Dias-Amado ハ腸粘膜炎固層内ニ於テ黃色細胞ヲ發見シ、該細胞ノ起源ヲ中胚葉ニ歸シタルモ上記ノ理由ニヨリ説明不充分ノ憾ミアリ。

外胚葉說ハ一九〇五年 Schmidt⁽²⁾ ガ黃色細胞ノ散在性分布ハ恰モ Nervöse Elemente タルヲ暗示スルガ如シト考ヘタルニ始ルモ氏ハ該細胞ガ Paraganglion ノ Chrom 親和細胞ト構造ニ於テ一致セザルヲ以テ兩者同一ナリトノ斷定ニハ躊躇セリ。Ciaccio⁽¹⁰⁾ ハ黃色細胞ハ Chrom 親和細胞系統ニ屬スベキモノニシテ、之ト共ニアドレナリンヲ分泌シ周圍ノ狀況ニ適應シテ特異ノ細胞形狀ヲ呈スルモノナリト想像セリ。Danisch⁽¹¹⁾ ハ一・五 μ ノ Gesamtlänge (13 Woche) ノ人胎兒ノ腸管ニ於テ始メハ Meissner 氏神經叢内ニ出現セシ黑色顆粒ヲ含有スル細胞ガ胎生四ヶ月ノ終期ニハ同神經叢ヨリ腸上皮内ニ遊走シ來タレル所見ヲ認メ黃色細胞ハ交感神經節ノ Primäre Anlage 内ノ分化セザル Embryonale sympathische Elemente ヨリ發生スト述べ、Kull⁽¹²⁾ ハ家鷄胎兒ニ於テ黃色細胞ガ其ノ發生初期ニ結締組織ヨリ一五一六 Bebrütungstage ニ固有膜ヨリ腸上皮内ニ楔狀ヲナシテ侵入スル所見ヲ認メ、該細胞ハ恐ラク副腎髓質及ビ Paraganglion ノ Chrom 親和細胞ト同一起源ヨリ發生スルモノナラント想像セリ。鄭⁽¹³⁾ ハ各級脊椎動物ノ胎兒ニ於テ黃色細胞ヲ發生學的ニ檢索シ、該細胞ハ副腎髓質細胞ト共ニ交感神經系統ヨリ發生スル外胚葉性ノ細胞ナリトセリ、即チ腸

壁ニ存スル交感神經叢特ニ Meissner 氏神經叢ノ神經節細胞ガ胎生初期ニ粘膜筋層ヲ貫キテ腸上皮内ニ遊走シ來タリ次デ細胞體及ビ核ノ變化ヲ來タシタル者ニ外ナラズ、即チ此ノ關係ハ正ニ副腎髓質ガ腹部大動脈ノ周圍ニ存スル Paraganglion ヨリ發生スルト同様ニシテ只前者ノ場合ハ神經節細胞ガ上皮層ニ到達スル前後ニ於テ始メテ、所謂黃色細胞トシテ現ハレ且其ノ遊走スル時期ガ比較の遅キニ反シ、後者ノ場合ハ比較の早期ニ Paraganglion ヨリ嗜 Chrom 性ノ細胞索トシテ副腎内ニ遊走シ來タレルヲ異ニスルノミト。而シテ斯カル神經節細胞ヨリ黃色細胞ヘノ轉化ハ腸管ノ一個所ニ局限スルモノニ非ズシテ其ノ全長ニ亘リテ行ハル、モノナリト述ベタリ。更ニ黃色細胞ト副腎髓質細胞トノ理化學的性状ヲ比較考察センニ Chrom 親和性、嗜銀性及ビ嗜酸性ノ三大性質ガ極メテ副腎髓質細胞顆粒ニ類似セル點又 Eri⁽¹⁴⁾ ハ Chrom 及ビ銀親和性ノ他ニ Lipoidhaltig ノ點ニテ一致セルヲ述ベ、更ニ鄭⁽⁴⁾ ハ各種固定液及ビ各種染色法ニテ詳細ニ兩細胞顆粒ヲ比較シ極メテ類似點アルヲ強調セリ。又黃色細胞顆粒ノ本態ニ關シ Vici⁽¹⁶⁾ ハ黃色細胞ハ副腎髓質ト共ニ Chrom 反應陽性ナレバ恐ラクアドレナリン様物質ヲ分泌スルモノト想像シ Hamperl ハ Brenzkatechin, Clara⁽¹⁶⁾ ハ Ortho-Dioxybenzolderivat⁽¹⁷⁾ ニシテ Para-Stellung⁽¹⁷⁾ 卽 Phenolische Hydrooxylgruppe ガ着キタルモノトシ鄭⁽⁴⁾ Mo Phenol 核中 OH ニ對シ Para-Stellung ニ一箇ノ側鎖ヲ有スル Ortho-Dioxybenzol 化合物ナリトセリ。是レアドレナリンノ構造式ト同様ナリト云フベク只アドレナリンニ於テハ側鎖ノ構造既ニ明カニセラレタルヲ異ニスルノミ。以上文献ヲ通覽スルニ黃色細胞ノ發生由來ニ關シ内胚葉性、外胚葉性ノ決定ハ暫ク措クモ副腎髓質細胞ト其ノ理化學的性状ニ於テ極メテ類似セルヲ知ルベシ。最近 G. Eri⁽¹⁷⁾ ハ犬及ビ家兎ニ於テ Paquein ニテ副腎ヲ大部分破壊シ腸管黃色細胞數ヲ檢索セシニ實驗動物ガ一週間モ生存セシ時ハ該細胞數著シク増加セルヲ認メタリ。

腸管ニ於ケル所謂黃色細胞ニ及ボス各種内分泌腺臟器ノ影響……(内野)

余モ同様ニ第三表ニ示セル如ク、副腎剥出ニヨリ明カニ黃色細胞數増加セルヲ認メタルモ副腎皮質粉末投與及ビ同皮質食鹽水エキスノ注射ニ於テハ對照ニ比シ著變ナカリキ。即チ腸管黃色細胞ハ副腎剥出ニヨリ其ノ數ヲ増加スルヲ以テ副腎ト關係ノルヲ思ハシム。然レドモ中胚葉性ナル皮質物質投與ニヨリテハ著シキ影響ヲ受ケザル事ヲ認メタリ。

第五章 結 論

余ハ海猿ヲ使用シ兩側副腎剥出、牛副腎皮質粉末投與及ビ同皮質食鹽水エキスを注射シ腸管黃色細胞ノ消長ヲ檢索シ左ノ成績ヲ得タリ。

- 一、兩側副腎剥出ハ海猿ノ腸管黃色細胞數ヲ増加セシム。
- 二、副腎皮質粉末投與ハ該細胞數ニ殆ト影響ヲ及ボサズ。
- 三、同皮質食鹽水エキスを注射モ殆ト影響ヲ與ヘズ。

綱筆スルニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導ヲ御校閲ヲ賜ヒシ恩師辻教授並ニ三宅講師ニ深謝ス。

出 版 文 献

- 1) R. Heidenhain: Arch. f. mikr. Anat. Bd. 6, S. 368 (1870).
- 2) Schmidt: ebenda Bd. 66, S. 12 (1905).
- 3) Tehver: Ztschr. f. mikr.-Anato. Forsch. 21, S. 462 (1930).
- 4) 鄭: 朝鮮醫學會雜誌, 第24卷, 第3號, 1頁 (昭和9年).
- 5) 中井川: 東北醫學會雜誌, 第17卷, 第5冊, 441頁, 459頁 (昭和10年).
- 6) G. Kahau: Ztschr. f. d. g. Exp. Med. Bd. 80, S. 190 (1932).
- 7) Parat: Compt. Rend. Soc. Biol., T. 90 (1924), Zit. nach Berichte ii. d. g. Physiol. 27, S. 43 (1924).
- 8) Clara: Ztschr. f. Mikr.-Anato. Forsch. Bd. 6, S. 28 (1926).
- 9) Dias-Arnado: Compt. Rend. Soc. Biol., T. 83, Nr. 37, S. 1650 (1925), Zit. nach Berichte ii. d. g. Physiol. 35, S. 418 (1926).
- 10) Ciaccio: Zit. nach Clara 8.
- 11) Danisch: Ziegler's Beiträge z. Pathol. Anat. u. z. allg. Path. Bd. 72, S. 687 (1924).
- 12) Kull: Ztschr. f. Mikr.-Anato. Forsch. Bd. 2, S. 163 (1925).
- 13) 鄭: 朝鮮醫學會雜誌, 第24卷, 第4號, 68頁 (昭和9年).
- 14) G. Erös: Frankf. Ztschr. f. Pathol. 36, S. 402 (1926).
- 15) Hamperl: Ztschr. f. Mikr.-Anato. Forsch. Bd. 2, S. 506 (1925).
- 16) Clara: ebenda Bd. 30, S. 467 (1932).
- 17) G. Erös: Frankf. Ztschr. f. Pathol. 40, S. 115 (1930).

Über den Einfluss der Nebennierenexstirpation und der Zufuhr von Nebennierenrinden- substanz auf die „gelben Zellen“ des Meerschweinchendarmes.

Von

Dr. K. Uchino.

(Ans der 1. Med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Der Verfasser versuchte, nach der G. Kahlauschen Methode die Anzahl der gelben Zellen des Meerschweinchendarmes festzustellen und kam dabei zu folgenden Resultaten.

1) Die gelben Zellen kommen beim Meerschweinchen im Darmtraktus an den verschiedenen Stellen in sehr wechselnden Mengen vor. Sie finden sich stets in der weit grössten Menge im Duodenum. Nach abwärts zu nehmen sie dann sehr schnell ab. Ich zählte auf 100 Drüsen im Duodenum 91 (Durchschnittswert), im Jejunum 37 und im Ileum 13 gelbe Zellen.

2) Bei beiderseitiger Nebennierenexstirpation finden sich im Darmtraktus mehr gelbe Zellen als beim Kontrolltiere, nämlich im Duodenum 128, im Jejunum 43 und im Ileum 22.

3) Die Fütterung mit Nebennierenrindenpulver des Rindes beeinflusst die Zahl der gelben Zellen des Meerschweinchen-Darmtraktus nicht.

- 4) Die Injektion des Kochsalzlösungsextrakts der Nebennierenrinde des Rindes hat auch keinen Einfluss auf die Zahl der gelben Zellen des Meerschweinchen-Darmtrakts. (Autoreferat)
-

Ein Beitrag zur Kenntnis der pharmakologischen Wirkung von Pituitrin, Histamin und Papaverin auf die Gefäße des Kaninchens.

Von

Dr. M. Sakamoto.

(Aus der 1. Med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto
in Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Die Wirkung des Pituitrins besteht darin, dass es beim Durchgange durch isolierte Organe die Gefäße kontrahiert. Der Verfasser hat schon in seiner früheren Mitteilung über die gefäßverengernde Wirkung des Pituitrins am isolierten Kaninchenhoden berichtet (*Folia Endocrinologica Japonica* Bd. XI, S. 24, 1935). In der vorliegenden Mitteilung handelt es sich um weitere interessante Gefäßwirkungen des Pituitrins.

Wenn man beim Durchblutungsversuch am isolierten Kaninchenhoden das Hodengewebe von der Art. spermatica interna abtrennt und nur diese Arteria durchblutet, so erzeugt die Injektion von Pituitrin in die Art. spermatica interna stets Beschleunigung des Durchflusses (Tab. 1). Das Pituitrin kontrahiert also zunächst die Kapillaren, nicht die Arterien.

Weiter stellte der Verfasser hinsichtlich der Wechselbeziehungen von Pituitrin, Histamin und Papaverin an den isolierten Hoden-, Ohr- und Nierengefäßen des Kaninchens folgende interessante Tatsachen fest (Tab. 2—Tab. 12).

- 1) Die kapillarenverengernde Wirkung des Pituitrins tritt an