骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン其他二、三藥物ノ影響……（今井）

八〇〇

骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン 其他二、三藥物ノ影響

京都帝國大學醫學部辻內科教室

大學院學生 醫學士 今井 霸 太 郎

目 次

第一章 緒 言	射及ビ鹽化バリウム及ビ ヒスタミンノ影響
第二章 實驗方法	第四節 チロキシンの影響
第三章 實驗成績	第五章 總括並ニ考按
第一節 對照實驗	結 論
第二節 鹽化アドレナリンノ影響	主要文獻
第三節 鹽化アドレナリンノ再注	

第一章 緒 言

末梢血液像ノ變動ヲ齎ラス要因トシテ舉ゲラル、モノハ實ニ多種多樣ナリト雖モ、要スルニ造血器ノ機能ニ基因スル眞性變化ト、造血器ノ機能ニ直接關係ヲ有セザル假性變化トニ集約シ得。アドレナリンニ著明ナル血球增多作用ノ存スルコトハ已ニ異論ナシトスルモ、其ノ作用機轉ニ關シテハ古來種々ノ說アリ、即チ脾臟平滑筋ノ收縮ニヨリ脾臟中ヨリ血球ノ壓出セラル、ニヨルトナスモノ（Frey, Harvey, Stein）、骨髓中ノ貯藏血球ノ動員ガ主ナリトナスモノ

(Hess, 中島、勝沼)肝臓ニ主因ヲ求ムルモノ(佐藤)、血液分布ノ變化ニヨルトナスモノ(Müller, Pappenheim, Kaegi, Glaser, Haregan, 尾崎、植松)、細胞向化性ノ變化ニヨルトナスモノ(Śkorczewsky u. Wasserberg, Schenkel u. Schlecht, Goldscheider u. Jacob, Friedberg)、血液酸塩基平衡狀態ノ變化ヲ其ノ一因ニ舉グルモノ(酒井)、血液濃稠ニヨルトナスモノ(Hess, Gaisböck)、血壓ノ昇騰ヲ舉グルモノ(Schenk)、植物神經ノ刺激ニヨルトスルモノ(Oehme, Schenk, Bertelli, Fatta u. Schweeger, Schoen u. Berchold)、白血球中樞ニ作用ストナスモノ(土肥)、骨髓機能亢進ニヨルトナスモノ(Mandelstamm, Schoen u. Berchold, Edmund u. Stone, Platz, Isamanowa, Walterhofer 中村、村尾、宇野、森本)等アリ甲論乙駁未ダニ論議ヲ跡ヲ斷タズト雖モ要之スルニ機械的作用ヲ主ナリトスル説ト造血器殊ニ骨髓機能ヲ主因ト看做ス説トニ歸納セラル。

余ハ曩ニアドレナリンハ骨髓系細胞ノ増加ヲ來スモ、骨髓營養血管ヲ結紮セル動物ニ於テハアドレナリンノ増血作用ハ減弱セルヲ認メ、アドレナリンハ骨髓ニ作用スルモノナラント推論セリ。然ルニアドレナリンハ骨髓ニ直接作用スルモノナリヤ否ハ又議論ノ存スル所ニシテ、Borchard ハホルモン乃至自律神經ヲ介シテ骨髓ニ作用スルモノニシテ直接化學的ニ作用スルモノニ非ズトシ、高橋ハ甲狀腺並ニ脾臓ヲ介シテ二次的ニ骨髓ニ作用スルモノナリト云ヘリ。余ハ直接骨髓ニアドレナリンヲ作用セシメテ血球ノ生産増加アリヤ否ヤヲ檢セントシテ本實驗ヲ企テタリ。

第二章 實驗 方法

H. Volker u. K. Erickson 〱 Bornstein ノ方法ニ倣ヒテ犬下

肢ヲ脱纖維牛血液ヲ以テ灌流シタルニ三十分以後ニ於テ牛血球

骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン其他二、三藥物ノ影響……(今井)

ハ犬血球ニヨリ置換サレ且赤血球白血球共ニ幼若型細胞ノ出現スルヲ認メ、骨髓ノ研究ニ下肢灌流ノ方法ヲ推奨セリ。余ノ先ニ行ヘル本誌第十二卷第二號所載ノ摘出家兔大腿骨ヲ灌流スル方法ハ更ニ合理的ナラント考ヘ本實驗ニ於テハ酸素ヲ以テ飽和セルリンガル氏液ヲ攝氏三十八度ニ加温シ五〇哩ノ水柱壓ヲ以テ灌流シ、灌流開始後約一時間後、即チ流出量略々一定シ、流出液透明トナリタル後試験液ヲカニューレ直上ノゴム管ヨリ注入シ、流出液中ニ含有サル、血球數ニ及ボス影響ヲ檢シタリ。

流出液ハ試験液注入前及ビ注入後各十分或ハ十五分間毎ニ目盛セルスピツグラスニ採集シ、量ヲ測定シタル後、一分間約三

千回轉ノ遠心器ニテ十分間遠心沈澱シタル上澄液ノ一c.c.ヲ殘シ他ハ棄テ、之ノ一c.c.ノ殘存液中ニ沈渣ヲ均等ニ混和シタルモノヲ、Thoma-Netz 血球計算板ヲ用ヒテ血液檢査同様ノ操作ニヨリ含有サル、血球數ヲ算出セリ。此處ニ得タル血球數ヲ流出液量數ニテ除シタル商ヲ流出液一c.c.中ニ含有サル、血球數ト看做セリ。

試験藥鹽化アドレナリン(三共)、ヒスタミン(グリユーブレル)、鹽化バリウム(メルク)ハ使用時ニ臨ミリンガル氏液ニテ稀釋シ、チロキシン(ロツシユ)ハ原液ヲ使用セリ。

第三章 實 驗 成 績

第一節 對 照 實 驗

骨髓血管中ニ貯溜サル、血球ガリンゲル氏液ニテ洗ヒ出サレタリト思ハル、後ニ於テ、流出液中ニ尙血球ノ存在スルヤ否ヤ及ビ夫ノ動搖ノ狀態ヲ知ラントシテ、灌流開始後一時間目ヨリ二時間ニ至ル間ノ流出液中ノ血球數ヲ檢シタルニ第一表ニ示セルガ如ク流出液量及ビ含有サル、血球數ハ略々不變ナルヲ知レリ。(第一表)

第一表 對 照

	經過時間	各15分間 ニ於ケル 流出液量 (c.c.)	沈澱液 1 c.c. 中ノ		流出液 1 c.c. 中ノ	
			白血球數	赤血球數	白血球數	赤血球數
1	0—15'	5.2	340	730	65.4	140.4
	15'—30'	5.0	310	700	62.0	140.0
	30'—45'	4.7	280	680	59.6	144.6
	45'—60'	4.3	230	620	53.4	141.1
2	15'	6.1	235	460	38.5	75.4
	30'	5.6	230	420	41.0	75.0
	45'	5.5	200	410	36.3	74.5
	60'	5.2	200	370	38.4	71.2
	75'	5.3	190	370	35.8	69.8
3	15'	5.8	170	960	30.6	165.5
	30'	5.8	170	950	30.6	163.8
	45'	5.6	150	930	26.8	166.0
	60'	5.3	130	860	24.5	162.2

第二節 鹽化あどれなりンノ影響

余ノ曩ニ行ヘル灌流實驗ノ成績ヲ見ルニ骨髓血管ニ對シアドレナリンノ十萬倍液ハ強キ收縮作用ヲ示シ、一時流出液ヲ停止セシメ、百萬倍液ハ收縮作用稍々弱キニ過ギ、五十萬倍液ヲ以テ適當ト思ハル、ニヨリ本實驗ニテハ五十萬倍液〇・五 c.c.ヲ注入シタルニ、流出液量ハ減少シ、血球數ハ白血球、赤血球共ニ明ニ増加セルヲ認メタリ。(第二表)

第三節 あどれなりン再注入及ビ鹽化ばりうむ

並ビニひすたみンノ影響(第三表)

前節ニ於テアドレナリンニヨリ著明ナル血球數ノ増加ヲ認メタルガ本節ニ於テハ、更ニ之ガアドレナリンノ收縮作用ニヨリ骨髓中ニ殘存セル血球ガ壓出サレタルモノナリヤ否ヤヲ知ラントシテ、第一回ノアドレナリン注入ニヨリ増加セル血球數ガ減少ニ向ハントスル時期ニ於テ再ビアドレナリンヲ注入セルニ血球數ハ再び増加ヲ示セリ(第一、第

第二表 アドレナリン

	経過時間	各10分或ハ 15分間ニ於 ケル流出液 量 (c.c.)	沈澱液 1 c.c. 中ノ		流出液 1 c.c. 中ノ	
			白血球數	赤血球數	白血球數	赤血球數
1	注射前10'	5.5	320	800	58.1	145.5
		50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入				
	注射後10'	3.1	230	500	74.2	161.3
	20'	3.3	300	1000	91.0	303.0
	30'	3.0	250	1200	83.3	400.0
	40'	3.0	200	400	80.0	160.0
2	70'	2.1	110	130	52.3	61.9
	前 15'	5.0	45	400	9.0	80.0
		50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入				
	後 15'	3.0	36	250	12.0	83.0
	30'	3.5	49	330	11.5	94.2
	55'	4.6	47	230	10.3	41.8
3	70'	4.1	32	280	7.0	68.2
	前 15'	6.6	0	600	0	90.9
		50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入				
	後 15'	4.6	78	828	16.9	180.0
	30'	3.7	85	670	22.9	181.1
	50'	3.5	0	360	0	102.8
4	65'	4.2	0	450	0	107.1
	80'	5.8	0	330	0	57.9
	前 15'	7.3	150	1500	20.5	205.4
		50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c.				
	後 15'	3.0	105	800	35.0	266.6
5	30'	2.4	100	630	41.6	262.0
	45'	4.5	100	750	22.2	166.6
	前 15'	5.0	80	1350	16.0	270.0
		50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c.				
5	後 15'	3.2	70	925	21.8	289.0
	30'	2.7	85	1450	31.4	537.0
	45'	3.5	60	1080	17.1	308.5

骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン其他二、三藥物ノ影響……(今井)

第 三 表

	經 過 時 間	各15分間 ニ於ケル 流出液量 (c.c.)	沈澱液 1 c.c. 中ノ		流出液 1 c.c. 中ノ	
			白血球數	赤血球數	白血球數	赤血球數
1	前 15'	4.8	200	2000	41.7	347.3
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	4.0	170	2500	42.5	625.0
	30'	4.0	180	2000	45.0	500.0
	45'	4.6	210	2300	42.0	460.0
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入					
	15'	3.2	270	2300	84.4	718.8
	30'	4.0	330	2500	82.5	625.0
	50'	3.5	220	1000	62.9	285.6
2	前 15'	5.3	120	900	22.6	169.8
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	2.7	116	680	42.9	251.7
	30'	3.2	116	750	36.2	234.3
	45'	4.0	123	700	30.7	175.0
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入					
	15'	2.0	95	520	47.5	260.0
	30'	1.7	83	480	48.8	282.3
	45'	2.8	70	480	29.1	171.4
3	前 10'	5.6	94	1510	16.7	269.8
	1 % 鹽化バリウム 0.5 c.c. 注入					
	後 10'	4.6	81	1230	17.5	267.3
	20'	3.7	50	930	13.5	167.8
	30'	3.5	60	950	17.1	260.1
	40'	3.2	54	900	16.8	281.2
	60'	4.5	45	500	10.0	111.1
4	前 15'	9.2	160	900	19.2	97.8
	1 % 鹽化バリウム 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	7.1	140	700	18.3	98.5
	30'	7.5	150	740	20.0	98.6
	45'	7.3	138	700	18.9	95.8

骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン其他二、三藥物ノ影響……(今井)

	経過時間		各15分間 ニ於ケル 流出液量	沈澱液 1 c.c. 中ノ		流出液 1 c.c. 中ノ	
				白血球數	赤血球數	白血球數	赤血球數
5	前	15'	5.0	0	930	0	186.0
	50 萬倍ヒスタミン 0.5 c.c. 注入						
	後	15'	3.0	0	680	0	226.7
		30'	3.2	0	250	0	78.1
		45'	4.0	70	250	17.5	62.5
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入						
		15'	3.0	50	700	16.7	233.3
		30'	4.0	100	1100	25.0	275.0
		45'	4.2	35	500	8.3	119.0
6	前	15'	4.0	65	600	16.3	150.0
	50 萬倍ヒスタミン 0.5 c.c. 注入						
	後	15'	2.6	44	400	16.9	153.8
		30'	3.2	50	520	15.9	162.5
	50 萬倍アドレナリン 0.5 c.c. 注入						
		15'	2.6	43	450	16.3	173.0
		30'	2.2	40	410	18.2	186.3

二例。

尙同ジク血管收縮作用ヲ有スルモアドレナリンノ交感神經性ナルト異リ主トシテ平滑筋ニ作用スル鹽化バリウムハ血球數ノ増加ヲ認メラレズ。(第四、第五例)

又アドレナリント匹敵スル骨髓血管收縮作用ヲ示セル(已報)ヒスタミンモ亦流出液中ノ血球數ヲ殆ド増加セシメザルモ、引續キアドレナリンヲ注入スルトキハ明ニ血球數ノ増加スルヲ認メタリ。(第五、第六例)

第四節 ちろきしんノ影響

骨髓機能ニ對シ甲状腺ホルモンハ促進的ニ作用スルモノナルコトハ已ニ多クノ實驗アリ。チロキシント灌流骨髓ニ作用セシメタルニ流出液量ハ輕度ノ減少ヲ示セルニ過ギザルモ、血球數

第 四 表

	經 過 時 間	流出液量 各15分間 (c.c.)	沈澱液 1c.c. 中ノ		流出液 1c.c. 中ノ	
			白血球數	赤血球數	白血球數	赤血球數
1	前 15'	3.3	42	125	12.7	37.0
	チロキシン 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	3.5	50	140	14.3	40.0
	30'	3.4	50	130	14.7	44.1
	45'	3.6	60	133	16.6	36.9
	60'	3.6	50	110	13.8	30.6
2	前 15'	8.2	50	300	6.1	36.5
	チロキシン 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	7.5	77	280	10.3	37.4
	30'	7.2	80	280	11.1	38.8
	45'	7.3	50	200	7.9	33.3
3	前 15'	3.6	60	278	16.7	77.2
	チロキシン 0.5 c.c. 注入					
	後 15'	3.1	90	250	28.9	80.6
	30'	3.4	75	270	22.1	79.4
	45'	2.8	70	220	18.9	78.5

ハ明ニ増加ノ傾向ヲ認メタリ。(第四表)

第四章 總括並ニ考按

末梢血液ニ及ボス種々ノ作用上ヨリ、アドレナリンノ骨髓刺激作用ヲ證シタルモノ尠カラザルコトハ已ニ緒言ニ於テ述ベタル所ナルガ、Loeper et Grouzon ハ家兎及ビモルモツトニテアドレナリン注射後三日目ニ骨髓組織ヲ檢査シ、骨髓ノ赤色増強シ、骨髓細胞ノ増加ヲ認メ、Papilian u. Jannu ハ家兎肋骨骨髓ヲ檢シアドレナリン注射後、四十分ニメガロブラステン、ノルモブラステン、ミエロチーテシ及ビ多核白血球ノ増加ヲ證シ、Mandelstam ハ大腿骨骨髓ニテアドレナリン注射後七分乃至一時間半ニテ已ニ骨髓組織ニ機能亢進狀態ヲ認メ、ミエロチーテン、メタミエロチー

テンヲ伴フ中性顆粒性白血球及ビエリトロブラステンノ増加ヲ認め、アドレナリンハ骨髓ヲ直接刺戟スルモノナリト云ヘリ。又 Schoen u. Berchold ハ、犬脛骨營養靜脈血ヲ檢シ、アドレナリン注射後十分ニシテ最高ニ達スル中性嗜好白血球及ビ其ノ幼若型ノ増加ヲ認め、アドレナリンハ骨髓ニ直接作用スルヲ證シ尙之ハ造血部位ノ直接刺戟ニヨルモノナルカ或ハ骨髓循環ニ變化ヲ齎ラセルガ爲ナリヤハ明ナラズト云ヘルモ、Schoen ハ更ニ此等ノ疑問ヲ解決ス可ク種々ノ實驗ヲ行ヒ、結論トシテアドレナリンハ骨髓ノ流血量ヲ著シク減少セシムルモ、單ニ血壓ヲ上昇セシムルカ又ハアスフィキシノ起サスノミニテハアドレナリン様作用ヲ骨髓ニ及ボサズト云ヘリ。

灌流骨髓ニ血球生産力アル事ハ已ニ Völker u. Eriehson ノ證明セル所ナルガ余ハ家兎大腿骨ヲ摘出灌流シ、略々流出液量及ビ流出液中ニ含有サル、血球數ノ一定セル時期ニ於テ五十萬倍アドレナリン〇、五 c.c.ヲ注入セルニ十分乃至四十分後ニハ著明ナル白血球及ビ赤血球ノ増加セルヲ認めタリ。此ノ増加ハアドレナリンノ有スル血管收縮作用ノ爲ニ骨髓中ニ殘存セル血球ノ壓出サレタルニ非ラザルコトハ、アドレナリンヲ連續二回注射セルニ二回共血球數ノ増加ヲ呈シタルコト及ビアドレナリント作用點ハ異ニスルモ、摘出灌流骨髓血管ニ對シテハ收縮作用ヲ示ス鹽化バリウム並ニヒスタミンヲ作用セシメタル時ニ於テハ流出液量ノ減少ヲ認ムルニ拘ラズ流出血球數ハ殆ド變化ヲ認めザリシコト及ビアドレナリンニ匹敵スル強力ナル血管收縮作用ヲ示スモ、血球數ニハ變化ヲ認めザルヒスタミンヲ注射セル後ニアドレナリンヲ注射セルニ血球數ハ増加ヲ示セルコトニヨリ明ナリ。

以上ヨリ見ルニアドレナリンハ骨髓ニ直接作用シ、骨髓造血機能ヲ促進スルモノナリ。又鹽化バリウムハ Harvey 栗原ニヨリ淋巴球增多ヲ主トスル白血球增多症ヲ來スコトヲ認めラレ、ヒスタミンハ Port u. Brunow, Ruggieri ニ

リ白血球增多ヲ認メラレ、Brednow ニヨリ赤血球ノ減少ヲ報ゼラレ Gerli, Pietro ハ赤血球數ハ不變、白血球總數及ビ淋巴球ノ増加ト中性嗜好白血球ハ著變ナシトシ、前田ハ血色素、赤血球ノ増加傾向ト中性嗜好白血球ノ増加、淋巴球ノ減少ヲ伴フ白血球増加ヲ報告シ、横山モ赤血球血色素ノ増加及ビ白血球ノ一時的減少後ノ増加ト淋巴球ノ減少ヲ報告セルモ、余ノ成績ヨリ見ルニ兩者ノ血液像ニ對スル作用ハ骨髓機能ト關係ヲ有スルモノトハ認め難ク、Harvey ハ鹽化バリウムハ脾臓ニ作用スト云ヒ筒井モヒスタミンノ血液像ニ對スル作用ヲ檢シ、骨髓機能ト關係ナキコトヲ記載セリ。甲狀腺ホルモンニ骨髓刺激作用アルコトハ已ニ Mansfeld u. orbán, Lim Sarkar & Broun, Base, Dumble, Thaddeu, 中尾、横井及ビ當教室錦織、上小澤、奥、空地、祝、村尾、宇野、森本等ノ業績ニヨリ證明サレシ所ナルガ余ハ灌流骨髓ニチロキシシンノ〇五・c.c.ヲ作用セシメタルニ流出液量ハ輕度ノ減少ヲ見タルニ過ギザリシモ、流出血球數ハ赤血球、白血球共ニ増加ノ傾向ヲ看取シ得タリ。

第五章 結 論

酸素ヲ飽和セルリンゲル氏液ニテ灌流セル摘出家兎大腿骨々髓ニアドレナリン、鹽化バリウム、ヒスタミン及ビチロキシシンヲ作用セシメタル實驗ニ於テ、

- 一、流出液量及ビ流出液中ニ含有サル、血球數ハ灌流開始後一時間目ヨリ二時間目ニ至ル間ニ於テハ殆ド一定ス。
- 二、アドレナリンハ流出液量ヲ減少セシメ、含有サル、白血球及ビ赤血球數ハ著明ニ増加セシム。
- 三、アドレナリンヲ二回注入スルニ二回共血球ノ増加アリ。

骨髓造血機能ニ及ボスアドレナリン其他二、三藥物ノ影響……(今井)

四、鹽化バリウム及ビヒスタミンハ流出液量ヲ減少セシムルモ、血球數ハ殆ト増加セシメズ。併シヒスタミンヲ作用セシメタル後ニ於テモアドレナリンヲ作用セシムルトキハ血球數ノ増加ヲ見ル。

五、チロキシニンヨル流出液量ノ變化ハ輕度ナルモ、血球數ハ増加ノ傾向ヲ認メ得。

謝辭ニ當リ恩師辻教授並ニ菊地前講師三宅講師ニ御指導ト御校閲ノ勞ヲ深謝ス。

出 張 文 献

- 1) H. Volker u. K. Erichson: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 127, 269 (1928).
- 2) Bornstein: Ebenda 115, 367 (1928).
- 3) Mandelstamm: Virchow. arch. 261, 858 (1926).
- 4) Schoen u. Berchtold: Arch. f. exp. Path. u. Pharm 105, 63 (1925).
- 5) Schoen: Ebenda 106, 78 (1925).
- 6) Hess: Dtsch. Arch. f. kl. med. 137, 200 (1921).
- 141, 151 (1923).
- 7) Edmunds u. Stone: Arch. internat. de pharmacodyn. et therapie (1924). 28, 39.
- 8) Platz: Ztschr. f. d. ges. exp. med. 30, 42 (1922).
- 9) Istran anova u. Chudrochewa: Ztschr. f. exp. med. 71, 212 (1930).
- 10) Walterhofer: Dtsch. Arch. f. Kl. med. 135, 208 (1921).
- 11) 中村: 福岡醫科大學雜誌, 第 26 卷, 691 頁 (昭和 8 年).
- 12) 宇野: 日本内分泌學會雜誌, 第 9 卷, 657 頁 (昭和 8 年).
- 13) 森本: 日本内分泌學會雜誌, 第 10 卷, 1301 頁 (昭和 10 年).
- 14) 今井: 日本内分泌學會雜誌, 第 11 卷, 第 12 號 (昭和 11 年).
- 15) Harvey: Journ. of physiol. 35, 115 (1906).
- 16) 筒井: 大阪醫事新誌, 原著版, 第 5 卷, 67 頁 (昭和 9 年).
- 17) Stein: Ztschr. f. Kl. med. 108, 566 (1928).
- 18) 中島: 日本藥物學雜誌, 第 9 卷, 第 3 號 (昭和 9 年).
- 19) 藤沼: 日本内科學會雜誌, 第 23 卷, 第 1 號 (昭和 10 年).
- 20) 佐藤: 醫學研究, 第 5 卷, 第 6 號 (昭和 6 年).
- 22) Pappenheim: Pol. Haemat. 25, 107 (1920).
- 23) Kaegi: Pol. Haemat. 25, 107 (1920).
- 24) Glaser: Med. Kl. (1925). 1589.
- 25) Hattegan: W. Klin. Wschr. (1917). H. 49.
- 26) 尾崎: 千葉醫學會雜誌, 第 10 卷, 1313 (昭和 7 年).
- 27) 植松: 慶應醫學, 第 4 卷 283 頁 (大正 13 年).
- 28) Skorzewsky u. Wasserberg: Z. f. exp. path. u. therap. 10, 330 (1912).
- 29) Schwenkel u. Schlecht: Z. f. Kl. Med. 76, 229 (1914).
- 30) Goldscheider u. Jacob: Z. f. Kl. Med. 25, 273

- (1884). 31) 酒井：臺灣醫學會雜誌，第297號，40頁(昭和4年). 32) Oehme: Dtsch. Arch. f. klin. med. 122, 101 (1917).
- 33) Schenk: med. Kl. 11, 279 (1920). D. M. Wschr. (1920). 1192. 34) Bertelli, Balta u. Schweeger: Z. f. Kl. Med. 71, 23 (1910). 35) Borchard: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 139, 47 (1929). 36) Papilian u. Jannu: Virchow. Arch. 264, 361 (1927). 37) 栗原：大阪醫學會雜誌，第30卷，367頁(昭和6年). 38) Port u. Bruunow: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 76, 239 (1914). 39) Ruggieri: Boll. Soc. ital. Biol. sper. 4, 415 (1929). Bericht u. ges. physiolog. 52, 431 (1930). 40) Brednow: Z. exp. Med. 78, 177 (1931). 41) Gerti, Pietro: Osp. Magg (milano) 17, 235 (1929). Bericht u. ges. Phys. 53, 143 (1930). 42) 横山：日本内科學會雜誌，第20卷，177(昭和7年). 43) 前田：日本内分泌學會雜誌，第5卷，2178頁(昭和4年). 44) Mansfeld u. Orbán: Arch. f. exp. Path. u. pharm 97, 285 (1923). 45) Lim, Sarkar u. Broun: J. of Path. and. Bact. 25, 228 (1922). 46) Base: Kl. Wschr. (1924). 1357. 47) Damblié: Z. f. d. ges. exp. Med. 89, 421 (1933). 48) Thaddea: Arch. f. exp. Path. u. Pharmac. 166, 276 (1932)
- 49) 中尾：日本外科學會雜誌，27，第1號(大正15年). 50) 横井：東京醫事新誌，第208號(大正6年). 51) 錦織：甲状腺論文集，第1卷. 52) 上小澤：醫學中央雜誌. 53) 奥：甲状腺論文集，第1卷. 54) 空地：甲状腺論文集，第1卷. 55) 祝：日本内分泌學會雜誌，第3卷，410頁. 56) 林尾：日本内分泌學會雜誌，第6卷，1651頁. 57) 高橋：京城醫事紀要 第6卷，第1號，44頁(昭和11年).

hemmende Wirkung der Ovarilaflüssigkeit war, verglichen mit der des Pelanins schwächer und ungleichmässiger, da die Konzentration der spezifischen Substanzen der Ovarialflüssigkeit je nach dem Zustande der Ovarialfunktion verschieden war.

3) Schilddrüse, Nebenniere, Pancreas und Thymusdrüse führten zu fast keinen nennenswerten Veränderungen. (Autoreferat.)

Über den Einfluss von Thyroxin und Insulin auf das Blutbild der Kaninchen mit unterbundenen Ernährungsgefässen des Knochenmarkes.

Von

Dr. H. Imai.

(Aus der I. Med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Der Verfasser untersuchte den Einfluss von Thyroxin und Insulin auf das Blutbild normaler Kaninchen und das von solchen mit den unterbundenen Aa, nutriciae femoris, tibiae, fibulae, humeri und radio-ulnae.

Die Resultate waren wie folgt:

1) Die Injektion des Thyroxins führte bei den normalen Tieren zur Vermehrung der Thrombocyten, Erythrocyten, Reticulocyten und granulierten Leucocyten sowie zur Verminderung der gesamten Leucocyten und Lymphocyten.

2) Bei den Tieren mit unterbundenen Ernährungsgefässen kam es durch das Thyroxin nicht zur Vermehrung der Thrombocyten, Erythrocyten, Reticulocyten und granulierten Leucocyten.

3) Die Injektion des Insulins führte bei den normalen Tieren zur Vermehrung der Reticulocyten, der gesamten und granulierten Leucocyten und zur Verminderung der Thrombocyten, Erythrocyten

und Lymphocyten.

4) Bei den Tieren mit unterbundenen Ernährungsgefäßen kam es durch das Insulin zur Vermehrung der gesamten und granulierten Leucocyten und zur Verminderung der Thrombocyten, Erythrocyten, Reticulocyten und Lymphocyten. (Autoreferat.)

Über den Einfluss von Adrenalin und einigen anderen Substanzen auf die blutbildende Funktion des Knochenmarkes.

Von

Dr. H. Imai.

(Aus der I. Med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Der Verfasser untersuchte den Einfluss verschiedener Substanzen (Adrenalin, Histamin, Bariumchlorid und Thyroxin) auf die blutbildende Funktion des Knochenmarkes des isolierten durchströmten Kaninchenfemurs.

Die Resultate waren wie folgt:

1) Die Anzahl der Blutkörperchen in der ausströmenden Flüssigkeit war während der zweiten Stunde nach dem Beginn der Durchströmung fast konstant.

2) Adrenalin führte zur Zunahme der Leukocyten- und Erythrocytenzahl in der auströmenden Flüssigkeit. Auf die nachfolgende zweite Adrenalininjektion kam es wieder zur Vermehrung der Blutkörperchen.

3) Histamin verringerte die aus dem Knochenmark strömende Flüssigkeit so stark wie Adrenalin, vermehrte aber nicht die Blutkörperchen in der ausströmenden Flüssigkeit. Wurde jedoch Adrenalin nach dem Histamin injiziert, so kam es zur Vermehrung der Blutkörperchen.

4) Bariumchlorid veränderte die Blutkörperchenzahlen in der