臨床及實驗

アヂソン氏病ノ一例

京都帝國大學醫學部辻內科教室

大學院學生 醫學士 林

大學院學生 醫學士 林

正

憲 裕

目次

第一章 緒言

第二章 臨床の所見

第一節 病歴、入院當時ノ現症

第二節 臨床の檢索

第三章 臨床の所見ニ基ク總括の考按

第四章 結論

主要文獻

第一章 緒言

一八五五年ニ Thomas Addison ニヨリ始メテ記載サレタルアヂソン氏病ハ皮膚粘膜ノ青銅色素沈着、脱力、胃腸障害ヲ主徴候トスル一獨立疾患ナルコトハ今日一般ニ承認セラレ、ソノ發生原因ハ副腎ノ機能不全ニ依ルコトモ亦殆ド

アヂソン氏病ノ一例……(林、林)

確認セラレタリト雖モ、副腎皮質ノミノ機能不全ニヨルモノナルカ又副腎髓質ノ機能不全ニヨルモノカ、多數ノ學者ハ二分シテ互ニ譲ラザル現狀ナリ。

本疾患ハ我國ニ於テハ比較的稀有ノ疾患ニシテ、ソノ豫後モ亦必ズシモ良好ナラズ。

余等ハ最近一例ノアヂソン氏病患者ニ遭遇シ、臨床的檢索ヲ行ヒ、ソノ治療ヲ行ヒタルトコロ輕快シタルヲ以テ、ソノ經過ヲ報告セントス。

第二章 臨床的所見

第一節 病歴、入院當時ノ現症

患者 五〇川 〆ス 四十九歳 吳服商ノ妻。

主訴 全身倦怠及ビ皮膚ノ黑褐色色素沈着。

家族歴 母ハ腦溢血ニテ死亡セリ。一姉ハ肋膜炎ニテ死亡シ、

姉妹中ニ一人ノ神經質ノ者アリト。尙一人ノ姉及ビ弟ハ前額部及ビ頬部ニ黑褐色々素沈着アリ、弟ノ方ハ倦怠感ヲ訴フ。

其他特記スベキコトナシ。

既往病歴 生來虛弱ニシテ約十五年前流行性感冒ヲ患ヒタルガ治療ニヨリ間モナク快癒セリ。尙丁度其ノ頃前頸部ガ腫脹隆起シタルモ身體ニハ何等異常ヲ感ゼズ、約八年ヲ經テ此ノ隆

起ハ漸次不識ノ内ニ消失セリ。

二、三年前屋根カラ落チ顔面ニ外傷シ非常ニ精神の感動打撃ヲ受ケタルコトアリ。

二十二歳ノ時結婚シ二十七歳ノ時流産セルモ其ノ後妊娠セズ。花柳病ニ罹患シタルコトナシ。飲酒癖ナキモ一日饗一箇位ノ喫煙家ナリ。

現病歴 約四、五年前ヨリ何等ノ誘因ナクシテ、茶、コーヒ等ヲ飲用スル際ニ惡心アリ。口唇及ビ乳頭ガ黑褐色トナリ、同時ニ睡眠障害ヲ來セリ。二、三年前ヨリ、食慾不振ニナリ、

胃部ニ膨滿感ヲ生ズ。昨年夏ヨリ全身倦怠、全身衰弱、心悸亢進ヲ來シ、此ノ頃ヨリ茶碗、鐵瓶等ヲヨク落スノニ氣付キ重イ物ヲ持ツコト不能トナレリ。本年一月感冒ニ罹リ。約一週間ニシテ輕快セルモ以上ノ障害ハ更ニ増強シ、難聴、耳鳴、頭痛、眩暈アリ。

前額部、兩側頰部及ビ下顎部續イテ頸部ニ黑褐色色素沈着ヲ生シ、記憶力減退シ著シク神經質トナレリ。意識不明、肩凝、咳嗽、喀痰、盜汗等ハナカリシモ最近ニ至リ手足ニモ亦黑褐色色素沈着ヲ來セリ。

便痛ハ便秘ニ傾キ三日ニ一回位ナリ。

入院當時ノ現症 體格中等大、骨骼纖細、筋發育稍々不良ニシテ皮下脂肪組織著明ニ少ク、羸瘦ス。

體重 三六・六瓩。

皮膚彈力弛緩シ、濕潤度ハヤ、乾燥セリ。

體表一般ニ稍々汚穢暗褐色ヲ呈シ、顔面特ニ前額、兩側頰部、下顎前面、兩耳殼外緣、上下口唇ニ瀰漫性ニ黑褐色色素沈着アリテ其ノ中ニ更ニ黑色調強キ色素斑ヲ認ムル所アリ。

口腔内ニ於テハ舌尖端、兩側舌緣、舌上下兩面及ビ兩側頰粘膜ニ散在性ニ黑褐色色素斑點ヲ見、硬軟兩口蓋、懸垂部ハ輕

微ナルモ亦黑色調ヲ帶ビ色素沈着ヲ認ム。上下齒齦粘膜ニハ著明ナル色素斑點ヲ認ム。

兩側上部眼瞼結膜緣ニ輕度ノ色素沈着アリ。

眼球結膜ニ於テハ右側内眼ニ黑色帶ヲ認ム。

鞏膜ハ兩側共ニ一般ニ稍々褐色ヲ呈シ、散在性ニ汚穢褐色ノ色素斑ヲ見ル。

頸部殊ニ其兩側部及ビ項部ハ瀰漫注ノ暗褐色ヲ呈ス。胸部ニ於テハ乳暈、乳頭極メテ強キ黑色色素沈着ヲ見ル。腹部ハ胸部ヨリ色調稍々強ク殊ニ臍窩ハ強キ黑色調ヲ帶ブ。

背部ニ於テハ腰部ニ頂點ヲ上ニセル略々三角形ノ色素沈着アリ。

上肢ニ於テハ兩側肘關節屈折側特ニ黑褐色ナリ。手掌ニアリテハ左手ニ瀰漫性色素沈着強ク、特ニ指ノ屈折面ノ皺襞及ビ手掌ノ皺襞ニ一致シテ色素斑ヲ認ム。手背ハ兩側殊ニ左側ニ於テ瀰漫性黑色色素沈着著シク、指ノ伸展側皺襞ニ一致シテ色素沈着ヲ見ル。腋窩モ亦其兩側ニ於テ汚穢黑褐色色素沈着著シ。

下肢ニ於テハ兩側膝關節ノ伸展側及ビ屈折側共ニ稍々輕度ノ黑褐色ヲ呈シ、足背部ハ一般ニ黑褐色ヲ帶ビ外踝趾關節及ビ

其ノ附近ニ於テ黑色調著明ナリ。

足蹠ハ兩側共殆下着色ヲ認メザルモ趾附近ノ皺襞ハ黑色ヲ呈ス。

脈膊整調、大サ稍々小ニシテ、緊張弱ク一分時約六十五ヲ算ス。

アシネル氏現象陰性、頸部淋巴腺及ビ腋窩淋巴腺ニ於テ豌豆大ノモノ多數觸ル。頭部尋常ニシテ毛髮發生狀態モ通常ナレド色調ハ所々灰色ヲ呈ス。

顔面左右對稱ニシテ顔面神經麻痺ノ微候ヲ見ズ。

顔貌ハヤ、悲觀的ナリ。結膜ニハ色素沈着ヲ見ル外異常ナク眼裂及ビ眼球運動共ニ正常。

瞳孔ハ左右同大、圓形ニシテ、對光反應、調節力ニ異常ナシ。舌ハ淡灰白色ノ苔有リ。伸展尋常、齒ハ多數ノ義齒及ビ齲齒ヲ認ム。其他咽頭懸壅垂、扁桃腺ニ異常ナシ。

嗅覺、聽覺、味覺ニ異常ナシ。頸部ニ於テ甲狀腺ノ腫脹ヲ認メズ。且頸靜脈ニ獨樂音ヲ聽カズ。

胸部ハ左右對照ニシテ、深呼吸時胸廓開縮差ハ左右共ニ等同程度ナリ。胸腹式呼吸、乳房ノ發育不良ナリ。

心尖搏動ハ第四肋間腔ニ於テ、左鎖骨中線內側一握ニ於テ微

弱ナガラ觸知ス。

心濁音界ハ右ハ胸骨左緣、上ハ第四肋骨、左ハ心尖搏動ニ一致ス。心音ハ總テ清純ナルモ稍々弱シ。肺、肝境界右鎖骨中線ニ於テ第六肋骨。

肺臟、右肺前部第五肋骨以下打診上短ニシテ、聽診上呼吸音ハ微弱ナリ。背部右上部ハ短ニシテ、呼吸銳利延長セルモ雜音ヲ聽取セズ。背部左下部ニ於テ呼吸音微弱ニシテ、氣管枝聲ハ稍々減弱セリ。腹部ハ一般ニ稍々陷歿ス。

異常抵抗、腫瘍壓痛點等ヲ觸知シ得ズ。

肝臟、脾臟、腎臟等ハ何レモ觸知セズ。

上肢ノ粗大力ハ比較的良好ニ保タルモ、握力ハ左右共減弱ス。腱及ビ骨膜反射ハ稍々低下セリ。筋萎縮及ビ癱瘓等ヲ認メズ。下肢ハ粗大力、正常運動及ビ知覺障害ヲ認メズ。浮腫ナシ。膝蓋腱反射及ビアヒレス腦反射ハ兩側共ニ低下ス。異常反射ヲ證明セズ。腓腸筋ノ把握痛ナシ。

尿ハ淡黃褐色透明酸性ニシテ比重一〇二二(三十度)蛋白、糖其ノ他ノ反應凡テ陰性。鏡檢上異常ナシ。糞便ハ消化稍々不良ナルモ、粘液、膿等ナク、虫卵ヲ認メズ。潛血反應陰性ナリ。

第二節 臨床的檢索

第一項 脱力

入院中ノ握力ハ左右共ニ五—十二間ヲ動搖ス。

患者ト約同體重ノ十七歳ノ少女ノ握力ハ左右共ニ二十五ナリキ。

第二項 體重及ビ

體溫

入院中ノ體重ハ三十五斤前後ヲ示シ増減ナク體溫ハ午前中ハ三十五・六度—三十六・〇度ニシテ午後ノ最高モ三十六度五分以上ニ上昇スルコト稀ナリキ。

第三項 血壓

入院中再三檢査シタルニ左側ハ右側ニ比シ最高最低共ニ一〇・〇位高ク。

アヂソン氏病ノ一例……(林、林)

第一表

検査日	血色素 ザーリー	赤色球數 (萬)	白血球數	中性多核 白血球 (%)	淋巴球 (%)	エオジン (%)	大單核 移行 (%)	核型 肥細胞 (%)
21/VI	61	512	9450	34.0	62.4	0.8	2.4	0.4
9/IX		369	6650	34.8	60.8	1.2	2.8	0.4
20/II	61	385	5900	23.2	72.0	0.8	4.0	ナシ

第二表 赤血球沈降速度

30 分	1 時間	2 時間	6 時間	12 時間	24 時間
14	33	64	82	91	101

第三表

検査日	處 置		前	½ 時間	I 時間	1 ½ 時間	2 時間	3 時間
1/VI	米 飯 2709 gr. K. H. 4.5 gr.	血 糖 尿 糖	0.068 (-)	0.129	0.127 (-)	0.115	0.102 (-)	0.093 (-)
12/II	葡 萄 糖 100 gr.	血 糖 尿 糖	(-)		(÷)		(+)	(+)
29/VII	葡 萄 糖 100 gr.	血 糖 尿 糖	0.079 (-)	0.125	0.161 (-)	0.125	0.108 (÷)	0.093 (-)
21/IX	0.1 % アドレ ナリン 0.7 c.c.	血 糖 尿 糖	0.079		0.136		0.083	

アヂソン氏病ノ一例……(林、林)

五七四

右 最高 八〇—九〇 最低 四五—五五

左 最高 八五—九五

最低 五〇—六〇

第四項 血液像及ビ赤血球沈降速度 (第一、二表参照)

第五項 血糖量・耐糖量 (第三表参照)

本患者ノ耐糖量ハ一〇〇・〇瓦ナリ。

量ノ最低値ノ範圍ナリ。

空腹時血糖量ハ〇・〇六八%乃至〇・〇七九%ニシテ正常血糖

第六項 胃 液

七月二日早朝空腹時ニ前液ヲ採リ試験食トシテパン三十瓦水

遊離鹽酸ハ前液及ビ後液共ニ存セズ。

一〇〇・〇瓦ヲ與ヘエワルド氏胃管ニヨリ一時間後ニ後液ヲ採

總酸度ハ前液一、後液五ヲ示セリ。

取セルモノナリ特記スベキコトナキモ、

第七項 瓦斯代謝

七月三日 R. Q. 0.777

九月十七日 R. Q. 0.816

G. U. — 6.5%

G. U. — 17.1%

第八項 腦脊髄液検査

九月七日検査

前壓 一〇〇・〇 m.m.

四・〇 c.c 採取

後壓 七〇・〇 m.m.

グロブリン反應、總テ陰性

含有糖量 〇・〇五二%

ビタミンC量 〇・〇〇二% (ニ―六クロールフェノールイン

ドールフェノール法)

外觀 無色清澄、性ハ中性、比重 一〇〇六

第九項 藥效學的検査

第四表 0.1% アドレナリン溶液 0.7 c.c. 皮下注射

注射前 四十分 一四十分		廿九日 一月																																
				最高血壓	最低血壓	體溫	呼吸數	脈搏數	不正脈	アシエホル	心悸亢進	胸部苦悶	振頭痛	頭面蒼白	惡心	疲勞感	湯散	腫尿																
一三〇〇〇 一〇九〇〇 五九〇〇	四六・〇 二四・八 二三・二	四・四 一・二 四・〇	四九・二 七〇・四 七二・〇	〇・四 〇・八 〇・四	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	〇・四 一・二 四・〇	前	5'	10'	15'	20'	30'	40'	50'	60'	90'	120'					
																			96	96	102	105	105	104	100	100	98	97	96					
																			60	58	60	60	62	56	58	56	58	58	60					
																			36.5°C					37.1°C										
																			22	23	23	22	21	22	21	23	23	21	21					
																			78	90	92	98	99	97	97	98	96	97	92					
																			(-)															

(一)

第五表 1%鹽酸ピロカルピン0.7 c.c. 皮下注射

九 九 日 月	最高血 壓	前	5'	10'	15'	20'	30'	40'	60'	80'	100'	120'
一 時 十 分 後	最高血 壓	99	98	109	110	119	115	112	106	104	100	94
十 分 後	高低血 壓	65	67	66	70	74	72	72	72	66	65	66
前	體 溫	36.7°C			36.7°C		36.5°C			36.2°C		36.2°C
六 六 五 〇	呼 吸 數	20	18	24	23	22	23	20	18	20	18	18
六 六 〇 〇	脈 搏 數	73	84	106	93	96	93	90	78	78	73	70
二 九 ・ 六	中性 血 多 核 球 數	(-)	(-)	5c.c.	10c.c.	25c.c.	25c.c.	25c.c.	20c.c.	10c.c.	(-)	(-)
三 四 ・ 八	ア シ ム ネ ル	(-)	(-)			(-)						
二 九 ・ 六	唾 液 分 泌 量	(-)	(-)									
七 四 ・ 四	縮 腹 裏 急 後 重 痛	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
六 〇 ・ 〇	吃 逆 心 吐											
六 二 ・ 八	嗜 好 嘔 吐											
一 ・ 二	嗜 好 嘔 吐											
二 ・ 四	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
一 ・ 六	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
二 ・ 八	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
五 ・ 二	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
四 ・ 四	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
〇 ・ 四	嗜 好 嘔 吐	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)

第六表 0.1% アトロピン溶液 0.7 c.c. 皮下注射

	前	5'	10'	15'	20'	30'	40'	60'	80'	100'	120'
最高血圧	92	94	94	92	98	94	94	92	92	94	92
最低血圧	60	60	62	64	64	62	60	62	62	62	60
口渴	(-)	(-)	(-)	(÷)	(+)	(+)	(+)	(÷)	(-)	(-)	(-)
胸部悶苦											
體溫	36.5°C					36.5°C					36.5°C
呼吸數	20	20	21	22	20	22	23	21	20	20	20
脈搏數	72	72	72	78	84	87	88	87	84	82	78
不整脈											
頭痛											
頭面蒼白											
瞳孔散大											
瞳力障害											
視力											
視力											
疲勞											
アシュメル尿											
糖尿											

(-)

第一圖

1%ピロカルピン 0.7 c.c. 皮下注射 = ヨル (9/IX)

血中 K, Ca. 量ノ變動

正常値 K 16—22, Ca 9—16, K/Ca 1.30.

	前	30'	60'	120'
K	30.99	31.40	30.23	29.80
Ca	11.32	11.78	11.55	11.10
K/Ca	2.72	2.66	2.62	2.68

(單位ハ mg/dl)

第二圖

0.1%アドレナリン皮下注射 (0.7 c.c.) = ヨル

血中 Ca, K ノ變動

胸部及ピ腹部ノレントゲンの検査ヲ行ヒタルモ兩側ニ於テ極

第十二項

大便秘及ビ尿ノ所見モ尋常ナリ。

ク輕度ノ肺浸潤ノ像ヲ認メタル外特記スベキコトナシ。

第十三項 治療經過

入院中ハ毎日〇・一%アドレナリン溶液〇・三c.c.及ビ副腎皮質ホルモンナルエネツクス一・〇c.c.ノ皮下注射ヲ行ヒ、退院後約半ケ年間隔日ニ〇・一%アドレナリン溶液〇・三及ビエネツクス二〇c.c.ノ皮下注射ヲ繼續セリ。

尙退院後ハ可及的多量ノ食鹽ヲ經口のニ投與セリ。即チ副食物モ多量ノ食鹽ヲモツテ調味料トシ且ツ食鹽水ヲ番茶ノ代リニ可及的多量飲マシメタリ。

然ルトコロ退院後約三ケ月間ヲ經過スル頃ヨリ元氣ヲ恢復シ次第二全身ノ色素沈着ハ稀薄トナリ、特ニ口腔内ノ濃厚ナル色素沈着斑點ハ或ハ稀薄トナリ或ハ消失スルモノヲ見タリ。

第三章 臨床的所見ニ基ク總括的考按

以上臨床的所見ヲ總括スルニ本例ニ於テハ特異ナル皮膚粘膜ノ色素沈着、脱力、血壓ノ低下、胃液ノ遊離鹽酸ノ缺乏、總酸度ノ減少、相對的淋巴球增多症及ビ血糖量及ビ耐糖量ノ低下、迷走神經ノ感受性ノ亢進、更ニ血中Kイオン量ノ増加等ヲ考フル時本疾患ガアヂソン氏病ナルコトハ確實ナリ。

以下簡單ニ文献ヲ顧ミツ、補足的説明ヲ加ヘン。

血壓ノ低下ハアヂソン氏病ニ殆ド毎常認メラレBaerハ最高血壓六五、最低血壓四〇ノ一例ヲ報告シ、島崎、新開ノ一例ハ最高七四、最低四四ヲ示シタリ。本例ノ血液像ハ相對的淋巴球增多ヲ示シ、實ニ六〇・〇%以上ニ達シタリ。

アヂソン氏病ノ一例……(林、林)

入院前ニハ茶碗ヲモ落ス程度ナリシニモ關ラズ退院翌年ノ三月頃ニハ乳兒ヲ抱クコトサヘ可能トナリ、婦人會幹事トシテ活動シ得ル狀態ヲ來セリ。當時血壓ヲ測定セシニ左右共ニ最高血壓ハ水銀柱一一〇以上ニ及ビ、脈搏モ正常ノ強度ヲ示スニ至レリ。退院シ家庭ニ於テ診察シタル爲甚ダ不充分ナル検査ニハ相違ナキモ血壓ノ高クナリシコト、一般症狀ノ輕快セルコト、手及ビ足ニ力ヲ得タルコト、而シテ常人ト同様ニ活動シ得ルニ至リタルコト及ビアヂソン氏病ノ特有ナル色素沈着ガ稀薄ニナリタルコト等ヲ綜合スル時ハ此ノ患者ハ幸ニモ或ハ一時的現症ナルヤモ測ラレザレドモ治癒ノ傾向ヲ示セルモノト推定シ得。

Neuser Bittorf, Rowntree, 西川、入澤、長谷川、田中、橋本及び島崎、新開等ハ何レモ相對的淋巴球ノ増加ヲ認メ五〇%ヲ超ユルモノ少ナシトセズ。之ニ反シ佐藤、加藤等ハ淋巴球ノ相對的增多ヲ認メザリキ。然レドモ Bengelmann ニ依レバ淋巴球ノ相對的増加ハアヂソン氏病ト密接ナル關係ヲ有スル胸腺淋巴體質並ニ結核ニ基因スルモノニシテ本病ニ特有ナルモノニ非スト言フ。其ノ他細胞ノ變化ハ從來ノ報告モ一致セズ。赤血球沈降速度ハ島崎、新開ノ例ニ於テモ促進セリ。本例モ輕度ナガラ促進セリ。

アヂソン氏病ト血糖トノ關係ハ多數學者ニ依リ報告セラレ、血糖低下ヲ示スト言フ者 (Porges, Bernstein, Grote)、血糖量ハ正常範圍ニアリト言フ者 (Mantner, Dornier, 日下部、坂口、片山、谷口)、又正常範圍ニアルモ最下位ニアリト言フ者 (Rowntree, Zondeck, 加藤、吳、岡田) 等アリ。本例ハ正常範圍ニアルモ極メテ輕微ノ低下ヲ示セリ。

アヂソン氏病ノ耐糖量ニ就キテモ高シトスル者 (Eppinger, Fata u. Rudinger)、或ハ高カラズトスル者行徳、加藤、日下部、島崎、新開等ナリ。

アヂソン氏病ノ胃液所見ニ就テハ Grawitz 以後游離鹽酸ノ缺乏ハ本病ニ特有ナリトスル者多ク、本例ニ於テモ缺乏ヲ認メタリ。基礎代謝測定ハ本例ニ於テハ(一)一七・一%、呼吸係數〇・八一六、Zondeck, 川西、橋本、岡田等ハ何レモ幾分低下ゼリト言フ。腦脊髓液ハ副腎機能不全ノ時ビタミンC量ハ減少スルト言フモ、本例ハ正常ニ保タレタリ。

本例ノ藥效學的検査ニ依レバアドレナリン、アトロピンニハ殆ド反應ヲ示サズト言フモ過言ニアラズ、而シテピロカルピンニハ極メテ強度ニ反應セリ。現在マデノ報告ヲ見ルモピロカルピンニ對シ敏感ナリトスル者多シ。(日下部、加藤、川西、岡田、新開、島崎) 即チ迷走神經亢進ノ狀態ナリ。

次ニ血中水分量及び筋肉ノ水分量ノ減少ハアヂソン氏病ニ於ケル特異ナル症狀ナルコトヲ G. Maranon u. J. A. Collazo (三十三例ノアヂソン氏病患者ニ付キ詳細ニ檢索發表セリ。又血中イオン量ノ變動ニ就キテ G. Maranon u. J. A. Collazo (アヂソン氏病患者ニ就キ發表セリ。即チ血中ハ量ハ著明ニ増加シ、二十四人ノアヂソン氏病患者ノKノ平均値ハ三二・一mg.%ヲ示シタリト言フ。又Ca量ハ正常ト殆ド變化ナシト言ヒ、Ehrmann u. Dierkin ハCaノ減少ヲ報告セリ。Kノ異常ナル増加ニヨリKトNaトノ平衡ガ破ラルト述ブ。余等ノ一例ニ於テモK三〇・九九mg.%ヲ示シ、Ca量ハ正常範圍ナリキ。而シテ G. Maranon u. J. A. Collazo 等ハK量ハアヂソ

ン氏病ノ豫後列定ニ極メテ必要ナリト解ケリ。而シテ彼等ハ副腎皮質ホルモンガ血中水分量及ビイオン量ニ如何ナル影響ヲ與フルモノナリヤヲ、アヂソン氏病患者及ビ犬ニ就キ實驗シ次ノ如キ結果ヲ發表セリ。即チ血中水分量ノ増加、K量ノ減少、Na・Cl・Ca・Pハ著變ナシト。

次ニ余等ノ行ヒタル治療方法ニ就キ文獻ヲ見ルニ、Marine u. Baumann, Ziemerノ副腎剝出動物ニ食鹽ヲ投與シテ好影響ヲ認メ、アヂソン氏病患者ニ就キテハLoeb, Loeb u. Achley, Harrop, Howel, Sears等ハ食鹽療法ヲ行ヒ、主觀的症狀ノミナラズ他覺的症狀モ例外ナク輕快シ、色素、沈着ノ消失ヲモ認メタリト言フ。

以上ヲ要スルニ余等ノ行ヒタル、副腎髓質ホルモン、皮質ホルモンノ注射、加フルニ食鹽療法ヲ併合シタル本例ガ症狀ノ輕快セルモ偶然ニ非ズシテ、尙今後モアヂソン氏病患者ニ遭遇シタル時ハ必ず、副腎ホルモンノ注射及ビ食鹽療法ヲ試ム可キナリト主張ス。

第四章 結 論

余等ノ經驗セルアヂソン氏病ノ臨床的所見ヲ總括スレバ次ノ如シ。

- 一、皮膚及ビ粘膜ニ於テ特有ナル色素沈着ヲ認メタリ。
- 二、脫力比較的強ク體重モ相當減少セリ。
- 三、體溫ハ三十五・五度乃至三十六度五分ノ間ヲ動搖セリ。
- 四、血壓ハ左右共ニ最高最低何レモ低ク

右	八〇—九五	四五—五五
左	八五—九五	五〇—六〇

アチソン氏病ノ一例……(林、林)

- 五、血液像ハ相對的淋巴球增多症著明ニシテ六〇・〇%以上ニ及ブ、血液沈降速度稍々促進セリ。
- 六、空腹時血糖量ハ〇・〇六八%—〇・〇七九%ニシテ耐糖量一〇〇・〇瓦。
- 七、胃液ノ游離鹽酸缺乏シ、總酸度減少ス。
- 八、基礎代謝ハ輕度ナガラ低下ス。
- 九、腦脊髄液中ノビタミンC量尋常。
- 十、ビロカルビンニ敏感ニシテ迷走神經ノ感受性高シ。
- 十一、血中ノKイオン増加シ、Caイオンハ正常。
K/Caノ平衡破ラル。
- 十二、レントゲンニヨリ輕度ノ肺浸潤症ヲ認ム。
- 十三、副腎髓質及ビ皮質ホルモンノ注射、並ニ食鹽療法ニヨリ病狀ノ輕快セルヲ認ム。

摺筆ニ當リ恩師辻教授ニ深謝ス。

主 要 文 献

- 1) 日下部, 井上, 藤上: 日本内分泌學會雜誌, 第1卷, 第5號, 733頁 (大正15年).
- 2) 島崎, 新開, 鶴崎: 日本内分泌學會雜誌, 第10卷, 第9號, 1051頁 (昭和9年).
- 3) G. Maranon u. J. A. Collazo: Wien. Arch. f. inn. Med, Bd, 27, S. 189 (1935).
- 4) Marine u. Baumann: Amer. Jour. of Physiol., Vol. 71, P. 281 (1927).
- 5) Zwerner: Endocrinology, 18, 161 (1934).
- 6) Loeb: Proc. Soc. exp. Biol. u. Med., 30, 808 (1933).
- 7) Loeb, Archley, Gutman a. Jillison: P. S. exp. Biol. u. Med., 31, 130 (1933).
- 8) Harrop: Jour of Amer. Med. Assoc., 100, 1850 (1933).

Über einen Fall von Addisonscher Krankheit.

Von

Dr. H. Hayashi u. Dr. M. Hayashi

(Aus der 1. Med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan,
Direktor: Prof. Dr. K. Tsnji)

Die Verfasser hatten die Gelegenheit, eine Addisonkranke zu beobachten. Es handelte sich um eine 49 jährige Hausfrau. Als Hauptklage hatte sie allgemeine Mattigkeit, besonders Kraftlosigkeit der Muskeln, und bräunlich-schwärzliche Hautpigmentierung.

In den hereditären Verhältnissen stellte sich heraus, dass 2 Geschwister der Patientin auch schwärzlich-bräunliche Hautpigmentation in Stirn- und Wangengegend zeigten. Eine von diesen 2 Geschwistern klagt angeblich auch über Mattigkeit. Leider unterblieb weitere genauere Nachforschung. In früherer Anamnese war nichts Besonders im Zusammenhang mit dem jetzigen Leiden feststellbar.

Das jetzige Leiden fing etwa vor 4-5 Jahren an. Zuerst bemerkte die Patientin schwärzlich-bräunliche Pigmentation an Mundlippen und Mamilla. Schlafstörung, Übelkeit und Appetitlosigkeit wurden auch angegeben. Seit letztem Herbst zunehmende Mattigkeit und Abmagerung. Zugleich wurde fortschreitende Muskelschwäche der oberen Extremitäten bemerkt. Die anfänglich kleine Hautpigmentierung breitete sich bis auf Stirn-, Wangen- und Halsgegend aus.

Der Befund bei Aufnahme in die Klinik:

Statur mittelgross, dünner Knochenbau und starke Abmagerung. Die bräunlich-schwärzliche Hautpigmentation erstreckt sich auf den ganzen Körper, besonders ausgeprägt an Gesicht und Hals. Die Mundhöhlenschleimhaut und Zungenoberfläche zeigen auch stellenweise Pigmentierung. In übrigen Körperteilen sind die Handteller, die Mamilla und der Mamillarhof, die Nabelgrube, der hintere Teil der Lenden, die beiderseitigen Achselhöhlen, Kniegegend und Fussrücken besonders stark pigmentiert.

Der Radialpuls schlägt ca 65 pro Minute, klein. Aschnersches Phänomen ist negativ. Die grobe Kraft der oberen Extremitäten ist sehr schwach, die Griffkraft der Hände ist auch stark herabgesetzt, mit Messapparat wurde nur als 5-12 Kg bezeichnet, während bei einem 17 jährigen Mädchen von gleichem Körpergewicht etwa 25 Kg gemessen wurde. Körpergewicht 35 Kg, hatte keine Temperatur. Blutdruck nach Riva-Rocci rechts Max. 80-90, Min. 45-55, links Max. 85-95, Min. 50-60 (Hg mm). Im Blutbild wurde starke relative Lymphozytose bis 62-72% festgestellt, die Leukocytose aber war nicht nachweisbar. Die Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten betrug in der ersten Stunde 33, in der zweiten Stunde 64. Die Zuckertoleranz war 100 g Glukose, die Zuckerausscheidungsschwelle war 0.16 %.

Der Nüchternwert des Blutzuckers betrug 0.068-0.079 %.

Im Magensaft Hypacidität, der respiratorische Quotient schwankte zwischen 0.777-0.816, der Grundumsatz zwischen -6.5—-17.1 %. Der Vitamin-C-gehalt der Cerebrospinalflüssigkeit war nicht vermindert (n. Chlorphenolindophenolmethode 0.002 %). Auf Adrenalin- und Atropininjektion nicht empfindlich, aber auf Pilocarpin sehr empfindlich.

Im Blut war K-wert stark vermehrt, ca bis 30.0 mg/dl, konsequenterweise deutliche Zunahme von K/Ca, dieser K-Wert sank bei Adrenalininjektion bis auf 19.0 mg/dl. Aus der Röntgenuntersuchung der Brustorgane ergab sich nichts Pathologisches als leicht vermehrte Lungenzeichnung in beiden Lungen.

Therapeutisch wurden Adrenalin und Enex (Rindenhormon

Shionos) injiziert in der Weise ca 0.3 cc Adrenalin und 1.0 cc Enex pro Tag. Diese Therapie wurde etwa 6 Monate lang fortgesetzt, danach wurde gleichzeitig eine grosse Menge Kochsalz gegeben als Zusatzmittel in Nahrung oder isoliert. Etwa 3 Monate nach Beginn dieser kombinierten Therapie erholte sich die Patientin allmählich von ihrer Kraftlosigkeit, die Hautpigmentierung wurde allmählich schwächer, z. B. in der Mundhöhle trat sie völlig zurück. Die grobe Kraft stellte sich wieder bedeutend her. Der Blutdruck stieg nun bis auf 110 mm Hg.

Die Arbeitsfähigkeit wurde bis zu den normalen Verhältnissen wiederhergestellt. Als Schluss dieser Arbeit wird empfohlen, bei Addison-kranken die kombinierte Adrenalin-Rindenhormon-Kochsalztherapie zu versuchen.

(Autoreferat)

Über die sensible Innervation der Stammgefässe in der Thoraxhöhle.

III. Mitt.

Durchschneidungsversuch am Nervus vagus und am Nervus depressor cordis, um festzustellen, welchen Nerven die Nervenfasern und deren Endapparate im Aortenbogen und im Ligamentum arteriosum angehören.

Von

Dr. M. Watanabe.

(Aus der 1. Med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Über die Verbreitung und die Gestalt der Nervenfasern und deren Endapparate in der Brustaorta sowie in deren Abzweigungen und im Lig. arteriosum wurde bereits in der I. und II. Mitteilung ausführlich berichtet. In dieser Arbeit versuchte der Verfasser zu