海女ノ形態學的研究

第二編 胴下半部形態

聖マリアンナ研究所 (所長 昭和醫大教授 小河原四郎)

明 石 嘉 聞

目 次

I. 緒 言	III. 研 究 成 績
II. 研究材料及研究方法	IV. 結 論

I. 緒 言

成人ノ生體計測ニ際シ胴下半部ノ一部ヲ計測シタモノニ、佐藤 (1926)、日置、髙部 (1933)、高橋、申 (1939) 諸氏ノ研究報告ヲカナリ見受ケラレルガ、胴下半部ヲ主眼トシタ計測學的研究ハ極メテ少ク、殊ニ該部ニ關シテ種々ノ示數ヲ求メ、ソレニヨル胴下半式ニ就イテノ研究報告ハ僅カニ柴田氏 (1951) ニヨル本邦成人男女子ニ就テノ報告ノミデ、ソレ以外ハ本邦ニ於テハ勿論、歐米ニ於テモ全クサレテイナイ。著者ハ海女ノ生體計測ヲ行ウ機會ヲ得タノデ、本研究ヲ企テ柴田氏ノ研究成績トノ比較檢討ヲ試ミタ。

II. 研究材料及研究方法

研究材料 第一篇ト同一ノ材料、即チ房州白濱ニ於ケル健康ナ海女 17~49 歳、114 名。

研 究 方 法

a) 計測項目及其ノ計測法

1. 前腹長 恥骨結合上緣點〔sy〕カラ胸骨下點〔sbst〕迄ノ直線距離、但シ投射計測法ヲ用ヒタ (Martin 氏身長計測器使用)。
2. 肋弓幅 胸部ノ兩側ノ輪廓上ニ於テ左右肋骨弓ノ最下點間ノ直線距離 (大型測徑兩脚器使用)。
3. 骨盤幅 左右兩腸骨稜最外側突出點〔ic〕間ノ直線距離 (大型測徑兩脚器使用)。
4. 最大股幅 大轉子ヲ考慮スルコトナク左右兩側大腿ノ最モ側方ニ突出シタ點間ノ直線距離 (大型測徑兩脚器使用)。
5. 最小腹圍 肋骨弓ト腸骨稜トノ間デ體側輪廓ノ最凹部ヲ水準トシテ計測シタ腹部周徑デ呼吸ノ終リニ測ル (鋼鐵製卷尺使用)。

以上ノ諸計測ニ際シテハ小河原ノ人體形態研究法 I、生體計測法及ビ其ノ備考欄ノ注意事項ヲ格守シタ。

b) 示數及ビ胴下半式

上記ノ計測量カラ小河原ハ 7 個ノ示數即チ胴下半示數 I (肋弓幅・100/前腹長)、胴下半示數 II (骨盤幅・100/前腹長)、胴下半示數 III (最大股幅・100/肋弓幅)、胴下半幅示數 A (骨盤幅・100/肋弓幅)、胴下半幅示

胴 下 半 示 數 I

分 類	記 號	境 界 値
過 狹 肋 弓 型	1	x ~ 49.9
狹 肋 弓 型	2	50.0 ~ 65.9
中 肋 弓 型	3	66.0 ~ 81.9
廣 肋 弓 型	4	82.0 ~ 97.9
過 廣 肋 弓 型	5	98.0 ~ x

胴 下 半 示 數 II

分 類	記 號	境 界 値
過 狹 骨 盤 型	1	x - 55.9
狹 骨 盤 型	2	56.0 ~ 75.9
中 骨 盤 型	3	76.0 ~ 95.9
廣 骨 盤 型	4	96.0 ~ 115.9
過 廣 骨 盤 型	5	116.0 ~ x

胴下半示數Ⅱ

分類	記號	境界値
過狹股型	1	x ~ 64.9
狹股型	2	65.0 ~ 84.9
中股型	3	85.0 ~ 104.9
廣股型	4	105.0 ~ 124.9
過廣股型	5	125.0 ~ x

胴下半幅示數A

分類	記號	境界値
過小骨盤型	1	x ~ 93.9
小骨盤型	2	94.0 ~ 109.9
中骨盤型	3	110.0 ~ 125.9
大骨盤型	4	126.0 ~ 141.9
過大骨盤型	5	142.0 ~ x

胴下半幅示數B

分類	記號	境界値
過大肋弓型	1	x ~ 101.9
大肋弓型	2	102.0 ~ 120.9
中肋弓型	3	121.0 ~ 139.9
小肋弓型	4	140.0 ~ 158.9
過小肋弓型	5	159.0 ~ x

胴下半幅示數C

分類	記號	境界値
過小股型	1	x ~ 95.9
小股型	2	96.0 ~ 105.9
中股型	3	106.0 ~ 115.9
大股型	4	116.0 ~ 125.9
過大股型	5	126.0 ~ 135.9
超大股型	6	136.0 ~ x

腹圍示數

分類	記號	境界値
過大腹型	1	x ~ 30.9
大腹型	2	31.0 ~ 40.9
中腹型	3	41.0 ~ 50.9
小腹型	4	51.0 ~ 60.9
過小腹型	5	61.0 ~ 70.9
超小腹型	6	71.0 ~ x

數B(最大股幅・100/肋弓幅), 胴下半幅示數C(最大股幅・100/骨盤幅), 腹圍示數(前腹長・100/最小腹圍)ヲ求メ, コレ等ノ示數ヲ夫々數値ノ大キサニヨツテ5個又ハ6個ノ段階ニ分類シ記號ヲ與ヘ(前表參照)腹圍示數ヲUデ表ハシⅠⅡⅢABCUノ順ニ示數ヲ並ベテソノ記號ヲ並記シタモノヲ胴下半式ト名付ケタ。故ニ著者ハ小河原ニ從ツテ上記諸示數及胴下半式ヲ求メ

タ。

Ⅲ. 研究成績

A. 示數

a) 各示數平均値ハ第一表ニ示ス如クナツテ, コレヲ柴田氏(1951)ノ東京都在住成人女子ノ成績ト比較スルト胴下半示數Ⅱ及ビ胴下半幅示數Cハ全ク相等シイガ, ソノ他ノ示數ノウチ胴下半示數Ⅰノミ海女大キク, 他ハスベテ東京都在住成人女子ガ大キイ値ヲ示シテイル。然シ小河原ノ分類法ニアテハメテ型ヲ定メルト著者ノ各示數平均値モ柴田氏ニヨル東京都在住成人女子ノ夫レモスベテ Mittelform〔3〕ニ屬シテ全ク同型トナル。

b) ソノ他ノ先人ノ成人女子ニ就テノ計測絕對値ノ平均値カラ示數(但シー或ハ三示數ノミ)ヲ著者ニ於テ算出シテ比較ヲ試ミルト

i) 胴下半示數Ⅱ: 阪本, 古屋, 寺尾氏等ニヨル京都市近郊某人絹工場女子工員ハ海女ヨリ小サイ値ヲ示スガ, シカシ型ノ上カラデハ〔3〕ニ屬シテ同型トナル。

ii) 胴下半示數Ⅲ: 本示數モ阪本, 古屋, 寺尾氏等ノ値ハ著者ノ夫レヨリ小サク年齢ニヨツテハ〔2〕又ハ〔3〕ニ屬ス。

iii) 胴下半幅示數C: 最大股幅ハ瘦セタ者デハ大轉子間幅ニ一致スルガ, 筋殊ニ皮下脂肪層ノヨク發達シテイルモノデハ必ズシモ一致シナイノデ, 先人ノ絕對値ノ平均値カラ本示數ヲ算出スルコトハ必ズシモ妥當デハナイガ一應求メテ比較ヲ試ミルト佐藤氏(21~40歳, 148名)及ビ日本婦人(21~40歳, 84名), 日置,

親部兩氏 (1933) ノ金澤市及ビ其ノ附近在住者女子 (18~70 歳, 286 名), 高瀧, 申兩氏 (1939) ノ朝鮮婦人 (20~25 歳, 500 名) 及在鮮日本婦人 (20~40 歳, 531 名), 竹内氏 (1939) ノ日本人公娼 (18~34 歳, 553 名), 矢内原氏 (1939) ノ中國婦人 (17~26 歳, 338 名), 川野氏 (1939) ノ滿州婦人 (15~40 歳, 1123 名), 徐氏 (1940) ノ朝鮮婦人 (20~25 歳, 265 名) 及ビ本多氏 (1942) ノ北陸地方女子 (上平村住民 18~49 歳, 159 名, 淺川村住民 19~49 歳, 204 名, 石川郡農村民 18~49 歳, 323 名) ハ何レモ著者ノ成績ヨリ大キイ値ヲ示スヤウニ思ワレルガ, 然シ型ノ上デハスベテ [3] = 屬シテ海女ト同型トナル. 又阪本, 古屋, 寺尾氏等ノ成績ハ年齢ニヨツテハ著者ノ平均値ト全ク相等シク, 各年齢共 [3] = 屬シテイル. 尙柴田氏ノ平均値トハ全ク等シイ.

コレヲ要スルニ胴下半部ハ示數平均値及ソレニ依ツテ分類サレタ型カラミテ海女ハ一般日本人成年女子ト同一ノ形態ヲ呈シテイルコトニナル.

第 1 表 各 示 數 平 均 値

示 數	海 女 (著 者)					東京都在住成人女子 (19歳~40歳)(柴田氏)	
	n	M ± m	Var	$\delta \pm m\delta$	V ± mv	n	M ± m
胴下半示數 I	113	76.39 ± 0.600	64.08 - 91.25	6.360 ± 0.424	8.325 ± 0.555	1820	72.94 ± 0.19
胴下半示數 II	114	89.19 ± 0.695	77.03 - 111.58	7.386 ± 0.490	8.281 ± 0.550	1820	90.33 ± 0.21
胴下半示數 III	113	95.89 ± 0.573	79.02 - 111.82	6.063 ± 0.404	6.322 ± 0.421	1820	97.93 ± 0.22
胴下半幅示數 A	114	115.51 ± 0.487	104.00 - 128.31	5.198 ± 0.345	4.500 ± 0.299	1820	124.18 ± 0.15
胴下半幅示數 B	114	125.67 ± 0.587	108.58 - 143.83	6.264 ± 0.416	4.984 ± 0.331	1820	134.52 ± 0.19
胴下半幅示數 C	114	108.04 ± 0.330	97.70 - 120.64	4.060 ± 0.269	3.757 ± 0.249	1820	108.75 ± 0.11
腹 圍 示 數	114	44.57 ± 0.396	35.30 - 53.38	4.226 ± 0.280	3.707 ± 0.246	1820	46.39 ± 0.12

c) 次ニ各示數ヲ小河原ノ分類法ニヨツテ各型ノ頻度ヲミルト第二表ノ如クナツテ,

i) 胴下半示數 I: 本示數ハ77%ヲ占メテ [3] 即チ「中肋弓型」ガ極メテ多ク, コレニ次イデ [4] 即チ「廣肋弓型」ガミラレ, [2] 即チ「狭肋弓型」ハ極メテ少イガ, 柴田氏ニヨル一般成人女子デハ [3] ノ最高頻度ヲ示スコトハ海女ノ場合ト同様デ, コレニ次イデ [2], [4] ノ順トナル. 即チ海女ハ一般成人女子ヨリ Uebermittelform [4] ガ多ク, Untermittelform [2] ガ著シク少ナイ. コノコトハ海女ハ一般成人女子ヨリ腹ノ長サニ比較シテ肋弓間ノ幅ノ廣イモノガ多イコトヲ意味スル.

ii) 胴下半示數 II: 本示數ハ [3] 即チ「中骨盤型」ガ極メテ多ク, コレニ次イデ [4] 即チ「廣骨盤型」ガミラレ, 柴田氏ニヨル一般成人女子ト頻度ニ於テ多少ノ相違ガアルガ全ク同一ノ順位ヲ示シテイル. コノコトハ海女ハ腹ノ長サニ比較シテ骨盤ノ幅ノ發育ガ一般成人女子ト同一ノ關係ニアル事ヲ意味スル.

iii) 胴下半示數 III: 本示數ハ [3] 即チ「中股型」ガ極メテ多ク第一位ヲ占メテ, コレニ次イデ [4] 即チ「廣股型」ガミラレ, [2] 即チ「狭股型」ハ極メテ少イガ, コレモ柴田氏ノ一般成人女子ト頻度ニ於テ相違アルガ全ク同一ノ順位ヲ示シテイル. コノコトハ腹ノ長サニ比較シテ股ノ幅ノ發育ガ海女ハ一般成人女子ト略々同一ノ關係ニアルコトヲ意味スル.

vi) 胴下半幅示數 A: 本示數ハ [3] 即チ「中骨盤型」ガ極メテ多ク80%以上ヲ占メテ第一位トナツテ, コレニ次イデ [2] 即チ「小骨盤型」ガミラレ [4] 即チ「大骨盤型」ハ極メテ少イガ, 柴田氏ノ一般成人女子デハ [3] ニ次イデ [4] ガ多數認メラレ [2] ガ極メテ少ナイ. 即チ海女ハ一般成人女子ヨリ Untermittelform [2] ヲ呈スルモノガ多ク, Uebermittelform [4] ヲ呈スルモノガ著シク少イ. コノコトハ海女ハ一般成人女子ヨリ骨盤ノ幅ニ比較シテ肋弓間ノ幅ノ廣イモノノ多イ事ヲ意味スル.

v) 胴下半幅示數 B: 本示數ハ [3] 即チ「中肋弓型」ガ著シク多ク80%ヲ占メテ, コレニ次イデ [2] 即チ「大肋弓型」ガミラレ, [4] 即チ「小肋弓型」ハ極メテ僅カニ認メラレルガ, 柴田氏ノ一般成人女子デハ [3] ニ次イデ [4] ガ比較的多數認メラレ [2] ハ極メテ少ナイ. 即チ海女ハ一般成人女子ヨリ Untermittelform

第2表 分類ニヨル各示數ノ頻度

分類	胸下幅示數 I				胸下幅示數 II				胸下幅示數 III			
	海女(著者)		成人女子(17~40歳)(柴田)		海女(著者)		成人女子(柴田)		海女(著者)		成人女子(柴田)	
	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%
1	-		2	0.11	-		2	0.15	-		2	0.11
2	2	1.75±1.230	385	20.24±0.92	1	0.88±0.877	75	3.94	3	2.63±1.506	114	5.99±0.65
3	88	77.19±3.950	1286	67.61±1.07	91	79.82±3.775	1386	72.87±1.02	97	85.09±3.351	1381	72.61±1.02
4	23	20.18±3.780	224	11.78±0.74	22	19.03±3.713	425	22.34±0.96	14	12.28±3.276	396	20.82±0.93
5	1	0.88±0.877	5	0.26	-		14	0.74	-		9	0.43
6	-		-		-		-		-		-	
計	114	100.00	1902	100.00	114	100.00	1902	100.00	114	100.00	1902	100.00

胸下 半 幅 示 數 A				胸下 半 幅 示 數 B				胸下 半 幅 示 數 C				腹 圍 示 數			
海 女 (著 者)		成 人 女 子 (柴 田)		海 女 (著 者)		成 人 女 子 (柴 田)		海 女 (著 者)		成 人 女 子 (柴 田)		海 女 (著 者)		成 人 女 子 (柴 田)	
n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%	n	%±m%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	14.04±3.268	18	0.95	21	18.42±3.645	53	2.79	35	30.70±4.339	543	28.55±1.02	27	23.68±3.999	263	13.83±0.79
95	83.33±3.506	1213	63.77±1.10	92	80.70±3.713	1386	72.87±1.02	77	67.54±4.405	1255	64.41±1.10	80	70.18±4.304	1306	68.66±1.06
3	2.63±1.506	664	34.91±1.09	1	0.88±0.877	456	23.97±0.98	2	1.76±1.230	101	5.31±0.51	7	6.14±2.259	324	17.03±0.86
—	—	7	0.37	—	—	7	0.37	—	—	3	0.16	—	—	9	0.47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	100.00	1902	100.00	114	100.00	1902	100.00	114	100.00	1902	100.00	114	100.00	1902	100.00

[2] 多く, Uebermittelform [4] 著シク少ナイ. コノコトハ海女ハ一般成人女子ヨリ股ノ幅ニ比較シテ肋弓間ノ幅ノ廣イモノガ多イ事ヲ意味スル.

vi) 胴下半幅示数C: 本示数ハ [3] 即チ「中股型」ガ最も多く, コレニ次イデ [2] 即チ「小股型」ガミラレ [4] 即チ「大股型」ハ極メテ少ナイ. コレハ頻度ニ於テ多少ノ相違ノアルヨウニ思ワレルガ, 柴田氏ノ一般成人女子ノ成績ト全く同一ノ順位ヲ示シテイル. 即チ海女ハ骨盤ノ幅ニ比較シテ股ノ幅ガ一般成人女子ト略々同程度ノ發育ヲナシテイルコトヲ意味スル.

vii) 腹圍示数: 本示数ハ [3] 即チ「中腹型」ガ極メテ多く, コレニ次イデ [2] 即チ「大腹型」ガミラレ [4] 即チ「小腹型」ガ少ナイガ, 柴田氏ノ一般成人女子デハ [3] ニ次イデ [4], [2] ノ順トナツテイル. 即チ海女ハ一般成人女子ヨリ Untermittelform [2] ヲ呈スルモノガ多く, Uebermittelform [4] ヲ呈スルモノガ少ナイ. コノコトハ海女ハ一般成人女子ヨリ腹ノ長サニ比較シテ腹ノ周リノ太イモノガ多イコトヲ意味スル.

以上分類ニヨル各示数ノ型ノ頻度カラミルト海女ハ一般成人女子ヨリ腹ノ長サニ比較シテ胴下半ノ上方ノ幅(肋弓幅)ノ廣イモノ, 又幅同士デハ上方ノ幅ガ下方ノ幅(骨盤幅及ビ最大股幅)ニ比較シテ廣イモノ, 又腹ノ長サニ比較シテ腹ノ周リノ太イモノノ多イコトガ明カニナル.

B. 胴 下 半 式

胴下半式ニ關シテハ柴田氏ノ本邦成人男女子(東京都在住)ニ就テノ研究報告以外ニハ今日迄發表サレタモノハ全クナイ.

海女ノ各個人ニ就テ調バルト數多クノ胴下半式ガ認メラレルガ 3333333 ガ約42%ヲ占メテ極メテ多く, 各示数平均値ヲモトシタ胴下半式モ亦 3333333 トナル. 尙柴田氏ニヨル胴下半式モ平均値カラミテモ最高頻度ノモノカラミテモ共ニ 3333333 トナルカラ海女ト一般成人女子トノ間ニハ胴下半式ノ相違ガミラレナク, 胴下半部ガ全ク同様ノ形態ヲ呈シテイルコトニナル.

IV. 結 論

第一篇ト同一ノ材料ノ海女ニ就テ前腹長, 肋弓幅, 骨盤幅, 最大腹幅及最小腹圍ヲ計測シテ, 其ノ實測値カラ小河原ニ從ツテ胴下半示数Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 胴下半幅示数A, B, C及ビ腹圍示数ヲ算出シ, 更ニ胴下半式ヲ判定シテ次ノ如キ結果ヲ得タ.

A. 示 数

1) 示数平均値ハ胴下半示数Ⅰ 76.39 ± 0.600 , 同Ⅱ 89.19 ± 0.695 , 同Ⅲ 95.89 ± 0.573 , 胴下半幅示数A 115.51 ± 0.487 , 同B 125.67 ± 0.587 , 同C 108.04 ± 0.330 , 腹圍示数 44.57 ± 0.396 トナツテ胴下半示数Ⅱ及ビ胴下半幅示数Cノミ柴田氏ノ一般成人女子ト全ク等シク, ソノ他ハ平均値間ニ差異ガ認メラレテ胴下半示数Ⅰ以外ハ一般成人女子ガ海女ヨリ大キイ値ヲ示シテイル, ソノ他著者ガ算出シ得タ先人ノ示数平均値ハ胴下半示数Ⅱ及Ⅲハ海女ガ大キイ値ヲ示スヨナニ思ワレルガ, 胴下半幅示数Cハ海女ヨリ大キイ値ヲ示スモノガ多イヨウデアル.

2) 示数平均値ヲ小河原ノ分類法ニヨツテ型ヲ定メルト各示数共スベテ Mittelform [3] ニ屬シ, 柴田氏ヲ始メ其ノ他ノ先人ノ成績モスベテ [3] ヲ呈シテイルカラ全ク同型トナル.

3) 各示数ヲ小河原ノ分類法ニヨツテ型ノ頻度ヲミルト各示数共 [3] ガ極メテ多く, コレニ次イデ胴下半示数Ⅰ, Ⅱ, Ⅲハ [4], [2], ソノ他ノ四示数ハ共ニ [2], [4] ノ順トナル. コレヲ柴田氏ノ一般成人女子ト比較スルト 胴下半示数Ⅱ, Ⅲ及胴下半幅示数Cハ頻度異ナルガ同一順位ヲ示シテ, ソノ他ノ示数ハスベテ Uebermittelform [4] Untermittelform [2] ノ順位ガ反對ニナル. 即チ海女ハ一般成人女子ヨリ胴下半示数Ⅰデハ [4] ヲ呈スルモノガ多く, [2] ヲ呈スルモノガ少ナク, 胴下半幅示数A, B及腹圍示数デハ反對ニ [2] ニ屬スルモノガ多く, [4] ニ屬スルモノガ少ナイ.

B. 胴 下 半 式

1) 個人差著シク多數ノ胴下半式ガ認メラレル.

2) 各示數平均値ニヨル胴下半式、最高頻度ノ夫レモ共ニ 3333333 トナツテ、柴田氏ノ一般成人女子ノ胴下半式ト平均値ニ於テモ最高頻度ニ於テモ全ク同式ヲ呈シテ式ノ上デハ海女ト一般成人女子トノ間ニ相違ガ全クミラレナイ。

以上要スルニ胴下半式ニ於テハ海女ト一般成人女子トノ間ニハ全ク相違ガ認メラレナイガ、然シ海女ハ一般成人女子ヨリ腹ノ長サニ比較シテ胴下半部上方ノ幅(肋弓幅)ガ廣ク、幅同士デハ上方ノ幅ガ下方ノ幅(骨盤幅及ビ最大股幅)ニ比較シテ發育勝ツテ、又腹ノ長サニ比較シテ腹ノ周リノ太イコトガ認メラレタ。

主 要 文 献

- 1) 日置陸奥夫、親部之道：十全會雜誌，第38卷，第13號(1933)。
- 2) 本多幸男：十全會雜誌，第47卷，第2號(1942)。
- 3) 徐敬庠：朝鮮醫學會雜誌，第30卷，第5號(1940)。
- 4) 川野宗義：滿洲醫學雜誌，第30卷，第6號(1939)。
- 5) 小河原四郎：人體形態研究法(未發賣)。
- 6) 小河原四郎：昭和醫學會雜誌，第10卷，第3號(1950)。
- 7) 阪本基，古屋昌夫，寺尾幸司：日本內分泌學會雜誌，第11卷，第8號(1944)。
- 8) 佐藤友定：滿洲醫學雜誌，第5卷，第3號(1926)。
- 9) 柴田賢二：本邦成人胴下半部ノ形態(未發表)。
- 10) 竹内玄洞：名古屋醫學會雜誌，第50卷，第5號(1939)。
- 11) 高楠榮，申雄治：日本婦人科學會會誌，第34卷，第4號(1939)。
- 12) 矢内原啓太郎：日本婦人科學會會誌，第34卷，第1號(1939)。

Morphological Study of the AMA (Women Divers) Part II. Morphology of the Lower Torso

Dr. Kamon AKASHI

St. Marianna Research Laboratory (Director: Dr. Shiro Ogawara, Professor
of Showa Medical College)

Vital measurements were conducted of 114 **ama** between the ages of 17 and 49 in Boshu Shirahama of Chiba prefecture, and under the direction of Dr. **Shiro Ogawara**, the following five quantitative measurements, seven indices and formulae for the lower torso were compiled and detailed statistical observations were made.

1) Measured items:

- i) Length of front abdomen
- ii) Width of rib-arch
- iii) Pelvis width
- iv) Maximum width of thighs
- v) Minimum circumference of abdomen

2) Indices:

- i) Lower-torso index I ($\text{Width of rib-arch} \cdot 100 / \text{Length of front abdomen}$)
- ii) Lower-torso index II ($\text{Pelvis width} \cdot 100 / \text{Length of front abdomen}$)
- iii) Lower-torso index III ($\text{Maximum width of thighs} \cdot 100 / \text{Length of front abdomen}$)
- iv) Lower-torso width index A ($\text{Pelvis width} \cdot 100 / \text{Width of rib-arch}$)
- v) Lower-torso width index B ($\text{Maximum width of thighs} \cdot 100 / \text{Width of rib-arch}$)
- vi) Lower-torso width index C ($\text{Maximum width of thighs} \cdot 100 / \text{Pelvis width}$)
- vii) Abdominal circumference index ($\text{Length of front abdomen} \cdot 100 / \text{Minimum circumference of abdomen}$)

3) Lower Torso Formulae:

Each index was classified into five or six groups according to its numerical quantity, and each group was marked from one to six.

The Abdominal Circumference Index was designated as "U", and the numerical formulae which were obtained as the result of arranging the markings in the order of their derivation: thusly, I II III A B C U, were called Lower Torso Formulae.

4) Only Lower Torso Index II and Lower Torso Width Index C derived from the mean numbers of each index were found to be absolutely equivalent when compared with the results of **Dr. Shibata's** observations of adult women in general residing in Tokyo.

In all other indices differences were noticed between the mean numbers, and except in the case of Lower Torso Index I, the **ama** were smaller.

However, when the shapes were fixed under **Dr. Ogawara's** classification system, the mean number of each index was "3", resulting in exactly identical shapes.

5) There are remarkable differences in individual Lower Torso Formulae, but the Lower Torso Formulae obtained from the mean numbers of each index is 3333333; therefore, presenting the same formula as that of **Shibata's** for adult women in general.

6) In other words, absolutely no difference is seen in the Lower Torso Formulae between

the **ama** and adult women in general, but compared to the length of their abdomen, the width of the upper part of the lower torso of the **ama** is wider than adult women in general and in comparing widths the upper part is better developed compared to the lower part, while on the other hand, the circumference of the abdomen is bigger compared to the length of the abdomen.

These facts mean that the **ama** is wider at the upper part of the lower torso and has a bigger abdominal circumference than adult women in general.

Influence of Caudal Resection of the Pancreas Upon the Hemogram of Epileptics

By

Shunji TOKUOKA

(From the First Surgical Division, Kyoto University, Medical School)

(Prof. Dr. Chisato Araki)

1). Hemogram of 100 epileptics is almost always normal in the intervals of fits, but slight leucocytosis accompanying eosinophilia has been observed within several hours after grand mal seizures.

2). In 28 out of 33 idiopathic epileptics (84.8%) significant eosinopenia has been observed following caudal resection of the pancreas (3/5 of the entire organ), and persisted over 10 days in 18 cases (54.5%). The persisting postoperative eosinopenia has been more frequently observed in the cases, in which postoperative hyperglycemia was pronounced and longer lasted. The relation between alleviation of epileptic seizures and eosinopenia after the operation was not confirmed. In childhood the persisting postoperative eosinopenia has been rarely observed, but eosinophilia more frequently.

3). Following miscellaneous surgical operations, except caudal resection of the pancreas, significant eosinopenia has been observed in 83.3 per cent of 78 patients with or without epilepsy, but in all cases circulating eosinophils returned to or above preoperative levels within 4 days after operation.

4). Some relation between the number of circulating eosinophils, level of blood sugar, insulin and estrogen after caudal resection of the pancreas was found in epileptics. The persisting depression of circulating eosinophils following caudal resection of the pancreas in epileptics may be caused by an increase in adrenal activity. I suppose that the yet unknown mechanism, which regulates pituitary ACTH secretion, not based on the action of epinephrine, may be concerned with the change in metabolism of zinc following caudal resection of the pancreas.