腹部大動脈瘤ヲ伴ツタ Marfan 氏症候群 (蜘蛛狀指趾症 Arachnodaktylie) ノ 1 例

東京大學醫學部冲中内科教室

醫學士 林 圭 雄

1. 緒 言

蜘蛛狀指趾症ハ1893年 Marfan¹⁾ ガ5歳ノ女兒ニツイテ Dolichostenomélie (long narrow extremities ノ意) ノ名稱ノ下ニ始メテ報告シ、ツイテ1902年 Achard²⁾ ガ蜘蛛狀指趾症 (Arachnodaktylie) ト命名シタモノデアル。ソノ他 Pfaunder³⁾ ハ Akromaklie トシテ報告シ、Weve⁴⁾ ハ Dystrophia mesodermalis congenita ト名付ケ、又 Marfan 氏症候群 (Marfan's Syndrome) トモ稱シタ。

マタ、Madonnenfinger ト記載シテイル報告⁵⁾ モアル。

即チ本疾患ハ一見シテ指趾ノ異常ナ畸形の伸長ガ特徴的デアリ、殊ニ手指ヲ見ルトキ蜘蛛ヲ連想サセルノデ通常、蜘蛛狀指趾症 (Arachnodaktylic) ト云ワレテイル。

本症ハ主トシテ中胚葉性組織ノ發育異常ヲ示ス身體畸形ノ症候群デアル。即チ指趾ガ異常ニ細長ク、長管狀骨モ同様ニ非常ニ細長ク、瘦身長軀デ無力性體質ヲ示シ、長頭症、老人様顔貌、漏斗胸、脊柱彎曲症、水晶體脱臼乃至半脱臼、及ビ心臟血管系ノ異常等ヲ呈スル症候群デアル。

本症ハ Marfan ノ報告以來、現在 (1950, 12月)迄外國デハ約240例ノ報告ガアリ、我が國ニ於イテハ約40例ノ報告ガアル。コノウチノ大多數ハ眼科醫ニョル報告デアリ、我が國デハ内科醫ニョル報告ハ未ダ見當ラナイ。剖検例ハ現在迄、外國デハ12例⁶⁾アリ、我が國デハ戸梶^{7,8)}ノ報告シタ1例ニ過ギナイ。私ハ當教室ニ於イテ、本症ト診斷シ得タ1例ヲ觀察スルコトガ出來タノデ、コゝニ報告シ、アワセテ今迄ノ諸報告例ト比較検討シ、若干ノ考察ヲ加エタイト思フ。

2. 症 例

患者、野○貢、31歳男、職業、中學校教員。

既往歴 出産ハ正常デアツタガ、出生時既ニ著シク大キカツタトイフ。5歳ノ時肺炎ニ罹患シタ以外著患ヲ經驗シナイ。幼時ヨリ身體ハヒヨコ長ク、小學校入學當時既ニ身長118.2cmアリ、高等學校迄ゾツト級中デ一番丈ガ高カツタ。學生時代ニハすば一つヲ盛ニ行ツタガ、心悸亢進、呼吸促迫等、心臟ノ自覺症狀ハ起ラナカツタトイフ。22歳ノ夏血痰ヲ少量咯出シ、中等度ノ熱ガ2週間余リ續キ、醫師ヨリ左肺炎かたるト診斷サレタコトガアル。まんと一反應ハコノ時既ニ陽性デアツタ。同ジ年ノ10月ニ右膝關節及ビ腰部ニ緊張性ノ疼痛ガ出現シ、10日バカリ續キ、關節ろいまちすノ疑ヲオカレタコトガアル。

現病歴 昭和21年春、發疹ちふすニ感染シテ以來、食慾等ハ良好デアルニモ拘ワラズ徐々ニ瘦セテ來タ。昭和23年5月頃ヨリ運動ニ際シテ、呼吸困難ヲ覺エル様ニナリ、ソノ後速ヤカニ増悪シ、階段ノ昇降、長途ノ歩行デ激シイ呼吸促迫、心悸亢進ガ起リ、血痰ガ少量出ル様ニナリ、聲モ嘎レル様ニナツタ。同年田植ヲシテイルト突然右背部ニ神經痛樣ノ激痛ガ起リ、コノタメ腕ヲ動カスコトガ出來ナカツタトイフ。又、コノ頃ヨリ激シイ胸部絞扼感モ屢々出現スル様ニナツタ。持續時間ハ5~10分間程度デアル。同年6月終り頃ヨリ食道ノ狹窄症狀ガ起リ、7月半バ頃ハ殆ンド食事嚥取不能ノ狀態デアツタガ、8月ニナルト再ビ輕快シ時々食物ガツカエル程度トナツタ。マタ7月終り頃ヨリ、食事中ニ屢々、左肩ヨリ左前腕尺骨側ニ疼痛ガ放散スル様ニナツタ。8月半バニハ38°C台ノ稽留熱ガ2週間許リ續イタガ惡感ハナク、喀痰嗽咳モ平常ト變リハ無カツタトイフ。10月半バ4晩ニワタリ睡眠中ニ突然心悸亢進ガ起リ、呼吸促迫シ坐居呼吸ヲ營ンダ。コノ時醫師ヨリ、心臟性喘息症發作ト診斷サレ、心臟ノ異常ナ擴張ヲ指摘サレ、更ニ詳細ナ診斷ヲ求メテ、當内

科ヲ訪レ入院シタ。今迄、出血性素因ヲ認メズ、骨折ヲ起シタコトモ無イ。食欲ハ良好デ、口喝モナイ。タゞ患者ハ非常ニ神經質デアリ、睡眠障害ヲ訴エテイル。

入院時所見。體格ハ瘦身長軀 (身長 175.6cm, 體重 56.0kg) デ全體のニ均整ガトレズ全ク不調和 (disharmonious) ナ感ジヲ受ケル。(寫眞1, 2) 筋肉ノ發達ハ悪イ方デアリ、皮下脂肪組織ハ可成リ減少シテイル。顔貌ハ全ク特異デ、年齢ニ比シテ甚ダ老人様 (greisenartig) デアリ、眉上隆起ガ強ク突出シ、顴弓ハ強ク横ニ張ツテイル。(寫眞3, 4) 顔色ハ蒼白デアリ、浮腫、紫斑症ハ認メナイ。ヒゲハ鼻下ニ薄ク疎ニ存スルノミデ顎ヒゲ、頬ヒゲ、ハ全ク生エテイナイ。皮膚ハ稍乾燥シテイルガ、浮腫及ビ靜脈怒張ヲ認メナイ。

呼吸ハ靜テ胸腹型。脈搏ハ1分間98整デ、緊張良ク、速脈ガ著明デアル。脈ノ大イサハ、橈骨動脈ニオイテ左ハ右ヨリモ明ラカニ大キイ。血壓ハ右腕ニ於イテ最大 117~最小 45mm 水銀柱デアリ、左腕ニ於イテハ最大 131~33mm 水銀柱デアル。爪床ニテ毛細血管搏動ヲ認メ、總頸動脈、上膊動脈、股動脈上ニテ收縮期性血管音ヲ聴診スル。

眼ハ睑結膜、球結膜、共ニ異常ナク、眼球運動正常、瞳孔ハ正圓、左右同大デ對光反應、調節反應共ニ正常デアル。視力ハ右 0.1, 左 0.2, デ矯正可也デアリ本症ニ好發スル水晶體混濁 (脱臼乃至半脱臼) ヲ認メナイ。又、虹彩震盪症 (Iridodonesis) モ認メナイ。唯、眼底ノ動、靜脈、毛細血管ハスベテ著シク搏動シテイルノガ見ラレ、殊ニ左眼ニ於イテ著明デアル。Horner 氏症狀ハナイ。

耳鼻ハ正常。舌咽頭モ異常ナシ。輕度ノ嗄聲ガアリ喉頭ニ内筋不全麻痺ヲ認メル。

Oliver-Cardarelli 氏 徵候ハ陰性。頸部りんば腺腫脹ヲ認メナイ。

胸廓ハ無力性デ左右不對稱デアル。心臟部前面ニ著シイ異常搏動ヲ認メ、心尖搏動ハ第5肋間デハ左乳線ヨリ1横指徑左、第6肋間デハ2横指徑左ニ存シ、廣範圍且ツ舉上性デアル。

心臟ハ著シク擴張シ、比較的濁音界ハ、右ハ胸骨右緣ヨリ3横指徑右、上ハ第2肋骨上緣、左ハ心尖搏動ニ一致シテイル。心音ハ心尖部ニテ著明ナ收縮期性及ビ擴張期性雜音ヲ聴キ、肺動脈瓣口デハ第2肺動脈音充進シ、輕度ノ收縮期性及ビ擴張期性雜音ガアル。大動脈瓣口デハ輕度ノ收縮期性雜音及ビ強盛ナ擴張期性雜音ガアリ、第3肋間左胸骨緣デハ典型的ノ湍水性擴張期性雜音ヲ聴ク。左鎖骨上窩ニハ著シイ搏動ヲ觸レル。

れ線像デハ心臟ハ左右ニ著シク擴張シテ居リ、又、大動脈弓ガ著シク膨隆シテ居ル。(寫眞5, 6)

れ線透視所見デハ、恰モ梅毒性大動脈中層炎ノヨウニ上行大動脈ヨリ下行大動脈ニワタリ様ニ幅太クナツテオリ、著シイ搏動ヲ呈シテイル。之ヲ動態れ線寫眞ニ撮影シタ。

心電圖所見。不整脈ハナイ。稍右型デアル。Tcf₂, Tcf₆, Tl, TIV₆ ガ何レモ陰性化シテオリ、心臟ノ擴張肥大及ビ心臟前面ノ可成リ廣範圍ニワタル心筋障碍ノ存在ヲ推定セシメル。

肺肝境界ハ第6肋骨上緣デ、呼吸音ハ概ネ正常デアルガ、前面デハ右上部ニ乾性羅音、背部デハ右下部デ濕性羅音、左下部デ乾性羅音ヲ聴ク。嗽痰ハ時ニアル程度デアリ、喀痰ハ少量、粘稠粘液性デ、少量ノ膿及ビ小血斑ガ混在シテオリ、鏡檢上抗酸性菌ヲ認メズ、イワユル心臟瓣膜症細胞ガ少數認メラレル。肺活量ハ2000ccデ體格ニ比ベテ非常ニ少ナイ。打診上、左背肩胛間部ニ輕濁音アリ、第1胸椎ヨリ第1腰椎ノ間ノ左脊柱傍部ニ大動脈ヨリノ收縮期性雜音ガ聴カレル。脊柱ハ第1胸椎ヨリ第7胸椎ノ間ニ著シイ前右側彎ガアリ、之ハれ線像ソノ他ノ所見カラ先天性ノ變形ト判斷サレル。(寫眞7)

食道ノれ線檢査デハ狹窄ハ認メラレズ、食道上部ガ僅カニ左背方ニ壓迫サレテイル程度デアル。

腹壁ハ緊張正常デ異常抵抗ハ無イガ、視診上中腹部ニ著シイ搏動ガ見ラレ、同部ニハ手拳大ノ各方向ニ様ニ強ク搏動スル腫瘤ガアリ、良ク把握出來ル。壓痛ハ無イ。コノ腫瘤ヲ腹壁上ニ投影シテ畫イタノガ第1圖デアル。腫瘤ハ單純れ線透視デハ證明シ得ナイガ、氣膜術ヲ行イ、前額方向ニれ線ヲ透シテ見ルト、顯著ニ搏動スル腫瘤ガ證明サレ、之ヲ動態れ線寫眞ニ撮影シタ。之ハ明ラカニ腹部大動脈瘤ト判定サレル。(寫眞8)

肝臟ハ右乳線デ2横指徑觸レ、緣邊ハ銳利デ硬度ハ僅ニ増加シテイル。壓痛ハ無イ。

第1圖 腹部大動脈瘤

脾、腎ハ共ニ觸レナイ。

陰毛、陰莖、睪丸ノ大キサ等何レモ正常デ性慾モ異常ナク陰萎ハナイトイフ。

神経系ニハ殆ンド異常ノ症状ヲ認メナイ。即チ知覺及ビ運動機能ノ障碍ハナイ。意識ハ正常デ知能モ良イ。失調症モ無ク、筋粗大力モ正常デアル。(例エバ握力ハ右42kg, 左37kg) 病的反射モ出現シナイ。

手ハ大キク細長ク、指モ細長ク明ラカニ蜘蛛指症(Arachnodaktylie)ヲ呈シテ居リ、(寫眞9)足ハ扁平足デ非常ニ長ク、幅ハ著シク狭ク、マタ第1趾ハ異常ニ大キク、カツ外反

位(Hallux valgus)ヲナシテイル。(寫眞10, 11)

骨ノ線像デハ一般ニ骨ノ長軸ガ著シク長ク、殊ニ手骨、足骨ノ長サハ日本人正常範圍ヲ遙カニ越エ(第1表)、手デハ橈骨ノ遠位端及ビ指骨底部ニ骨端線癭痕ガ遺殘シ、第1中手骨底部ニハ偽性骨端線癭痕ガ見ラレル。(寫眞12, 13)

とるこ鞍ハ淺ク且ツ甚ダ小サイ。(第2表、及ビ寫眞14)

第1表 1. 手骨ノ長サ 單位:mm
下段ノ括弧内ハ日本人ノ平均値

	第1指	第2指	第3指	第4指	第5指
中手骨	52.5 (41.9)	76.1 (62.2)	74.5 (59.3)	67.2 (54.2)	57.5 (50.5)
基節	34.5 (28.2)	45.0 (37.7)	52.0 (42.3)	48.0 (40.0)	37.3 (31.5)
中節		27.8 (22.2)	30.4 (25.7)	30.1 (25.3)	23.6 (17.4)
末節	23.0 (21.6)	18.0 (16.9)	18.9 (17.8)	20.0 (18.4)	18.0 (16.5)

2. 足骨ノ長サ 單位:mm
下段ノ括弧内ハ日本人ノ平均値

	第1趾	第2趾	第3趾	第4趾	第5趾
中足骨	71.5 (54.4)	72.0 (63.2)	70.0 (63.7)	65.0 (62.1)	65.0 (58.7)
基節	35.0 (24.5)	30.0 (25.1)	26.5 (23.6)	20.0 (22.0)	20.0 (20.0)

(中節・末節ハレントゲン像ニテ測定不能)

第2表 とるこ鞍ノ測定値
(高木氏法ニヨル) 單位:mm

	本例	日本人平均値	正常値ノ範圍
b e	11.5	16.3	14.0~22.0
c e	10.5	14.6	13.0~17.0
T	8.0	12.9	11.0~16.5
t	7.0	10.6	8.5~13.0

身體計測 身體計測ヲ精細ニ行ツタトコロ、身體各部ノ長サハ日本人平均値ニ比ベルト遙ニ長イ。(第3表)

次ニ身長ニ對スル身體各部ノ比率デハ手長ガ特ニ長ク、上肢長、胴長ガ稍長クナツテイル。(第4表)第5表ハ Gray⁹⁾ノ報告ノ表ト本例ノ比率トヲ對照シテミタモノデアル。

一方、身體各部ノ幅ハ日本人平均値ニ比シテ大抵ハ小サク、各部ノ幅ト長サノ比率ヲミ

ルト幅ガ非常ニ狭イコトガ分ル。(第6表)殊ニ手長幅指數、足長幅指數ハ著減シテイル。

頭ハ後頭骨ガ異常ニ突出シ、最大頭長ハ日本人平均ニ比シテ遙カニ長イガ最大頭幅ハ平均ニ比ベテ却ツテ短カイ。即チ著シイ長頭型(Dolichocephalie)デアル。

次ニ各測定値ヲ正常人ニ於ケル測定値ノ分布ノぐらふノ上ニ記シテ標準偏差ヲモツテ正常人トノ比較ヲ行

ツタ(第7表, 東大人類學教室増谷¹⁰⁾
ニ依ル), コノ表カラ分ルヨウニ正常
ノ身體各部ノ長サ及ビ比率ヲモツテ
イル人ナラバ略々直線トナルベキモ
ノガ, 本例ニオイテハ非常ニ亂雜ニ
入り亂レタ折線トナリ, 殊ニ足長,
頭長ハ長ク, +3%ノ範圍外ニトビ

第3表 身體計測値 單位: cm

	本 例	日本人 平均値
身 長	175.6	159.0
胸 骨 上 縁 高	143.0	123.8
恥 骨 上 縁 高	87.4	80.8
右 脛 骨 上 縁 高	46.9	42.6
右 内 踝 端 高	6.3	7.5
右 肩 峰 高	147.8	133.6
右 尺 骨 上 縁 高	110.0	101.8
右 機 骨 下 端 高	84.5	78.6
右 中 指 端 高	62.0	59.6
右 腸 骨 前 上 棘 高	93.1	89.0
胸 長	55.7	47.9
上 體 長	83.2	78.1
右 上 肢 長	85.8	73.8
右 上 腕 長	37.8	31.8
右 前 腕 長	25.5	23.3
右 手 長	22.5	18.7
右 手 幅	8.8	10.2
右 下 肢 長	92.7	85.7
右 大 腿 長	45.8	43.1
右 下 腿 長	40.6	35.0
右 足 長	27.5	24.5
右 足 幅	9.7	10.7
右 第 1 趾 長	6.1	4.6
最 大 頭 長	25.0	18.6
最 大 頭 幅	14.8	15.0
最 小 頭 幅	10.9	10.4
額 弓 間 幅	14.4	14.1
下 顎 骨 幅	10.3	11.0
形 態 學 顔 高	11.8	12.4
鼻 高	5.0	5.2
鼻 幅	4.0	3.6

第4表 身長ニ對スル身體各部長ノ比率

	本 例	日本人平均	増 減 率
上 體 長/身 長	50.2%	49.2%	+2.0%
胸 長/身 長	31.7%	30.1%	+5.3%
上 肢 長/身 長	48.8%	46.4%	+5.1%
下 肢 長/身 長	52.8%	53.9%	-2.2%
手 長/身 長	12.8%	11.7%	+9.2%
足 長/身 長	15.7%	15.3%	+2.8%

第5表 外國ノ報告症例トノ比較 (Gray H. ニヨル)

1. 比較の手長(手長/身長)ノ比較

報 告 者	患者ノ性	年 齡	(手長/身長)%	増減率
Roch	♀	29	13.8	+23%
(本 例)	♂	31	12.8	+16%
Gray (Case 2)	♀	13	12.7	+15%
Borger	♂	9	12.0	+15%
Francois	♂	12	12.3	+14%
Mery	♀	11	12.4	+12%
Gray (Case 1)	♂	10	12.0	+8%
Marfan	♀	5	11.7	+7%
Roederer	♀	13	10.9	+3%
Gray (Case 4)	♀	6	11.0	+2%
Gray (Case 3)	♂	13	11.2	+1%
(正 常 人 對 照)		成人	11.0	

2. 比較の足長(足長/身長)ノ比較

報 告 者	患者ノ性	年 齡	(足長/身長)%	増減率
Mery	♀	11	17.6	+16%
Gray (Case 1)	♂	10	16.8	+12%
Roch	♀	29	16.3	+10%
Borger	♀	1	16.4	+9%
Borger	♂	9	15.8	+5%
(本 例)	♂	31	15.7	+5%
Gray (Case 2)	♀	13	15.6	+5%
Marfan	♀	5	16.2	+4%
Francois	♂	12	15.5	+3%
Gray (Case 4)	♀	6	14.1	+2%
Gray (Case 3)	♂	3	15.3	+1%
(正 常 人 對 照)		成人	15.0	

出シテオリ, 如何ニ異常ニ不調和ナ體型ヲモツテイルカラ如實ニ示シテイル。

臨床検査所見. 血液ノ諸検査ノ結果ハ第8表ノ如クデアル. 血液像デハ8.5%ノえおぢん好性細胞が見ラレル以外ニ著變ハナイ。

第6表 身體各部ノ長サト幅ノ比率

	本 例	日本人 平均値	増 減 率
頭長幅指數 (頭幅/頭長)	57.6%	80.6%	-28.6%
手長幅指數 (手幅/手長)	39.1%	54.5%	-28.2%
足長幅指數 (足幅/足長)	35.3%	43.3%	-18.5%

血清Ca, 總コレステリン, 無機磷濃度, 血糖値, 赤血球沉降速度, 血清もいれんぐらはと値ハ何レモ正常デア。糖同化機能試験 (坂口氏法ニヨル)モ正常。血清高田氏反應陰性, Weltmann 氏反應正常。尿ニ異常ナク, 水試験ニヨル腎機能ニモ異常ナシ, 糞便ニハ蛔虫卵ガ認メラレル。

第7表 身體計測値ノ關係偏差折線表

基礎代謝率ハ-4.34%。

皮膚毛細血管抵抗 (Borbély 氏法), 17cm 水銀柱 (正常)。髄液ハ壓, 性狀共ニ異常ナシ。

血清及髄液ノ梅毒反應ハ何レモ陰性デアリ問診上, 臨床上ニモ梅毒ノ徵候ヲ認メナイ。

あどれなりん試験, 陰性。びろかるびん試験, 陽性, あとろびん試験, 陰性。

あしゆねる氏試験, 陰性。つえるまく氏試験, 陰性。

入院後ノ經過 入院中ハ11月末夜間ニ1回心臓性喘息ノ發作ガ起ツタ他ハ大シタ變化ヲ示サナカッタ。

食道ノ狹窄感ハ時トシテ存スルガ通過障礙ハ無ク, 時ニ左前胸エノ放散痛ガ起ルトイウ狀態デアツタ。嗄聲ハ可成リ輕快シタ。

治療トシテハ症候學的ニ強心劑ソノ他ヲ投與シタ他, 沃剝, ふれはるもんノ投與ヲ行ツタガ他覺の所見ハ入院以來殆ンド變化セズ, 動脈瘤ノ大キサニモ變化ハ認メラレナカッタ。同年12月上旬一應退院シ, 自宅デ

第 8 表 臨床検査成績

Hb	(小宮氏法)	92%
赤血球數		418萬
色素係數		1.1
網狀赤血球		8%
血小板數		272000
白血球數		8400
血液像	骨髓細胞	0
	後骨髓細胞	0
	好中球	桿狀核
		4.5%
		分葉核
		62.0%
	エオザン好性細胞	8.5%
		鹽基好性細胞
		單球
	リンパ球	大
		1.0%
	リンパ球	小
		20.0%
	赤血球ノ形態異常	
赤血球沈降速度(1時間値)		5mm
出血時間		2½分
血液凝固時間	開始	4½分
	完結	24分
赤血球抵抗値	最小	0.48%食鹽水
	最大	0.30%食鹽水
血清もいれんぐらはと値		6.5
血清かるしうむ濃度		9.91 mg/dl
血清總これすてりん濃度		146 mg/dl
血清無機燐濃度		38 mg/dl

糖同化機能試験 (坂口氏法)

時 間	血糖値 (mg/dl)	糖 尿
前	86	(-)
½	143	
1	145	(-)
1½	123	
2	93	(-)
3	96	(-)

モ伴ツタ例ハ未ダ 1 例モ報告ガナイ。

胸廓ハ漏斗胸ガ多ク、肺ノ畸形トシテハ左肺ガ 1 葉シカナカツタ 1 例ガ報告サレテイル¹³⁾。

コノ他青色鞏膜、先天性筋無緊張症 (Amyotonia congenita) ヲ伴ツタ例モ報告サレテイル。マタ水晶

療養ヲ續ケテイタガ 12 月中旬自覺ノニ苦痛モ全ク無クナツタノデ家人ノトメルノヲキカズ、自轉車デ方々乗り廻シタトコロ、急激ニ顔面、四肢等ニ高度ノ浮腫ガ出現シ、呼吸困難、心悸亢進ガ激シク起リ、同月下旬ヨリ坐居呼吸ノ状態トナリ、同月末突然死亡シタ。郷里ハ片田舎デアツタノデ、貴重ナ剖檢ノ機會ヲ失ツタコトハ残念デアル。

3. 總括並ニ考按

本例ハ蜘蛛狀指趾、四肢細長、長頭症、脊柱前側彎症、扁平足、胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大型脈辨閉鎖不全症等多彩ノ症状ヲ有スル Marfan 氏症候群ノ 1 例デアル。

Marfan 氏症候群トハ蜘蛛狀指趾症 (Arachnodaktylie) ヲ主症状トシ、骨、腱、筋、結合組織、脂肪組織、血管等中胚葉性組織ノ變化ニヨル諸症状ヲ伴ツタ症候群トシテ理解サレル。

即チ骨ハ異常ニ伸長シ、構造ハ一般ニ纖弱デアルト云ワレ、本例ノ如ク偽性骨端線形成 (Pseudoepiphysenbildung) ノ見ラレルコトモアル。

マタ筋肉ノ發育ハ一般ニ惡ク、時ニハ一部ノ筋ノ缺損ノ見ラレルコトモアル。又、腱及ビ靱帶ノ發育ガ骨ノ異常伸長ニ伴イ得ズ、諸關節ノ強直ヲ來スコトガアルトイフ。

合併症トシテハ眼ノ水晶體偏位 (脱臼乃至半脱臼) ガ最も多ク見ラレ、視力障碍ノタメ眼科醫ニ發見サレルコトガ多イ。Weve⁴⁾ ハ本症候群中 33% ニ之ヲ伴イ、梶¹¹⁾ ハ 83% ニ之ヲ見タト報告シテイル。水晶體偏位ノ成立機轉ニ關シテハ、色々ナ假説ガ唱エラレテイルガ確カナコトハ未ダ不明デアル。タゞ、水晶體偏位ノ起ル時期ハ胎生 3~4 ケ月デアルト云ワレル。

次ニ多ク見ラレル合併症ハ心臟血管系ノ異常デアリ Rados¹²⁾ ノ調査デハ 204 例中 63 例、即チ 30.9% ニ之ヲ見、Weve⁴⁾ ハ 25~30% ニ之ヲ伴イ、梶¹¹⁾ ハ 20% ニ之ガ見ラタト報告シテイル。トコロガ、剖檢例デハ心臟血管系ニ異常ヲ認メナカツタノハ全剖檢例 13 例中僅カ 1 例ニ過ギナイ。即チ、卵圓孔開存 5 例、胸部大動脈瘤 4 例 (コノ中 3 例ガ解離性大動脈瘤 (Aneurysma dissecans) デアツタ。) 大動脈中層壞死 3 例、大動脈辨疾患 3 例、僧帽辨疾患 3 例、肺動脈中層壞死 1 例、心筋瀰濁腫脹 1 例、全ク異常ヲ認メナカツタモノ 1 例、トナツテイル。ソノ他剖檢例ハ無イガ、臨床的ニハぼたろ氏管開存、中隔缺損、肺動脈辨口狹窄等ガ報告サレテイル。然シ本例ノ如ク著明ナ腹部大動脈瘤ヲ

體缺損，耳翼缺損ノ見ラレタ例モアル。

以上イロイロナ症候ヲ考慮スルト，本症候群ハ大體ニオイテ中胚葉性組織ノ發育不全ニ歸セラレルトイウ **Weve** ノ見解ハアル程度承認シテヨイト思ウ。

本症候群ガ出現スル機序及ビ要因乃至原因ハ全ク不明デアルガ，最モ密接ナ關係ヲ想定サレルノハ内分泌機能トノ關係デアル。

就中，下垂體ガ最モ重要視セラレテオリ，13例ノ剖検例中4例ニオイテハ下垂體前葉酸好性細胞ノ増殖ガ記載サレテイル。本症ノ原因トシテ，**Pfaundler**³⁾ 等ハ下垂體機能亢進說ヲ唱エタ。

とるこ鞍ハ變化ナシトスル報告モアリ，**Fleischer**¹⁴⁾ ノ如ク甚ダ擴大シテイタイトウ例モアリ，マタ **池田**¹⁵⁾ ノ報告デハ形ハ扁平デ基底ハ肥厚シテイタイトウ。本例ニオイテハ著シク淺ク且非常ニ小サカッタ。マタ **Moehling**¹⁶⁾ ノ報告デハ2例中1例ハとるこ鞍ハ著シク擴大シ，他ノ1例デハ反對ニ著シク小サカッタ。ナホ，兩側トモ卵胞刺激ほるもん，Ketosteroid 等ノ測定値ハ正常デアツタガ，第2例デハ葡萄糖負荷時ノ血糖曲線ハ下垂體機能低下型 (hypopituitary type) ヲ示シタイトウ。**Moehling** ハ下垂體ト血管系トノ關連性 (pituitary-vascular relationship) ニツイテノ自己ノ實驗カラ心臟血管系ノ發育不全乃至畸形ハ下垂體系統ノ機能不全ニ基クノデハナイカト想像シテイル。ナオ，**Moehling** ハ Arachnodaktylie ノ患者ガ high arched palate ヲ有シテイルコトヲ見テ，下垂體ハ發生學上，口蓋ノ屋根カラ發達スルノデ high arched palate ガ下垂體ノ發育不全乃至ハ機能異常ニ關係スルノデハアルマイカト述ベテイル。

Saint-Martin¹⁷⁾ 等ハ基礎代謝ノ低下ヲ報告シテイルガ，本例デハ異常ヲ認メナカッタ。マタ，**池田，田上**¹⁸⁾ 等ノ例デハ基礎代謝亢進ヲ報告シテイル。

マタ **木下**¹⁹⁾ ハ偽骨端線形成 (Pseudoepiphysenbildung) ヲ指摘シテ本症ニ内分泌異常ノ存在ヲ肯定シタ。本例ニオイテモ骨ノ骨端線癭痕遺殘及ビ偽性骨端線癭痕ノ存在，ナラビニ著シク狭小ナとるこ鞍ナド内分泌機能異常ノ存在ヲ推定スルニ足ル所見ガ見ラレテイル。

戸梶^{7,8)} ノ剖検例ニオイテハ下垂體各細胞ノ増殖ナラビニ前葉ノ一部ノ腺腫樣變化ヲ認メ，ソノ他，甲狀腺ニ退行變性，硝子樣變性，ナラビニ間質増殖ヲ認メ，又睪丸ニモ間質増殖，細精管退縮等ヲ認メ内分泌障礙ヲ肯定シテイル。

Börger²⁰⁾ ハ末子ニ患者ガ多ク見ラレタコトカラ胎生中ノ消耗 (exhaustion) ニ關係アリ，殊ニ内分泌腺ノ消耗ガ密接ナ關係ヲモツテイルノデアラウト推論シテイル。

ナオ **Winkelman**²¹⁾ ハ特ニ間腦系統ト本症候群トノ關係ヲ論ジテイル。

ソノ他 **Marfan**²²⁾ ハ神經疾患ノ原因トシテ考慮シ，**Poynton**²³⁾ 及ビ **Thursfield**²⁴⁾ ハ infantile muscular dystrophy ノ一型デアルトシタ。

マタ **Méry et Baboneix**²⁵⁾ ハ Hyperchondroplasia ノ範疇ニ屬スベキモノト考エタガ **Green**¹³⁾ ハコノ見解ヲ否定シテイル。

以上ノ如ク決定的ナ病因論ハ未ダ確立サレテナイ。

本症候群ノ患者ノ年令ハ幼兒ガ大部分デ，肺炎，結核症，等デ死亡スル者ガ多イノデ，30歳以上ニ達スル者ハ少ナイト云ワレテイル。

性別ニハ大差ハナイ。

本症ノ遺傳關係ヲ見ルト，**梶**¹¹⁾ ハ54例中35例 (66%) ニ遺傳關係ヲ認メ，**戸梶**⁷⁾ モ18例中10例 (63%) ニ之ヲ認メ，**Weve**⁴⁾ ハ83例ノ調査ノ結果カラ Mendel ノ法則ニヨル優性遺傳ヲ主張シタ。本例ニオイテモ家系圖 (第2圖) ニ見ラレルヨウニ，完全ナ症候群ハ少ナイカモ知レナイガ，可成リ濃厚ナ家族ノ出現ヲ示シ，之デハ明ラカニ Mendel ノ單純優性遺傳ノ形式ヲ示シテイル。

然シ本症ガ全ク孤立的ニ出現シタイトウ報告モアルノデ遺傳關係モナオ斷定ハ出來ナイ。

ナオ特徴的ナ病的體格ヲ示ス先端巨大症 (Akromegalie) ノ諸計測値ト本症ノソレト比較シテミルト，身體諸長徑ニオイテハ先端巨大症モ本症モ共ニ正常ヨリ増大シテイルガ，身體諸幅徑，周徑及ビ體重ニオイ

テハ兩者ノ差異ハ甚ダ著明デアツテ、先端巨大症ニオイテハ著シク増加ノ方向ニ變化ヲ示シ、蜘蛛狀指趾症ニオイテハ之ト反對ニ減少ノ方向ニ變化ヲ示シテイル。

コノ事ハ既ニ園田²⁶⁾ガ報告シテイルガ本例ニオイテモ全ク一致シテイル。

4. 結 語

1. 著明ナ腹部大動脈瘤ヲ伴ツタ Marfan 氏症候群 (Arachnodaktylie) ノ 1 例ニツイテ報告シタ。

2. Marfan 氏症候群ニ關スル現在迄ノ報告ヲ總括シ、諸家ノ見解ヲ紹介シ、本例トノ比較ヲ行イ検討ヲ加エタ。

終リニ臨ミ御懇切ナ御指導ヲ賜ツタ恩師沖中教授、ナラビニ村上博士ニ深く感謝イタシマス。マタ御援助ヲ戴イタ東大人類學教室ノ増谷學士、ナラビニ東大整形外科教室ノ津山學士ニ厚ク感謝ノ意ヲ表シマス。

文 献

- 1) Marfan A. B.: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Paris, 13:220 1896.
- 2) Achard C.: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Paris, 19:834 1902.
- 3) Pfaundler M.: München. Med. Wschr. 61:280 1914.
- 4) Weve H.: Arch. f. Augenh. 104:1 1931.
- 5) Schinz-Baensch-Friedel: Lehrbuch d. Röntgendiagnostik BdI. Skelett: 16.
- 6) Uyeyama H., Kondo B., Kamins M.: Am. H.J. 34:580 1947.
- 7) 戸梶一齊: 日本内分泌學會雜誌. 18 (5): 520 昭17.
- 8) 戸梶一齊, 西富久恵: 日本内分泌學會雜誌. 18 (1): 40 昭17.
- 9) Gray H.: Arch. Int. Med. 75:215 1945.
- 10) 増谷乾: 人類學雜誌. ZZL-X3(IV):1 昭24.
- 11) 梶利一: (a) 日本眼科學會雜誌. 44:2368 昭15. (b) 日本眼科學會雜誌. 42:1770 昭13.
- 12) Rados A.: Arch. Ophth. 27:447 1942.
- 13) Green H., Emerscn P. W.: Arch. Pediatr. 60 (6):299, 1943.
- 14) Fleischer: Klin. Mbl. f. Augenheilk. 102:421 1939.
- 15) 池田一三, 久富良雄: 綜合眼科雜誌. 37 (10): 1261 昭17.
- 16) Moehling R.C.: Am. J. Roentg. 61 (6):797 1949.
- 17) Saint-Martin R.: Ophthalmologia 98:201 1939.
- 78) 池田一三, 田上滿年: 實驗眼科學雜誌. 20 (197): 794 昭12.
- 19) 木下昌樹: 實驗眼科學雜誌. 18 (170):514 昭10.
- 20) Börger F.: Ztschr. f. Kinderh. 12:161 1914.
- 21) Winkelman J.E.: Ophthalmologia 112 (3):157 1946.
- 22) Marfan A.B.: Arch. d' Ophtalm. 2:881 1938.
- 23) Poynton F.J., Maurice W.B.: Jr. Med.

第1圖

第2圖

第3圖

第4圖

第5圖

第6圖

第7圖

第 8 圖

第10圖

第12圖

第 9 圖

第18圖

第11圖

第14圖

- Soc. London 45:21 1923. 24) **Thursfield H.**: St. Barth. Hosp. Rep. 53:35 1917. 25) **Méry et Baboneix**: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Paris 19:671 1902. 26) 岡田俊吉: 日本眼科學會雜誌. 45 (7):1772 昭16. 27) 綾部松次, 松井正三: 東大齒科學教室業蹟集. 昭15. 28) 高橋亮平: 綜合眼科雜誌. 37 (6):873 昭17. 29) 齊藤淑: a) 兒科雜誌. 48 (1):109 昭17. b) 兒科診療. 8 (9):590 昭17. 30) **Piper P.K., Irvine J.E.**: Am.J. Dis. Child. 31:882 1926. 31) **Baessler F., Schneider J.**: Ztschr. f. d. ges. Anat. 13:54 1927. 32) **Ingram W.W., Inglis K.**: M.J. Australia 2:238 1931. 33) **Kilmer A.**: Arch. f. Kinderh. 97:206 1932. 34) **Weber F.P.**: Lancet 2:1472 1933. 35) **Villard H., Viallefant H., Temple J.**: Bull. Soc. d' Ophth. de Paris: 384 1934. 36) **Bücklers M.**: Klin. Monatsbl. f. Augenh. 94:547 1935. 37) **Francois J.**: Bull. et mém. Soc. franc. d' ophth. 48:157 1935. 38) **Fassow A.**: Klin. Monatsbl. f. Augenh. 94:102 1935. 39) **Burch F.E.**: Arch. Ophth. 15:645 1936. 40) **Kurz O.**: Arch. f. Augenh. 106:592 1936. 41) **Westendorff E.G.**: Kinderärztl. Praxis 7:393 1936. 42) **Charamis J.**: Arch. d' Ophth. 1:1067 1937. 43) **Fischbach H.**: Ztschr. f. Kinderh. 58:630 1937. 44) **Cockayne E.A.**: Brit. J. Child. Dis. 35:231 1938. 45) **Futcher P.H., Southworth H.**: Arch. Int. Med. 61:693 1938. 46) **Giraud P. et al**: Bull. Soc. de pédiat. de Paris 36:713 1938. 47) **Nercross J.R.**: J. Bone & Joint Surg. 20:757 1938. 48) **Rambar A., Denenholz E.J.**: J. Pediat. 15:844 1939. 49) **Baer R.W., Taussig H.B., Oppenheimer E.H.**: Bull. Johns Hopkins Hosp. 72:309 1943. 50) **Etter L.E., Golver L.P.**: J.A.M.A. 123:88 1943. 51) **Bergstrand C.G.**: Acta Pediat. 27:583 1945. 52) **Schneider W.F.**: J. Pediat. 27:583 1945. 53) **Bhat P.K.**: Antiseptic 43(10):651 1946. 54) **Zeman T.C.**: Am. J. Ophth. 29(12):1588 1946. 55) **Sabata J.**: Lék. listy. 2:477 1947. 56) **Agundis T. Jr.**: Arch. As. evit. ceguera México 5 (1):173 1947. 57) **Tobin J.R. Jr., Bay E.E., Humphreys E.M.**: Arch. Int. Med. 80:475 1947. 58) **Dalaker S.**: Nord. Med. 40 (44):2004 1948. 59) **Lloyd R.I.**: Arch. Ophth. 39 (5):558 1948. 60) **Bauer J.**: Arch. Int. Med. 81 (2):289 1948. 61) **Cordtsen L.**: Nord. Med. 4 (24):1079 1949. 62) **Lindeboom G.A., Bouwer W.F.**: Cardiologia 15 (1):1949.

A case of arachnodactylia (Marfan's syndrome), accompanied with marked aneurysm of aorta abdominalis.

Tamao HAYASHI

The 3rd Medical Clinic, School of Medicine, University of Tokyo.

(Director: Prof. S. Okinaka)

Since the original description of arachnodactylia by **Marfan** 1896, about 230 cases of this disease have been reported, of which about 40 cases are found in Japanese literatures.

The author observed a patient, who showed a typical **Marfan's** syndrome.

The patient was an unmarried Japanese man, aged 31 years. Nothing noteworthy was found in his past history except for abnormal body form. In June, 1948, illness began with severe agonizing, compressing pain over the anterior chest and the right back, accompanied with palpitation and dyspnoea.

In October, 1948, the patient was transferred to our hospital.

Physical examination revealed as follows- His height was 175.6 cm (taller than common Japanese man), and his weight was 56.0 kg. His extremities were slender and long, and showed typical arachnodactylic forms. Disharmonious bodily development, dolichocephalic head with old-appearing features, lordoscoliosis, pes planus, and hallux valgus were marked. Vision was short sighted. No dislocatio lentis.

The heart was markedly enlarged, rough systolic and diastolic murmurs were loudly heard over the entire precordium, and they were most intensive at the aortic ostium. (aortic stenosis and mitral stenosis) Electrocardiogram showed the existence of myocardial disturbance.

Roentgenologic examination revealed marked aortic aneurysm.

The blood pressure was 117/45 in the right arm, 131/33 in the left arm.

The blood Wassermann was negative. There was a marked pulsation over the middle abdomen. Palpatoric finding and roentgenologic examination revealed aneurysm of aorta abdominalis.

Sella turcica was shallow and very small. Long tubular bone showed remaining epiphyseal line and pseudo-epiphyseal formation. These findings may prove the existence of endocrine dysfunction. Hematologically nothing was abnormal, except for eosinophilia (8.0%). Neurologically normal.

In this case familiar relationship was evidently recognized. Bloodrelational appearance of this disease showed **Mendel's** dominant hereditary type.

Except for a attack of asthma cardiale, the patient was almost asymptomatic during his hospital stay.

On December 3., 1948, he was sent home. In the middle of December, 1948, symptoms of decompensation rapidly developed, and he died suddenly on December 23., 1948.

(author's abstract)