上皮小體剔出ノ肝臟機能ニ及ボス影響ニツイテ

東京大學醫學部柿沼内科

堀 越 知 之

本論文ノ要旨ハ昭和26年4月第24回及ビ昭和27年4月第25回日本内分泌學會總會ニオイト發表シタ。

緒 言

上皮小體（副甲状腺）ガ生體ニ重要ナル内分泌器官デアルコトハ周知ノ事實デアル。上皮小體はるもんノ主ナル働キトシテハカルシウム、磷ノ代謝ヲ司ルコトデアリ、はるもんノ過剰ニヨツテハ骨ノ脱灰ニヨル纖維性骨炎ヲ、欠乏ニヨツテハ血中Caノ減少ニヨリてたにーヲ起スコトガ知ラレタイル。シカシ乍ラ上皮小體はるもんガCa.Pノ調節ヲ行フ機構ニツイテハ未ダ定説ガ無ク、今日ニ至ルマデ種々ノ報告ガ見ラレタイル。第一ニハ腎ヲ介シテ調節ヲ行ウトイウ説¹⁾、第二ニハ直接ニ骨組織ニ働クトイウ説²⁾、更ニ第三ニハ肝ヲ介シテ調節ヲ行ウトイウ説ガアル。肝ニ對スル上皮小體はるもんノ作用ニツイテハ從來イクツカノ報告ヲ見ルガ、一方ニハ肝機能ニ重大ナル關係アリトスル者（Underhill³⁾、金⁴⁾、Greenberg⁵⁾、Nitzescu⁶⁾、Lederer⁷⁾、Cavallero、瀬田及ビ小原⁸⁾）アリ、他方ニハ有意ノ關係ナシトスル者（Thomson a. Callip⁹⁾、Selye¹⁰⁾）ガアル。余ハ上皮小體剔出ニ際シテ肝機能ニイカナル變化ガ來ルカヲ見ル目的ヲ以テ、肝組織中ノ酵素かたらーゼ、あみらーゼノ消長、組織學的ニ見タ糖原ノ變化、更ニあぞるびンS尿排泄試験、とりふとふあん代謝障礙ノ有無等ニツイテ觀察シ、アル結果ヲ得タノデ此所ニ報告スル。

實驗方法並ビニ結果

實驗動物トシテハ體重100~180gノ成熟シタ白色雄性大黒鼠ヲ用イ、實驗前少クトモ1週間以上一定量ノ碎麥及ビ水更ニ週2回程度少量ノ野菜ヲ以テ攝氏18度ノ恒温室内ニテ飼育シタ。尚後半ノ實驗ノ一部ニハ黑白混合ノ變種ラツテヲ用イタ（ラツテ176番ヨリ184番マデ）。

上皮小體剔出ニハえーてる麻酔下ニ型ノ如ク固定シ、頸部前中央ニ縦ニ切開ヲ施シテ甲状腺ニ達シ眼科用ノ小剪刀ヲ用イテ上皮小體ヲ切取ツタ。此ノ剔出標本ハばらふいん包埋、へまときしりんえおじん染色ヲ行ツテ鏡檢シ、完全ナ上皮小體デアルコトヲ確カメ、全剔不成功ノモノハ除イタ。對照トシテハ同様ノ操作ノ下ニ手術ヲ行イ、上皮小體ノ剔出ノミヲ行フズ同程度ノ負荷ヲ與エタモノヲ用イタ。

術後ノ體重ノ變化ノ1例ハ第1圖ニ示シテアル。剔出動物ハソノ1/4ニ於テハてたにーヲ起シ、てたにーヲ起シタモノハ早イモノデハ術後30~50時間、遅イモノデハ5~7日ノ間ニ斃レタモノガ多カツタ。

肝酵素エノ影響ヲ見ルタメニ屠殺ノ時期トシテハ手術ノ影響ガ消失シ、對照動物ノ體重ガ略々術前ニ復スル時期、且剔出動物ガ脱落症狀ノ爲ニマダ死亡セヌ時期トシテ術後滿4日及ビ滿7日ヲ選ンダ。食餌ノ影響ヲ避ケルタメニ屠殺前24時間ハ水以外ノ餌ヲ與エズ、斷頭法ニヨツテ

第1圖 上皮小體剔出後ノ體重曲線

屠殺シ、血液ハ1000倍溶血液ヲ、肝ハソノ中葉ヨリ切取ツタ組織ヲ表面ニ附着シタ血液ヲ可及的拭イ去リ手早ク500mg秤量シ10ccノ蒸溜水ヲ加エほもげないざーヲ用イテ碎キソノ上清ヲ酵素原液トシ、血液かたらーゼ數、肝かたらーゼ數、肝あみらーゼ量ヲ測定シタ。かたらーゼ數ハ井上、越智、白井氏¹¹⁾ノ過まんがん酸加里法ニ從イ、夫々血液ハ1cc、肝ハ1gニヨツテ分解サレタ過酸化水素量ヲg單位テ表シタ。あみらーゼ量ハ吉尾氏法¹²⁾ニ做イ、20倍酵素液2ccニ1%澱粉液2ccヲ加エ、pH6.5ニオイテ37度恒温器内ニテ15時間ニ澱粉ヲ分解シテ產生サレル糖量ヲはーげどるん、えんぜん氏法ヲ用イテ測定シmg/dlヲ用イテ表シタ。結果ハ第1表及ビ第2, 3, 4圖。

第 1 表

組番號	ラツテ番 號	體重(g)	手術ノ種類	屠殺迄ノ日數	血液かたらーゼ數	平均	肝かたらーゼ數	平 均	肝あみらーゼ量	平 均	てたにーニヨル死亡つて	
I	64	135	P	4	3.5	3.5	7.7	7.7				
	66	140	K		4.4	4.4	11.3	11.3				
II	67	150	K	4	3.8	4.0	9.15	8.85	196	201		
	68	130			4.1		10.15		213			
	69	150			5.3		7.25					
	70	165			2.9		8.75		194			
	71	160	N		4.4	4.4	11.35	11.3	214	214		
	72	165					11.25					
III	74	195	P	4	4.4	4.2	9.2	8.3	171	166		
	76	155	K		4.0		7.4		161			
	73	155					9.55	9.55	206	206		
IV	92	125	P	4	4.5	4.5	7.05	7.05				
	91	145	K		4.4		8.1					
	93	145			4.5	8.85	8.5					
V	106	150	P	4	5.6	5.1	6.35	5.6	133	149		
	107	145			4.8		6.15		162			
	109	150			4.8		4.35		152			
	110	150	K		4.3	4.5	6.85	6.45	167	158		
	111	125					5.75		169			
	112	140					4.6		6.8			139
VI	128	145	P	4	6.2	5.8	3.15	6.55	153	161		
	131	135			5.4		9.95		168			
	129	140	K		5.6	5.8	8.1	9.25	196	180		
	130	150			6.0		10.4		163			
				總平均	P	4.8		6.8		157		
					K	4.5		8.55		180		
					N	4.4		11.3		214		
VII	86	160	P	7	4.3	4.3	5.75	8.65	167	174		
	87	185			4.3		11.55		181			
	88	155	K			4.5	12.4	13.85	207	196		
	90	185			15.3		184					

Ⅷ	103	135	P	7	4.1	4.8	8.75	7.7		181	
	104	145	K		5.4		6.6		181		
	101	130			5.4	4.6	9.75	10.35	193		
	102	160			3.7		10.9		198		
Ⅸ	114	160	P	7	5.2	5.2	3.8	3.8	144	144	No.113
	116	162	K		3.9	4.1	9.35	10.1	211	188	No.115
	117	190			4.3		10.8	165			
	119	215	N		4.6	4.2	12.7	11.65	247	220	
	120	150			3.7		10.55	192			
Ⅹ	122	125	P	7	4.2	3.5	4.85	7.35	183	166	No.121
	124	120	K		2.9		9.8		149		
	123	130			5.2	4.6	6.95	10.5	183	180	
	125	125			4.0		14.0		177		
	126	130	N		3.4	3.9	12.55	13.0	163	186	
	127	135			4.3		13.4	209			
Ⅺ	132	135	P	7	4.6	4.6	8.35	8.35	166	166	No.133
	134	122	K		4.5	4.5	12.25	12.25	201	201	No.135
	137	135	N		4.1	4.8	14.45	14.15	189	196	
	138	135			5.5		13.85	203			
總平均					P	4.4		7.45		167	
					K	4.4		11.3		191	
					N	4.3		12.95		201	

P: 剔出動物. K: 對照動物. N: 正常動物.

第2圖 血液かたラーゼ數

第3圖 肝かたラーゼ數

次ニ肝ぐりコーゲンヲ組織學的ニ見タ。剔出術後4日, 7日, 20日及ビ29日ノ後ニオイト屠殺シ, 肝組織ヲつえろいぢん包埋, ペサト氏かるみん染色ヲ施シテ見タ。對照トシテハ前實驗ト同様ノモノヲ用イタ。結

第4圖 肝あみらーゼ量

果ハ第2表.

次ニあぞるびんS尿排泄検査ヲ行ツタ. 術後3~22日ノ間ニオイテ尾靜脈ヨリ1%あぞるびんS色素注射液0.15ccヲ注入シ, 時間ヲ追ツテ尿エノ排泄持續時間及ビ尿色調ヲ調ベタ. 結果ハ第3表.

次ニ必須あみの酸ナルとりふとふあん代謝状態ヲ見ル目的ニテ次ノ如キ實驗ヲ行ツタ. とりふとふあんハみのふあーげん會社製D.L.とりふとふあん結晶ヲ用イ, 溜水15ccニツキD.L.とりふとふあん0.1gヲ溶解滅菌シ注射液ヲ調製シタ.

上皮小體剔出後1~8日ノ間ニオイテ體重1kgニツキLとりふとふあん50~100mgノ割合ニナル様ニ皮下注射シ, 時間ヲ追ツテ尿ちあぞ反應ノ推移ヲ見タ. 此ノ際ちあぞ反應ハ濱田氏¹³⁾ノ考案セル濾紙上ニ於テ反應ヲ起サセル方法ヲ用イ, 反應ノ強度ハ濱田氏論文附

第2表 肝臓ぐりこーげん量 (組織學的)

らつて 番 號	體重 (g)	手術 の 種類	4 日	らつて 番 號	體重 (g)	手術 の 種類	7 日	らつて 番 號	體重 (g)	手術 の 種類	20 日	らつて 番 號	體重 (g)	手術 の 種類	29 日
147	150	P	+					167	120	P	++	160	125	P	-
149	160	P	++					169	135	P	+	161	125	P	+
152	180	P	++									165	140	P	++
148	150	K	++	139	140	K	+	166	125	K	++	159	135	K	+
150	135	K	++	141	140	K	++	170	125	K	++	162	125	K	++
				142	115	K	++								
				144	145	K	++								
				146	125	N	++	171	125	N	++				

第3表 あぞるびんS尿排出試験 (排出持續時間)

らつて 番 號	體重 (g)	手術 ノ 種類	手 術 後 ノ 日 數			
			3 日	10 日	15 日	22 日
160	125	P		10.5時間	13.5時間	13時間
161	125	P		10.5 "	11.5 "	8 "
159	135	K		10.5 "	11.5 "	9 "
162	125	K		8.5 "	12 "	11 "
167	120	P	10時間	8.5 "	9 "	
166	125	K	12 "	14 "	13 "	
170	125	K	10 "	10 "	11 "	
171	125	N	12 "	12.5 "	11 "	
172	155	P		11 "	6 "	
173	150	P		11 "	8 "	
174	140	K		11 "	10 "	

圖ニ準ジテ判定シタ. 結果ハ第4表.

考 案

上皮小體剔出術後ノ體重ノ變化ハ第1圖ノ例ニ示ス如ク, 最初2~3日ノ間ハ剔出動物, 對照動物共ニ體重ノ減少ヲ見ルガ, 對照動物ハソレニ續イテ今度ハ體重ガ増加シ, 7日前後ニハ略々術前ノ値ニ復スル. シカシ剔出動物ハソノ後モ漸次減少ノ傾向ヲ辿リ一向ニ體重ノ増加ガ見ラレナイ. 故ニ體重ノ變化ヲ見

ルノミニテモ大體剔出ノ成否ヲ知ルコトガ出來ル.

第4表 とりふとふあん代謝検査(尿ちあぞ反應)
ソノ1

らつて番 號	體 重 (g)	手術ノ 種類	手術後1日・100mg/kg					手術後4日・50mg/kg								手術後6日・50mg/kg				
			注射後ノ時間					注射後ノ時間								注射後ノ時間				
			前	2	3.5	5	9	前	1	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	8	前	1	2.5	3.5	5.5
172	155	P	±	+	++	++	-	-	±	+	+	+	-	-	-	±	+	+	+	±
173	150	P	±	+	++	++	-	-	-	+	±	+	+	+	+	-	+	+	+	+
174	140	K	-	-	++	++	-	-	-	++	++	+	-	-	-	±	++	++	++	+

ソノ2

ら つ て 番 號	體 重 (g)	手 術 ノ 種 類	手 術 後 3 日・80mg/kg						手 術 後 8 日・100mg/kg					
			注 射 後 ノ 時 間						注 射 後 ノ 時 間					
			前	1	2	3	4	5	前	1	2	3	5	6
177	220	P	—		+	++	—		—	—		+	+	—
180	185	P	—		+		+	+	—	—		+	+	—
176	205	K	—	+		—	—	—	—	±	±			—
178	180	K	—	—	+	+	—	—	—	—	±	—	—	—
179	245	K	—	—	—	—		—						

ソノ3

らつて 番號	體 重 (g)	手術ノ 種類	手術後3日・100mg/kg							
			注射後ノ時間							
			前	1	2	3	4	5	6	7
182	205	P	-	-	++	++	+	±	-	
183	225	P	-		+	+		+	-	-
181	210	K	-	-	±	+				-
184	180	K	-	-	±	-				

次ニ血液かたらーゼ數
ニツイテ見ルニ第1表及
ビ第2圖ニ見ラレルヨウ
ニ剔出動物ハ4日ノ組4.8,
7日ノ組4.4, 對照動物ハ
4日ノ組4.5, 7日ノ組4.4
ヲ示シソノ間ニ特ニ差ハ
見ラレナカッタ。

一方肝かたらーゼ數ハ
第1表及ビ第3圖ノ如ク

4日ノ組ニツイテ見ルニ, 剔出動物ハ平均6.8, 對照動物ハ8.55, 正常動物ハ11.3ヲ示シ, 剔出動物ハ對照
ニ比シカナリ減少ノ傾向ヲ示シテ居リ, 組毎ニ見ルト夫々カナリノ變動ガ認メラレルガ常ニ剔出動物ノ方ガ
低下シテイルコトガワカル。組ニヨル變動ハ實驗時ノ季節ソノ他ノ條件ノ差異ガ影響シテイルモノト思ワレ
ル。7日ノ組ニオイトモ剔出動物ハ平均7.45, 對照動物ハ11.3, 正常動物ハ12.95ヲ示シ同様ノコトガイ
エルガ, 對照動物ノ方ハ4日ノ組ヨリモ正常動物ニ近附イテ來テイルノガワカル。

肝あみらーぜ量ニツイテハ第1表及ビ第4圖ノ如ク4日ノ組デハ剔出動物ハ平均157mg/dl, 對照動物ハ
180mg/dl, 正常動物ハ214mg/dlデアリ, 7日ノ組デハ剔出動物167mg/dl, 對照動物191mg/dl, 正常動物
201mg/dlヲ示シ, イヅレモ對照ニ比シ相當ノ低下ガ見ラレル。

以上コレヲ剔出動物肝酵素ノ値ガ對照ヨリ少イコトハ, イヅレモ肝機能ノ低下ヲ思ワセルモノト考エラ
レル。

肝ぐりこーげンノ組織學的變化ニツイテハ1914年頃既ニ Underhill 等³⁾ハ上皮小體ヲ剔出スルト肝ぐりこ

ーげんガ消失スルコトヲ報告シテイル。余ノ實驗ニオイテモ剔出動物ハ對照ニ比シ相當減少シテイルコトガワカルガ完全ニ消失スルマデニハ至ツテイナイ。コレハ急性でたにーノ症狀ノ下ニ斃レタ動物ガ含マレテイナイ爲ト思ワレル。肝ぐりこーげんハ死後速カニ消失シテ行クモノデアル爲、死亡時直ニ肝ヲ取出サネバぐりこーげんノ消失ノ意義ヲ明確ニ出來ヌノデアルガ、主トシテ死亡ハ夜間ニ多イ爲ニ適當ナ例ガ得ラレナカタコトニヨルト思ワレル。

1929年金ヨリハ家兎ヲ用イ膽管瘻ヲ作ツテ膽汁排泄狀況及ビあぞるびんS靜注後ノ膽汁エノ色素排泄状態ヲ觀察シ、上皮小體剔出家兎ニオイテ著名ニ排泄ガ抑制サレルコトヲ見テ、上皮小體ほるもんハ肝機能ニ重大ナ關係アリトシテイル。

余ノ實驗ニオイテハ色素ノ尿排泄持續時間及ビ尿色調ヲ肉眼的ニ見タノデアルガ、人間ニオケル検査ト同様ニ尿色調ハイヅレノ動物ニオイテモ最初ノ1時間目採尿ノ部分ニ最モ濃厚デアリ、ソノ後次第ニ稀薄ニナツテ行ツタ。此ノ場合全尿ヲ採取シテ、注射シタ色素ノ何%ガ腎ヲ介シテ排泄サレルカラ測定スルノガ正確ナ結果ヲ示ス方法デアルト思ワレルガ、全尿ノ採取ガ困難ナ爲ニ尿色調ヲ參考ニトドメ、排泄持續時間ノミヲ觀察シタ。即チ腎ノ色素排泄能力ハ一定シテイル爲、排泄持續時間ガ延長スルコトハ尿中エノ色素排泄ガ多イコトヲ意味シ、ソレハ言イカエレバ肝ノ色素排泄機能ニ低下ガアルコトヲ意味スルノデアル。第3表ニ見ル如ク剔出後イヅレノ日ニオケル試験ニオイテモ剔出動物ト對照動物トノ間ニ特ニ差ハ見ラレナカッタ。

とりふとふあんハ必須あみの酸ノ一ツデアリ、古武氏等¹⁴⁾ノ業績ニヨレバ種々ノ疾病殊ニ肝ニオイテ大量ノ蛋白ガ一時ニ崩壊スルヨウナ場合ニハ多量ノうろくろもーげんガ尿中ニ出テエーるりつひノちあぞ反應ヲ呈スルト言ワレテイル。とりふとふあんハ正常ナ代謝過程ニオイテハ肝ニオイテ先ヅきぬれにんニ變化シ、次デあんにとらにーる酸或ハきぬれん酸ニ變化スル。所ガ肝機能ノ低下ガアリ、とりふとふあんノ中間代謝障礙ガ存スルときぬれにんカラ所謂蛋白酸ト稱セラルルうろくろもーげんヲ生ジうろくろもーむトナリ尿ちあぞ反應ヲ呈スル。コレヲ過程ハスベテ肝ニオイテノミ進行スルモノデ肝機能ノ状態ヲソノママ反映スルト思ワレル。

余ノ實驗ニオイテハ第4表ニ見ル如ク、イヅレノ動物ニオイテモ注射後3時間目前後採尿ノ部分ニちあぞ反應ガ最モ強く見ラレル。第1ノ組ノらつてNo.174ノミハ對照動物デアリ乍ラ剔出動物ヨリ強イちあぞ反應ヲ示シタガ、ソレ以外ハスベテ剔出動物ノ方ガヨリ強度ノちあぞ反應ヲ示シ肝機能ニ低下ガアルコトヲ示シタ。

結 論

上皮小體剔出ノ肝機能ニ及ボス影響ヲ見ル目的ヲ以テらつてニ剔出手術ヲ施シ次ノ如キ結果ヲ得タ。

- 1) 肝酵素カタラーゼ、あみラーゼハ對照ニ比シカナリ減少スルヲ見タ。
- 2) 組織學的ニ見タ肝ぐりこーげんハ對照ニ比シ減少シテイタガ、完全ニ消失スルニハ至ツテイナカッタ。
- 3) あぞるびんS尿排泄試験デハ排泄持續時間ハ剔出、對照兩動物間ニ特ニ差ハ見ラレナカッタ。
- 4) とりふとふあん代謝検査デハ對照ニ比シ尿ちあぞ反應ガ強度ニ陽性ニナッタ。

以上上皮小體剔出ニヨリ肝機能ハ低下ノ状態ニアルト考エラレル。

文 献

- 1) Ellsworth: J. Clin. Investig. 11:1011, 1932. Tweedy: Am. J. Physiol. 115:514, 1936. Neufeld a. Collip: Endocrinology 30:135, 1942.
- 2) Collip, Pugsley, Selye a. Thomson: Brit. J. Exp. Path. 15:335, 1934. Stewart a. Bowen: Endocrinology 48:568, 1951.
- 3) Underhill: J. of biol. chem. 18:87, 1914.
- 4) 金: 日本病理學會誌, 第18年(昭和3年12月).
- 5) Greenberg: Proc. Soc. Exper. Biol. u. Med. 34:622, 1936.
- 6) Nitzescu: Compt. rend. Soc. biol. 110:1141, 1932.
- 7) Lederer: Am. J. Physiol. 118:52, 1937.
- 8) 瀨田, 小原: 生化學, 21卷, 4號, P173, 22卷, 4~5號, P272, 23卷, 2~3號, P192, 生體ノ化學, 3卷, 5號.
- 9) Thomson a. Collip: Physiol. Rev. 12:309, 1932.
- 10) Selye: Arch. Path. 34:625, 1942.
- 11) 井上, 越智, 白井: 東京醫學會雜誌, 39:1304, 大14.
- 12) 吉尾: 京都府立醫大雜誌, 42:4~6號, P51(昭21.9).
- 13) 濱田: 大阪醫學會雜誌, 35:2211, 1936.
- 14) 古武: 醫學總覽, 1, 179, 昭19金原.

Studies on the influence of parathyroidectomy on the liver function

By

Tomoyuki HORIKOSHI

1st Internal Medical Clinic, Faculty of Medicine, Tokyo University

In order to elucidate the relationship between parathyroid gland and the liver, I performed parathyroidectomy on rats and observed effects of parathyroidectomy in them. After studying changes of the enzymatic activities of the liver (catalase and amylase), the storage of glycogen and some excretory and metabolic function of the liver, the following results were obtained.

- 1) The enzymatic activities of the liver such as catalase and amylase, decreased after the parathyroidectomy.
- 2) Hepatic glycogen, that is histologically observed, diminished but not completely depleted.
- 3) Urinary excretion of azorubin-S in parathyroidectomized rats were normal.
- 4) It was supposed that metabolism of tryptophan was also obstructed to some extent judging from diazo-reaction of urine.

On the whole, I noticed that by the parathyroidectomy, the function of the liver of the animal fairly decreased.

In fluences of Robal on Male Sexual Grands.

By

Shigeharu YOSHIDA and Shizuo NAKASHITA

From the Dept. of Dermatology, Tottori, Univ, School of Medicine. (Director: Prof. S. Yoshida)

By

Shin MATSUDA

From the Dept. of Pathology, Tottori, Univ., School of Medicine, (Director: Prof. Y. Tokumitsu)

When we have made repeating injections of Robal of Per kg 2000 or 5000 units (aqueous female hormones) in the ripe male or the castrated rabbits for fourty days, the greatest in fluences appear at the Prostate gland, and especially at the testicles, Cooper's glands are under the least in fluences of these.

We know, subjective and objective symptoms are remarkably reduced by injecting Robal in patients of the prostate hypertrophy and especially in some of them, whose prostate glands in crease in hardness.