卵巢黃體ノ窒素新陳代謝ニ及ボス影響ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 青 木 主 計 述

目 次

緒 言	第一章 實驗動物及ビ方策	第三章 總括及ビ結論
第二章 實驗成績	文 献	

緒 言

卵巢黃體ノ機能ノ研索ハ種々ナル方面ヨリ既ニ多數學者ニヨリテ行ハレタル所ナレドモ、之ガ窒素代謝ニ對シ如何ナル影響ヲ及ボスモノナリヤノ點ニ關シテハ未ダ其報告寥寥タルモノ、如ク、余ノ涉獵セル範圍ニ於テハ僅カニ Sack⁽²⁾ (1912) Orita (1925) ガ大ニ就キテ尿中總窒素ノ減少ト窒素ノ體內滯留ノ増加ヲ來スヲ報ズルト、Korenchevsky (1925) ガ犬及ビ家兎ニ於テ卵巢黃體ガ窒素代謝ヲ低下スル作用ヲ有スルコトヲ實驗セル三業績ヲ得タルニスギズ。而モ上記諸氏ハ唯總窒素ノ消長ヲ云々スルニ止リ、尿中含窒素物質ノ消長ヲ檢セズ。即チ尿中諸含窒素物質ノ分配ニ及ボス黃體ノ影響ニ關シテハ未ダ何人モ之ニ指ヲ染メザル所ナルガ如キヲ以テ、余ハ辻教授指導ノ下ニ、黃體ノ尿總窒素並ニ

卵巢黃體ノ窒素新陳代謝ニ及ボス影響ニ就テ……(青木)

尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素ノ排泄並ニ分配率ニ及ボス影響ヲ檢シ、今ヤ一定ノ成績ヲ得タルヲ以テ茲ニ報告セントスルモノナリ。

第一章 實驗動物及方策

實驗動物トシテハスベテ成熟ヲ遂ゲ既ニ經産セル牝犬ノ健康ト認メタルモノノミヲ用ヒ、一定ノ新陳代謝檻ニ收容シ一定食餌ノ許ニ之ヲ飼養シ、毎朝一定時ニ採尿シ(若シ檻中ニテ放尿セル時ハ豫メ之ヲ集ムルタメニトルオルヲ盛リタル受器ニ集マルヤウニシ)廿四時間尿ヲ集メ、尿總窒素、尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素ヲ夫々、キエルタール氏法、プリムマースケルトン氏法、フオリン氏法、フオリン氏比色法ヲ以テ測定シ總窒素ノ排泄略一定シタル時、ルテオグランドル(ロツシユ)其ノ一坵ハ新鮮臟器〇・五瓦ニ相當ス)ヲ日々皮下ニ注射シ、依ツテ來ル所ノ前記諸尿成分ノ變化ヲ觀察シ更ニ注射中止後ノ狀態ヲモ併セ檢索セリ。

第二章 實驗成績

今表示セル所ヲ綜合スルニ、

一、尿總窒素、第一例ニアリテハ注射前平均三・五〇五瓦ナリシモノ、試驗期ニハ三・一五八瓦トナリ約九・九%ノ減少ヲ來シ體重一疋ニ就キテノ窒素出納ヲ見ルニ前期平均(十・一〇四瓦ナリシモノ、試驗期ニハ十・一〇・一三六瓦トナリ體內沈着ノ増加アルヲ窺フベク、第二例ニテハ前期平均四・一一一瓦ナリシモノ、試驗期ニハ殊ニ注射開始後二日間ニ於テ其排泄減少著シク平均三・九四四瓦トナリ約四・〇七%ノ減少ヲ來シ、體重一疋ニツキテノ窒素出納ヲ見ルニ

第一例

月日	體重 (kg)	原量 (g)	比重 (15°C)	攝取 窒素 (g)	尿總 窒素 (g)	尿素窒素		アミノア 窒素		クレアチ ニン窒素		クレアチン 窒素	
						g	%	g	%	g	%	g	%
前 期	VII.16	10.45	375	1018	4.597	3.626	2.807	77.41	0.203	5.59	0.139	3.83	0.008
	17	10.50	325	1018	"	3.304	2.696	81.59	0.174	5.27	0.109	3.29	0.006
	18	10.60	330	1019	"	3.584	3.002	83.78	0.190	5.30	0.129	3.59	0.014
平均	10.525	343	1018	"	3.505	2.835	80.93	0.189	5.39	0.126	3.57	0.009	0.27
試 驗 期	19	10.60	315	1017	"	2.996	2.401	80.14	0.193	6.44	0.136	4.54	0.003
	20	10.60	250	1023	"	3.080	2.580	83.77	0.171	5.55	0.136	4.42	0.007
	21	10.70	200	1028	"	3.290	2.700	82.07	0.184	5.59	0.144	4.38	0.005
	22	10.60	270	1036	"	2.986	2.337	78.26	0.185	6.19	0.130	4.25	0.010
	23	10.60	350	1018	"	3.439	2.819	81.97	0.186	5.41	0.136	3.95	0.003
平均	10.62	277	1024	"	3.158	2.567	81.24	0.184	5.83	0.136	4.33	0.006	0.18
後 期	24	10.55	360	1016	"	3.427	2.770	80.83	0.178	5.19	0.144	4.20	0.006
	25	10.55	260	1021	"	3.332	2.759	82.80	0.160	4.80	0.132	3.96	0.003
	26	10.55	160	1034	"	3.766	3.093	82.13	0.155	4.12	0.147	3.90	0.011
	27	10.55	180	1030	"	3.304	2.596	78.57	0.162	4.93	0.147	4.45	0.016
	28	10.55	160	1031	"	3.584	2.885	80.49	0.174	4.83	0.142	3.96	0.010
平均	10.55	226	1026	"	3.483	2.821	80.96	0.166	4.77	0.142	4.09	0.009	0.26

食餌：白米190g、牛肉75g、醬油10g、蛋白質28.73g、脂肪4.80g、含水炭素174.78g、
總カロリー879.031、窒素量4.597g、

註：試験期=ヘルテオグラントール(ロツシュ)2錠ヲ3日間、3錠ヲ2日間皮下注射ス。

卵黃黃體ノ窒素新陳代謝ニ及ボク影響ニ就テ……(青木)

第 二 例

月日	體重 (kg)	尿量 (g)	比重 (g)	攝取 窒素 (g)	總尿 窒素 (g)	尿素窒素		アミノア 素		クレチ ニン窒素		クレチヂ ン窒素	
						g	%	g	%	g	%	g	%
前 期	IX. 4	11.10	400	1022	5.091	4.060	3.061	75.29	0.229	5.62	0.094	2.32	0.047
	5	10.90	450	1030	"	4.256	3.318	77.96	0.238	5.59	0.086	2.02	0.041
	6	11.00	450	1028	"	4.018	3.035	75.53	0.241	5.99	0.094	2.34	0.050
	7	11.00	450	1024	"	4.032	3.041	75.42	0.235	5.83	0.095	2.30	0.055
	8	11.00	500	1022	"	4.188	3.335	79.63	0.235	5.61	0.095	2.27	0.045
平均	11.00	450	1025	"	4.111	3.158	76.82	0.236	5.74	0.093	2.26	0.048	1.17
試 驗 期	9	11.15	440	1023	"	3.836	3.024	78.83	0.182	4.74	0.086	2.24	0.025
	10	11.00	470	1025	"	3.864	3.058	79.14	0.176	4.55	0.093	2.41	0.036
	11	11.15	475	1028	"	4.060	3.203	78.89	0.185	4.56	0.093	2.29	0.046
	12	11.10	535	1024	"	4.015	3.145	78.33	0.165	4.19	0.098	2.44	0.041
平均	11.10	480	1025	"	3.944	3.110	78.85	0.177	4.48	0.093	2.36	0.037	0.94
後 期	13	11.10	420	1026	"	4.108	3.212	78.19	0.216	5.26	0.090	2.19	0.044
	14	11.10	360	1030	"	3.976	3.102	78.02	0.188	4.73	0.094	2.36	0.053
	15	11.00	470	1022	"	4.046	3.186	78.74	0.202	4.99	0.093	2.22	0.043
	16	11.00	480	1022	"	4.046	3.135	77.48	0.204	5.04	0.095	2.35	0.049
平均	11.05	432	1025	"	4.044	3.159	78.12	0.203	5.02	0.093	2.29	0.047	1.16

食餌：白米220 g, 牛肉80 g, 醬油10 g, 蛋白質31.82 g, 脂肪5.18 g, 含水炭素158.68 g,
 總カロリー 829.183, 窒素量 5.091 g.

註：試験期ニハルチオグランドール（ロツシユ）2錠宛テ皮下注射ス。

第 三 例

月 日	體重 (距)	尿量 (距)	比重 (15°C)	攝取 窒素 (瓦)	尿總 窒素 (瓦)	尿素窒素		アミノア 窒素		クレチ ニン窒素		クレチン 窒素	
						瓦	%	瓦	%	瓦	%	瓦	%
前 期	IX. 5	12.00	440	1016	5.426	4.569	3.649	79.86	0.285	6.22	0.099	2.17	0.034
	6	12.10	400	1015	"	4.586	3.585	78.17	0.279	6.08	0.101	2.20	0.021
	7	12.10	520	1013	"	4.586	3.666	79.94	0.252	5.49	0.099	2.16	0.032
	8	12.00	480	1014	"	4.558	3.518	77.27	0.279	6.13	0.100	2.19	0.029
平均	12.05	463	1015	"	4.574	3.605	78.82	0.274	5.99	0.0998	2.18	0.029	0.63
試 驗 期	9	12.00	430	1014	"	4.494	3.637	80.93	0.213	4.74	0.103	2.29	0.020
	10	12.00	570	1009	"	4.351	3.489	80.19	0.215	4.94	0.112	2.57	0.017
	11	12.10	450	1013	"	4.466	3.595	80.49	0.213	4.79	0.097	2.17	0.027
	12	12.10	485	1015	"	4.438	3.601	81.57	0.221	4.98	0.110	2.48	0.027
平均	12.05	484	1013	"	4.437	3.581	80.71	0.216	4.87	0.106	2.29	0.023	0.52
後 期	13	12.10	490	1015	"	4.424	3.605	81.49	0.224	5.06	0.107	2.42	0.018
	14	12.00	385	1022	"	4.438	3.562	80.26	0.218	4.93	0.101	2.28	0.028
	15	12.00	490	1014	"	4.410	3.475	78.79	0.221	5.01	0.094	2.13	0.023
	16	12.00	460	1017	"	4.522	3.618	80.08	0.246	5.44	0.103	2.28	0.029
平均	12.02	456	1017	"	4.449	3.565	80.13	0.227	5.10	0.101	2.27	0.025	0.56

食評： 白米 220 瓦, 牛肉 90 瓦, 醬油 10 瓦： 蛋白 33.91 瓦, 脂肪 5.43 瓦, 含水炭素 158.68 瓦,
總カロリー 839.118, 窒素量 5.426 瓦.

註： 試験期ニハルチオグラントール（ロツジュ） 2.5 距宛チ皮下注射ス.

卵巢黃體ノ窒素新陳代謝ニ及ボス影響ニ就テ……（青木）

窒素出納表

例	試験 日數	平均 日數	體重 (庇)	攝取 窒素 (瓦)	尿 總窒素 (瓦)	體重一庇ニツキテ		
						攝取 窒素	尿總 窒素	出納
I	前、試、後	3	105.25	4.597	3.505	0.437	0.333	+0.104
		5	10.620	//	3.158	0.433	0.297	+0.136
		5	10.550	//	3.483	0.436	0.330	+0.106
II	前、試、後	5	11.000	5.091	4.111	0.463	0.374	+0.089
		4	11.100	//	3.944	0.459	0.355	+0.104
		4	11.050	//	4.044	0.461	0.366	+0.095
III	前、試、後	4	12.050	5.426	4.574	0.450	0.379	+0.071
		4	12.050	//	4.437	0.450	0.368	+0.082
		4	12.020	//	4.449	0.451	0.370	+0.081

平均前期(+0.089)八九瓦、試験期(+0.104)四瓦ヲ示シ試験期ニ於ケル體内沈着ノ度ノ増加アルヲ知ルベク、第三例ニ於テハ注射前平均四・五七四瓦ナリシモノ、試験期ニハ平均四・四三七瓦トナリ約三%ノ減少ヲ來シ、體重一庇ノ窒素出納ヲ見ルニ、前期平均(+0.071)七一瓦ナリシモノ試験期ニハ平均(+0.082)八二瓦トナリ僅カナレドモ値ノ大ナルヲ見ル。而シテ三例共ニ注射中止後ニハ前期ノ値ニ歸ラントスル傾向アルガ如キモ、而モ何レモ後期ノ平均値ハ前期ノ夫レヨリモ小ナリ。

要之尿總窒素ハ黃體注射ニヨリテ其排泄減少ヲ來シ、窒素ノ體内沈着ノ度増加スルヲ知ル即チ余ノ成績ハ⁽³⁾Backガ犬ヲ用ヒテ實驗シ黃體投與ガ牝犬ニハ何等影響ヲ與ヘザルモ、牝犬ニハ其窒素沈着ノ増加ヲ來スヲ見タルガ如キ、⁽²⁾H.E.G.ガ牝犬ニ於テ實驗シ黃體ガ窒素排泄ヲ減少セシメ、⁽¹⁾Blantツヲ増加セシムルヲ報ズルガ如キ、Korenchevsky

ガ黃體ニハ生體ノ窒素代謝ヲ低下スル作用アリト言ヘルガ如キ報告ト一致セリト言フベシ。

二、尿素窒素。第一例ニ於テハ前期平均二・八三五瓦ナリシモノ、試験期ニハ二・五六七瓦トナリ約九・五%ノ減少ヲ來スモ其ノ總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均八〇・九三%ナリシモノ試験期ニハ八一・二四%トナリ僅カナレドモ増加ノ傾向ヲ示シ、第二例ニテハ前期平均三・一五八瓦ノ排泄アリシモノ試験期ニハ三・一一〇瓦トナリ、約一%ノ減少ニシ

テ殆ンド變化ナシトイフベク其ノ總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均七六・八二%ナリシモノ、試験期ニハ七八・八五%ニ増加シ、第三例ニ於テハ前期平均三・六〇五瓦ノ排泄アリシモノ試験期ニハ三・五八一瓦トナリ、約一%内外ノ減少ニ止リ殆ンド變化ナシト見ルベク、其總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均七八・八二%、試験期平均八〇・七一%ニシテ僅カニ増加ヲ示セリ。

要之、尿素窒素ハ僅カニ絶對量ニ於テ減少ノ傾向アルガ如キモ著シカラズ其總窒素ニ對スル百分率ハ寧ロ増大スルモノナルヲ知ル。

三、**あむもにあ窒素**。第一例ニアリテハ前期平均〇・一八九瓦ナリシモノ、試験期ニハ〇・一八四瓦トナリ殆ンド變化ナク其總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均五・三九%、試験期平均五・八三%ニシテ試験期ニ於テ僅カニ増加ノ傾向ヲ示スモ第二例ニテハ前期平均〇・二三六瓦ナリシモノ、試験期ニハ〇・一七七瓦トナリ約二五%ノ減少ヲ來シ、其ノ總窒素ニ對スル百分率モ前期平均五・七四%ナリシモノ、試験期ニハ四・四八%トナリ減少ノ傾向アリ、第三例ニテハ前期平均〇・二七四瓦ナリシモノ、試験期ニハ〇・二一六瓦トナリ、約二一%ノ減少ヲ來シ、其ノ總窒素ニ對スル百分率モ前期平均五・九九%ナリシモノ、試験期ニハ四・八七%トナリ減少ヲ示セリ。

要之**アムモニア**窒素ノ排泄ハ一般ニ其ノ絶對量及總窒素ニ對スル百分率ノ減少ヲ來スモノナルヲ知ル。

四、**くれあちにん窒素**。第一例ニ於テハ前期平均〇・一二六瓦ナリシモノ、試験期ニハ平均〇・一三六瓦トナリ、約八%ノ増加ヲ來シ、總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均三・五七%ナリシモノ、試験期ニハ四・三三%トナリ増加ヲ來セリ。第二例ニ於テハ前期平均〇・〇九三瓦、試験期平均〇・〇九三瓦ニシテ變化ナク總窒素ニ對スル百分率ハ二・二六%

ナリシモノ試験期ニハ平均二・三六%トナレリ。第三例ニ於テハ前期平均〇・〇九九八瓦ナリシモノ、試験期ニハ平均〇・一〇六瓦トナリ殆ンド變化ナク、總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均二・一八%ナリシモノ試験期ニハ二・三九%トナリ僅カニ増加ノ傾向ヲ示セリ。

要之、クレアチニン窒素ハ絶對量ニ於テモ、百分率ニ於テモ何レカトイヘバ増加スルノ傾向アリ。

五、くれあちん窒素。第一例ニテハ前期平均〇・〇〇九瓦ナリシモノ試験期ニハ平均〇・〇〇六瓦トナリ、總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均〇・二七%ナリシモノ〇・一八%トナリ何レモ減少ヲ來セリ、第二例ニテハ前期平均〇・〇四八瓦ノ排泄アリシモノ、試験期ニハ〇・〇三七瓦トナリ、總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均一・二七%ナリシモノ、〇・九四%トナリ何レモ減少ヲ來セリ、第三例ニアリテハ前期平均〇・〇二九瓦ナリシモノ、試験期ニハ〇・〇二三瓦トナリ、總窒素ニ對スル百分率ハ前期平均〇・六三%ナリシモノ、試験期ニハ平均〇・五二%トナリ減少ノ傾向ヲ來セリ。要之、クレアチン窒素ハ其絶對値、百分率何レモ僅カナレドモ減少ノ傾向ヲ示スヲ知ル。

第三章 總括及ビ結論

以上余ハ健康ナル成熟牝犬ヲ用ヒテ、黃體製劑(ルテオグランドール)ヲ注射シ、其ノ尿中總窒素ノ排泄量並ニ尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素ノ絶對量及ビ總窒素ニ對スル百分率ニ及ボス影響ヲ檢シ、得タル成績ニ就キテ叙述セリ、今之ヲ左ニ綜括シ以テ結論ニ代エン。

一、黃體ハ尿總窒素ノ排泄ヲ減少セシメ、窒素ノ體內瀦留ヲ増加セシム。

二、黄體ハ尿中尿素窒素、クレアチニン窒素ノ總窒素ニ對スル百分率ヲ増加セシム而シテアムモニア窒素、クレアチン窒素ニ對シテハ絶對排泄量並ニ百分率共ニ之ヲ減少セシム。

脱稿ニ際シ、本命題ノ研究ヲ命ゼラレ、終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ賜ハリタル恩師辻教授ニ謝意ヲ表ス。

(昭和二年十一月十二日脱稿)

参考文献

- 1) v. Korochevsky: The sexualglands and metabolism: III. The influence of injections of testicular or ovarian emulsion upon the nitrogen and gaseous metabolism of dogs and rabbits. Brit. Journ. of exp. Path. Vol. 6, No. 4, S. 138-172. 1925. zit. n. Berichte über die ges. physiol. Bd. 33. S. 618. 1926.
- 2) Inao, Orita; Experimentelle Studien über den Einfluss der Ovarien auf den Stickstoffwechsel. Arch. f. gynæk. Bd. 123. S. 133. 1925.
- 3) Waldemar Th. Sack; Über den Einfluss von corpus luteum und Hypophyse (lobus anterior) auf den Stoffwechsel. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 70. S. 293-301. 1912.

zwischen Chinin und der Schilddrüse und Hypophysis herrscht noch manche Unklarheit. Der Verfasser untersuchte die histologischen Veränderungen der Schilddrüsen und Hypophyse von Ratten nach Chinineinspritzung. Die Schilddrüsen zeigten die Bilder des Kolloidstrumas. Der Verfasser konnte nicht entscheiden, ob diese Veränderungen durch Chinin direkt oder indirekt hervorgerufen wurden. An den Vorderlappen der Hypophyse fanden sich Vermehrung, Vergrößerung der eosinophilen Zellen und Hyperämie. Nach Meinung des Verfassers handelt es sich bei diesen Veränderungen der Hypophyse wahrscheinlich um kompensatorische Vorgänge. (Autoreferat.)

THE INFLUENCE OF CORPUS LUTEUM ON THE NITROGEN METABOLISM.

By

K. Aoki.

(From the First Medical Clinic of the Imperial University of Kyoto.

Director: Professor K. Tsuji.)

The three healthy adult female dogs were employed for this experiment. The animals were fed upon a fixed diet composed of rice, lean beef and soy. The urine was collected each day and diluted to a constant volume. The total nitrogen, urea, ammonia, creatinin and creatin were estimated by the usual methods. After the animals obtained the nitrogenous equilibrium, 2—3 c.c. of luteoglandol (Roche) was daily administrated subcutaneously during 4—5 days. The results of the experiment were summerized as follows.

The corpus luteum causes the diminution in the excretion of total nitrogen, but the increase in the output of urea- and creatinin-nitrogen. The output of ammonia- and creatin-nitrogen decreases in the percentage to total nitrogen. (Author's abstract.)