Experimental Studies on Adreno-cortical Proliferation

By

Shirô HIGASHIMORI

(From the Department of Pathology, Faculty of Medicine, Kyoto University; Prof. Shigeki Mori)

There are two conflicting concepts about the cells of the adrenal cortex. One is the escalator or cell-migration theory formulated by Gottschau. According to this theory, the growth of the cortex takes place in the outer part of the cortex and the cells originate from the capsular fibroblasts and gradually migrate inwards towards the medulla until in the zona reticularis they degenerate and are removed. The second is the so-called zonal theory advocated by Deane et al. Deane and Greep firmly believe that the zona glomerulosa and the zona fasciculata of the adrenal cortex are different in structure, origin and function.

In this paper, the author discussed the nature of the cortical cells especially the proliferation of the cortical cells.

Chapter 1. Regenerative process of rat's adreno-cortical cells after adrenal enucleation.

1). After adrenal enucleation, rats lived for a long period without any cortical deficiency syndrome, and the body weight was greatly increased. Even a few cortical cells regenerated from the capsular regions, could secrete enough cortical hormone to maintain life.

2). By means of colchicine, the author observed the mitotic activity in the capsular regions soon after the operation. Later, the mitotic activity were somewhat decreased in the capsular regions, but increased in all the other regenerated cortical cells.

This experiment of adrenal enucleation, suggests that cortical cells apparently proliferate from capsular cells.

- 3). The author concludes that there are 4 types of cortical regeneration after adrenal enucleation :
1. Mitotic division in the capsule.
 2. Metamorphosis from capsular cells.
 3. Mitotic division in the cortex.
 4. Metamorphosis from blast cells in the cortex.

Chapter 2. The problem of adreno-cortical autonomy.

After hypophysectomy, the zona fasciculata and the zona reticularis were atrophied in rats, whereas the zona glomerulosa did not show any change. It is generally accepted that glucocorticoids are secreted by the zona fasciculata by stimulated the anterior pituitary adrenocorticotrophic hormone, and mineralocorticoids are secreted by the zona glomerulosa which is not under hypophyseal control.

In the author's experiment of adrenal enucleation in rats, the cells of the zona glomerulosa showed autonomous proliferation even in the hypophysectomized rat. The histochemical findings in these regenerated cells, suggest to the author, autonomous secretory activity in the zona glomerulosa also, the cells of the zona fasciculata however, did showed no proliferation in hypophysectomized rats.

Chapter 3. The influence of various hormones on adreno-cortical proliferation.

1). After adrenal enucleation, regeneration of adreno-cortical cells was stimulated by ACTH injection, or other hormones provoking anterior pituitary ACTH secretion (estrogen). These results show

that anterior pituitary adrenocorticotrophic hormone controls the proliferation of cortical cells.

2). But in addition to ACTH, growth hormone and testoids stimulate adrenal regeneration markedly. So ACTH is not the only tropic hormone for the adrenal cortex.

3). Cortisone depressed the regeneration of the adrenal cortex, and this effect acts through anterior pituitary depression. DOCA did not depressed adrenal regeneration, because of its milder pituitary depressive action as compared with cortisone.

4). In female rats, the regeneration of cortical cells is somewhat depressed by gonadectomy.

5). This experiment shows that all cortical cells seem to proliferate from the same capsular origin. In the early stage of regeneration, the zonal difference was indistinct. But in later stages, regenerated cortical cells show different zonal functions.

Chapter 4. Hormonal influence upon regeneration of the zona fasciculata.

1). The cells of the zona fasciculata could regenerate when the anterior pituitary was present. And ACTH seemed the only factor in the regeneration of the zona fasciculata. The cells of the zona glomerulosa seem to be transformed into the cells of the zona fasciculata under ACTH influence and acquire the ability to secrete glucocorticoids.

2). Growth hormone, testoids and chorionic gonadotrophin did not transform the cells of the zona glomerulosa into cells of the zona fasciculata in this experiment.

副腎皮質増殖に関する実験的研究

京都大学医学部病理学教室（指導 森 茂樹教授）

研 究 生 東 森 四 郎

本研究要旨は、第5回及び第6回日本病理学会西部地方会、第43回日本病理学会総会、第27回日本内分泌学会に於て発表した。尚、内分泌のつどい第7集森、安藤一副腎皮質の機能的な形態学—に本論文の一部紹介発表あり。

目 次

はしがき	第1章 緒 言
第1編 ラット副腎 Enucleation 後の副腎 皮質細胞の再生過程について	第2章 実験材料及び実験方法
第1章 緒 言	第3章 実験結果
第2章 実験材料及び実験方法	第4章 考 案
第3章 実験結果	第5章 要 約
第4章 考 案	第4編 束状帯細胞再生増殖に及ぼす2～3 ホルモンの作用について
第5章 要 約	第1章 緒 言
第2編 副腎皮質の自律性	第2章 実験材料及び実験方法
第1章 緒 言	第3章 実験結果
第2章 実験材料及び実験方法	第4章 考 案
第3章 実験結果	第5章 要 約
第4章 考 案	第5編 全編の総括
第5章 要 約	引用文献
第3編 副腎皮質細胞増殖に及ぼす各種ホル モンの影響	写 真

は し が き

1855年 Thomas Addison が Addison 氏病なる疾患が副腎特に皮質と密接な関係のあることを唱えて以来、副腎が次第に注目せられるようになった。1856年 Brown-Séquard が副腎剔出に関する実験的研究を初めて行い、全副腎を剔出すると間もなく動物は死亡するが、副腎を移植することにより、一定期間缺落症状の発生を阻止し得ることを報告している。しかしこの追試成績は極めてまちまちであり、両側副腎が完全に壊された場合にも、アヂソン氏病の徴候が発現しない場合がしばしば認められた。この理由は、傍副腎が代償性増殖を惹起し、または残存皮質の小組織が機能を代償するためと考えられる。その後 Adrenalin が高峰、Aldrich (1901) により分離され、Adrenalin の構造、合成、生理学的機序、薬理学的作用の面に研究が向けられてきた。そして副腎剔出後欠落症状並びにアヂソン氏病症候群の原因は Adrenalin 缺乏によるものとみなされてきた。

その後、副腎皮質が生命保持に絶対必要であるが、髄質は然らざる点が判明するに及び、再び皮質が重視せられ皮質エキスの研究が行われる様になった。Rogoff and Steward, Hartmann 一派、Swingle and Pfiffner 等により、副腎剔出動物の生命延長に有効な皮質エキスが抽出され、次で Grollmann and Firor, Kendall, Winterstein 等は純結晶性物質を得るに到り、本物質がステロイドホルモンであることが分り、皮質より出さ

れるステロイドは一般にコルチコイドまたはコルチコステロイドと呼ばれるに到つた。

副腎皮質ホルモンは生理学的機序の上から、糖質コルチコイド (Glucocorticoids) と鉱質コルチコイド (Mineralocorticoids) 及び性ホルモン作用を有するコルチコイドとに大別することが出来る。かかる作用の異つた副腎皮質ホルモンは、副腎皮質の如何なる細胞より、また如何なる機構の本に分泌されるか、その全貌は今日未だ明かでなく、副腎皮質ホルモン分泌機序の問題に関しては、従来数多くの議論がある。Selye (1946a¹⁸⁸), 1946b¹⁹³), 1949¹⁹⁹) は多ステロイド説 (Multiteroid concept) を述べ、副腎皮質からは多種類のホルモン— Glucocorticoid, Mineralocorticoid, Lipocorticoid, Testocorticoid 等が分泌され、生体の要求に応ずるものとしている。これに対して Sayers (1948¹⁷⁹), 1950¹⁸⁰), Feldman (1951)⁷⁴) は単一説 (Unitarian concept) を主張し、副腎皮質からは唯一種類のホルモンのみが分泌され生体側の状態に応じて種々異つたホルモン作用を発揮するものとしている。

一般に副腎皮質機能は、他の内分泌腺機能より下垂体に高度に支配されている (Smith 1926, Smith 1930)²⁰⁰。そして副腎皮質は下垂体—副腎皮質系として、生体の防禦機序に重大な役割を有することが知られて来たが、下垂体と副腎皮質機能との相互関係についても前述の副腎皮質分泌機序と絡んで、多くの議論が存在する。Li, Evans and Simpson (1943)¹⁴⁰) は純粹の Adrenocorticotrophic Hormone (以下 ACTH と略す) を分離したが、Sayers (1948)¹⁷⁹) はかかる ACTH が副腎皮質機能すべてを支配するという、下垂体副腎皮質系一元論を述べている。即ち、下垂体前葉からは副腎皮質を支配する唯一種類の向副腎皮質刺激ホルモンが分泌され、これに対して副腎皮質からは唯一種類のコルチコイドが分泌されるというのである。一方 Albright 一派 (Reifenstein, Forbes, Albright, Donaldson and Corroll (1945)¹⁷²), Albright (1947)⁷⁴), Talbot, Albright, Saltzman, Zygmuntowicz and Wixon (1947)²⁰⁰), Albright and Reifenstein (1948)⁵⁰) は N 及び S ホルモン説 (N and S Hormone concept) を述べ、副腎皮質は C の 11 及び 17 の位置に酸素を有する Cortisone 様作用を発揮する S-hormone と、Testoid 様作用を有する N-hormone を分泌し、何れも下垂体の支配の下で分泌されるものとしている。即ち ACTH は S-hormone の分泌を、LH (Luteinizing hormone) は N-hormone の分泌を支配するものと考えている。

他方、副腎皮質を組織学的観点よりみると、増殖と關聯して種々の問題が存在する。哺乳動物の副腎皮質は一般に細胞の配列、血管、結合織の關係から Arnold (1866)¹¹) によつて三層 (球状帯 Zona glomerulosa, 束状帯 Zona fasciculata, 網状帯 Zona reticularis) に分類されているが、これら各層が如何なる機能的意義を持つているか興味ある問題として議論されている。

従来、副腎皮質細胞は副腎皮質の周辺部から増殖して、次第に内方に移動し内層部の細胞とおき代り、網状帯で変性死滅するものと考えられている。この説は所謂 escalator または cell-migration theory と称せられるもので、己に 1883 年 Gottschau⁸³) 以来かかる説が提案されている。それ故網状帯は Zona consumptiva (老廃層) とも呼ばれてきた。この考えでは副腎皮質外層部ほど比較的幼若な細胞で、内方ほど老廃した細胞とみなされるものである。また Bennett (1940)²²) は副腎皮質を、細胞の life cycle または secretion phase の上から分類し、球状帯を presecretory zone、束状帯外層を secretory zone、束状帯内層を post-secretory zone、最内層を zone of senescence と呼び、球状帯は皮質細胞の準備層であり、眞の分泌層は束状帯であるとしている。これらの人々は副腎皮質三層は secretion phase の相異を示すものとしての意義を認めているが、副腎皮質三層は種々環境下に於て、常に必ずしも平行協同的な変化を示すものとは限らず、時には全く異つた反応態度を示す場合がしばしば認められている。特に Bennett (1940)²²) 以来、諸種の組織化学的検索が副腎に応用されてきて、各層の機能異質性の問題が取り上げられる様になった。そして種々の染色所見から球状帯の変化は、他の皮質層とは独立的な変化を示すものであると認められて来た (Yoffey and Baxter 1949)²³³。また Swann (1949)²⁰⁴) は皮質の外層部と内層部とでは、分泌機能の分立があることを想像している。更に Weaver and Nelson (1943)²¹⁴) は少くとも球状帯と束状帯の二個所に於て、重屈折性物質の放出 (一般に皮質ホルモンの分泌と關聯) が行われることを述べている。

一方 ACTH 投与による副腎皮質の組織学的、組織化学的变化は主として束状帯であり球状帯の変化は認

められないか、或いは極めて軽微である(Bergner and Deane 1948²³⁾, Ducommun and Mach 1949)⁶¹⁾。下垂体剔出によつて束状帯、網状帯が高度に萎縮するに反し、球状帯は殆んど萎縮しない(Deane and Greep 1946⁴⁶⁾, Jones 1950)¹¹⁹⁾。そして球状帯は諸種の塩類(Na, K)失調で撰択的に変化が惹起される点より、球状帯は下垂体の支配を受けずに自律的に鉍質コルチコイドを分泌するものと考えているものが多い。それに反して束状帯は ACTH の支配の本に糖質コルチコイドを分泌するもので、ここに Deane and Greep (1946)⁴⁷⁾の副腎皮質の二元論が主張されるに及んだ。Deane 一派によると球状帯と束状帯とは機能、形態並びに origin 共に全く異つた組成より成り立つていていると考えている。この Deane 一派の二元論と上述 escalator theory (一元論)とは全く矛盾する説であるが、今日此等諸問題に対して明確な解答は全く与えられていない。また Albright (1947)³⁾は網状帯は下垂体の Gonadotropin に支配されていると述べているが、網状帯も他の二層と同様に重要な課題となつてゐる。さて以上諸問題を要約すると、次の三つに分けられる。

- ① 副腎皮質の下垂体前葉ホルモンによる分泌支配の問題
- ② 皮質各層の機能的意義
- ③ 皮質各層細胞の増殖の問題

副腎皮質ホルモン分泌機序として、束状帯のみが分泌機能を司る分泌層であつて、この層から一種類のホルモンが分泌されるという見方は escalator theory にも、また Sayers 一派の所謂下垂体副腎皮質一元論にも極めてよく当てはまる説である。然し、実際副腎皮質から分泌されるコルチコイドは決して唯一つのホルモンではなく、糖質コルチコイド、鉍質コルチコイドの他に男性ホルモンの分泌が行われているという見方が強い。近年副腎の灌流実験等により、強力な鉍質コルチコイド Aldosterone (Electrocortin) の存在が確められて、鉍質コルチコイドの分泌は最早疑う余地なき迄に至つてゐる(Grundy et al 1952²²⁾, Simpson and Tait 1953¹⁹⁸⁾, Mattox, Masson and Albert 1953¹⁷⁰⁾, Farrell and Richards 1953⁷³⁾, Desaulles, Tripod and Schuler 1953⁵⁾, Gaunt et al 1954⁷⁸⁾, Gross 1954⁸⁸⁾, Gross and Gysel 1954⁸⁹⁾, Luetscher and Johnson 1954¹⁴⁴⁾。しかし一方皮質ホルモン分泌機序には他の可能性も考えられている。即ち副腎皮質は生理的に少くとも電解質・水及び糖代謝の二つの作用がみられるが、これはホルモンの量的相異に基くものではないかという可能性である(Swann 1940)²⁰⁾。即ち下垂体剔出動物に於て糖質代謝がおかれ、塩類代謝が保持されるのは、下垂体剔出動物副腎は塩類・水代謝機能を保持するには充分なホルモンを出す、糖質代謝を保つ量には達しないのではあるまいか。また副腎皮質の外層部で作られたホルモンが、内層部に運ばれて、そこで化学的に塩類代謝機能に加うるに糖質代謝機能をうる様になる可能性も考えられている(Swann 1940)²⁰⁾。

ともあれ組織形態学的に、副腎皮質各層は異つた機能を有するものか、各層細胞が独立的に増殖するのか、または同じ細胞であつても異つた機能相を示すものなのか等の問題は、極めて重大な課題であつて、私は Enucleation の実験により、これら諸問題の分析的検索を試みたのである。そして副腎皮質細胞の増殖形式と下垂体ホルモンとの関聯に於ける、特に球状帯細胞と束状帯細胞の形態学的並びに機能的意義の解明を、ラットについて検索してみた。

第1編 ラット副腎 Enucleation 後の副腎皮質細胞の 再生過程について

第1章 緒 言

従来、多くの人々により、副腎皮質細胞は副腎皮質の周辺部から内層部に向つて増殖するものであるとの見解が示されている。即ち皮髄部に於ける皮質細胞の変性死滅を補充するために、周辺部から新たに皮質細胞が増生されるという考えである。この見解の根底をなしている事実としては、副腎皮質周辺部には比較的核分裂像が多く、内層の網状帯には一般に細胞の変性、崩壊像が多いという層の分布に由来している。既に

1883年, *Gottschau*⁸³⁾がかかせる移動増殖形式を提唱して以来, この分野に於てはおびただしい研究が行われている。 *Canalis* (1887)⁸⁵⁾は犬, ウサギ等について, 周辺部に核分裂像が多い点から全く同様の結論を出し, *Mulon* (1903)¹⁶¹⁾は副腎皮質各層の核分裂像を観察し, 間接分裂と直接分裂が球状帯と束状帯の外層部に認められることを述べている。併し乍ら, 一方皮質細胞の分裂能力は皮質内層部に於ても保持されていることも知られている (*Bernard and Bigart* 1902²⁴⁾, *Wiesel* 1902²¹⁹⁾, *Cellestino da Costa* 1913³⁸⁾, *Baxter* 1946)²¹⁾, *Haber* (1908)⁹³⁾は犬, ネコ, ウサギに於ては束状帯に多数の分裂像を見出し, これらの学者の中には束状帯の部位から逆に外方に増殖するとみているものもある。しかし *Kolmer* (1918¹³⁰⁾, 1919¹³¹⁾)は分裂像の最も多数出現する部位は, 束状帯と球状帯との間であると述べており, *Baxter* (1946)²¹⁾は被膜ら2~3個細胞の深さの球状帯部に多いと述べている。また *Bachmann* (1939)¹⁶⁾は人体例に於て, 分裂像は被膜直下に最も多いとしている。 *Graham* (1916)⁸⁴⁾はクロロホルム麻酔で副腎を傷害した場合には網状帯に多数の細胞変性像が出現する一方, 球状帯と束状帯の外層部に最も多数の核分裂像が出現する事実を挙げている。特に *Stress* または *ACTH* 投与時には球状帯と外束状帯に核分裂像の増加する点が認められている (*Anselmino, Herold and Hoffmann* 1934⁹⁾, *Weber* 1938²¹⁵⁾, 大樋 1955¹⁴⁵⁾)。然し乍ら副腎皮質の核分裂は動物により著しい差異が見られるもので, 嚙歯動物に於ては非常に多く, 成人の副腎皮質では非常に少ないものとされている。これらの点より, 副腎皮質の増殖は核分裂のみでは説明が出来ないもので, 直接分裂または *metamorphosis* による増殖が大きな役割を占めるものと思われる。この点で最も重要な課題となるのは, 皮質細胞の胚芽層の問題である。この問題についてもかなりの議論があり, 胚芽層を被膜の内層とみなすもの, 球状帯とみなすもの, 球状帯と束状帯の移行部とみなすもの等種々の主張があるが, これらの内でも特に被膜内層部が胚芽層とみなす主張が圧倒的に多い。 *Zwemer* 一派 (1936a²³⁷⁾, 1936b²³⁸⁾, 1938²³⁹⁾)は球状帯細胞は被膜内の未分化線維芽細胞様の細胞から発生し, 内方に増殖するに従い, 次第に皮質細胞の形態をとり, リポイド顆粒を含有する海綿状細胞となる如く述べている。併し最近 *Greep and Deane* (1949)⁸⁶⁾, *Brenner* (1954)⁸⁰⁾は球状帯細胞自体が胚芽層であり, 副腎被膜から皮質細胞への増殖を否定している。即ち *Enucleation* や副腎移植にみられる再生期に, 被膜細胞は何等核分裂等の増殖態度を示さない点を挙げている。ところが同じく *Enucleation* の観察に於ても, *Baker and Baillif* 1938¹⁹⁾, 1939²⁰⁾は被膜細胞が分裂像を示すことを述べている。この様に被膜が皮質細胞の増殖源であるか否かについても賛否両論がある。

副腎 *Enucleation* は副腎被膜のみ残して (少数の球状帯細胞の残存はまぬがれ得ない), 皮質, 髓質共に剔出する方法で, その後短時日の間に皮質細胞が元通りに再生される。この点, 副腎皮質細胞の増殖過程を検索するには, 最も適した方法と思われる。私が副腎皮質細胞の増殖過程検索に, 敢えてこの *Enucleation* の方法を撰んだ所以も此の点にある。

第2章 実験材料及び実験方法

実験動物としては体重100~150grの雌雄ラットを使用した。副腎 *Enucleation* は *Evans* (1936)⁹⁾, *Ingle and Higgins* (1938 a.)¹⁰⁹⁾ の方法及び大森 (1951)¹⁶¹⁾ の副腎剔出術及び被膜並びに *Zona glomerulosa* 残存副腎剔出術の方法に従い, エーテル麻酔下に於て行つた。即ち副腎門部血管を鉗子で挟み, 副腎の上端部に小孔を穿ち, 内部の皮質髓質を共に圧出し, 生理食塩水で被膜嚢内を数回洗滌し, 殆んど皮質細胞の残存なきまでに留意した。その後血管の圧迫を取り除き, 1~2分にして血液の被膜嚢内に充満するを見とどけて元の位置に復旧した。 *Enucleation* により圧出した組織塊は組織標本を作製し, どの程度まで剔出出来たかを鏡見により確めた。

尚動物は術後の感染を予防するため水溶性結晶ペニシリンGを投与し, 副腎不全の予防のため1%食塩水5ccを皮下に投与 (2日間) した。

第1群 右側副腎剔出, 左側副腎 *Enucleation* 術後2時間目, 3日目, 5日目, 15日目, 30日目, 60日目のもの各例雌雄3匹づつ, 特に15日目のものは雌雄15匹づつにつき検索した。

再生副腎重量は *torsion balance* で計量し, 体重曲線は15日目群ラットの平均値をとつた。

副腎はブアン固定と、10%中性ホルマリン固定を施し、ブアン固定のものはパラフィン切片として、ヘマトキシリン・エオジン、一部はマツソン染色、アザン染色、ワンギーソン染色を行った。中性ホルマリン固定のものは氷結切片により、Sudan IV, Schiff, Schultz 一部は重屈折性、Nile blue 染色を行い検索した。

第2群

i) 右側副腎残存，左側副腎 Enucleation

ii) 両側副腎 Enucleation

各雄ラット5匹づつを使用し、すべて15日目のものを検索した。

第3群 コルヒチン投与群

右側副腎を剔出し，左側副腎 Enucleation を行い，コルヒチン0.1mgを屠殺9時間前に皮下注射により，mitotic cycle を metaphase の初期に抑制して，その出現及び分布を検索した。

ラットは Enucleation 後24時間目，3日目，5日目，10日目に殺し，ブアン，カーノイ固定，ヘマトキシリン・エオジン染色，メチレン・ブルー染色により核分裂像を観察した。

第4群 i) Thorn test ii) NaCl 及び KCl 投与

i) 右側副腎を剔出し，左側副腎 Enucleation を施し，7日目，10日目，21日目，26日目，40日目の再生期に検索した。水溶性 ACTH (Amour) 5 mg を使用し，その投与前及び投与後3時間後の血中好酸球を検索した。何れも雌雄2匹づつ使用し，好酸球は Dunger の Hills, Forsham and Finch (1948)⁹⁰⁾の改良法により，その平均値をとった。

ii) 副腎 Enucleation 後3% KCl, 3% NaCl 各3cc連日皮下投与し，15日目に屠殺した。また他の群は Enucleation 後30日を経過後，初めて3% KCl, 3% NaCl 各3ccを更に連続15日間皮下投与し屠殺した。

何れも雌雄5匹づつ使用し，副腎はブアン固定，中性ホルマリン固定によりヘマトキシリン・エオジン染色及び Sudan IV, Schiff 染色により検索した。

第3章 実験結果

第1群 手術後最初の1~2日間は1%食塩水の経口投与によって副腎皮質機能の脱落を防いだが，3日目からは食塩水の投与を中止した。併し手術ラットは何等副腎不全の徴を示すことなく，一般状態も極めて良好であり，体重も手術直後よりかなりの増加を示した。小数例に於て，手術後2~3日後に死亡したものがあつたが，これ等は特に手術時出血の著明なものや，一般状態の概して不良な動物であつた。

体重曲線

一侧副腎剔出，他側副腎 Enucleation のラット体重曲線は，初め20日間位は正常ラット以上の体重上昇を示した（第1表）。しかもかかる体重の増加は特に雄ラットに於て顕著なものが認められた。対照例として両側副腎全剔出のラット体重曲線を検べたが，かかる群は初期より体重は著明に減退し，且つ一般状態は悪化の傾向をたどり，2週間前後に於てその大半が死亡した。即ち副腎 Enucleation の場合は副腎剔出の場合とは全く

第1表 副腎 Enucleation ラットの体重曲線

異り、急速に副腎機能が恢復されることが想像出来る。副腎全剔出群に於ても小数例のものが長期生存し得たが、かかる動物では傍副腎の存在を認めた。おそらくこれらの傍副腎が副腎機能を代償したものと考えられる。

再生副腎重量

術後、副腎被膜内には著しい出血があり、血腫状を呈し、従つて重量も異常に大きい。術後7日目位で、これらの血腫は次第に吸収されるが、真の副腎のみの重量ではない。Hartman, Brownell and Knouff (1947)⁹⁷⁾はマウス Enucleation 後7日目で副腎はかなりの血塊で占められているためこの時期の副腎重量は真の重量を示さないとしている。しかしこの実験で15日目に於ては、殆んど副腎自体の重量を示すと思われたので、表は15日以後の重量を掲げた。第2表、第3表の如く術後15日目に於ける再生副腎の平均重量は7~9mgで、雄雌ラットで著明な相異は認められなかつた。Hartman (1947)⁹⁷⁾は15日で組織学的にも幾分皮質組織が増加し、正常の副腎の $\frac{1}{2}$ になるとしている。術後30日後においてはかえつて元の副腎重量より大きくなり、Ingle and Higgins (1938)¹⁰⁰⁾も5~6週で14~16mgなる値をのべている。60日後に於ては正常ラット左右副腎合計重量をはるかに凌駕するに至る。

再生副腎の外景

再生副腎の外観は略球状を呈するが、一般に不規則な形態を示す。しばしば副腎周囲脂肪組織内に、黄白色の傍副腎の発生を認めたものが、かなりの頻度にあつた。また再生した副腎被膜面に、かなり大きな被膜腺腫の増生が比較的明確に窺われた。

再生副腎の色調は一般に正常副腎にみる如き黄色調に乏しく、多くは淡紅白味を帯び、小さきものは、周囲リンパ腺と極めて混同し易い外観を呈していた。

組織学的所見

副腎 Enucleation 後24時間後に於ては、副腎は血液の充満した血腫状を呈し、被膜は著しく膨化し浮腫状を呈しており、被膜直下で皮質細胞は殆んど再生されておらず、血液凝塊、細胞崩壊物白血球の浸潤で占められている。

尚、被膜下の極く少部分に於て、極めて少数の球状帯細胞の残存を認めた。これら皮質細胞の残存は、特に周囲脂肪組織附着面側の被膜直下にしばしば認めた。一般に此等残存皮質細胞には変性像を認めることが出来た。

副腎 Enucleation 後3日目に於ては、被膜は著しく浮腫状で、被膜細胞も著しい膨化及び空胞化を示している。被膜下には血液凝塊及び細胞崩壊、多核白血球の浸潤を認める。しかしこの時期では、被膜直下に於て全周に亘つて皮質細胞の再生、増殖の像を認めることが出来た(再生皮質細胞を以下R細胞と呼ぶ)。しかし、一般に此等のR細胞は線維芽細胞との鑑別が極めて困難であり、従つて被膜細胞との区別も困難であつた。再生細胞の中には核分裂像が数多く認められ、また核分裂を終了した直後の細胞と思われるものを多数認めた。またこの時期に於ては被膜から中心部に向つて、多数の結合織様細胞が侵入している。被膜内の細胞は何れも一般に大きく紡錘形で、著しく膨化しているが、Greep and Deane (1949)⁸⁹⁾が Enucleation の実験で述べている如く、被膜細胞の核分裂を認めることは出来なかつた。

副腎 Enucleation 後5日目に於ては、被膜下の皮質細胞の再生は更に進行しており、明確に皮質細胞の性格を示している。かかるR細胞がほぼ球状帯に相当する厚さにまで完成しているが、明確な細胞の配列が

第3表 副腎 Enucleation 後の各臓器重量

	雄							雌						
	実験 日数	体 重 (gm)		副腎重量 (mg)	胸 腺 mg/ 100g B. w.	腎 mg/ 100g B. w.	実験 日数	体 重 (gm)		副腎重量 (mg)	胸 腺 mg/ 100g B. w.	腎 mg/ 100g B. w.		
		開始時	終結時					開始時	終結時					
右側副腎剥出 左側副腎 Enucleation	15	126±2	151±13	剥 出	7.5±1.0	193±12	820±25	15	128±4	135±7	剥 出	8.3±0.9	238±30	832±25
右側副腎残存 左側副腎 Enucleation	15	114±4	110±6	4.0±0.3	32.0±2.5	183±18	880±31	15	121±7	124±14	3.5±0.5	28.0±4	230±15	802±16
両側副腎 Enucleation	15	103±3	123±5	6.0±0.5	6.0±1.5	166±20	1008±28	15	149±6	156±9	6.0±0.5	7.0±1.5	115±21	385±24
右側副腎剥出 左側副腎 Enucleation + NaCl	15	113±4	157±10	剥 出	15.2±3.5	126±9	767±13	15	123±10	137±10	剥 出	14.2±4.1	299±23	670±31
右側副腎剥出 左側副腎 Enucleation + KCl	15	108±5	125±12	剥 出	8.0±1.5	190±11	880±24	15	114±3	125±4	剥 出	17.5±2.0	272±15	880±16

Standard error of the mean: $\sqrt{\sum d^2/n(n-1)}$

みられず、これらの細胞が球状帯細胞か、または束状帯細胞であるかその区別は明確でない。中心部の血液凝塊、多核白血球は殆んど吸収、消失しており、その場所には結合織が侵入して中心部を満たしている。3日目群に比し、副腎の形は著しく縮小し、殆んど被膜、結合織R細胞等の再生成分で占められている。

副腎 Enucleation 後15日目に於ては、R細胞は更に深層部まで完成していた。しかも内層部のR細胞は束状の配列を示し、明らかに束状帯細胞と判定し得る像を示している。最内層部に於ては、然し明確なる網状帯と認められる層はなく、血管腔が著しく拡大している。被膜は Enucleation 後5日目のものに比し、かなりうすくなり略々正常の所見を呈し、細胞も比較的細長である。此の時期の被膜内に於ては、しばしば黄色の色素沈着を認めた。また被膜から中心部に向つて大量の結合織の進入を認め、これらの結合織は中心部の結合織まで連続しているものが多い。結合織の増生はかなりの個体差があり、動物により特に著しいものがあつた。

R細胞は一般に、緻密で細胞内特に外層部細胞はやや粗大な空胞形成の傾向がみられ、中にはフィブリノイド変性を示すものがあり、そのため特に外層部は弱拡大では蜂窩状の構造を呈している。球状帯と束状帯との間には移行層 (Engström (1936)⁶⁸⁾ のいう *Grenzschicht*, Sarason (1943)¹⁷⁾ の *Clear zone*, Mitchell (1948)¹⁵⁷⁾ の *zone of compression*) は認めることが出来ず、また球状帯細胞と束状帯細胞とは連続しており、両層を区別することは組織学的に極めて困難である。併し一般に被膜直下の細胞はどさくさ、内方に進むに従つて次第に大きくなつていく。中心部は大多数の例に於て結合織または壊死物質で占められ、これらの結合織内に於て明かに皮質細胞と思わ

れる細胞島が混入している例がしばしば認められた。また中心部のかかる部位では細胞の配列が不規則であり、拡大した血管腔を囲んで肝小葉に似た組織像をしばしば認めることが出来た(写真4)。被膜内に於てもしばしば皮質細胞の混在を認め、また被膜及びその周囲に被膜腺腫を形成しているものがしばしば認められ

た。これ等の所見は被膜内細胞または線維芽細胞様の細胞から皮質細胞が再生されるという説は妥当の様にみえる。

また被膜腺腫細胞にも田所氏(1954)³⁰⁷⁾の述べている如く、比較的明調な light cell と dark cell との区別が明瞭である。中心部には髓質の再生は全く認めず、血管腔が著しく拡大し、また多数の血管再生も認められるが、細胞の変性・崩壊像は正常副腎の網状帯にみる如く著明ではなかつた。

副腎 Enucleation 後30日目に於ては、再生副腎は極めて大きく、組織学的にも略々三層が完成し、網状帯も判定し得る状態となつている。併し球状帯と束状帯との間には、移行層細胞は認められなかつた。何れも髓質細胞の再生は全く認めず、R細胞にはかなりの変性像がみられた。一般にR細胞の配列は正常副腎に比し非常に不規則であり、彎曲した配列を示すものがみられた。

副腎 Enucleation 後60日目に於ては、再生副腎は異常に大きく、正常ラット副腎の2~3倍のものがみられた。組織像も略々正常副腎皮質に近いが、数多くの被膜腺腫の形成及び結合組織の侵入のため、形は不整形を示している。またこの時期に於ては、皮質細胞にフィブリノイド変性が極めて高度にみられた。

組織化学的所見

副腎 Enucleation 後24時間目に於ては、Sudan 染色により中心部の血液凝塊と、被膜下の残存球状帯細胞が僅かに粗大な滴状として染る。

副腎 Enucleation 後3日目に於ては、R細胞は Sudan, Schiff, Schultz 反応何れも殆んど陰性である。被膜内または結合組織中に於て、一部 Sudan, Schiff 陽性顆粒が認められた。

副腎 Enucleation 後15日目に於ては、R細胞は Sudan, Schiff, Schultz 反応で漸慢性にうすく染る程度で、正常副腎皮質にみられる如き微細顆粒は一部のものを以外には出現していなかつた。またこれらの組織化学的所見で、球状帯細胞と束状帯細胞とは全く同様な態度を示し、両層を区別することは困難である。勿論移行層にみられる sudanophobe zone は、雌雄共に見出し得なかつた。興味あることには、被膜内または被膜から侵入している結合組織内に於て、Sudan, Schiff, Schultz 反応が強く粗大顆粒状に染る個所がしばしば見られるのが特異的である(写真8)。特にこれらの結合組織中には皮質細胞の混入がみられ、一般にみられる結合組織並びに被膜とは異つた性格を思わせる。被膜腺腫細胞もR細胞と略々同様の組織化学的所見を呈している。R細胞の中でも、処々に極めて強く、これらの脂肪染色反応陽性細胞が出現しているものがみられた。これらの顆粒は、一般に粗大で散在性に認められた。

副腎 Enucleation 後21日目に於ては Sudan, Schiff, Schultz 反応が再生皮質細胞にやや強く出現しており、特に球状帯にはかなり粗大に強く染つている。束状帯は微細で球状帯に比し幾分少い。一般に組織化学的所見より球状帯と束状帯との区別は容易であるが、雌雄共に両層の間の sudanophobe zone は明確に認めることは出来なかつた。またある例では球状帯と束状帯とは、上記組織化学的所見で一樣の強さに染るものもあつた。束状帯内に於ても比較的粗大な、強く染る顆粒の細胞と弱く染る細胞とが混在していた。

副腎 Enucleation 後30日目に於ては、球状帯、束状帯の区別は諸種脂肪染色で極めて明確であり、しかも一般にこれら顆粒は増加の傾向を示している。しかもこの時期に於ても、明確な sudanophobe zone は認め得なかつた。

副腎 Enucleation 後60日目に於ては、比較的粗大な顆粒の出現を認め、正常副腎皮質に於て認める状態の顆粒の状態に復していた。

第2群 i) 右側副腎残存, 左側副腎 Enucleation 再生副腎重量

手術後15日目の再生副腎重量は第3表に示す如く、極めて小さく、著しい再生遅延を認めた。併し右側副腎の代償性肥大はかなり著明であつた。

組織学的所見

右側副腎(残存側)は著しく肥大し、特に束状帯細胞が著明であり、組織化学的にも、Sudan IV, Schiff, Schultz 重屈折性は束状帯から殆んど消失し、Deane and Greep (1946)⁴⁶⁾, Deane, Shaw and Greep (1948)⁵²⁾等のいう所謂皮質機能亢進像を呈する。被膜及び束状帯は著しくうすく、特に球状帯細胞は萎縮性であり

且つ細胞が互に解離している（写真9）。かかる束状帯の肥大は大樋（1955）¹⁶⁵の片側副腎剔出時にみられる他側副腎の代償性肥大の場合と同様であるが、球状帯の所見が全く異つてゐる。即ち片側副腎剔出時の場合にみられる他側副腎の肥大時には、球状帯細胞もかなり肥大しているが、この場合にはかえつて球状帯は萎縮性傾向を示していた。

左側（Enucleation 側）副腎は術後15日目に於ても、再生は著しく遅延され、皮質の厚さはうすく、中心部まで再生が行われていない。この場合被膜は著しく肥厚しており、被膜直下に於ける皮質細胞の再生は比較的良好である。併し一般的にR細胞は萎縮性であり、特に内層部では粗大空胞を有する脂肪細胞並びに結合織で占められている（写真10）（この種の萎縮性細胞をD細胞と以下呼ぶ）。中心部を占めるこれらのD細胞群は、核は pycnotic で、一見脂肪細胞に全く類似した変性細胞が主体をなしている。外側の再生皮質細胞は Sudan IV, Schiff, Schultz 反応でやや粗大に染るが、中心部の上述細胞は極めて粗大な滴状として染る。特に Sudan IV には強く染り、Schiff, Schultz 反応も Sudan IV よりは弱い同様滴状を呈する。また中心部のこれら細胞は Nile blue 染色により、淡紅色に染る。中心部のD細胞群はちようど下垂体剔出時にみられる萎縮性束状帯細胞と類似しており、おそらくは同種類の細胞と思われる。またかかる種類の細胞は第2編、第3編の各実験にもしばしば出現するもので、D細胞として夫々の項に於て後述する。

ii) 両側副腎 Enucleation

前者と比べ、組織学的にもR細胞の再生はかなり良好であり、且つかかなり内層部まで完成している。また前群に於て認めたD細胞は、全く出現していなかつた。組織学的には、リポイド顆粒はやや粗大の傾向を示した。

第3群 副腎 Enucleation ラットにコルヒチン注射群

副腎 Enucleation 後1日目、3日目群の雄雌ラットにコルヒチン注射せしものは全例死亡した。5日目に於ては、半数は生き残り、10日目群は全例生き残つた。3日目の副腎に於ては、核分裂像は大多数被膜内に認め、尚被膜下の再生皮質細胞内にも認めた。特に被膜内には極めて多数の核分裂を認め、被膜下の再生皮質細胞は崩壊像を呈しているものが多かつた。5日目のものは被膜内核分裂像は3日目群のものよりは少いが、比較的多く認めることが出来た。尚再生皮質細胞内にはより多数の核分裂像を認めたが、これらの細胞は一般に崩壊像が顕著であつた。10日目群に於ては被膜内の核分裂像は殆んど認めず、再生全層皮質細胞に於て核分裂を認めた。

第4群

i) 副腎 Enucleation ラットの Thorn test

ii) 副腎 Enucleation ラットに NaCl, KCl 投与

i) Thorn test

副腎 Enucleation 後各時期に於ける Thorn test による成績は第4表の如くである。ラット血中好酸球は極めて個体差があり、好酸球数が著しいひらきがみられるが、ACTH 投与による好酸球減少率は26日前後に初めて50%以上となつた。

ii) NaCl, KCl 投与

Enucleation 後翌日より NaCl, KCl 連日15日間投与の場合、副腎皮質細胞再生には殆んどみとむべき所見がなかつた。KCl 投与の場合には再生皮質細胞にはかなりの変性像がみられ、フィブリノイド変性、コロイド体の形成がみられた。併しこの時期に於ける皮質外層部は何等肥大及び機能亢進像を示さなかつた。また球状帯、束状帯は第1群と同様な所見を呈し、両層

第4表 副腎 Enucleation ラットの ACTH 投与による血中好酸球減少
(Amour ACTH5mg 投与3時間後)

	動物 匹数	前	後	判定
7日	2	50	31	—
	2	20	26	—
10日	2	21	20	—
	2	32	42	—
21日	2	3	4	—
	2	27	26	—
26日	2	19	3	+
	2	32	12	+
30日	2	71	11	+
	2	49	14	+

を区別することも組織学的に困難であつた。NaCl 投与ラット再生副腎もかなり再生が良好であり、内層部の細胞も極めて大きな形態を呈していた。且つ中心部に於ては血管腔が異常に拡大している例がみられた。また NaCl 投与群のあるものに於て、被膜内に多発性の被膜腺腫を認めた例があつた(写真19)。

副腎 Enucleation 後1ヶ月目より NaCl, KCl を5日間投与した群に於ては、球状帯にかなりの変化を認めた。即ち KCl 投与により球状帯はやや広く、細胞も大きく組織化学的にリポイド顆粒は減少、微細化し明かに球状帯の機能亢進像を捉えた。また NaCl 投与により球状帯細胞は小さく、リポイド顆粒は粗大で球状帯機能減退像を思わしめる所見を認めた。

第4章 考 案

副腎皮質細胞の増殖

副腎皮質細胞は Gottschau (1833)⁸³⁾以来より、所謂 escalator または cell-migration theory が唱えられ週辺部から増殖し、内方に移動するという考えが圧倒的である。けれども皮質細胞の増殖源である、胚芽層については、被膜及び被膜下となすもの (Zwemer 1936²³⁷⁾ ²³⁾, Lux, Higgins and Mann 1937¹⁴⁶⁾, Zwemer, Wotton and Norkus 1938²⁸⁰⁾, Ingle and Higgins 1938b¹¹⁰⁾, Bachmann 1939¹⁷⁾, Turner 1939²¹¹⁾, Baker and Baillif 1939²⁷⁾, Bennett 1940²²⁾, Salmon and Zwemer 1941¹⁷⁵⁾, Gruenwald 1942⁹⁰⁾, Wotton and Zwemer 1943²³¹⁾, Gruenwald and Konikov 1944⁹¹⁾, Baxter 1946²¹⁾, Baker 1952¹⁸⁾) 球状帯とみなすもの (Mylon 1903¹⁶¹⁾, Bognomoz 1903²¹⁾, Hoerr 1931⁹¹⁾, Williams 1947²²¹⁾, Greep and Deane 1949⁸⁵⁾, Brenner 1954³⁰⁾), 球状帯と束状帯との移行部とみなすもの (Graham 1916³⁴⁾, Hoerr 1931¹⁰¹⁾, Blumenthal 1940²⁷⁾, Cameron 1952³⁴⁾), また束状帯とみなすもの (Celletino da Costa 1913³⁸⁾) 等があり、その見解はまちまちである。これらの各主張は副腎皮質細胞の核分裂像並びに変性崩壊像の分布・リポイド・ミトコンドリア・Golgi 装置の所見・細胞学的な見解、各層に出現する reticulum の状態、トリパンブルー生体染色の所見、副腎移植、副腎 Enucleation にみられる再生像等の諸種の組織学的、組織化学的検索に基いている。副腎移植の場合は Enucleation と同様、皮質細胞が再生されるものである (Bernstein 1950²⁵⁾)。副腎移植または 副腎 Enucleation 後にみられる再生機転は、正常副腎皮質の増殖機転にそのままではまることは勿論出来ないが、諸種環境下に於ける副腎皮質の増殖肥大機転の一端を窮うことが出来ると思われる。副腎を移植する際には、被膜部位の挿入が必須であることが述べられており、この点から被膜が皮質細胞の再生に重大なる役割を有する点が強調されている (Ingle and Higgins 1938b¹¹⁰⁾, Turner 1939²¹¹⁾), Baker and Baillif (1939)²⁰⁾は左副腎剔除、左副腎 Enucleation 後24時間でコルヒチンを投与することにより被膜内に核分裂像の出現するのを認めている。被膜内の核分裂像は同じく Nathanson and Brues (1941)¹³³⁾が Testosterone propionate を投与したラット副腎被膜内に於てコルヒチンを投与して認めている。また正常時の副腎に於ても、Jayne (1953)¹¹⁷⁾は幼若ラットの副腎被膜内に核分裂を認めており、更に Kitchell (1952)¹²⁴⁾は胎生ラット副腎被膜内には、数多くの核分裂像が存在することを述べている。これらの観察は、何れも副腎被膜が皮質細胞の増殖源であることを疑っていない。

ところが他方 Everett (1949)⁷²⁾は副腎移植の場合は、別に被膜の包含がなくとも移植が可能であると述べており、Greep and Deane (1949)⁸⁶⁾は副腎 Enucleation に於て、被膜内には核分裂像は出現せず、Enucleation の際残存する球状帯細胞が皮質の再生に与るものとしている。また Brenner (1954)³⁰⁾はラット副腎移植の実験に於て Greep and Deane と全く同様の見解をとっており、Williams (1947)²²¹⁾等も被膜細胞が皮質細胞に再生増殖するという、所謂被膜細胞胚芽説には否定的な見解を示している。これらの実験は、何れも被膜下の皮質細胞があくまで皮質細胞の増殖源であるとの見解を示している。

さて私はこの実験に於て、各時期の副腎皮質再生期に於て、特に被膜内の核分裂像に留意して観察したのであるが、明確な被膜内の核分裂像は Greep and Deane が述べている如く認め得なかつた。併し第2群のコルヒチン投与群に於ては、再生の極めて初期に多数の核分裂像を被膜内に捉えることが出来た (写真7)。

しかしまた再生過程の進んだ時期に於ては、再生皮質全般に亘つてかえつて多数増加し、被膜内には反対

に減少してくる事実を知った。これは被膜細胞から皮質細胞の再生増殖の可能な点を想像せしめるもので、更に皮質細胞自体も旺盛な増殖能力を示すものであることが考えられる。また被膜内の核分裂像は、コルヒチンを投与しない限り発見出来なかつたのは、被膜細胞の核分裂は非常に短い時間で終了するために、普通の観察では発見が出来なかつたためと思われる。またコルヒチン自体が強い Stress として作用し、更に増殖過程をおし進め、核分裂像の出現を多くしたためかも知れない。

この実験では被膜内の核分裂は特に再生の初期に極めて多く、再生がある程度進めば再生細胞自体が更に増殖的役割を演ずるようである。即ち Enucleation の如き状態下に於ては、副腎皮質の如何なる個所（皮質の内層部）に於ても、増殖能力が保持されている様にみえる。Baxter (1946)²¹⁾, Vaccarenza (1945)²¹²⁾, Hartman (1949)¹⁰⁷⁾, Jayne (1953)¹¹⁷⁾ 等は副腎皮質内層部にも核分裂像が出現することを述べており、また Baxter (1946)²¹⁾ は網状帯にも核分裂の存在をみとめ、この層が全く変性、崩壊層でないことを示すと述べている。またラットに ACTH を大量投与した場合には、網状帯にも核分裂が出現するものである (Baker 1952¹⁸⁾, 大樋 1956¹⁴⁴⁾). 併し何れの場合にも網状帯に出現する核分裂の頻度は少く、束状帯外層、球状帯に最も多く出現することは確かで、網状帯に核分裂が出現することで escalator theory を決して否定する理由にはならない。また副腎皮質細胞の増殖を単に核分裂の分布のみから判断するのは、当を得ないものがある。核分裂の出現は動物種により、また年令によつても非常に差がある点が知られている (Blumenthal 1945)⁸⁾. Zwemer 一派が述べている様に、被膜その他の fibroblast-like cell からの metamorphosis が副腎皮質細胞の増生には極めて大きな役割を占めているようである。特に Enucleation の際には、被膜から多数の結合組織細胞が索状に内方に侵入している像がみられ、これら細胞は被膜細胞と同様に注目し値する所見を呈している。更に被膜直下に於ては少型のクロマチンの多い被膜細胞との中間形と思われる細胞が出現している。これらの細胞は Atkinson (1954)¹²⁾ がマウス副腎皮質増殖の場合のべている A 細胞、更に安藤 (1953)⁸⁾ がマウスで塩化カリ投与により球状帯が肥大した場合、被膜下にみとめている移行型細胞と同様の所見をしばしば認めることが出来た。同様な被膜下の移行型細胞は Jayne (1953)¹¹⁷⁾ が幼若ラットの被膜下にみとめている。Knigge (1954)¹²⁰⁾ もハムスター副腎被膜から球状帯細胞が発生する如き細胞像を捉えている。Lux, Higgins and Mann (1937)¹⁴⁷⁾ は移植実験で、皮質細胞の再生が被膜からおこつてくることを述べている。更に Baxter (1946)²¹⁾ は被膜下に同様移行形細胞の存在をみとめ、球状帯細胞が新しく細胞を増殖するときには preglomerulosa cell の増加がみられると述べている。Enucleation の場合には、被膜内の被膜腺腫の出現や皮質内結合組織中の皮質細胞島や傍副腎を極めてしばしば認めることが出来る。これら細胞の組織化学的所見は Jayne (1953)¹¹⁷⁾ が述べている如く、再生皮質細胞と全く同様であり、結合組織中に皮質芽細胞があり、成熟して皮質細胞に移行したと思われる所見である。被膜内に球状帯型の細胞島がみられることは、Williams (1945)²²⁰⁾ も述べており、ラットでも老年になると皮質結節 (Yeckel 1947²³²⁾, Dribben and Wolfe 1947¹⁰⁾) や被膜が皮質内に侵入する像 Jayne (1953)¹¹⁷⁾ が認められている。そして特に副腎皮質が肥大、増殖する場合に被膜腺腫の形成が認められると云われている (Selye 1949¹⁸⁹⁾, 1950¹⁹⁰⁾, Baker 1952¹⁸⁾). また Wolley, Fekete and Little (1940²²⁸⁾, 1941²²⁹⁾, Wolley (1950)²²⁷⁾ は JAX dba 系マウスで去勢後被膜下に多数の核分裂像と結節性肥大が出現することを認めている。

実験的に副腎不全に陥らしめた状態に於ては、この種の傍副腎が発生するものと考えられている。(Schour and Rogoff 1936)¹⁴⁶⁾. 傍副腎は一般に副腎不全の場合 coelomic mesothelium から増殖するもので、coelomic wall の細胞は active interrenal tissue に分化する潜在能力を有するものと考えられている (Mac Farland 1945¹⁴⁷⁾).

皮質結節は Waring and Scott (1937)²¹³⁾, Zwemer, Wotton and Norkus (1938)²³⁰⁾ によれば、capsular trabeculae から形成されると考えられている。副腎 Enucleation の場合に、これらの異所的皮質細胞増生のみみられるのは、特に増殖機転が activate された結果と考えられる。Zwemer, Wotton and Norkus (1938)²³⁰⁾ は皮質細胞の芽細胞は被膜内の fibroblast-like の細胞であり、この細胞から被膜下に於て皮質細胞に metamorphosis すると主張しているが、副腎 Enucleation の場合は、単に被膜下のみでなく、結合組織内に於て異所

的に増殖する傾向が大きいと思われる。

Enucleation の際には、要約すると次図の如き増殖形式が存在することが確められる。

第 1 図

- ① 被膜内の増殖及び分化 (fibroblast 様細胞の分裂像)
- ② 被膜下に於ける metamorphosis
- ③ 皮質細胞の核分裂
- ④ 皮質原基が一旦皮質内に侵入し、そこで分化する形式
- ⑤

Enucleation の実験では、単に Zwemer 等が述べている如き被膜下に於ける分化のみではなく、更に多種多様の増殖形式をもつものであつて、正常副腎に於てもこれら増殖形式が多分に存在するのではないと思われる。Gruenwald and Konikov (1944)⁹¹⁾は被膜から分化した皮質細胞

が増殖するには多くの哺乳動物で、二つの機構が存在することを述べている。一つは Zwemer (1936³⁷⁾, 1938³⁹⁾等が述べている end-to-end junction of newly formed cords で、他は apposition of a complete new layers から球状帯細胞に移行する形式とである。また分泌皮質細胞の増殖には

- ① 球状帯と束状帯の間の核分裂
- ② 球状帯にたくわえられている細胞の動員
- ③ 被膜にたくわえられている細胞から apposition による再生増殖

が考えられている。

Vaccarenza (1945)²³⁹⁾によれば、皮質細胞の増殖は移動ではなく、centripetal proliferation であるとしているが、少なくとも Enucleation の際には両者がありうる事が考えられる。

Salmon and Zwemer (1941)¹⁷⁵⁾はトリパンプルー生体染色から、皮質細胞が被膜から球状帯細胞に escalate するに 6 日、被膜から束状帯へは 12 日、網状帯には 20~30 日要すると述べている。この見解にはかなりの反駁がみられはするが、副腎 Enucleation 後の再生過程は、この成績と略々一致した日数で層形成が行われる点は、興味あることと思われる。

皮質機能の恢復

一般に Enucleation の再生初期には、細胞内に殆んどリポイド顆粒が認められない。これらの細胞は未だ分泌活動を営まないと考えるよりは、むしろ分泌機能亢進の状態のためにリポイドがないものと考えられる。何故ならば、再生初期の極く僅かの皮質細胞で、已に副腎不全をおこさぬ量のホルモンが出されているからである。Hartman, Brownell and Knouff (1947)⁹⁶⁾, Hartman (1949)⁷⁷⁾によれば、Enucleation の際少量の皮質組織が正常以上のホルモン分泌を行うことを述べている。従来より諸家により副腎皮質機能の組織化学的な指標が考えられており、Dempsey (1948)⁵⁴⁾等の多角的証明法が皮質機能判定に広く応用されて来た。そして皮質機能とリポイドとの關聯 (Deane and Seligman 1953³⁰⁾, Deane 等 1946⁴⁰⁾, 1948³²⁾, 橘 1951²⁰⁸⁾), 重屈折性 (Weaver and Nelson 1943)²¹⁴⁾, アスコルビン酸との關聯 (Sayers et al 1944¹³¹⁾, Sayers et al 1946¹³²⁾, Knoff, Brown and Schneider 1941¹²⁶⁾, Dosne and Dalton 1941⁷⁹⁾, Ludewig and Chanutin 1947¹⁴³⁾), オスミウム酸との關聯 (Flexner and Grollman (1939)⁷⁵⁾) が述べられている。また正常動物では Sudan, Schiff, Schultz などの諸反応は、略々平行するものとされている。Popjak (1944)¹⁷⁰⁾, Sayers et al (1950)¹⁸⁰⁾は皮質にみられるコレステロールは、おそらくステロイドホルモンの storage form またはその前段階物質形成に使われるものと考え、Weaver and Nelson (1943)²¹⁴⁾は微細な重屈折物質のみを storage form とみなしている。一般にリポイドは皮質機能亢進時にも低下時にも消失することが知られている (Deane and Greep

1946)⁴⁶⁾。そして Enucleation の際にみる無リポイド状態は、前者即ち分泌が迅速で細胞内に蓄積するといまのない状態と考えられる。Enucleation ラットの抵抗力は初めの1～5日までは極めて弱く、この事は第3群コルヒチン投与実験に於ても窮われる。即ち1～5日目のものはすべて、コルヒチンの毒性によつてたおれ、5日以後のものはかなり抵抗があり、10日目のものは死亡しなかつた。それ故 Stress に対する抵抗性も、皮質細胞が再生すると共に次第に恢復するものと考えられる。また副腎の再生が完了した場合には髓質がなくとも、副腎はインシュリン・ヒスタミン・寒冷に反応することが認められている (Gordon 1950)⁸²⁾。このことは髓質と皮質との隣接が、必ずしも副腎皮質反応に必要な条件ではないものと思われる。尚上述 Thorn test では Enucleation 後25～30日後に血中好酸球減少率は50%以上となり、この時期で初めて下垂体副腎系が正常に復するものと思われる。Greep and Deane (1949)⁸⁶⁾は Enucleation 後32日後に於て、アスコルビン酸が組織化学的に正常値に復することを述べ、Gordon (1950)⁸²⁾は化学的に同じく Enucleation 後32日後にアスコルビン酸は正常値より幾分高いが、一定値に復することを述べている。また組織学的にみても1ヶ月位で初めて皮質全層の完了がみられ、更に副腎重量の点からもこの時期に於て、元の副腎皮質機能状態に復したのと考えられる。この点 Thorn test がこの時期に初めて陽性となることは、非常によく合致する事実である。中尾 (1952)¹⁶²⁾は副腎 Enucleation により血圧は初め低下するが、束状帯の再生により正常にもどることを述べている。

一般に球状帯細胞と束状帯細胞とは二元的構成よりなり、前者は電解質代謝ホルモンを、後者は糖質代謝ホルモンを分泌するものとされているが、もしそうであれば、Enucleation 後球状帯が出来上る時期には電解質代謝ホルモン分泌機能のみが恢復し、束状帯細胞が再生される時期に及んで糖質代謝ホルモン分泌が恢復すべき筈で、Enucleation の方法は副腎皮質の機能局在性を分析するには極めて好都合である。倉田 (1952)¹³³⁾は副腎 Enucleation 後5日以内に加里毒性試験は正常に恢復し、水中毒試験は10～20日の間に至つて正常に復することを述べている。また佐藤 (1952)¹⁷⁷⁾も同種の検索を行つているが、このことは球状帯の再生が完了すれば、球状帯から出される電解質代謝機能が恢復するものとみて好都合である。しかし氏は球状帯から分泌されると云う塩類代謝と水代謝に關聯する副腎皮質ホルモンは、質的に或いは量的にその性質を異にすることを暗示している。また glucose 投与後の肝グリコーゲン沈着作用能は、30～40日に恢復することから、鈣質コルチコイドと糖質コルチコイドとの独立性を一応認めてよいと結論している。また Greep and Deane (1949)⁸⁶⁾は Enucleation のラットに DOCA を投与して、束状帯には何ら変化なくして、球状帯の萎縮と、リポイドの消失を認め、二元論を認めしめるに好都合な結果を出している。併し、他方 Brownell, Hartman and Reiman (1950)⁹²⁾は Enucleation 後 serum sodium の値を測定し、術後数週間には正常以下で、54日も恢復しない点をあげている。そしてこのことは、再生された球状帯から出されるホルモンは全層が全く再生されるまで分泌されないのか、または二元論には誤りがあるためかも知れないと述べている。Enucleation 後の再生副腎皮質は一般に組織学的、組織化学的にみて特に初期に於ては、球状帯と束状帯とは明確に判別することは不可能であり、30日以後の再生の全く完了した時期に至つて、初めて、二層の判別が明確となつてくる。Williams (1947)²²¹⁾は移植再生副腎に於ても、球状帯と束状帯との明確な分離線は認められないことを述べている。またかゝる再生期に NaCl, KCl, DOCA (第3編に後述) を投与しても、球状帯には Deane, Shaw and Greep (1948)⁵²⁾が述べている如き、明確な変化は惹起されなかつた。Greep and Deane (1949)⁸⁶⁾が Enucleation ラットに DOCA を投与して、球状帯に disuse atrophy を認めているが、これは Enucleation 後1ヶ月半のラットに1日2mg 1ヶ月間投与した場合の成績で、再生が一応完成した後の状態である。私も Enucleation 後1ヶ月後に NaCl, KCl 投与を行つた場合には、正常ラット副腎と同様に球状帯に若干特異的な変化を認めた。以上の点より、再生初期には組織学的、組織化学的にも球状帯と束状帯とは明確に分離出来ないと共に、機能的にもはつきりした局在性が認められない様である。しかし再生が全く完成してから、初めて外層部と内層部の機能局在性が現われる様に思われる。これ等の点は Deane 一派が強く主張している皮質二元論には異論が存するもので、球状帯細胞も束状帯細胞も本は同一系統の細胞であるものと考えざるを得ない。また副腎 Enucleation のときに特に興味ある事実は、皮質

細胞の未だ極く僅かな再生期に, fat factor が正常以上に増加する点であり, これは比較的少量の皮質成分でも比較的大量の皮質ホルモンを分泌する能力があることを示すものとして注目に値する事実である (Hartman, Brownell and Knouff 1947)⁹⁶⁾. 更にこのことはホルモンの分泌は必ずしも内層部の細胞のみで行われるものでないことを示すものである. また gluconeogenetic factor の方は Enucleation 後1ヶ月で最高となり, 上述 fat factor と gluconeogenetic factor との2つの異つたホルモンが, 夫々2つの下垂体向副腎皮質刺激ホルモンによつて支配されていることを示すものと考えられている (Brownell and Hartman 1948)⁹⁷⁾.

要するに Enucleation 後の再生期に於ける副腎皮質機能は正常の場合とはかなり異なるもので, かかる状態から副腎皮質内外二層の分泌機能を分析することは無理なようである. 即ち小数の皮質細胞でも, かなり高度の皮質機能代償が行われるものの如く考えられる. Greep and Deane (1949)⁸⁶⁾も Enucleation 後1ヶ月も経てば, 組織像の上でも, また機能的にも元の副腎皮質の状態にかえるものとしているが, 一方 Ingle, Li and Evans (1946)¹¹⁰⁾は数ヶ月前に Enucleation を行つた老年ラットは大量の ACTH を毎日投与しても, 極めて少いか, または全く反応しない事実をあげている. これらの点については, 更に検索を要する点である.

体重曲線

副腎を剔出すれば, 動物は漸次悪化する進行性の副腎脱落症状を呈し, 大抵は1~2週間で死亡する. その致死原因は副腎皮質の脱落であつて, 髄質でない点は多くの人々によつて主張されてきた.

副腎を両側共に剔出すれば, 一般に体重は減少するが, これは脱水によるものとされている (Hartman 1949)⁹⁷⁾. Enucleation の場合には, 殆んど体重の減少は認められず, 倉田 (1952)¹³³⁾も正常発育曲線を示すことを述べている. 併し私の実験結果では, 雄ラットは雌ラットよりも体重の増加が著明である. この事実はかかる時期には皮質ホルモンの不均衡があり, 雄の場合特に性ホルモンが関与しているためかも知れない.

Enucleation 後の再生に及ぼす条件

正常ラットでは一側副腎を剔出すれば, 他側が代償性に肥大することが知られている (Mac Kay and Mac Kay 1926¹⁴⁸⁾, Mac Kay and Pollard 1931¹⁴⁹⁾, Carlson 1931¹⁸⁶⁾, Swinyard and Bruner 1940²⁰⁵⁾, Tepperman, Engel and Long 1943²⁰⁹⁾, Miller 1950¹⁵³⁾). この場合組織学的に束状帯細胞の肥大が顕著であるが, Miller (1950)¹⁵³⁾はマウスで, Swinyard and Bruner (1940)²⁰⁵⁾は犬で球状帯も正常より広くなり, ミトコンドリアも増殖する点, 他の Stress とは異なるものである. また Tobin (1939)²¹⁰⁾は胎生ラットの片側副腎剔出の場合も球状帯は巾が増加するものとしている. 一般に一側副腎剔出による他側の代償性肥大は, 下垂体剔出の場合には認められず, やはり下垂体を介する肥大と考えられている (Tepperman, Engel and Long 1943²⁰⁹⁾, Miller 1950¹⁵³⁾). Gemzell, van Dyke, Tobin and Evans (1951)⁸⁰⁾は両側副腎剔出を行えば, 下垂体 ACTH の分泌を促し, 末梢血 ACTH の量も増加する, それで多分一側副腎剔出のときにも, 同様な ACTH の上昇を示すものであろうと述べている. Enucleation の初期には殆んど副腎剔出の状態に近いから, 大量の ACTH が分泌されるであろうことは想像に難くない. 鈴木 (1952)²⁰³⁾もかかる検索を Enucleation ラットの下垂体を検索して述べている. 併し一側副腎を残存しておけば, Enucleation の再生が著しく抑制される. Ingle and Higgins (1938) a¹⁰⁰⁾も一側健在のときは再生は全くおこらず, またおこつても僅かであると述べている. 移植の場合も一側副腎が残存しておれば, 再生は行われないことも知られている (Ingle and Higgins 1938 b¹¹⁰⁾, Wyman 1928²³¹⁾). これらの事実は Enucleation 副腎の再生を刺激するには, 一側副腎剔出時に於ける他側代償性肥大に要する ACTH よりも更に大量の ACTH の分泌が必要であらうと考えられるのである. Ingle and Higgins (1938) c¹¹¹⁾は再生速進過程は下垂体 Adrenocorticotrophic hormone によるもので, 一側健在の場合にもサイロキシシン等を投与すると, Enucleation 側の球状帯 capsular remanent を刺激すると述べている. 一側健在の場合には, 組織学的に再生が悪く, 特に中心部には萎縮性の D細胞の出現を認めたのはやはり, ACTH の分泌が内層部細胞まで再生を遂行するには不十分な量であつたことを示すものと思われる.

正常動物で一側副腎剔出を行えば、他側の球状帯も幾分肥大する。Enucleation の際には、残存側副腎の球状帯がかえつて萎縮している点は興味がある。

第5章 要 約

1. 副腎を被膜のみ残して Enucleation の処置を施しても、動物は何等副腎不全の徴を呈することなく、体重増加も顕著である。被膜から再生した極少量の皮質細胞でも、充分生命維持に必須な皮質ホルモンを分泌し生体を維持することが出来ると考えられる。

2. コルヒチン を投与することによつて副腎 Enucleation 直後では、被膜内に数多くの核分裂像を認めることが出来た。更に日を経過すると共に、被膜内の核分裂像は少くなり、皮質全般に増加してくる。かゝる Enucleation の実験より、皮質細胞は明かに被膜細胞から増生する事実を知つた。

3. 尚副腎 Enucleation の実験では、皮質細胞は、①被膜内の mitosis により、②被膜細胞の皮質細胞への metamorphosis、③皮質細胞の mitosis、④被膜から結合組織が皮質内に進入し、その中の皮質原基から metamorphosis により増生する四つの増殖形式が認められた。

4. Enucleation 後皮質細胞は周辺部から再生するが、30日位で層形成が完成する。この初期に於ては球状帯と束状帯との区別は不明瞭であり、かゝる再生期には、球状帯の塩類による特異的变化は認められなかった。Thorn test は25~30日目に陽性となり、副腎皮質機能もこの時期に至つて、略々完全に再生するものと思われる。即ち再生初期には、皮質機能の局在性は認められない様であり、全皮質が完成して後に、皮質機能局在性が認められるようになるものと思われる。

5. Enucleation 後の再生過程には、極めて大量の下垂体ホルモンを要するものと考えられる。

第2編 副腎皮質の自律性

第1章 緒 言

多くの動物では、副腎剔出によつて短期間の内に死亡するが、その支配中枢である下垂体剔出の場合にはかえつて長期間生存し得る (Swann 1940)²⁰⁴⁾。これは下垂体切除によつては、副腎皮質ホルモンの内、蛋白、糖代謝によるホルモンの分泌が障碍されるのみで、副腎皮質の塩類・水調節ホルモンの分泌は障碍されないためと説明せられている (Ingle 1942)¹⁰³⁾、Swann 1940²⁰⁴⁾。即ち下垂体は諸種内分泌腺の中枢として、各種ホルモン分泌の調節に与るが、副腎皮質の塩類・水代謝ホルモン等生命維持に必要なホルモン分泌は下垂体の支配を受けていないと思われるためである。組織学的検索の上から、副腎皮質機能がどの程度まで下垂体に支配され、またどの程度までが下垂体の支配を受けていないかという点を知ることが、甚だ重大な課題ではあるが、また非常に困難な研究でもある。それは下垂体剔出によつて、他のすべての内分泌臓器も著しい影響を蒙るために、副腎のみに出現する変化を指摘することは不可能に近いと考えられる。しかし実際に、下垂体剔出実験によつても、副腎皮質に現われるかなり興味ある所見を掴み得るのである。

諸種内分泌腺の中でも副腎は多くの動物に於て、特に下垂体の支配を強く受けているもので、実験的に下垂体剔出、または下垂体に広範な機能障碍を惹起せしめるが如き病変が存在する時には副腎皮質は極度に萎縮を示す (Smith 1926¹⁹⁾、1930²⁰⁰⁾、Collip 1933⁴⁰⁾、Schaffer 1933¹⁸⁴⁾、Shumacker and Firor 1934¹⁹⁶⁾、White 1933²¹³⁾、Perla 1935¹⁶⁹⁾、Mc Phail 1935¹⁵¹⁾、Cutuly 1936⁴³⁾、Riddle 1937¹⁷⁴⁾、Crooke and Gilmour 1938⁴²⁾、Meyer, Mellish and Kupperman 1939¹⁵²⁾、Miller and Riddle 1939¹⁵⁴⁾、Deane and Greep 1946⁴⁶⁾)。

下垂体剔出による副腎の萎縮は皮質の萎縮に基くもので、髄質は殆んど変化を受けないものと云われている (White 1933²¹⁸⁾、Mcphail 1935¹⁵¹⁾、Crooke and Gilmour 1938⁴²⁾、Smith 1946²⁰²⁾、Feldman 1951⁷⁴⁾)。勿論下垂体剔出後長期に亘れば、髄質も幾分萎縮を示すが、皮質の変化ほど著明ではない (Smith 1930²⁰⁰⁾、Cutuly 1936⁴³⁾、Reese and Moon 1938¹⁷³⁾)。

皮質の中でも特に束状帯、網状帯の萎縮が著しく、これに反して球状帯は殆んど正常、またはかえつて肥

大するものと云われている (Crooke and Gilmour 1938⁴², Housay and Sammartino 1933¹⁰³, Sarason 1943¹⁷⁶, Deane and Greep 1946⁴⁶, Deane, Shaw and Greep 1948³², Greep and Deane 1949⁶¹, Schweizer and Long 1950¹⁸⁶, Miller 1950¹⁵³, 大森¹⁶⁰). また Deane and Morse (1948)⁴⁹は下垂体剔出によつて球状帯はかえつて厚くなり, アスコルビン酸も残存し, Evans and Li (1943)⁷⁰は球状帯のズダン顆粒, 自働螢光性, 重屈折性は変化されずに残存することを述べている. 下垂体剔出によつて, 束状帯からはアルカリ・フォスファターゼは消失するが, 球状帯には残存することも知られている (Dempsey, Greep and Deane 1949)⁵⁵. 下垂体剔出時には, これら組織学的, 組織化学的に束状帯は殆んど機能が停止する所見を呈するが, 球状帯は少しも機能低下の像を現わされないものであつて, このことは球状帯は少くとも副腎皮質束状帯や網状帯よりも下垂体の支配を受ける影響が少いものと推定され得る. そして最近多くの人々により球状帯は塩類・水代謝と密接な関聯がある如く実験的に立証されている (Orient-Keils, Robinson and Mc Collum 1937¹⁸⁷, Miller and Riddle 1942¹⁵⁵, Deane and Greep 1946⁴⁶, Greep and Deane 1947⁵⁹, Deane, Shaw and Greep 1948³², Deane and Masson 1951⁴⁷, Badinez and Croxatto 1948¹⁷, Nichols 1948¹⁶⁴, Miller 1950¹⁵³, Bacchus 1950¹³, Bacchus 1951¹⁴, Knowlton, Loeb, Steegal and Stoerk 1949¹²⁸, Jones 1950¹¹⁹, Bacchus, Heiffer and Altszuler 1952¹⁵, Eichner 1953⁶⁵). 実際下垂体剔出によつても副腎機能は全く停止するものではなく, かゝる萎縮副腎でも幾分かホルモンを分泌すると云われる (Ingle 1942¹⁰⁸, Hartman 1949⁷⁷). かゝる場合に, 球状帯が分泌機能を発揮しているものと考えるのが最も妥当である. また Cortisone を投与した場合には, 束状帯のみが萎縮し, 球状帯は殆んど変化しないことが知られており, この点は下垂体剔出の場合と同様である (Wells and Kendall 1940)²¹⁶.

これらの実験的な根拠の本に Deane 一派は副腎皮質二元論 (zonal theory) を主張するに到つたのである. 即ち束状帯は下垂体前葉 ACTH の支配の下に糖質コルチコイドを分泌し, 球状帯は下垂体の支配を受けることなく, 自律的に鉱質コルチコイドを分泌するという説を押し進めて行つた. 球状帯が鉱質コルチコイドを分泌するという点は, 実験的に Na 缺乏食の場合に束状帯には何等変化がおこらず, 球状帯のみが撰択的に肥大し, 機能亢進像を呈し, また K 缺乏食の時には逆にこの層が撰択的に萎縮し, 機能低下像を呈する. また鉱質ホルモンである DOCA を投与した場合には, 球状帯のみが特異的に廃用性萎縮におちいる事實は, この層が鉱質コルチコイドを分泌することを間接的に物語るものとされている. この事實はその後も多くの人々により追試実証され, 一般に球状帯は血中 Na/K 比によつて, そのホルモン分泌が自律的に調節せられ, 従つて球状帯は血中 Na/K 比の変動によつて, 或いは肥大, 或いは萎縮するものと考えられている (Deane, Shaw and Greep 1948³², Badinez and Croxatto 1948¹⁷, Nichols 1948¹⁶⁴, Knowlton, Loeb, Steegal and Stoerk 1949¹²⁸, Bacchus 1950¹³). また副腎剔出による動物の死因が塩類代謝失調 (Swann 1940²⁰⁴)であることを考え合すと, 球状帯は下垂体の支配を受けることなく自律的に鉱質コルチコイドを分泌するという仮説は容易に納得出来よう. これらの関係は殆んどラットについての実験結果に基いているが, ラット以外の動物でも, 犬・モルモット・マウス等に於て, 球状帯は下垂体に支配されず, 自律的に機能を営むものと考えられている (Housay and Sammartino 1933¹⁰³, Knowlton, Loeb, Stoerk and Seegal 1947¹²⁷, Schweizer and Long 1950¹⁸⁶). また幼若ラットについても, DOCA は球状帯を萎縮せしめるものであると述べている (Rennel 1952)¹⁷³. そして Miller (1950)¹⁵³は球状帯の刺激は, ACTH によつておこらぬことを述べている. 実際 ACTH はラットの電解質には, 殆んど影響を及ぼさぬと云われている (Ingle, Li and Evans 1946¹¹⁵, Ingle, Prestrud, Li and Evans 1947¹¹⁶, Bergner and Deane 1948³³). それがために球状帯の自律説は, 多くの人々により強く認められている (Deane, Shaw and Greep 1948³², Nichols 1948¹⁶⁴, Ducommun and Mach 1949⁶¹, Daughaday and Mac Bryde 1950⁴⁵). 併しこの仮説には, 未だ賛否両論があつて激しい論争が繰返され, 多くの学者 (Selye et al. 1950)¹⁹⁵は此の仮説を肯定するには未だ極めて慎重な態度を示している. また Deane 一派は, 球状帯と束状帯とは, 構造・機能・origin 共に全く異つた二元的構成よりなるものと述べているが, この主張に対しても強い反駁がある. 即ち Stress または ACTH 投与時には束状帯が肥大して機能亢進像を示すのは勿論であるが, この場合球状帯にも幾分変化が惹起される (Moon 1940)¹⁵⁹, また下垂

体剔出ラットに純粋な ACTH を投与した場合、球状帯に変化がおこることも知られている (Wexler 1955)²¹⁷⁾。特に ACTH を長期間投与した場合には、球状帯は非常にうすくなり束状帯細胞の形態に似てくると云われている (Baker 1952)¹⁸⁾。これらの点は従来から説えられている escalator theory が適合するもののようで、球状帯細胞も束状帯細胞も一元的な細胞で、外方から内方に移行する life history の一段階に過ぎないものようである。Baker (1952)¹⁸⁾、Ingle (1942)¹⁰⁶⁾等によれば、これらの細胞を外層部から内層部に移行する過程は、ACTH によつて行われるものとしているが、下垂体欠損時にはこの増生過程が全く行われないと述べている。併し、球状帯細胞が諸家の述べている如き自律性格の強い細胞であるとすれば、ここから更に内層への移行は行われないとしても、被膜から球状帯までの移行過程は当然遂行されるべき筈のものである。併しこれらの詳細な層形成過程機構の検索は、従来何人も触れられずに来ている。私は本編に於ては、下垂体がない状態下に於ても、球状帯細胞のみは層形成を遂行し得るや否やの問題を、下垂体剔出ラットに副腎 Enucleation を行い検索してみた。

第2章 実験材料及び実験方法

実験動物は雄・雌ラット体重150g前後のものをを用いた。下垂体剔出術は慈恵中尾教室の方法により、エーテル麻酔の下で、気管枝側から行つた。下垂体剔出後3日後に前編同様の操作の本で副腎 Enucleation を行つた。尚此の場合は、第1編実験群に比し死亡率が著しく多く、特に動物の保温に留意し、副腎不全を防止するために3日間1%食塩水を5cc皮下に投与した。本編実験ラットの中、雄ラットは12匹中殆んど5~6日以内に死亡し、1匹のみが生存し、雌ラットは20匹中8匹生存し得た。そのため本編実験結果は主に雌ラットの成績である。

副腎 Enucleation の術式は特に慎重を期し、右側は剔出し、左側の Enucleation を行つた。副腎被膜下の皮質細胞の残存を極度に最小限に止めるため、Enucleation 時には、被膜嚢内を数回生理食塩水で洗い流し、殆んど被膜のみとなる様に努めた。且つ2~3匹のラットは3日目に殺し、組織学的に検索し、殆んど残存皮質細胞がないのを確めた。

動物は副腎 Enucleation 後15日目に5匹、21日目に3匹屠殺し、再生副腎は精確に torsion balance で計測し、一部はブアン固定、一部は10%中性ホルマリンで固定した。ブアン固定のものはパラフィン切片によりヘマトキシリン・エオジン染色を、中性ホルマリン固定のものは氷結切片 (15 μ) により Sudan IV, Schultz, Schiff, 重屈折性、及び Nile blue 染色を行つた。また下垂体剔出の有無は屠殺時に綿密に確めた。

第3章 実験結果

再生副腎重量

すべての例に於て再生副腎重量は著しく小さく、15日目のものは平均3mg、21日目のものも3mg前後にして、その間に殆んど重量の増加を認めなかつた。また15日目群の1例に於て、腎臓附近に粟粒大の傍副腎の形成を認めた。

組織学的所見

15日目の副腎被膜は著しく膨化しており、巾が著しく厚く、一般に被膜細胞は比較の数が多い。しかも被膜の外層部と内層部とは、明確に差があり、内層部に於て比較の細胞数が多い。被膜下にはかなりの巾の再生皮質細胞が認められ、再生副腎の大部分を占めるR細胞が20個分の厚さに亘つて配列している。再生皮質細胞の大きさは幾分小さく、被膜直下から一列に索状に配列する傾向を示し、著しく密に存在している。これらのR細胞層の内側には、第1編に於て述べたと同様の極めて少数のD細胞群、または結合組織がみられ、副腎の中心部を占めている。R細胞は組織学的に二層を区別することは出来ず、中心部のD細胞群とははつきり分割されており、移行層に相当する層は全く認められない。R細胞は一般に Sudan IV 染色により、うすく瀰漫性に染り、リポイド顆粒は極めて微細である。尚 Schiff, Schultz 重屈折性も略々同様な所見を呈するが、Sudan より Schiff 反応の方がかなり強く染つている。しかしR細胞の中でも処々に粗大顆粒を

有する細胞が少数ではあるが認められる。D細胞は Sudan IV 染色で粗大滴状に濃染し、また Schiff, Schultz 重屈折性も Sudan IV 染色よりは弱い陽性に染る。また被膜内に於ても一部 Sudan IV, Schiff 反応が強く粗大滴状に染るものが認められた。中心部のD細胞及び結合組織中には黄色の色素が著しく多く認められ、これらの色素は Sudan IV に染らなかつた。21日目群の副腎に於ても、15日目群と全く同様であり、その間に層形成の進捗したと思われる所見は認められなかつた。

第4章 考 案

副腎皮質の層形成には下垂体前葉の ACTH が必須であつて、下垂体剔出時には層形成過程が行われないことが Ingle and Higgins (1938 a)¹⁰⁹⁾, Greep and Deane (1949)⁶⁷⁾ により述べられている。また副腎被膜から皮質細胞に metamorphosis を行うためにも、更にまた皮質細胞の増殖が行われるためにも ACTH が必要であることが述べられている (Baker 1952)¹⁸⁾。併し私の実験結果では、下垂体のない状態下に於ても被膜から皮質細胞への metamorphosis 及び増殖がある程度行われることを示し、このことは球状帯に相当する皮質細胞は自律的に増殖しうる可能性を立証し得る。しかしかゝる状態下に於ては、更に内層の皮質細胞への増殖は不可能であることも分る。下垂体缺損時に出来上つた再生副腎は、下垂体剔出時の萎縮性副腎皮質に極めてよく類似している。この場合外層部に再生した皮質細胞は幾分束状配列の傾向を示すが、やはり球状帯細胞と思われる。それは下垂体剔出時の萎縮性副腎皮質に於ても、球状帯細胞は巾が幾分広くなり、束状配列の傾向を示すものであり、この実験の場合に於ける R 細胞と極めて類似した像を示す。それでこの場合の R 細胞はやはり球状帯に属する細胞群と断定してよいと思う。一方中心部を占める D 細胞は組織学的、組織化学的にも下垂体剔出時にみられる萎縮性束状帯細胞に相当している様に思われる。唯細胞の配列の上からは、かゝる再生皮質細胞は球状帯の細胞なのか、または束状帯の細胞なのかは断定することは出来ない (かゝる缺点是 Dr. Laquer よりも個人的に指摘されている)。併し私はこの二層の決め手となる他の根拠を示し得るのである。それは第4編の実験に詳述する如く、かゝる動物に ACTH を連続投与すれば、上述の如き被膜下の R 細胞群の下に更に新しい一つの層が形成され、これが組織学、組織化学的に束状帯であることが判明出来るのである。即ち ACTH が投与されない場合には束状帯細胞が出来ないことを確めている。この場合束状帯に相当する層は、中心部を占める D 細胞群の部位に認められる。

副腎の発育期に於ける下垂体の影響については、Domm and Leroy (1951)⁵⁸⁾, Jost (1948)¹²⁰⁾ は胎生のラット、ウサギの下垂体を decapitation により剔出すると副腎の発育が遅延することを述べている。かゝる動物副腎はすべての層の細胞と核が小さく、リポイドが少いと云われている。そして Kitchell and Wells (1952)¹²⁴⁾ は、外層部細胞を内層部細胞へ metamorphosis するのを遅延する結果であるとしており、ACTH がかゝる遅延を防ぐものと考えられている。かゝる事実は副腎 Enucleation 後の再生期に於ける私の実験結果と極めて類似した所見である。

また副腎 Enucleation 後の皮質細胞の再生機転は、副腎移植時の皮質細胞再生機転に非常によく似ているものであるが、Enucleation の場合には手術的に皮質髄質共に剔出するのであり、移植の場合は皮質髄質の大部分が壊死に陥り、次で吸収され、その後皮質細胞が周辺部から新しく再生してくることに於て全く類似している。

併し Brenner (1954)³⁰⁾ は副腎移植時に皮質細胞は、次の如き段階を経て成熟皮質細胞に発育することを述べている。即ち被膜に附着している球状帯細胞は、初めの1~2日は、① static glomerulosa cell に入る。この時期にはかえつて細胞内にリポイドの蓄積がみられるという。② 3~6日にして transitional glomerulosa cell となり再生が初る。③ 7~10日にしてリポイド顆粒を含まない empty cortical cell に変り、④ 11~14日にして微細顆粒を含む granular cortical cell になり、⑤ 16~21日にして mature cortical cell が出来上るものとしており、Enucleation の際にも此と同様な再生過程を示すものとしている。7~10日目に相当するリポイド顆粒の含まれない empty cortical cell は、已にホルモン分泌能力があると考えられている。これは細胞がホルモンの前段階物質を急速に放出するために、細胞内にリポイド滴を蓄積するといま

がないためと説明せられている (Brenner 1954)⁸⁰⁾。

私の下垂体剔出副腎 Enucleation の実験時に再生する皮質細胞は、細胞内に殆んど Sudan 顆粒を認めず、Schiff 反応がかなり高度である状態で、上述の empty cortical cell 乃至は granular cortical cell の時期に相当するものである。Komard and wyman (1951)¹³²⁾は副腎移植後10日目 (empty cortical cell の時期) で已にヒスタミン Stress に対する防止作用があり、これは再生皮質細胞が已に分泌機能を發揮しているためと考えられている。それ故この場合の Enucleation 再生副腎も組織像の上からは、已に分泌機能を發揮しているものの如く考えられよう。しかもこの場合の再生皮質細胞は下垂体のない状態下に於て自律的に再生した球状帯細胞である点を考え合すと、これら再生皮質細胞は自律的に電解質・水代謝ホルモンを分泌することは想像に難くない。

DOCA 及び KCl の球状帯に及ぼす影響は下垂体剔出ラットに於ても認められることから、Deane 等 (1948)⁷²⁾はこの球状帯は DOCA 様物質を下垂体の支配を受けずに自律的に分泌することを述べている。Stress や Estrogen による副腎皮質 (束状帯) の肥大作用は下垂体 ACTH を介して行われるもので、これは下垂体剔出ラットに於ては、Stress や Estrogen によつて副腎皮質は全く反応しない点からも明かである (大樋 1956)¹⁶⁵⁾。これ等の点から球状帯に及ぼす変化は下垂体を介せずに直接副腎に作用するもののようであり、また下垂体以外の中介によつて支配されているものとも考えられる。

併し一方、副腎皮質の増殖機能と分泌機能とを別個に取り扱うべきものであり、軽々しくかゝる結論を下すことは出来ない。副腎皮質の分泌機能を組織学的、組織化学的に云々するには常に皮質細胞の大きさや、リポイド顆粒等の分泌顆粒の状態等のみを指標としているのみで、あくまでこれは間接的な指標に過ぎない。かゝる点に形態学的に副腎皮質機能を論ずる一つの困難性がある。更に皮質細胞の再生増殖は下垂体がなくとも自律的に行われ得るが、機能的再生は下垂体がなくとも行われ得るや否やについても疑問がある。この実験では確かに増殖の面に於ては球状帯が下垂体とは独立的に再生しうることを示し得るが、機能の面に於ては、間接的にその自律的再生をうかがい知るのみで、この点は更に他の方面からも裏付けを必要とする。

Sayers (1948)¹⁷⁹⁾は副腎皮質の自律性という点に関しては、副腎皮質のすべての面に於て全く否定的な見解を示しているが、増殖の面については明かに Sayers の主張は正しくないものと結論することが出来る。併しまた Sayers は ACTH を皮質ホルモンの前段階物質から皮質ステロイドに変える一種の catalyst と解釈し、ACTH が存在しない場合でも皮質ステロイドの合成過程は遅くではあるが、全く停止することはなく徐々に続けられると述べている。それ故副腎剔出の場合には、動物は短期間に死亡するが、下垂体剔出の場合には長期間生存しうるものと説明している。かゝる Sayers の見解よりすれば、再生皮質細胞は下垂体がなくとも、皮質ステロイドを合成が可能な事も推察してよい筈である。ともあれ、この実験結果の如く下垂体剔出時に於ても、分泌機能を有すると思わしめる如き皮質細胞の再生増殖が自律的に行われることは、副腎皮質細胞の自律性という問題に新しい根拠を示し得るものと思う。

元来副腎皮質周辺部の球状帯細胞は幼若な細胞と考えられており、かゝる細胞は中枢性の支配を受けることなく自律的であることは、Selye and Stone (1950)¹⁹⁵⁾によつても想像されている。哺乳動物以外にも Miller and Riddle (1943)¹⁵⁶⁾はハトに於て、下垂体を剔出すると皮質の中心部は萎縮するに反し、球状帯に相当すると思われる周辺部細胞は萎縮しないことを述べている。私の実験からも副腎皮質外層部の細胞は束状帯細胞とは幾分異つた性格を有することが推測される。下垂体切除時に於ても被膜から球状帯細胞までの escalate は行われ得るが、球状帯以後の細胞の進行は下垂体がない場合には行われないものと思われる。Sarason (1943)¹⁷⁰⁾は正常副腎皮質に於ては幼若な球状帯細胞が増殖して、成熟した内層部細胞におき代つて行くが、下垂体を剔出すれば未成熟のまま死滅するものと解している。かゝる見地からすれば、かゝる下垂体剔出、副腎 Enucleation の場合中心部に出現する D 細胞は、球状帯下部に於て死滅変性した皮質細胞に属するものと思われる。特にこれ等の D 細胞内には、黄色の色素が多数認められるのが特徴である。Hoerr (1931)¹⁰¹⁾によれば人、モルモットの副腎網状帯にかゝる色素が多数みられるもので、細胞変性の場合出現するものと解している。また Sarason (1943)¹⁷⁶⁾は下垂体剔出時には、束状帯の内層にかかると黄褐色の色素

が多数出現することを述べている。またD細胞内には、pyncotic, extruded の核が多数出現している。一般に下垂体剔出時には、網状帯内にかゝる piknotic, extruded の核が多数出現するものと云われている (Smith 1930²⁰⁰), Crooke and Gilmour 1938⁴²), Sarason 1943¹⁷⁶)。色素の出現や、細胞、核の崩壊像等から推しても、これ等D細胞は変性萎縮に陥つた細胞群であることが容易に想像出来る。Hoerr (1931)¹⁰¹)によれば、副腎皮質内層部が変性する場合には、次の二型の中何れかの型をとると述べている。

- ① cytolysis, chondroriolysis, Karyolysis, loss of lipid and pigment
- ② shrinkage, homogenerization of the cytoplasm, chondrimegaly, pycnosis, retention or increased of lipid and pigment.

このD細胞の場合にはむしろ後者に属する変性像に近い。

以上の如く、副腎皮質外層部の細胞は自律的で ACTH の支配を受けることが少ないものと思われるが、一方この部の細胞も ACTH により、かなり変化すると云われる報告がある。即ち下垂体剔出によつて球状帯も幾分萎縮するというもの (Lane 1951¹³⁴), Earle et al 1951⁶³), Feldman 1951⁷⁴), Lane and Debodo 1952¹³⁷), ACTH 投与によりラット副腎球状帯が肥大すること (Feldman 1951)⁷⁴), Golgi 装置が肥大すること (Reese and Moon 1938)¹⁷¹), ACTH によりマウス副腎球状帯のリポイドが変化すること (Jones 1949)¹¹⁸)等である。また胎生ラットは ACTH によつて、束状帯は勿論球状帯も肥大すると云われている (Kitchell and Wells 1952)¹⁴⁰)。即ち ACTH は厳密に見て球状帯には全く変化を及ぼさぬものでは決してなく、この点に関しては第4編に改めて検討している。一般に球状帯は下垂体の支配を受けないというのと、下垂体の支配がなくとも自律的に増殖し機能を果すというのでは、厳密に区別すべきであつて、私の実験では後者が正しいと思われる。球状帯は明かに ACTH によつても変化するものであつて、球状帯には常に自律性格+ACTH の作用が加わっているものと云わねばならぬ。この点束状帯の場合は球状帯とは全く異り、ACTH によつて初めて増殖し、機能を発揮する様に思われる。

人の場合に於ては、束状帯と球状帯との態度を検索することは一層困難であり、また複雑でもある。人の場合には、ACTH によつて糖質代謝のみなく、sodium retention のおこることが知られている (Forsham, Thorn, Prunty and Hills 1948⁷⁶), Conn et al 1948¹¹)。人体副腎の組織像については教室島本 (1955)¹⁴⁷)が述べている如く、諸種の因子の介入によりラットに於けるほど各層の反応態度は明確でなく、特に慢性疾患の場合には球状帯にも変化がみられることが多いと云われる。また人体に於ては、動物実験に於て観察出来る如き条件のものは極めて少く、皮質細胞が自律性を有するや否やを検索することは極めて困難である。唯両眼融合児の場合には、しばしば下垂体の缺除することが報告されている。Edmonds (1950)⁶⁴)はかゝる例に於ては、副腎皮質細胞の发育は極めて遅延しており、皮質は非常にうすいと述べている。併しこの皮質細胞は、下垂体がなくとも自律的に出来上つたものか、または母体の ACTH が胎盤を介して胎児の副腎層形成に与つたものか、現今では之を判定する手段に缺けている。また最近胎盤内には ACTH が含まれる点が知られているが (宮川 1953¹⁵⁸), 赤須 1954¹¹), 赤須, 竹内, 宮川 1954²⁰), かゝる ACTH が胎児副腎に作用し得ることも考えられる。

第5章 要 約

1. 下垂体剔出時に於ても、球状帯細胞は副腎被膜から再生され得る。
2. かゝる再生副腎皮質細胞は微細な Sudan 顆粒, Schiff, Schultz 陽性顆粒を有し、重屈折性陽性にして、自律的に分泌機能を有することも想像出来る。
3. 下垂体剔出時に於ては、束状帯細胞の再生は行われない。

第3編 副腎皮質細胞増殖に及ぼす各種ホルモンの影響

第1章 緒 言

副腎皮質機能は下垂体前葉 ACTH の支配を受けていることは、今日明かな事実となつているが、副腎皮質細胞の増殖は如何なる ホルモン によつて支配されているであろうか。Greep and Deane (1949)⁸⁵⁾ 及び Ingle (1938 a)¹⁰⁹⁾ は、下垂体 ACTH が再生増殖を促進するものとしている。従つて、下垂体 ACTH の分泌を亢進せしめる如き Stress やホルモン投与は、また副腎皮質の再生を促進するように考えられている。即ちサイロキシンや四塩化炭素は下垂体 ACTH の分泌を亢める結果、副腎皮質機能を亢進せしめるが、副腎 Enucleation 後の再生過程にも著しく促進的に作用することが知られている (Ingle and Higgins 1938 c¹¹¹⁾)。また Cortin の経口投与は副腎皮質機能を低下せしめるが、Enucleation 後の再生過程をも著しく抑制することが知られている (Ingle and Higgins 1938 a¹⁰⁷⁾, Higgins and Ingle 1938⁹⁸⁾)。かゝる点から正常副腎皮質を肥大せしめる如き要因は、副腎 Enucleation の再生にも促進的に働くことが想像されている (Ingle and Higgins 1938 c¹¹¹⁾)。即ち生体の皮質ホルモン要求を必要とする如き条件が、副腎皮質細胞の再生を促進せしむる結果となるものの様である。併しまた一方副腎皮質細胞の増殖には ACTH 以外のホルモンによつても影響を受けているのではないかという疑問もある。併しかゝる検索は、従来殆んど行われておらず、ACTH のみが副腎皮質細胞に影響を及ぼす唯一のホルモンの如く固く信じられてきている。それで私は副腎皮質の機能と増殖との二面から、この問題を検索してみた。

副腎皮質機能に関しては、従来から下垂体 ACTH によつて強く支配されていることは周知の事実であるが、各種ホルモン環境によつても大きく修飾を受けている。森教授 (1955)¹⁶⁰⁾ はつとに内分泌自律神経環境説を説かれ、個体が恒常性を維持するためには、絶えず内分泌自律神経相互間の緊密な協調の必要性を主張せられている。また諸種ホルモン投与環境下に於ける副腎皮質機能の検索については、教室大樋 (1956)¹⁶⁵⁾ が詳述しており、私は主として諸種ホルモン投与環境下に於ける副腎皮質の増殖の点に主眼をおいて検索してみた。

一般に下垂体前葉から出される ACTH は、その標的臓器である副腎皮質のホルモンの血中濃度により自己調節が行われているもので、このことはすべての内分泌腺と下垂体前葉 trophic hormone との関聯に於て共通的な原則である (Greep and Jones 1950⁷⁾, Sayers 1950¹⁰⁹⁾)。即ち副腎皮質の著しい萎縮は大量の副腎皮質ホルモンの投与により惹起されるが、これは副腎皮質ホルモンが下垂体前葉に作用して ACTH の分泌を抑制する結果と考えられている (Ingle and Kendall 1937¹¹⁴⁾, Ingle, Higgins and Kendall 1938¹¹³⁾, Ingle 1939¹⁰⁶⁾, Wells and Kendall 1940¹¹⁶⁾, Sarason 1943¹⁷⁶⁾, Antopol 1950¹⁰⁾, Sayers and Sayers 1947¹⁷⁸⁾)。副腎皮質ホルモン投与による ACTH の分泌抑制作用は Stress の際にも認められ、予め副腎皮質ホルモンを投与することによつて、Stress によつて惹起する副腎皮質肥大やアスコルビン酸の変動が防止されると述べられている (Long 1947 a¹⁴¹⁾, Long 1947 b¹⁴²⁾, Ingle 1938¹⁰⁵⁾, Sayers 1948¹⁷⁹⁾)。

ステロイドホルモンの中でも Folliculoid は副腎皮質の著しい肥大と機能亢進像を惹起するが、これは下垂体 ACTH を介しておこる変化と考えられている (Allen and Bern 1942⁶⁾, Selye and Stone 1950¹⁹⁵⁾, 大樋 1956¹⁶⁵⁾, 土居 発表予定)。このことは下垂体剔除動物に Folliculoid を投与しても、副腎皮質は何等肥大せぬことから明かである。一方男性ホルモンはむしろ副腎皮質を萎縮せしめるもので、下垂体 ACTH の分泌機能を抑制するためによると考えられている (Selye 1949¹⁸⁹⁾, 1950¹⁹⁰⁾)。

併し Testoid の作用には、下垂体を介せずに直接副腎皮質に作用する機序も知られており、Folliculoid とはちがつて特異的なホルモンに属する。私は Testoid のかゝる特異的な面を、副腎 Enucleation 後の再生増殖過程に於ても促えることが出来た。これは Sayers (1948)¹⁷⁹⁾ が従来から述べているように、ACTH は副腎皮質の機能並びに増殖のすべてを司る唯一の因子という主張には、同意出来ぬ点でもある。また Sayers のかかる ACTH 一元論に反駁する事実としては、Dixon (1951)⁵⁷⁾ により下垂体前葉抽出物中には、少くと

も2つの因子が存在するという報告である。即ち1つはむしろ副腎皮質重量増加作用があり、1つはアスコルビン酸減少作用が強く、前者はおそらく成長ホルモンと考えられている。成長ホルモンについても、副腎重量増加作用が知られているが、これは他の臓器の重量増加と平行した増加と云われている。それ故、私は他の臓器重量も比較しつつ成長ホルモンの作用を検索した。

第2章 実験材料及び実験方法

実験動物はすべて100~130gの雌雄ラットを使用した。副腎 Enucleation の方法は、第1編と同様で、右側副腎は剔出し、左側副腎の Enucleation を行つた。動物は11群に分ち、下記の如き各種ホルモン投与及び去勢を行つた。

- 第1群 副腎 Enucleation 無投与(対照)
- 第2群 副腎 Enucleation+ACTH
- 第3群 副腎 Enucleation+成長ホルモン
- 第4群 副腎 Enucleation+Cortisone
- 第5群 副腎 Enucleation+DOCA
- 第6群 副腎 Enucleation+Estradiol
- 第7群 副腎 Enucleation+Testosterone propionate
- 第8群 副腎 Enucleation+MAD
- 第9群 副腎 Enucleation+Progesterone
- 第10群 副腎 Enucleation+Cortisone+Test. prop.
- 第11群 去勢ラット副腎 Enucleation

術後2日目より上記各種ホルモンを連日投与し、15日後(術後)に屠殺し、再生副腎重量その他の臓器を計測し、ブアン固定、一部は10%中性ホルマリン固定を施し、ヘマトキシリン・エオジン染色及び各種脂肪染色を行つた。

尚中には3日目、5日目、10日目のものも併せて検索したものもある。第11群は雌雄ラット5匹づゝ去勢を行い、7日後に副腎 Enucleation を行い、更に15日後に屠殺した。

第3章 実験結果

再生副腎重量

各種ホルモン投与ラットの再生副腎重量は第5表及び第6表に示す如くである。ACTH、成長ホルモン、Testosterone propionate 及び MAD 投与群が、特に再生副腎重量が大きい。一方 Cortisone 投与群は下垂体剔出群と同程度で、再生副腎重量は最も少ない。DOCA は殆んど Cortisone にみる如き抑制作用は認められなかつた。尚成長ホルモンには著しい再生促進作用がみられるが、すべて臓器重量を増大せしめる一部分の作用に基づくかの懸念があるため、ACTH 投与群、男性ホルモン投与群のもの等と、2~3臓器重量の比較を表示した。成長ホルモン投与群はこの実験では、他の臓器よりも副腎の再生に特に強い作用のある点が見える。

体重曲線

第7表に示した如くである。

Testoid (Testosterone propionate, M.A.D.) 投与群は雌雄共体重は著しく増加し、一方 Cortisone 投与群は著明な減退がみられた。また Testosterone propionate と Cortisone とを併用した例に於ては、体重曲線は両者の中間位を占めた。その他 DOCA 投与時にかなり体重の増加がみられた。

生長ホルモンは体重の増加が特に著明であつた。

組織学的、組織化学的所見

第1群 副腎 Enucleation 対照群(無投与)

第 5 表

	雄					雌						
	実験 日数	体 重 (gm) 開始時	終結時	副腎重量 (mg)	胸 腺 mg/ 100gB.w.	腎 mg/ 100gB.w.	実験 日数	体 重 (gm) 開始時	終結時	副腎重量 (mg)	胸 腺 mg/ 100gB.w.	腎 mg/ 100gB.w.
対 照 Enucleation	15	126±2	151±13	7.5±1.0	193±12	820±25	15	128±7	135±5	8.3±0.9	238±30	832±25
ACTH 2mg	15	133±4	157±22	13.8±1.6	132±29	775±35	15	122±3	113±10	13.0±3.5	215±82	668±42
生長ホルモン0.25cc Antuitrin growth 2rat growth units	15	160±8	215±16	22.0±2.1	226±31	887±21	15	136±5	165±10	21.0±2.3	200±28	860±32
Cortisone 0.1cc	15	126±2	111±4	3.7±0.2	162±23	1045±41	15	120±4	103±8	4.3±0.9	136±39	952±30
DOCA 2.5mg	15	136±2	166±5	9.2±0.5	135±17	906±19	15	113±5	141±4	8.5±2.5	236±35	858±5
Estradiol (50γ)	15	131±8	152±2	13.0±1.5	235±6	865±21	15	119±7	110±3	11.5±1.5	163±45	792±9
Testosterone prop. 2.5mg	15	116±4	144±13	16.8±1.3	131±13	950±31	15	109±6	125±15	17.0±2.8	163±13	870±33
M.A.D. 2.5mg	15	123±4	161±8	14.2±2.4	161±15	888±64	15	124±1	141±11	17.5±2.5	138±16	899±15
Progesterone 1mg	15	137±3	167±12	11.0±1.4	179±11	925±25	15	126±1	139±2	10.7±2.0	276±31	860±26
Testosterone Prop. 2mg + Cortisone 0.05cc	15	96	97	3.5	98	1320	15	125	117	6.8	59.8	1072
去 勢	15	100±5	120±10	8.5±1.5	225	1500	15	137±4	137±8	8.0±1.6	250	900
下垂体剥出	15	98±4	94±12	2.3±0.5	129±15	1002±32	15	164±12	157±19	3.0±0.3	188±30	583±31

Standard error of the mean: $\pm\sqrt{\sum d^2/n(n+1)}$

この成績は既に第1編に於て述べている。

第2群 副腎 Enucleation + ACTH 投与

副腎皮質細胞の再生は極めて良好であり、被膜は第1群対照(第1編に於て詳述)に比して、著しく薄くなっている。再生皮質細胞は一般に全層に亘つて肥大しており、球状帯と束状帯との区別は、全く不明確で

第6表 各種ホルモンの副腎再生に及ぼす影響
(重量mg15日間)

ある。しかも束状帯に相当する個所は、かなりの細胞変性像がみられ、核崩壊及び fibrinoid 変性、顆粒状変性に陥った細胞が認められる。雄、雌ラット何れも同様な所見を呈しているが、雌ラットに於ては、特に細胞の変性の極めて高度のものがあ、広範囲に顆粒状変性に陥った細胞群が認められた。核分裂像は全皮質層に亘り、且つ中心部の皮質細胞にも多数出現していた。一般に対照群に認められる如き被膜からの結合織成分の進入は殆んど認めず、中心部には僅かの結合織が進入しているに過ぎない。また中心部の壊死物質も殆んど吸収されている。網状帯部は血管腔が著しく開大し、高度の充血像を示している。

組織化学的に、これらのR細胞は殆んど Sudan IV 染色で陰性であり、結合織中には若干の Sudan 顆粒を認めるに過ぎない。

Schiff 反応、Schultz 反応も Sudan IV 染色と略々同様であるが、中心部の結合織内には粗大顆粒が Sudan よりもやや弱く染つていた。

第3群 生長ホルモン

副腎皮質細胞の再生は極めて良好であり、外層部の再生細胞は、粗大空胞が多数出現し蜂窩状を呈している。雄ラットに於ては外層部細胞が著しく肥大しているに反し、束状帯中層以下の細胞は非常に小さく、細胞索が著しく哆開している。しかもこれ等の細胞は、細長で一部 Fibroblast 様の外見を呈しているものがみられた。併し細胞の変性像や核崩壊像は殆んど認めなかつた。一般に被膜結合織は非常にうすくなり、被膜から

第7表 副腎 Enucleation ラットの体重曲線

から侵入する結合織、中心部を占める結合織も殆んど認めなかつた。雌ラットでは内層部細胞は著しく肥大しており、且つ核も大きく雄の場合とは全く所見を異にしていた。一般にR細胞の胞体は好塩基性で、細胞内には殆んど微細顆立を認めなかつた。

組織化学的にR細胞は何れも Sudan, Schiff, Schultz 重屈折性が全く陰性であつた。

第4群 副腎 Enucleation + Cortisone

再生副腎皮質は極めて小さく、何れも被膜下の皮質細胞は比較的再生過程も良好であるが、内層部は殆んど再生が認められない。一般に被膜は著しく膨化しており、被膜からの結合織の侵入は少ないが、中にはかなり多数侵入せるものがあつた。これらの被膜成分が特に球状帯と束状帯との間に侵入し、結合織の帯として、再生皮質を分離しているものも見られた。雌ラットに於ても、再生皮質細胞は著しく萎縮性であり、外層部細胞も比較的萎縮性であつた。また細胞内には、かなり粗大な空胞形成があり、海綿状を呈し、特に fibrinoid 変性の高度なものが認められた。また内層部の萎縮性細胞の中には多数の黄褐色色素の存在を認めた。

組織化学的には、中心部のD細胞群は Sudan で強く染り、顆粒も粗大であるが、周辺部細胞は比較的微細顆粒状に染る。Schiff, Schultz 反応も Sudan よりはうすいかなりよく染つていた。

第5群 副腎 Enucleation + DOCA

副腎皮質の再生はかなり良好にして、R細胞は殆んど萎縮性の変化を示さない。DOCA 投与群の場合は、他の群に比し被膜腺腫形成が著しく著明にみられ、被膜腺腫は特に被膜部に数個出現しているものが多い。また被膜腺腫の細胞は略々R細胞と同様の所見を呈し、明細胞と暗細胞との区別が明確である。また fibrinoid 変性及びコロイド体形成のかなり認められた例があつた。内層部細胞も比較的良好に再生され、かなり大きい核を有する。球状帯と束状帯との区別は不明確であり、且つ球状帯に相当する細胞もそれほど著しい萎縮像を見出すことは出来なかつた。2例に於て被膜直下にD細胞群の出現を認めた。此の場合内層部にはかゝるD細胞群の出現なく、被膜下にD細胞群が認められたのが特異的であつた。

組織化学的に Sudan 顆粒は全R細胞に亘つて微細滴としてみられたが、球状帯は殆んど陰性であつた。しかし Schiff 及び Schultz 反応はこれら球状帯も瀰漫性にうすく染つていた。被膜腺腫の染色所見も略々同様である。被膜下のD細胞群は此等染色で粗大滴状に染つている。また中心部の結合織中にも Sudan 陽性顆粒を認めた。

第6群 副腎 Enucleation + Estradiol

皮質細胞の再生はかなり良好で、被膜もうすくなつている。一般に被膜下近くの細胞は小形なるに反し、内層部細胞は著しく大きく、また著明な変性像がうかがわれた。しかし球状帯と束状帯との区別は極めて不明である。

束状帯内にはコロイド体形成及び fibrinoid 変性の像がかなり認められた。

組織化学的には Sudan, Schiff, Schultz 重屈折共に陰性であり、または極めてうすく瀰漫性に認められ、中心部の結合織中にわずかに粗大滴が認められたに過ぎなかつた。

第7群 副腎 Enucleation + Testosterone propionate

副腎は極めて大きく、皮質細胞の再生は極めて良好である。また結合織増生が著しく、被膜から侵入せるもの及び、中心部の結合織は極めて多く、また被膜側から trabeculae の進入も著明であつた。また中心部に於ては結合織が壊死物質を厚く取りまいてる像がみられた。被膜下には小型の増殖性細胞が多く、且つ核分裂像もかなり認められた。またこれらの細胞は Atkinson 等 (1954)¹²⁾が述べている如き、A細胞に極めて類似している。被膜下のある個所に於ては明かに被膜細胞と皮質細胞との移行細胞と思われる細胞が認められた。内層部の細胞は著しく大きく、好塩基性で細胞内には顆粒像が認められない。R細胞の中にはかなり多くの fibrinoid 変性及びコロイド形成が認められる。また脂肪細胞化生と思われる空胞細胞が少数出現していた。皮質の外層部細胞は胞体は一般に蜂巢織状である。

組織化学的には、R細胞の殆んどすべては全く Sudan 反応が陰性であり、外層部の蜂巢織状細胞の処々にやゝ粗大な顆粒を認めるのみである。併し Schiff 反応はやゝうすく瀰漫性に染る。また内層部の処々に於てやゝ粗大な滴状顆粒が極めて少数認められるに過ぎない。

第8群 副腎 Enucleation + MAD

第7群ほど再生は良好ではないが、対照群に比すとかなりの再生促進像が認められる。被膜は著しく増生肥厚し、且つ結合織が多数被膜から中心部に侵入し、索状の走行を示している(写真25)。また中心部は著

しく増生した結合織で占められ、これら結合織細胞は細長の形態を示めしている。周辺部の皮質細胞は比較的海綿状構造を示し、内層部細胞は胞体が全く緻密で好塩基性である。また被膜直下はかなりの細胞増殖像が認められ、特に術後5日目の標本に於ては、核分裂像が多く、皮質細胞と被膜細胞との区別の不明確な中間形細胞の出現が認められた。またある標本に於ては増生せる結合織中に2~3個の皮質細胞が混入している像が認められた。

組織化学的には Testosterone propionate 投与群と同様で、R細胞は Sudan IV で殆んど陰性である。唯外層部の海綿状細胞中に少数の粗大滴を認めたに過ぎない。また内層の皮質細胞の1~2個所に於て粗大滴状顆粒を認めたが、これは脂肪細胞化生によるものと考えられた。

結合織及び被膜内に混入せる皮質細胞も全く同様な所見を呈する。Schiff 反応は Sudan よりややよく diffuse に染るが、略々 Sudan 染色と同様である。

第9群 副腎 Enucleation + Progesterone

再生はかなり抑制され、且つ高度の変性像がみられ、皮質細胞中には細胞の崩壊及び fibrinoid 変性、コロイド体形成が認められる。R細胞は全体的に萎縮性であるが、特にD細胞の出現は認めなかった。外層部細胞は前群と同様比較的海綿状構造の細胞が多い。

組織化学的には Sudan 染色で全層の細胞はやゝ粗大で、組織化学的には球状帯と束状帯との区別も略々明瞭である。Schiff 及び Schultz 反応は Sudan IV に略々同様。

第10群 副腎 Enucleation ラットに Cortisone と Testosterone propionate の併用投与

Testosterone propionate 単独投与に比し、再生はそれほど顕著ではない。一般に皮質細胞は小さく萎縮性である。また中心部にはD細胞群を認めた。

第11群 去勢+副腎 Enucleation

雄ラットは副腎皮質細胞の再生が極めて良好で、細胞は一般に好塩基性であり、細胞は顆粒を殆んど認めない。中心部には充血がかなり高度である。

雌ラットの場合は雄ほど再生が著明でなく、細胞も萎縮性である。外層部の細胞は比較的再生が良好であるが、中心部にはD細胞群が出現している。これらのD細胞群は Sudan, Schiff, Schultz 反応で粗大滴状に強染し、Nile blue 染色によつても淡紅色に染る。外層部の細胞は比較的微細な顆粒がみとめられる。

第4章 考 案

私の実験では、上述の如く副腎 Enucleation 後の再生増殖に対して ACTH・生長ホルモン・男性ホルモンなどに著しい促進作用がみられた。これ等の事実から ACTH 以外に、生長ホルモン及び男性ホルモンが増殖を促進せしめる作用があるのではないかと疑問が生じた。従来、ACTH のみが副腎皮質を支配する唯一のホルモンであるとの見解が多い。

Sayers (1948)¹⁷⁾によれば

- ① 現在唯一の ACTH が取り出されているに過ぎない。
- ② 今日分離されている純粋な ACTH は副腎皮質の大きさ・形態・コレステロール及びアスコルビン酸等のすべての変化を惹起する。
- ③ 純粋な ACTH は下垂体剔除動物の副腎の大きさ、構造を共に正常までに保持する。
- ④ C₁₁ oxygenated steroid も desoxycorticosterone と共に下垂体 ACTH の分泌を抑制する。
- ⑤ 今日分離純化されている ACTH は、副腎皮質の Corticoid 及び性ホルモン両者の分泌を刺激する。

Sayers はこれらの理由から、ACTH は全副腎皮質に対して tropic であるとの主張を示している。そして Golla and Reiss (1942)¹⁸⁾が妊娠 meres serum 中に副腎の大きさのみに作用する物質があると述べている点は、単に血中の ACTH を証明しているに過ぎないと反駁している。ACTH 投与時には副腎皮質は肥大し機能亢進像を惹起することは疑のない点であつて、下垂体剔除動物でも ACTH 投与により副腎皮質が刺激されて、萎縮が防止される (Evans 1933¹⁹⁾, Sayers, Winter and Long 1943²⁰⁾)。更に ACTH は下垂体

剔出動物の副腎の大きさ、組織像を保つのみでなく肥大をおこすことも知られている (Reese and Moon 1938)¹⁷¹⁾。

種々の Stress により exogen に ACTH の分泌を促進せしめた場合にも、同様に副腎は肥大することが多くの実験によつて知られている (Selye 1937¹⁸⁷⁾, Ingle 1938¹⁰⁷⁾, Engel, Winton and Long 1943⁶⁷⁾, Sayers, Sayers, Fry, White and Long 1944¹⁸¹⁾, Tepperman, Engel and Long 1943²⁰⁰⁾, Deane and McKibbin 1946⁴⁸⁾, Sayers et al 1946¹⁸²⁾, Sayers and Sayers 1948¹⁷⁹⁾, Dugal and Therien 1949⁶²⁾)。そして Li, Evans and Simpson (1943)¹⁴⁰⁾ は副腎重量は投与した ACTH の量に比例して肥大することを述べている。Folliculoid も副腎皮質の著しい肥大と、機能亢進像を来すが、下垂体 ACTH を介する変化とされている (Selye and Stone 1940)¹⁸⁵⁾。副腎皮質 Enucleation 後の再生には、ACTH も Folliculoid も促進的に作用し、これは ACTH 自体が再生増殖促進の本態と考えれば納得出来る。Ingle and Higgins (1938 c)¹¹¹⁾, Higgins and Ingle (1938)⁸⁾ はサイロキシンの四塩化炭素吸入も、共に副腎再生現象を著しく促進することを述べているが、結局これらの要因は Stressor として下垂体 ACTH の分泌を亢進せしめる結果認められると考えられる (Ingle and Higgins 1938 c)¹¹¹⁾。

これらの結果のみから判断すれば、副腎皮質の再生増殖機転も ACTH 投与、または ACTH の分泌を亢める如き要因によつて促進せられると考えられる。併し一方、この実験から男性ホルモン並びに成長ホルモン投与によつても、再生が著しく促進されることがわかつた。一般に Testoid は副腎皮質に対して抑制的に作用し、これは下垂体 ACTH 分泌機能をおさえるためにおこる現象とみられている (Selye 1949)¹⁸⁹⁾。

かゝる抑制的作用を有する Testoid が Enucleation 後の再生には促進的に作用する点は、全く意外な結果であつて、これはかゝる Enucleation の際には Testoid も ACTH 分泌亢進作用へ転換するのか、または Testoid 自体に再生を促進せしめる能力が存在するか何れかである。併し一般的に、Testoid には他のホルモンとは全く異つた副腎皮質に及ぼす特異的な作用が他の多くの実験から認められている。即ち正常動物に Testoid を投与した場合には副腎皮質萎縮性に働くが、下垂体剔出ラットでは全く逆で、かゝつて副腎皮質の萎縮防止作用がある点である (Cutuly 1938¹⁴⁾, Leatham 1943¹³⁶⁾, Leonard 1944¹³⁸⁾, Zizine 1950²³⁶⁾)。また Cortisone 投与による副腎萎縮が Testoid を投与することにより、組織化学的に、また副腎重量減少が共に防止される点が知られている (Gaunt 1952⁷²⁾, Gaunt 1953⁷⁰⁾, Winter, Holling and Stebbins 1953²²⁴⁾)。かゝる Testoid の副腎保持作用は Testoid による直接作用とも考えられるもので、この萎縮防止は細胞の大きさが保持される結果であるとも云われている (Leonard 1942)¹³⁷⁾。また幼若雌ラット副腎皮質細胞の細胞分裂機能は Testosterone により著しく亢められる事実も知られている (Nathanson and Brues 1941)¹⁶³⁾。かゝる意味からも Testoid は一面に於て ACTH と同様の作用を有するのである。副腎 Enucleation の場合の Testoid の増殖促進作用は、上述の Testoid の特異作用と関聯があるかも知れない。とにかく此の実験に於ては、副腎再生増殖に及ぼすホルモンは ACTH のみとは考え難い結果である。併し Testoid 投与時にみられる再生促進像は ACTH 投与時にみられる再生促進像とは幾分異つた所見を呈するものであつて、Testoid 投与時には結合繊維細胞の増生が特に顕著である。また中心部の結合繊維性増殖も顕著であつて、此等の成分が再生副腎重量増加の一因となすとも考えられる。しかしまた実際には、皮質細胞成分も非常に多数再生している。またこの場合の再生皮質細胞内には殆んどリポイド顆粒がないが、これは副腎皮質機能亢進時の状態であるか否かについては、判定を下すことは困難である。というのは Testoid は一般に、副腎皮質のリポイドを減少せしめる点が知られており (Hall and Korenchevsky 1938⁹⁵⁾, Selye, Rowley and Hall 1943¹⁹¹⁾, Greep and Jones 1950⁸⁷⁾, Rennels 1952¹⁷³⁾)、Greep and Jones (1950)⁸⁷⁾によれば、Testoid はステロイド産生臓器の機能を弱め、コレステロールの減少を来すと云い、更にこのコレステロールの減少はホルモン前駆物質の形成の抑制によるものと認めている。

また Testoid 投与時は ACTH 投与時とは異り、副腎皮質アスコルビン酸を減少せしめないことが知られており (Lewis, Demajo and Rosenberg 1949)¹³⁰⁾、かゝる所見から Testoid 投与時の副腎皮質機能の判定は極めて困難で、Deane その他による副腎皮質機能判定の組織学的指標の模型図は Testoid の場合には通

用しないものである(大樋 1956)¹⁶⁷⁾。また Testoid 投与時には一般に、副腎皮質に spheroid body や脂肪細胞化生が出現するが、Selye によればこの脂肪細胞化生は Testoid による特異的な反応であり、特に Testoid と下垂体エキスを投与した場合に顕著であると述べている。併し副腎 Enucleation ラットに Testoid を投与した場合には、余り著明な脂肪細胞化生の出現を認めなかつた。Enucleation 後には下垂体よりの ACTH 分泌が極めて旺盛であり、従つてかゝる状態時に Testoid を投与した場合には、当然多数の脂肪細胞化生の出現することが予想される。

脂肪細胞化生については大樋(1956)¹⁶⁶⁾が詳細に検索しており、下垂体剔除時にも M.A.D. で著しく出現する事実を認め、むしろ Testoid の副腎に及ぼす直接作用と考えている。一般に Testost. prop. と M.A.D. 投与 Enucleation ラットの皮質再生像に及ぼす相異は殆んど認められないが、M.A.D. 投与の場合は被膜性結合組織の増生がやゝ顕著なものようであつた。

副腎 Enucleation ラットは一般に良好な体重増加を示すことは第1編に於て述べたが、Testoid を投与した場合には更に体重曲線は上昇し、特に雄ラットの場合には著しい増加を示した(第7表)。Testosterone propionate, M.A.D. は発育促進、窒素平衡の点に於て anabolic action のあることが知られている(Kochakian 1949)¹²⁰⁾、Homberger Kasdon and Fishman 1950¹⁰²⁾。かゝる Testoid の anabolic action は身体多くの組織に作用していると思われ、Cortisone による副腎萎縮を防止する作用もこの anabolic action によるものと考えられている。また一方この同化作用は身体すべての組織に於て証明出来ないとも云われている(Winter 1953)²²⁴⁾。Cortisone 投与の場合には体重は何れも減退しているが、これは Ingle (1941)¹⁰⁷⁾、Kendall (1942)¹²²⁾、Wells and Kendall (1940)²¹⁶⁾等の述べている如く Cortisone による growth inhibition の作用と思われる。体重及び再生副腎重量の点に於ては、Cortisone と Testoid とは全く反対の作用がみられるが、両者を併用した場合には、Testoid 投与による再生促進作用も消失し、Testoid 投与による体重増加作用も不明確となつている。一般に Testosterone propionate は Cortisone による生長阻止作用に拮抗すると云われ(Gaunt 1953)⁷⁹⁾、また Testosterone は正常組織に於て、Cortisone のある作用に拮抗すると云われている(Pearson 1951)¹⁶⁸⁾。また臨床的にも Cortisone、Androgen を投与した場合には、Cortisone の catabolic effect を防ぐと云われている(Kinsell et al 1951)¹²³⁾、Luft and Sjogren 1951¹⁴⁵⁾、Clark et al 1951³⁰⁾。併しまた一方、Cortisone による体重・発育減退は Testoid により防止されないという報告もある(Winter et al 1953)²²⁴⁾。副腎 Enucleation に Cortisone と Testosterone propionate を併用投与した場合は再生副腎重量は、両ホルモン単独投与時の中間値を示し、組織像も両者の中間に値した。やはり再生増殖力の点に於ても Cortisone と Testoid とは反対の作用を有する如く見える。

Cortisone 投与による副腎皮質の萎縮は、下垂体 ACTH の分泌抑制の結果と考えられている(Ingle 1938)¹⁵⁷⁾。このことは前以て皮質ホルモンを投与しておく、Stress による副腎皮質のアスコルビン酸の減少が防止される点からも明かである(Sayers and Sayers 1948)¹⁷⁹⁾。それ故 Cortisone 投与の場合には、Enucleation の再生過程を抑制することは当然想像出来る。併し正常ラットに Cortisone を投与した場合には、主に副腎皮質の束状帯の萎縮が著明であり、球状帯はかえつて巾が広くなり、リポイドも増加してくる(Wells and Kendall 1940)²¹⁶⁾、Winter 1950²²⁵⁾、Winter 1953²²⁷⁾。即ち下垂体剔除時に於ける副腎皮質像にかなり類似の組織像である(Winter 1950)²²⁵⁾。かゝる関係は副腎 Enucleation の場合にはある程度認められる。中心部の束状帯に相当する細胞は D 細胞で占められ、下垂体剔除副腎 Enucleation の場合と似ている。併し、かゝる D 細胞の出現は比較的少く、萎縮性ではあるがやはり束状帯と思われる細胞の再生がかなり認められる。これは Cortisone による ACTH 分泌の遮断が完全でないためと思われ、特に副腎 Enucleation の場合には極めて大量の ACTH が分泌されることが予想されており、再生を抑制するには極めて大量の Cortisone を必要とする結果と思われる(Ingle 1938 a)¹⁰⁵⁾。Enucleation ラットに Cortisone を投与した場合には、外層部の細胞も比較的萎縮性である。これは第1編に於て既に述べた如く、かゝる再生過程の状態に於ては皮質細胞は未だ球状帯と束状帯とが明確な機能局在性を示していないためと思われる。

DOCA 投与による副腎皮質の萎縮も下垂体前葉 ACTH の分泌の抑制によるためと考えられている。

DOCA 投与時には束状帯が Cortisone と同様に萎縮すると述べているものがあり (Carnes, Ragan, Ferrbee and G'Neil 1941³⁷⁾, Selve and Dosne 1940¹⁹¹⁾, Stress のときおこる副腎肥大を DOCA が防止 (Woodburg, Cheng, Sayers and Goodman 1950)²²⁶⁾, サイロキシンの副腎肥大を防止 (Hoen, Lanyfield and Oehme 1939)¹⁰⁰⁾, Estrogen による副腎肥大を防止 (Albert and Selye 1942)³⁾, するものと云われている。これらは DOCA による下垂体 ACTH の分泌抑制によるものと考えられるが, DOCA の下垂体 ACTH 分泌抑制作用は, Cortisone の $\frac{1}{2}$ とされ (Sayer and Sayer 1948)¹⁷⁹⁾, Selye and Dosne (1942)¹⁹¹⁾は大量の DOCA の ACTH 分泌抑制は alarm reaction の際の副腎反応を防止するのに充分でないと述べている。また Miller (1950)¹⁵³⁾は一側副腎剔除時に於ける他側の代償性肥大を, DOCA が防止し得ないことを述べている。また Miljer (1950)¹⁵³⁾は一側副腎剔除時に於ける他側の代償性肥大を DOCA が防止し得ないことを述べている。即ち DOCA は Cortisone に比し作用がかなり弱いものである。Wells and Kendall (1940)²¹⁶⁾は DOCA を 3 日おきに 9 日間投与しても副腎の萎縮がみられず, Cortisone は一方 8 日目に著明な萎縮がみられると述べている。併し DOCA 2 mg 20 日間ラットに投与した場合には軽度の萎縮, 10mg では更に強い萎縮がおこると述べられており (Selye and Dosne 1940)¹⁹¹⁾, 大量投与すれば全層の萎縮がみられるという (Sarason 1943¹⁷⁶⁾, Delecastillo 1945⁵³⁾).

副腎 Enucleation の際の再生には, DOCA は殆んど影響をみなかつた。これは Cortisone に比し, ACTH 分泌抑制力が弱い点を考へれば当然と思われる。また DOCA は下垂体 ACTH の分泌を低下して副腎皮質を萎縮せしめる以外に, 球状帯を撰択的に萎縮せしめる点があげられている。(Carnes 1941³⁷⁾, Miller and Riddle 1942^{153a)}). かゝる作用は ACTH を介さない直接作用に属する。(Sarason 1943¹⁷⁶⁾, 大樋 1956¹⁶⁵⁾). かゝる球状帯の特異的な萎縮作用は Enucleation 15 日目の副腎には認められない。この時期は第 1 編に於て既に述べた如く, 両層の細胞の判別は困難であり, 機能的にも局在性が明確でないためと思われる。Deane 一派が述べている如く, 球状帯と束状帯とは二元的な構成であれば, 球状帯は DOCA 投与により, 全く特異的な反応が出現すべき筈である。かゝる点は特異な条件下に於ては, 球状帯と束状帯との機能局在性は保持されていないものと思われる。即ちかゝる条件下に於ては球状帯に相当する細胞が束状帯機能を代償しているという実験結果もかなり挙げられている。球状帯は一般に DOCA の如き鉱質コルチコイドを分泌する層にして, DOCA を投与した場合球状帯が廃用性萎縮を来すものと考えられている。しかし前にも述べた如く, 副腎皮質細胞は外層部から内層部に向つて増生するもので, 従つて球状帯細胞は内層部の皮質細胞よりも幼若な細胞である。それでかゝる幼若な球状帯細胞は, 特に DOCA の毒作用によつて萎縮すると解しているものもある。若しこの説が正しいとすれば, 何故 Enucleation 後新しく再生される皮質細胞は, DOCA によつて萎縮しないのであろうか。また束状帯細胞が出来上るには, 一度球状帯を通過せねばならぬ故, Enucleation の際 DOCA によつて球状帯が萎縮されれば, それより内方の束状帯細胞は全く再生されない筈ではなからうか。併し私の実験では, DOCA 投与時にも内層部の細胞も完全に再生され, また外層部の細胞も普通の副腎の如く撰択的に萎縮を来すことはなかつた。これ等の結果及び他の実験より, 私は次の如き説明を述べようと思う。

即ち, 副腎皮質各層の機能局在性は正常時には比較的明確に立証しうるが, 特別な場合には成り立たない。Enucleation の場合は特別な例であつて, 特に再生初期に於ては機能の分化が進んでいないものと思われる。この場合外層部皮質細胞も束状帯細胞の機能を発揮するものと考えられる。また第 1 編に於ても述べた如く, 再生初期には組織学的にも球状帯と束状帯とは明確に区分することが出来ない。また機能的にも球状帯と束状帯とは明確に区分することが出来ない点を述べたが, 第 3 編に於ても全く同様の結果である。しかし一応皮質細胞の再生が完成した後は, DOCA によつて球状帯は萎縮し, また組織学的にも球状帯と束状帯とは明確に区分することが可能となつてくる。

以上の点からも明かな如く, Deane 一派の考へている如き, 球状帯と束状帯とは二元的構成とみなす説は正しくなく, やはり皮質細胞は一元的なものであつて, 機能的には分化したものと考えざるを得ない。安藤 (1953)⁸⁾は皮質細胞は一元的な増殖を示すものであつて, 併も分泌, 機能は局在的に分化してくるものと述べている。この Enucleation の実験は更に一元的機能局在説を裏付けるものである。

去勢による影響

一般に雌ラット副腎は雄ラット副腎よりも大きく、且つ組織化学的に雄副腎は sudanophodezone があり、雌ラットには不明確な点から、雌副腎皮質機能は雄副腎皮質機能より亢進した状態にあるものと考えられている。(Greep and Jones 1950⁸⁷, 田所 1954²⁰⁷, 大樋 1956¹⁶⁵)。去勢により、雄ラット副腎は肥大し、雌ラット副腎は萎縮する点から、体内の Estrogen や Testoid がこれら副腎皮質機能の雌雄二型性に原因しているものとされている。即ち体内の Estrogen が皮質機能を亢進せしめ、Testoid は皮質機能を低下せしめるものと云われている。去勢による副腎皮質の組織学的変化は、体内性ホルモンの影響がなくなつた結果発来する変化と考えられている。また卵巣によつて ACTH の分泌が抑制されることが知られている (Ellison and Burch 1936)⁶⁶。それ故去勢時に於ける副腎 Enucleation の再生像には、かなり異つた所見が認められてよい筈である。この実験では雄ラット去勢時には殆んど正常ラットと差がなかつたが、雌ラット去勢の場合には、再生副腎皮質はかなり萎縮性であり、且つ写真の如く中心部はすべて D 細胞で占められていた。即ちこれは ACTH 分泌低下時にみられる像であつて、去勢によつて ACTH の分泌が抑制された結果とみるべきであらう。特に副腎 Enucleation 再生増殖には既に第 1 編に於ても述べた如く、極めて大量の ACTH の分泌によつて遂行されるものと考えられるために、卵巣剔除によつて Enucleation の再生もかなり抑制されることが想像される。

一方卵巣剔除によつて、副腎皮質機能は何等変化しないと述べているものもある。(マウス Haward-Miller 1927¹⁰⁴, ラット Sarason 1943¹⁷⁶, モルモット Zalesky 1936²³⁴)。然しこれは一般に卵巣剔除の時期と実験の長さにより生ずる差異と考えられている。(Anderson and Kennedy 1933⁷, Blumenfeld 1939²⁶, Sarason 1943¹⁷⁶)。Ellison and Burch (1936)⁶⁶は卵巣剔除によつて副腎は始め肥大し次いで萎縮することを述べている。私の実験で卵巣剔除時にはかなり再生抑制的な作用が見られた点から、卵巣剔除は多少とも下垂体副腎系の機能を修飾するものの如く思われる。一方雄ラット去勢時に於ては、再生像には著明な変化が見られなかつた。一般に雄ラット去勢によつて副腎皮質は肥大するもので、之は Androgen が下垂体 ACTH の分泌を抑制しているためと考えられている。それ故、雄ラット去勢時には副腎皮質の再生像も促進されるべき筈のものであるが、前述の如く Testoid 自体には再生増殖する作用があり、此の場合に於ける再生増殖力の問題は一層複雑な因子が介在している様に思われる。

第 5 章 要 約

1). 副腎 Enucleation 後の再生は、ACTH 投与または下垂体 ACTH の分泌を促す如きホルモン (Estrogen) によつて促進される。このことは、ACTH が副腎皮質細胞の増殖をも支配していることによるものと考えられる。

2). 併し ACTH 以外に生長ホルモン、男性ホルモンもまた著しい再生促進作用を有し、このことは ACTH のみが副腎皮質を支配する唯一のホルモンでないことを示すものと考えられる。

3). Corisone によつて再生は著しく抑制されるが、これは下垂体 ACTH の分泌を抑制するためと思われる。DOCA には殆んど抑制的な作用は認められなかつた。これは DOCA は Cortisone よりも下垂体 ACTH の分泌を抑制する力が弱いためと思われる。

4). 雌ラット去勢時には、副腎 Enucleation 後の再生はかなり抑制される。

5). 以上の実験から副腎皮質細胞は一元的な増殖を示すもので、再生初期に於ては、内外二層の機能局在性が明確でない。全く再生が完成した後は、内・外二層には機能局在性が認められてくる。

第 4 編 束状帯細胞再生増殖に及ぼす 2~3 ホルモンの作用について

第 1 章 緒 言

下垂体切除の動物に於ては、副腎皮質は肥大及び増殖をおこさぬことは、諸家が既に多方面に亘つて検索

している。併し私は第2編に於て、下垂体切除時に於ても副腎皮質外層部は比較的自律的に増生をおこし、且つ一見分泌機能を發揮しうる如き所見を示す点について述べた。しかしこの場合に於ても、内層の束状帯に相当する細胞は全く再生されず、同個所には変性萎縮性の細胞が代りに出現するものであつて、此等の点から、内層の束状帯細胞が出来るためには、更にまた束状帯が分泌機能を發揮するためには、下垂体ホルモンが必須であることが予想せられた。

副腎皮質の三層形成には下垂体が必要であるならば、果して下垂体の如何なるホルモン因子がこれに関与しているのだろうか。本編はこれらの実験的研究を主体として検索してみた。

既に第3編に於て、成長ホルモンと男性ホルモンが ACTH 以外に強い再生増殖作用を有することを知つたが、しかしこの両ホルモンのかゝる作用は下垂体の健常な場合の所見であつて、これら両ホルモンの独自の作用か、または下垂体ホルモンとの協同作用のためのものであるかは判らない。そのため、下垂体剔出動物に各種ホルモンを投与しない限り、そのホルモン自体の作用か否かは見出すことは出来ない。

従来から球状帯細胞が被膜から増生する点に関しては、かなりの実験事実が認められているが、束状帯細胞の増生に関する観察は殆んど皆無である。また束状帯細胞と球状帯細胞との形態学的關聯、並びに下垂体支配の關聯の本に、この問題は明示されねばならない。束状帯細胞は下垂体の如何なる因子の本に、また何処の個所から再生増殖するかという点に関しては、従来実験的に殆んど検索されていない。私は下垂体剔出ラットに於て、副腎 Enucleation を行い、更に ACTH、生長ホルモン、性腺刺激ホルモン、男性ホルモンを投与して束状帯細胞が如何なるホルモン因子によつて再生増殖するかを検索してみた。

第2章 実験材料及び実験方法

実験動物はすべて150g前後の雌ラットを使用した。下垂体剔出法及び副腎 Enucleation の術式は第1編、第2編の如くである。副腎 Enucleation 1日後より下記各種ホルモンを投与し、Enucleation 手術日より15日目、23日目に屠殺した。

第1群	下垂体剔出+Enucleation	15日
第2群	下垂体剔出+Enucleation+Test. prop.	15日
第3群	下垂体剔出+Enucleation+生長ホルモン	15日
第4群	下垂体剔出+Enucleation	23日
第5群	下垂体剔出+Enucleation+ACTH	23日
第6群	下垂体剔出+Enucleation+gonadotrophin	23日

Testosterone propionate は1日量2.5 mg, ACTH (Amour) は2 mg, chorionic gonadotrophin は1 K.E.を連日皮下若しくは筋肉内投与した。

副腎その他臓器の計測は、第1編に同じ。また標本も同様各種染色法により作製した。

第3章 実験結果

再生副腎重量:

各群の再生副腎重量は第8表の如くである。Testosterone prop. 投与群でやゝ著明な副腎重量の増加が認められたが、ACTH投与群では予期に反して、それ程著明な増加はみられなかつた。下垂体剔出と Enucleation のみの対照は15日後も23日目の場合も、殆んど差がみられなかつた。Gonadotrophin も殆んど対照との間に、差が認められなかつた。

組織学的所見:

第1群並びに第4群の対照例は、第2編に既に所見は述べたから、こゝでは省略する。唯、15日群のものも23日群のものも、組織像並びに組織化学的所見とも殆んど差がみられなかつた。即ち下垂体剔出ラット Enucleation 後の外層部の再生細胞は23日後には、更に内方まで増殖する傾向はなかつた。

第2群 Testosterone propionate

第 8 表

	実験 日数 (日)	体 重 (gm)		副腎重量 (mg)		胸 腺 mg/ 100g B.w.	腎 mg/ 100g B.w.
		開始時	終結時	右	左		
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation	15	98±4	94±12	剔 出	2.3±0.5	129±15	1002±32
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation	23	141±8	122±8	剔 出	3.2±0.8	147±27	876±20
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + ACTH	23	132±11	114±15	剔 出	3.5±0.7	210±26	1100±35
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + 生長ホルモン(0.25cc)	15	133±13	125±15	剔 出	4.2±0.7	207±38	876±31
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + Test. prop. (2mg)	15	146±12	143±16	剔 出	5.7±0.6	165±28	871±31
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + ACTH (2mg) + 生長ホルモン(0.12cc)	15	112±3	108±12	剔 出	5.8±0.3	312±20	1048±28
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + ACTH (2mg) + Test. prop. (2mg)	15	123	98	剔 出	2.5	38.7	1070
下垂体剔出 + 副腎 Enucleation + gonadotropin(1K.E.)	23	117	95	剔 出	1.5	82	747

第9表 下垂体剔出ラットの副腎再生に及ぼす影響(重量mg)

この例では明かに、再生副腎の大きさが大であるが、組織学的には再生像は何等著明な促進がみられなかった。この場合大きな副腎の容積を占めるのはD細胞群であつて、再生副腎中心部は殆んどこれらのD細胞で占められている。被膜下のうすい周辺層は、対照と同様にR細胞が完成している。R細胞は明かに皮質細胞の形態を整え、第2編で述べた如く球状帯に相当する細胞と考えられ、D細胞群は萎縮した束状帯細胞と考えられる。尚此の場合には層的判別は極めて著明であり、外層部のR細胞群は明かに球状帯細胞と断定しうる所見である。このR細胞も一般に細胞は非常に小さく、配列がやゝ索状を呈しており、第2編に於て述べたR細胞と同じくリポイド顆粒は殆んど含有されていない。このR細胞帯の下部には移行層と思われる層は全く存在せず、直接中心部大半を占めるD細胞群に移行している。D細胞はすべて萎縮性の細胞で、核は偏在性の pycnotic ないしは核崩壊像の多い細胞で、下垂体剔出時に出

現する束状帯細胞とその様相を酷似している。また中心部にはかなりの結合組織が進入しており、これらの萎縮性細胞内には黄褐色の色素が極めて大量含有されている。Sudan 染色で中心部のD細胞群は粗大滴状に染り、褐色色素も同様に陽性である。Schiff, Schultz 反応でもD細胞は若干程度は弱い滴状に染るが、褐色色素は染らない。またD細胞は Nile blue で淡紅色に鮮に染る。これらの組織化学的並びに組織学的所見は、下垂体剔出時の萎縮性束状帯、網状帯の細胞と略々同様の所見である。

第3群 生長ホルモン

組織像は略々対照群と同様である。即ち周辺部にはうすいR細胞帯の再生がみられ、中心部はD細胞群で占めらる。尚D細胞は Testoid 投与群に比し量が少ない。組織学的、組織化学的並びに色素の態度は殆んど第2群と同様である。

第5群 ACTH

組織学的に内外二層を判然と区別することが容易で、球状帯は好塩基性の細胞で、細胞の形は小さく、その下部には束状配列の束状帯細胞がかなり中心の方まで再生している。併し全体としての大きさは殆んど対照群と差がみられない。この場合にみられる球状帯は第2編に於て述べた球状帯の如き、はつきりした束状の配列を示していない。且つまた、この場合の球状帯の巾は著しく狭く、細胞7～8個の巾である。一般に球状帯細胞はクロマチンが多く、その下部の束状帯細胞とは明瞭に区別することが出来る。(写真31)。束状帯細胞は束状に配列し、細胞の大きさは球状帯細胞より幾分小さく、細胞内には微細な空胞を有する。組織化学的にも球状帯は、一般にリポイド顆粒が少く、微細であり、または殆んど陰性と云つてよい程少い。一方束状帯は微細な顆粒が非常に多く、組織化学的にも球状帯、束状帯はきわめて明確に区別し得る(写真32)。

第6群 Gonadotrophin

組織学的には下垂体剔出副腎 Enucleation の場合に殆んど一致しており、周辺部には球状帯が再生しており、束状帯の再生は認められない。内層部は何れも萎縮性のD細胞群で占められ、且つ網状帯細胞も再生されている像は認められなかつた。

第4章 考 案

副腎皮質に於て下垂体支配の最も強く関与している部位は束状帯であり、球状帯は下垂体には余り強く影響を受けぬことは既に述べた。また第2編に於ても束状帯は下垂体剔出時には再生し得ない点を述べたが、この編に於ては、如何なるホルモンを補足すれば束状帯が再生し得るか、即ち副腎皮質層形成は如何なるホルモンの支配下に遂行されるかを検索したのである。そして実験の結果は、ACTH のみがかゝる層形成能力がある点を知つたのである。下垂体剔出時に於ても球状帯は再生し得ることは第2編に述べたところであるが、それ以下の層の形成には下垂体が必須であり、下垂体欠損時には束状帯への形成が停止する如く考えられるのである。下垂体剔出時に再生する球状帯は、一般に層の巾がかなり広く、細胞が多数個配列しているが、ACTH を投与した場合の球状帯はかえつてうすくなつてきている。このことは ACTH の作用によつて球状帯細胞が束状帯細胞に移行し、従つて球状帯細胞が少くなつたものと考えられる。かゝる事実は他の実験からも窺い知ることが出来るのであつて、教室大樋 (1956)¹⁶⁾はACTHを長期間正常ラットに投与した場合、束状帯が肥大して大きくなるに反し、球状帯は反対にうすくなるのを認めている。またACTHを投与した場合にコルヒチンを用いて核分裂像を観察した際、束状帯のみなく球状帯にも核分裂像が増加する事実を認めている。これ等の事実から球状帯細胞は ACTH の作用によつて、下部の束状帯細胞に移行することが想像出来るのである。元来副腎皮質細胞は被膜の方から再生増殖するものであつて、球状帯細胞も束状帯細胞も一連の細胞で単に機能相を異にする点については、既に述べた如くである。また一般に球状帯細胞は、束状帯細胞に転換されるものと考えられており、Baker (1952)¹⁸⁾はラットで大量の ACTH 投与によつて、球状帯は束状帯の細胞に似てくることを述べているが、これは球状帯細胞が ACTH により修飾され、束状帯細胞に転換することを示すに外ならない。即ち束状帯肥大のためには、球状帯から細胞を増殖し動員する

ための一機序と思われる。かくの如く、球状帯細胞は ACTH の作用によつて下部層への転換を行うことから、球状帯は ACTH に全く作用を受けないとするのは誤りであり、従来この点に関しては多くの誤解がある。厳密に云うならば、球状帯は下垂体とは独立的とは云えず、自律性があると表現せねばならない。即ち球状帯は下垂体がなくとも、自律的に増殖しうる能力があるが、その上 ACTH の作用を受け、細胞を束状帯細胞に転換するものである。Jones (1949)¹¹⁸⁾はマウス副腎の球状帯は下垂体とは全く独立的でないことを述べており、同様に Wexler et al (1955)²¹⁷⁾も下垂体別出ラットの副腎球状帯は、ACTH によつて変化する点を述べているが、これがために球状帯の自律性を否定する根拠にはならず、むしろ私の上記の解釈からすれば、球状帯も当然 ACTH の作用を受けて奇異とするに足らぬ。河原、青木 (1953)¹²¹⁾は ACTH はホルモン分泌に関しては、球状帯は支配されないとしても皮質の再生には必要なる点を述べているが、特に束状帯細胞の再生には ACTH は必須と考えられる。ACTH 投与時に初めて束状帯細胞が再生してくるが、これらの細胞は細胞内に多数の小型の空胞を有している。束状帯細胞に於ける空胞形成については ACTH 投与 (Baker 1952)¹⁸⁾、または ACTH の分泌を促進する諸種のストレス (Deane and Shaw 1947⁷¹⁾、大橋 1956¹⁶⁵⁾)の場合に認められ、特に刺激が長期間持続したときに出現するものと考えられる。安藤 (1953)⁸⁾は塩化カリ、塩化カルシウムを長期間投与して球状帯が肥大、機能亢進状態を示す場合に、球状帯に同空胞の出現することを述べている。即ちかかる空胞の出現はホルモンの放出と関聯がある様で、Rennels (1952)¹⁷³⁾は discharge body なる名称の本に ACTH 投与時に出現することを述べている。これらの点からみても、この場合の束状帯の空胞形成は ACTH の作用によつて出現したことは容易に想像され得る。そしてまたかかる束状帯細胞はリポイド顆粒が微細でかつ多く、分泌機能も保持されているものの如く考えられる。しかし一方出来上つた束状帯細胞はかなり小さく、かえつて球状帯細胞より小さい位である。更にかゝる ACTH 投与時に於ても再生副腎の重量は極めて小さく、このことは全く予期に反した結果であつた。これは投与した ACTH の量の不足に起因するものか、または下垂体別出後の期間の長さが問題であるかも知れない。Evans, Pencharz (1933)⁷¹⁾等は下垂体別出後時日の経過する程、ACTH は萎縮副腎皮質の恢復を来すことが困難となり、下垂体別出後 4 週目では、一般に下垂体別出後 1 週目に要する 6 倍の ACTH の量で初めて副腎皮質が恢復しうることを述べている。更に第 3 編に於ても述べた如く、副腎 Enucleation の場合には極めて大量の ACTH が放出されることが必要であるため、量の不足が最も強く原因しているようでもある。特に私の実験では、下垂体別出後翌日副腎 Enucleation を行い、1 日おいて直ちに ACTH 投与を開始し、下垂体別出後における副腎の不感受性を極力さけている。同様の結果は既に Ingle (1942)¹⁰⁸⁾も述べており、大量の ACTH でも下垂体別出ラット副腎 Enucleation の皮質再生を殆んど促進しないと述べている。そしてかかる結果は、Ingle をしてもかなり予期に反した事実として取り上げさせている。彼は一般に副腎皮質の再生は、ACTH によるものと信じているため、この説明は甚だ困難で、多分再生に要する ACTH の量は非常に大量を要するものか、または他に再生過程を活性化するものがあるかも知れないと述べている。この最後の指摘は甚だ興味ある点であり、一考を要するものと思われる。最近、下垂体向副腎皮質刺激ホルモン中には、二つの因子があり、一つは Adrenal weight factor (A.W.F.) で他は Ascorbic acid factor (A.A.F.) である (Dixon, Stack-Dunne, Young and Cater 1951)⁵⁷⁾。前者は副腎アスコルビン酸減少作用は弱く、副腎重量を保持する作用があり、また Subglomerulosa, Sudanophobic zones のリポイドを著しく増加したこの部の核分裂像を著しく増加させると云われる。即ち A.W.F. は下垂体別出ラットの steroidogenesis をおこさぬもので、growth promotion に関与するものとされている。A.A.F. はかかる growth promotive の作用はなく、steroid synthesis 及び放出に関与するもので、両因子共に副腎皮質が適度の機能を発揮するに必要であると云われている (Bush)⁸³⁾。また A.W.F. は生長ホルモンではないかも知られている。私の行つた実験でも、ACTH が副腎重量を大して増加せしめ得なかつた理由もかかる点に起因するのかも知れない。

第 3 編の実験の結果から、Testoid、生長ホルモンが著明な再生増殖作用が認められたが、本編の下垂体別出ラットに於ては、Testoid も生長ホルモンも束状帯細胞を再生増殖せしめる能力がなかつた。Testoid の

場合は周辺部の球状帯の他に、中心部にD細胞群の形成が顕著であつたが、何れも萎縮性である。生長ホルモン、胎盤性性腺刺激ホルモンも機能的な束状帯細胞を再生することはなかつた。即ち Testoid, 生長ホルモンの再生増殖促進作用は下垂体ホルモンと協同の本に発揮されるものの様であるが、一方私が用いたホルモン量が過少であつたために束状帯細胞を再生し得なかつたのかも知れない。

結論として私は、副腎皮質細胞の増殖過程に及ぼす下垂体との関係を、次図の如く示した。

殖するのであるが、下垂体剔出時に於ては active functional phase を介することなく Retic. B に移行し変性崩壊することを述べている。副腎 Enucleation ラットの場合に於ても同様であり、正常時には被膜内細胞→球状帯→束状帯→網状帯と移行して変性崩壊するのであるが、下垂体剔出時には被膜内細胞→球状帯→変性崩壊の過程をたどる様に考えられる。

第5章 要 約

1. 束状帯細胞は下垂体の存在の本に於て初めて再生しうるもので、ACTH はこの増殖過程を支配するホルモンと考えられる。即ち ACTH によつて球状帯細胞から束状帯細胞が出来上り、束状帯細胞は分泌機能を営むものと考えられる。
2. 男性ホルモン・生長ホルモン・胎盤性性腺刺激ホルモンなどは、球状帯細胞を束状帯細胞に転換せしめ得なかつた。

第5編 全編の総括

従来副腎皮質細胞の増殖に関しては、escalator theory という一元的な説があり、副腎皮質機能に関しては zonal theory という二元論があり、互に対峙した説となつている。かかる問題の解決には、副腎皮質細胞の増殖機構と機能との二面から検索する必要がある。私は副腎 Enucleation の実験を行い、球状帯細胞と束状帯細胞との増殖、並びに両層の機能的差異、また特に両層の相互関係を下垂体支配の影響と共に検索した。

副腎皮質細胞の増殖個所、乃至増殖源は、被膜または被膜下の fibroblast 様細胞であることは、副腎 Enucleation の実験でも確められた。即ちコルヒチンを用いた観察によれば、再生初期には被膜内に数多くの分裂像が捕捉され、また副腎 Enucleation の場合には、被膜下細胞の増生が旺盛となる事実からも明かである。被膜または被膜下から増生した皮質細胞は、次第に内方に escalate する様にみえるが、副腎 Enucleation の場合には、すべてこの増殖形式を示すものとは限らぬ。被膜下に於て皮質細胞に転化するもの以外に、皮質内層に於ても核分裂により増殖が行われ、更に皮質原基が一旦皮質内に進行して、そこで metamorphosis を行う形式がみられた。併し副腎皮質細胞は一般に Salmon, Zwemer, Bennett 等が述べている如く、life history の極めて短いもので、原則的にはやはり escalation による形式が多い様に思われる。

副腎 Enucleation の場合再生は略々1ヶ月で完成し、内層部細胞も出来上り、組織学的、組織化学的にも略々正常皮質像に復する。Thorn test は大体この時期に到つて陽転するもので、副腎皮質機能も略々此の

時期に元に復するものと思われる。

球状帯細胞は一般に自律的に電解質代謝ホルモンを分泌するもので、下垂体の支配を受けないものと解せられている。第2章に於て、下垂体剔出ラットの場合にも球状帯細胞の再生が完全に行われることを述べたが、このことは球状帯細胞は自律的増殖能力があることを示す点である。また下垂体缺損時には束状帯以下の細胞の再生は全く行われず、ACTH 投与によつて初めて行われる点から、束状帯細胞は増殖の上にも、また機能の上にも下垂体 ACTH の支配下にあるものと考えられる。更に球状帯細胞は ACTH 投与によつて、束状帯細胞に転化するものであり、かゝる点に於て球状帯は下垂体とは独立的な層ということは出来ない。即ち厳密に云えば、球状帯細胞は自律的性格が強いが、更に下垂体 ACTH の作用によつて束状帯細胞に転化する性質のものと考えられる。

副腎皮質細胞の再生・増殖を刺激するためには極めて大量の ACTH 分泌が必要と思われる。一側副腎が残存している場合には、再生が著しく遅延し、下垂体剔出ラットで束状帯細胞を再生せしめるためには、大量の ACTH 投与を必要とし、このことは副腎皮質の分泌を刺激するよりも、再生を刺激する方が大量の ACTH を必要とする様に考えられる。それ故副腎 Enucleation 後の再生を促進するには、大量の ACTH 投与や下垂体 ACTH の分泌を高める諸種の Stress 要因が必要である。

ACTH によつて再生は著しく促進されるが、この実験では尚、男性ホルモン、生長ホルモンが著しい再生促進効果を示した。このことは副腎皮質が単に ACTH のみによつて支配されているとみなす Sayers (1948) 一派の一元論では説明し難い事実である。

一般にラット副腎皮質は外層部と内層部とでは、機能局在性が認められている。併し副腎 Enucleation 後の再生過渡期の副腎皮質では、かゝる関係は殆んど認められない。またこの時期の副腎皮質は組織学的・組織化学的にみても、球状帯と束状帯との層の区別は明確でなく、正常副腎の如く二層を分離することは出来ない。また副腎 Enucleation 後再生が未だ極めて僅かしに行われていない時期に於て、已に副腎不全の徴を来すことなく、また Hartman 等によれば、副腎 Enucleation の後には fat factor が正常以上に分泌されることが述べられており、これらのことは、皮質ホルモン分泌能力は内層部のみより行われるものでなく、外層部の細胞でも比較的大量の皮質ホルモン分泌能力がある点を示すものである。即ち副腎 Enucleation の如き特殊な条件下に於ては、外層部と内層部とで機能局在を示すことはなく、このことは Deane 一派の zonal theory は肯定し難い点である。併し副腎 Enucleation 後1ヶ月後には、両層の区別が組織学的、組織化学的にも明確となり、且つ両層の反応態度の差異が明確となつてくる。即ち球状帯と束状帯との機能的差異は絶対的なものではなく、特殊な環境下に於ては成り立たないものと考えられる。

以上の点より球状帯細胞も束状帯細胞も一元的な細胞であり、球状帯は自律的に増殖し且つ機能を発揮し得るが、下垂体 ACTH の作用により束状帯に transform し、下垂体支配の本に糖質コルチコイドを分泌するに至るものと思われる。

(擧筆するに臨み、終始御懇篤なる御指導と御校閲を賜つた恩師森教授に満腔の謝意を表します。

尚、本研究に御協力戴いた安藤卓爾博士に感謝致します)

引用文献

- 1) 赤須, 竹内, 宮川: ホルモンと臨床, 2:1082~1085, 1954.
- 2) 赤須, 竹内, 宮川: ホルモンと臨床, 2:12~15, 1954.
- 3) Albert, S. and H. Selye: J. Pharm. & Exp. Therap. 75: 308-315, 1942.
- 4) Albright, F.: Recent Prog. in Horm. Res. 1: 293-353, 1947.
- 5) Albright, F. and E.C. Reifenstein: The parathyroid Glands and metabolic Bone Disease. Baltimore: Williams & Wilkins 1948.
- 6) Allen, B.M. and H. Bern: Endoc. 31: 586-591, 1942.
- 7) Andersen, D.H. and H.S. Kennedy: J. Physiol. 79: 1-30, 1933. (Hartman. 1949より引用).
- 8) 安藤: ホルモンと臨床, 1:218~230, 1953.
- 9) Anselmino, K.J., L. Herold und Fr. Hoffmann: Klin. Wochsch. 1724, 1934.
- 10) Antopol, W.: Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med. 73: 262-265, 1950.
- 11) Arnold, J.: Virchow's Arch. f. Path. Anat. 35:

- 64-107, 1866. 12) Atkinson, W.B., M.M. Dickie and E. Fekete: *Endoc.* 55: 316-325, 1954. 13) Bacchus, H.: *Am. J. Physiol.* 163: 326-331, 1950. 14) Bacchus, H.: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 76: 391-393, 1951. 15) Bacchus, H., M.M. Heiffer and N. Altszuler: *Endoc.* 50: 264-268, 1952. 16) Bachmann, R.: *Klin. Wochenschr.* 22: 783-784, 1939. 17) Badinez, O. and H. Croxatto: *Bol. Soc. Biol. Santiago* 5: 40, 1948. (Deane, H.W. and L.I. Gardner, *Endoc.* 48: 237, 1951より引用). 18) Baker, B.L.: *Recent. Prog. in Horm. Res.* 7: 331-364, 1952. 19) Baker, D.D. and R.N. Baillif: *Anat. Rec. (Suppl.)* 70: 5-6, 1938. 20) Baker, D.D. and R.N. Baillif: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 40: 117-121, 1939. 21) Baxter, J.S.: *J. Anat.* 80: 139-146, 1946. (Hartman 1949より引用). 22) Bennett, H.S.: *Am. J. Anat.* 67: 151-214, 1940. 23) Bergner, G.E. and H.W. Deane: *Endoc.* 43: 240-260, 1948. 24) Bernard, L. and Bigert: *Compt. rend. soc. Biol.* 54: 1400-1401, 1902. (Hartman 1949より引用). 25) Bernstein, D.E.: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 73: 175-176, 1950. 26) Blumenfeld, C.M.: *Endoc.* 24: 723-738, 1939. 27) Blumenthal, H.T.: *Endoc.* 27: 477-480, 1940. 28) Blumenthal, H.T.: *Arch. Path.* 40: 264-269, 1945. 29) Bogomolez, A.: *Folia Serologica* 3: 125-155, 1909 (Salmon 1941より引用). 30) Brenner, R.M., D.I. Patt and L.C. Wyman: *Anat. Rec.* 759 1954. 31) Brownell, K.A. and F.A. Hartman: *Endoc.* 42: 232-235, 1948. 32) Brownell, K.A., F.A. Hartman and R.W. Reiman: *Endoc.* 47: 326-330, 1950. 33) Busch, I. Cited. 34) Cameron, G.R.: *Pathology of the cell.* Oliver and Boyd Edinburgh. 1952. 35) Canalis, P.: *Internat. monat. f. Anat. a. Physiol.* 4: 312-334, 1887. (Hoerr 1931より引用). 36) Carlson, H.E.: *Endoc.* 15: 524-530, 1931. 37) Carmes, W.H., C. Ragan, J.W. Ferrebee and J. O'Neill: *Endoc.* 29: 144-149, 1941. 38) Cellestino, da Costa. A.: *Arch. de Biol.* 28: 111-196, 1913. (Hoerr 1931より引用). 39) Clark, W.S., E.L. Manning and J.E. Appleton: *J. Clin. Invest.* 30: 633, 1951. 40) Collip, J.B., E.A. Anderson and D.L. Thomson: *Lancet* 225: 347-348, 1933. 41) Conn, J.W.L., L.H. Louis, M.W. Johnston and B.J. Johnston: *Proc. Am. Soc. Clin. Invest.* 40th. Meet. 11. 1948 (Greep and Jones 1949より引用). 42) Croke, A.C. and J.R. Gilmour: *J. Path. and Bac.* 47: 525-544, 1938. 43) Cutuly, E.: *Anat. Rec.* 66: 119-122, 1936. 44) Cutuly, E., E. Cutuly and D. Mc Cullagh: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 38: 818, 1938. 45) Daughady, W.H. and C.M. Mac Bryde: *J. Clin. Invest.* 24: 519, 1950. 46) Deane, H.W. and R.O. Greep: *Am. J. Anat.* 79: 117-137, 1946. 47) Deane, H.W. and G.M.C. Masson: *J. of Clin. Invest.* 11: 209-212, 1951. 48) Deane, H.W. and J.M. Mc Kibbin: *Endoc.* 38: 385-400, 1946. 49) Deane, H.W. and A. Morse: *Anat. Rec.* 100: 127-141, 1948. 50) Deane, H.W. and A.M. Seligman: *Vitamin and Hormones* 11: 173, 1953. 51) Deane, H.W. and J.H. Shaw: *J. Nutrit.* 34: 1-19, 1947. 52) Deane, H.W., J.H. Shaw and R.O. Greep: *Endoc.* 43: 133-153, 1948. 53) Delcastillo, E.B. and C.E. Rapela: *Rev. Soc. argent. de biol.* 21: 338-359. 1945. 54) Dempsey, E.W.: *Recent Prog. in Horm. Res.* 3: 127-157, 1948. 55) Dempsey, E.W., R.O. Greep and H.W. Deane: *Endoc.* 44: 88-103, 1949. 56) Desaulles, P., J. Tripod and W. Schuler: *Schweiz. Med. Wsehr.* 83/45: 1088, 1953. 57) Dixon, H.B.F., M.P. Stack-Dunne, F.G. Young and D.B. Cata: *Nature* 168: 1084, 1951. 58) Domm, L.V. and P. Leroy: *Anat. Rec.* 109: 395-396, 1951. 59) Dosne, C. and A. J. Dalton: *Anat. Rec.* 80: 211-217, 1941. 60) Dribben, I.S. and J.M. Wolfe: *Anat. Rec.* 98: 557-586, 1947. 61) Ducommun, P. and R. S. Mach: *Acta Endoc.* 3: 17-26, 1949. (Feldman 1951より引用). 62) Dugal, L.P. and M. Therien: *Endoc* 44: 420-426, 1949. 63) Earle, D.P., R.C. de Bodo, I.L. Schwartz, S. J. Farber, M. Kurtz and J. Greenberg: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 76: 608-612, 1951. 64) Edmonds, H.W.: *Arch. of Path.* 50: 727-735, 1950. 65) Eichner, D.: *Z. Zellforsch.* 38: 488, 1953. 66) Ellison, E.T. and J.C. Burch: *Endoc.* 20: 746-752, 1936. 67) Engle, F.L., M.G. Winton and C.N.H. Long: *J. Exptl. Med.* 77: 397-410, 1943. 68) Engstrom, H.: *Anat. Anz.* 83: 1-19, 1936 (van Dorp,

- A.W. and H.W. Deane *Anat. Rec.* 107: 264, 1950より引用). 69) Evans, G.: *Am. J. Physiol.* 114: 297-308, 1936. 70) Evans, H.M., M.E. Simpson and C.N.H. Li.: *Endoc.* 33: 237-238, 1943. 71) Evans, H.M., R.I. Pencharz, K. Meyer and M.E. Simpson: *Memor. Univ. of Calif.* 2: 319, 1933 (Swann 1940より引用). 72) Everett, N.B.: *Anat. Rec.* 103: 335-349, 1949. 73) Farrell, G.L. and J.B. Richards: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 83: 628-631, 1953. 74) Feldman, J.D.: *Anat. Rec.* 109: 41-69, 1951. 75) Flexner, L.B. and A. Grollman: *Anat. Rec.* 75: 207-221, 1939. 76) Forsham, P.H., G.W. Thorn, F.T.G. Prunty and A.G. Hills: *J. Clin. Endoc.* 8: 15-66, 1948. 77) Gaunt, R., C. Howell and N. Antonchak: *J. Clin. Endoc. & Med.* 12: 958, 1952. 78) Gaunt, R., A.S. Gordon, A.A. Renzi, J. Padawer, G.J. Fruhman and M. Gilman: *Endoc.* 55: 236-241, 1954. 79) Gaunt, R., C.H. Tuthill, N. Antonchak and J.H. Leatham: *Endoc.* 52: 407-423, 1953. 80) Gemzell, C.A., D.C. van Dyke, C.A. Tobias and H.M. Evans: *Endoc.* 49: 325-336, 1951. 81) Golla, Y.M.L. and M. Reiss: *J. Endoc.* 3: 5-9, 1942. 82) Gordon, M.L.: *Endoc.* 47: 13-18, 1950. 83) Gottschau, M.: *Arch. f. Anat. u. Entwickl.* 412-458, 1883. 84) Graham, G.S.: *J. Med. Res.* 34: 241-261, 1916. (Hoerr 1931より引用). 85) Greep, R.O. and H.W. Deane: *Endoc.* 40: 417-425, 1947. 86) Greep, R.O. and H.W. Deane: *Endoc.* 45: 42-56, 1949. 87) Greep, R.O. and I.C. Jones: *Recent. Prog. in Hormone Res.* 5: 197-261, 1950. 88) Gross, F.: *Recent. Prog. in Horm. Res.* 9: 1954. (Gaunt et al *Endoc.* 55: 236-240, 1954より引用). 89) Gross, F. and H. Gysll: *Acta Endoc.* 15: 199, 1954 (Gaunt, et al *Endoc.* 55: 236-240, 1954より引用). 90) Gruenwald, P.: *J. Morph.* 70: 353-387, 1942. 91) Gruenwald, P. and W.M. Konikov: *Anat. Rec.* 89: 1-18, 1944. 92) Grundy, H.M., S.A. Simpson, J.F. Tait and M. Woodford: *Acta Endoc.* 11: 220, 1952 (Gaunt et al 1954より引用). 93) Haberer, H. und O. Stoerk: *Sitzgsber. Ges. Ärzte Wiens* 21: 2, 1908. Bachmann, R.: *Handbuch der Mikroskopische Anatomie des Menschen. Fünfter Teil Die Nebenniere-Neurosekretion* 1954. Berlin, Göttingen Heidelberg. 94) Hall, K.: *J. Path. Bac.* 51: 75-82, 1940. 95) Hall, K. and V. Korenchevsky: *J. Physiol.* 91: 365-374, 1938 (Rennels 1952より引用). 96) Hartman, F.A., K.A. Brownell and R.A. Knouff: *Endoc.* 41: 213-219, 1947. 97) Hartman, F.A. and K.A. Brownell: *The Adrenal gland*. Lea & Febiger. Philadelphia. 1949. 98) Higgins, G.M. and D.J. Ingle: *Endoc.* 23: 424-428, 1938. 99) Hills, A.G., P.H. Forsham and C.A. Finch: *Blood.* 3: 755-768, 1948. 100) Hoen, E., H. Langefeld and C. Aehme: *Endokrinologie.* 21: 305-314, 1939. 101) Hoerr, N.L.: *Am. J. Anat.* 48: 139-193, 1931. 102) Homburger, F., S.C. Kasdon and W.H. Fishman: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 74: 162-164, 1950. 103) Houssay, B.A. and R. Sammartino: *Compt. Rend. Soc. Biol.* 114: 717-721, 1933. 104) Howard-miller, E.: *Am. J. Anat.* 40: 251-293, 1927. 105) Ingle, D.J.: *Am. J. Physiol.* 124: 627-630, 1938. 106) Ingle, D.J.: *Endoc.* 24: 194-196, 1939. 107) Ingle, D.J.: *Endoc.* 29: 649-652, 1941. 108) Ingle, D.J.: *Endoc.* 31: 419-438, 1942. 109) Ingle, D.J. and G. M. Higgins: *Am. J. Med. Sci.* 196: 232-239, 1938a. 110) Ingle, D.J. and G. M. Higgins: *Endoc.* 22: 458-464, 1938b. 111) Ingle, D.J. and G.M. Higgins: *Endoc.* 23: 419-423, 1938c. 112) Ingle, D.J. and G.M. Higgins: *Endoc.* 24: 379-382, 1939. 113) Ingle, D.J., G.M. Higgins and E.C. Kendall: *Anat. Rec.* 71: 363-372, 1938. 114) Ingle, D.J. and E.C. Kendall: *Science* 86: 245, 1937. 115) Ingle, D.J., C.H. Li and H.M. Evans: *Endoc.* 39: 32-42, 1946. 116) Ingle, D.J., M.C. Prestrud, C.H. Li and H.M. Evans: *Endoc.* 41: 170-176, 1947. 117) Jayne, E.P.: *Anat. Rec.* 115: 459-483, 1953. 118) Jones, I.C.: *Endoc.* 45: 514-536, 1949. 119) Jones, I.C.: *Am. J. Anat.* 86: 371-403, 1950. 120) Jost, A.: *Compt. Rend. Sod. de Biol.* 142: 273-275, 1948. (Kitchell, 1952より引用). 121) 河田, 青木: *ホルモンと臨床*, 1: 28-41, 1953. 122) Kendall, E.C.: *Endoc.* 30: 853-860, 1942. 123) Kinsell, L.W., F. Olson, L. Boling, J. Partridge and S. Margen: *J. Clin. Endoc.* 11: 1030-1033, 1951.

- 124) Kitchell, P. L. and L. J. Wells: *Anat. Rec.* 112: 561-592, 1952. 125) Knigge, K. M.: *Am. J. Anat.* 94: 225-272, 1954. 126) Knoff, R.A., J.B. Brown and B.M. Schneider: *Anat. Rec.* 79: 17-39, 1941. 127) Knowlton, A. I., E. N. Loeb, H. C. Stoerk and B. C. Seegal: *J. Exptl. Med.* 85: 187-198, 1947. 128) Knowlton, A. I., E. N. Loeb, B. C. Seegal and H. C. Stoerk: *Endoc.* 45: 435-445, 1949. 129) Kochakian, C. D.: *Am. J. Physiol.* 158: 51-56, 1949. 130) Kolmer, W.: *Arch. f. mikroskop. Anat.* 91: Abt 1: 5-139, 1918. (Hoerr 1931より引用). 131) Komard, E. L. and L. C. Wyman: *Endoc.* 49: 481-483, 1951. 132) 倉田: 東京慈恵会医科大学雑誌, 66: 第4号, 102-108, 1952. 133) Lane, N.: *Federation Proc.* 10: 78, 1951. (Baker, B. L. 1952より引用). 134) Lane, N. and R. C. de Bodo: *Am. J. Physiol.* 168: 1-19, 1952. 135) Lane, N. and R. C. de Bodo: *Am. J. Physiol.* 168: 1-19, 1952. 136) Leatham, J. H. and B. J. Brent: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 52: 241, 1943. 137) Leonard, S.L.: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 51: 302-303, 1942. 138) Leonard, S.L.: *Endoc.* 35: 83-90, 1954. 139) Lewis, R.A., Salvador de Majo and E. Rosenberg: *Endoc.* 45: 564-570, 1949. 140) Li, C.H., H.M. Evans and M.E. Simpson: *J. Biol. Chem.* 149: 413-424, 1943. 141) Long, C.N.H.: *Bull. New York Acad. Med.* 23: 260-282, 1947 a. (Sayers 1950より引用). 142) Long, C.N.H.: *Fed. Proc.* 6: 461-471, 1947 b. (Sayers 1950より引用). 143) Ludewig, S. and A. Chanutin: *Endoc.* 41: 135-143, 1947. 144) Luetscher, J. A. Jr and B. B. Johnson: *J. Clin. Invest.* 33: 276-286, 1954. 145) Luft, R. and B. Sjogren: *Nord. Med.* 46: 1319, 1951. (Gaunt 1953より引用). 146) Lux, L., G.M. Higgins and F.C. Mann: *Anat. Rec.* 67: 353-365, 1937. 147) Mac Farland, W.E.: *Anat. Rec.* 93: 233-247, 1945. 148) Mac Kay, E.M. and L.L. Mackay: *J. Exptl. Med.* 43: 395-402, 1926. 149) Mackay, E.M. and W.O. Pollard: *J. Path. Bac.* 34: 73-79, 1931. 150) Mattox, V.R., H.L. Masson and Albert: *Proc. Staff. Meet. Mayo. Clinic.* 28: 569, 1953. 151) McPhail, M.K.: *Proc. Roy. Soc. London Series B.* 117: 45-63, 1935. (Knigge, R.A. 1954より引用). 152) Meyer, R.K., C.H. Mellisch and H.S. Kupperman: *J. Pharm. and Exptl. Therap.* 65: 104-114, 1939. 153) Miller, R.A.: *Am. J. Anat.* 86: 405-437, 1950. 154) Miller, R.A. and O. Riddle: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 41: 518-522, 1939. 155) Miller, R. A. and O. Riddle: *Am. J. Anat.* 71: 311-341, 1942. 156) Miller, R.A. and O. Riddle: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 52: 231-233, 1943. 157) Mitchell, R.M.: *Anat. Rec.* 101: 161-185, 1948. 158) 宮川: 日産婦誌, 5: 9号: 953-955, 1953. 159) Moon, H.D.: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 43: 42-44, 1940. 160) 森: 新撰内分泌学, 1955. 161) Mulon, P.: *Compt. Rend. Soc. Biol.* 55: 592-595, 1903. (Salmon 1941より引用). 162) 中尾: 日新医学, 39: 387-394, 1952. 163) Nathanson, I.T. and A.M. Brues: *Endoc.* 29: 397-401, 1941. 164) Nichols, J.: *Arch. Path.* 45: 717-721, 1948. 165) 大槻: 日内分泌学雑誌, 31巻: 第10号: 468-512, 1956. 166) 大森: 成医会雑誌, 65: 原著第3号, 83-92, 1951. 167) Orent-Keiles, E., A. Robinson and E.V. McCollum: *Am. J. Physiol.* 119: 651-661, 1937. 168) Pearson, O.H.: *Recent. Prog. in Horm. Res.* 6: 1951. 169) Perla, D.: *Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med.* 32: 655-658, 1935. 170) Popja'k G.: *J. Path. and Bac.* 56: 485-496, 1944. 171) Reese, J.D. and H.D. Moon: *Anat. Rec.* 70: 543-556, 1938. 172) Reifenstein, E.C. Jr., A.P. Forbes, F. Albright, E. Donaldson and E. Carroll: *J. Clin. Invest.* 24: 416-434, 1945. 173) Rennels, E.G.: *Anat. Rec.* 112: 509-528, 1952. 174) Riddle, O.: *Cold Spring Harbor Symp.* 5: 262, 1937. (Swann 1940より引用). 175) Salmon, T.M. and R.L. Zwemer: *Anat. Rec.* 80: 421-427, 1941. 176) Sarason, E.L.: *Arch. Path.* 35: 373-390, 1943. 177) 佐藤: 東京慈恵会医科大学雑誌, 66: 第4号, 109-112, 1952. 178) Sayers, G. and M.A. Sayers: *Endoc.* 40: 265-273, 1947. 179) Sayers, G. and M.A. Sayers: *Recent. Prog. in Horm. Res.* 2: 81-115, 1948. 180) Sayers, G.: *Physiol. Rev.* 30: 241-320, 1950. 181) Sayers, G., M. A. Sayers, E. G. Fry, A. White and C. N. H. Long: *Yale J. Biol. Med.* 16: 361-392, 1944 (Hartman 1949より引用). 182) Sayers, G., M.A. Sayers, T.Y. Liang and C.N.H. Long: *Endoc.* 38: 1-9,

1946. 183) Sayers, G., A. Winter and C.N.H. Long : J. Biol. Chem. 149 : 425-436, 1943. 184) Schaffer, W. H. : Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med. 30 : 1363-1365, 1933. 185) Schour, I. and J. M. Rogoff : Am. J. Physiol. 115 : 334-344, 1936. 186) Schweizer, M. and M. E. Long : 46 : 191-206, 1950. 187) Selye, H. : Endoc. 21 : 169-188, 1937. 188) Selye, H. : J. Clin. Endoc. 6 : 117-230, 1946. 189) Selye, H. : Textbook of Endoc. Acta Endoc. Inc. Montreal, Canada 1949. 190) Selye, H. : Stress. Acta Inc. Montreal 1950. 191) Selye, H. and C. Dosne : Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med. 44 : 165-167, 1940. 192) Selye, H. and C. Dosne : Endoc. 30 : 581-584, 1942. 193) Selye, H. and H. Jensen : Ann. Rev. Biochem. 15 : 347-360, 1946. 194) Selye, H., E. M. Rowley and C. E. Hall : Proc. Exptl. Biol. & Med. 54 : 141-143, 1943. 195) Selye, H. and H. Stone : On the Experimental Morphology of the adrenal cortex : Charles. C. Thomas Springfield 1950. 196) Shumacker, H.B. and W.M. Firor : Endoc. 18 : 676-632, 1934. 197) 島本 : Acta Scholae Medicinalis Univ. Kyoto, Jap. XXXIII, 1-44, 1955. 198) Simpson, S. A., J. F. Tait, A. Wettstein, R. Neher, J. V. Euw and T. Reichstein : Experimentia 9 : 333, 1953. (Swingle, W. W. et al : Endoc. 54 : 698-705, 1954より引用). 199) Smith, P. E. : Anat. Rec. 32 : 221, 1926. 200) Smith, P. E. : Am. J. Anat. 45 : 205-273, 1930. 201) Smith, D. E. : Endoc. 38 : 402-403, 1946. 202) Smith, D. E. : Am. J. Physiol. 146 : 133-139, 1946. 203) 鈴木 : 東京慈恵会医科大学雑誌, 66 : 第4号, 42-47, 1952. 204) Swann, H. G. : Physiol. Rev. 20 : 493-521, 1940. 205) Swinyard, C. A. and H. A. Bruner : Endoc. 26 : 886-890, 1940. 206) Talbot N.B., F. Albright, A.H. Saltzman, A. Zygmuntowicz and R. Wixon : J. Clin. Endoc. 7 : 331-350, 1947. 207) 田所 : Gumma. J. of med. Science 3 : 121-137, 1954. 208) 橘 : 成医会雑誌, 65, 原著第3号, 74-82, 93-104, 1951. 209) Tepperman, J., F. L. Engel and C. N. H. Long : Endoc. 32 : 373-402, 1943. 210) Tobin, C. E. : Am. J. Anat. 65 : 151-176, 1939. 211) Turner, C. D. : Anat. Rec. 73 : 145-162, 1939. 212) Vaccarezza A.J. : medicina 5 : 425-445, 1945 (Deane H.W. and R.O. Greep, 1946より引用). 213) Waring, H. and E. Scott : J. Anat. 71 : 399-414, 1937. 214) Weaver, H. M. and W. O. Nelson : Anat. Rec. 85 : 51-66, 1943. 215) Weber, M. : Diss. morbung. 1938. 216) Wells, B.B. and E.C. Kendell : Proc. Staff. Meet. Majo. Clinic. 15 : 133 and 565 1940 (Stebbins, R. E. : Endoc. 49 : 671, 1951より引用). 217) Wexler, B. C., A. P. Rinfret, A. C. Griffin and H. L. Richardson : Endoc. 56 : 120-123, 1955. 218) Whita, W. E. : Proc. Roy. Soc. London. Series. B. 114 : 64-79, 1933 (Knigge, K.M. 1954より引用). 219) Wiesel, : Anat. Hefte 63 : 19, 481 bis 522 1902. 220) Williams, R. G. : Am. J. Anat. 77 : 53-79, 1945. 221) Williams, R. G. : Am. J. Anat. 81 : 199-231, 1947. 222) Winter, C. A. and F. E. Emery : Anat. Rec. 66 : 401-409, 1936. 223) Winter, C. A. and H. L. Hollings : J. Pharmacol. Exptl. Therap. 193 : 366, 1951. 224) Winter, C.A., H.L. Hollings and R.B. Stebbins : Endoc 52 : 123-134, 1953. 225) Winter, C. A., R. H. Silber and H. C. Stoerk : Endoc. 47 : 60-72, 1950. 226) Woodburg, D.M., C.P. Cheng, G. Sayers and L.S. Goodman : Am. J. Physiol. 160 : 217-227, 1950. 227) Woolley, G.W. : Recent. Prog. in Horm. Res. 5 : 383-405, 1950. 228) Woolley, G.M., E. Fekete and C.C. Little : Proc. Soc. Exptl. Biol. & Med. 45 : 796-798, 1940. 229) Woolley, G.M., E. Fekete and C.C. Little : Endoc. 28 : 341-343, 1941. 230) Wotton, R.M. and R.L. Zwemer : Anat. Rec. 86 : 409-416, 1943. 231) Wyman, L.C. : Am. J. Physiol. 87 : 29-41, 1928. 232) Yeakel, E.H. : Arch. Path. 44 : 71-77, 1947. 233) Yoffey, J. M. and J. S. Baxter : J. Anat. 83 : 89-98, 1949. (Feldman 1951より引用). 234) Zalesky, M. : Anat. Rec. 65 : 467-468, 1936. 235) Zelesky, M., L.J. Wells, M.D. Overholser and E.T. Gomez : Endoc. 28 : 521, 1941. 236) Zizine, L.A., M.E. Simpson and H.M. Evans : Endoc. 47 : 97-101, 1950. 237) Zwemer, R.L. : Am. J. Pathol. 12 : 107-114, 1936 (Feldman 1951より引用). 238) Zwemer, R. L. and R. Truszkowski : Science 83 : 558-560, 1936. 239) Zwemer, R.L., R.M. Wotton and M.G. Norkus : Anat. Rec. 72 : 249-263, 1938.

東 森 論 文 附 図 (其の1)

第1図

第2図

第3図

第4図

第5図

第6図

東 森 論 文 附 図 (其の2)

第7図

第8図

第9図

第10図

第11図

第12図

東 森 論 文 附 図 (其の3)

第13図

第14図

第15図

第16図

第17図

第18図

東 森 論 文 附 図 (其の4)

第19図

第20図

第21図

第22図

第23図

第24図

東 森 論 文 附 図 (其の5)

第25図

第26図

第27図

第28図

第29図

第30図

東 森 論 文 附 図 (其の6)

第31図

第32図

第33図