7) The respiratory function of the testicles showed the most remarkable diminution of all endocrine glands.

8) The longer the hyperglycemic phase became, the more the respiratory function of the testicles was hindered.

9) The more remarkable was the hyperglycemic condition, the more the respiratory function of testicles was hindered.

10) From the facts above mentioned, it is concluded that alloxan diabetes is not only pancreatogenic, but polyglandular diabetes participated by various endocrine glands such as hypophysis, adrenal cortex and testicles.

Chapter III. The Influence of the Serum of Alloxan Diabetic Rabbits on the Respiratory Function of Organic Tissues

I investigated the influence of the serum of alloxan diabetic rabbits upon the respiratory function of organic tissues of ordinary mice, comparing with that of the serum of ordinary rabbits and at the same time pursued the study of the influence of the serum of diabetic patients upon the respiratory function of organic tissues. Lastly I experimented the influence of the serum of alloxan diabetic rabbits at the hypoglycemic convulsionary phase.

I concluded as follows:

1) The serum of normal persons and normal rabbits remarkably accelerate the respiratory function of cerebral cortex, lungs, liver and renal cortex.

2) The serum of diabetic persons accelerated the respiratory function of organic tissues, but its degree was smaller compared with the serum of normal persons.

3) The serum of alloxan diabetic rabbits accelerated the respiratory function of organic tissues. The degree of acceleration was found greater than caused by that of ordinary rabbits.

4) Between the serum at the hypoglycemic convulsionary phase and that of persistent hyperglycemic phase, no difference could be found upon the respiratory function.

5) No poisonous material was found in the serum of alloxan diabetic rabbits such as found in the serum of diabetic patients.

6) Not concerning with the blood sugar level, the tendency was recognized of accelerating the respiratory function compared with the contrast.

7) Alloxan diabetes and human diabetes are not considered to have the same course.

Studies on the Aberration of Living Body with Tuberculosis

Especially the Aberration of Splenic Function Caused by Infection
with Tuberculosis, Indicated by the Salt-Fever

Shozo MORI and Satoru FUNATA

Department of Pathology, Tottori University School of Medicine

1) If normal rabbits were injected 5 per cent solution of NaCl in a dose of 1 cc per kg of their bodyweight (a small dose), or 4 cc per kg (a great dose), or 5 per cent solution of CaCl₂ in a dose

of 1 cc per kg of their bodyweight (a small dose), or 4 cc per kg (a great dose), the following responses were manifested; they did not react to a small dose of Na-stimulus and reacted with a fever to a great one, and also reacted with a fever to a small dose of Ca-stimulus and with a fall of their body temperature to a great one. But, if the rabbits were infected with tuberculosis by the method of pouring tuberculous bacilli into their trachea, they showed the following responses after 22-24 days later, when tuberculin reaction became positive, they did not react to both a small and a great dose of Na-stimulus and to a small dose of Ca-stimulus and then reacted for the first time with a fever to a great dose of the latter.

This abnormal reaction of the salt-fever indicated that the rabbits with tuberculosis became dull to the salt-stimuli.

2) If normal rabbits were injected the serum of the rabbits with tuberculosis in a dose of 3 cc per kg of their bodyweight and examined their responses to the afore-mentioned salt-stimuli 20 minutes later, they showed the abnormal reaction of the salt-fever as the rabbits with tuberculosis.

This fact indicated that active factors, which made positively the responses to the salt-stimuli dull, were generated in the blood of the rabbits with tuberculosis.

3) These active factors were found in a high grade in the splenic venous blood of the rabbits with tuberculosis at the earlier stage, when the tuberculin-reaction had not yet become positive and the action of these factors had not been observed so strongly in the general blood. These disappeared from the blood in the rabbits with tuberculosis by their splenectomy. If the spleen of the rabbits with tuberculosis was transplanted to a normal rabbit, the afore-mentioned abnormal reaction of the salt-fever became to occur in the latter, but the rabbits with tuberculosis that were transplanted with a spleen of normal rabbits showed again a former and normal reaction of the salt-fever.

It was indicated by these experiments that these active factors were products of the aberrated splenic function as a result of infection with tuberculosis.

Clinical Observations of Diabetes Insipidus

(2nd Report): Statistical Analysis of the Etiology

By

Teruo OMAE and Yoshimi MURAKAMI

From the Second Department of Internal Medicine (Director: Prof. G. Kusunoki),
Kyushu University School of Medicine

The etiology of 269 cases of diabetes insipidus which have been reported in Japanese literatures since 1927 was analyzed statistically, and the following results were obtained:

(1) Causative diseases and their frequency: Idiopathic 116 cases (43.1%), symptomatic 105 cases (39.0%), familial 27 cases (10.1%) and others 21 cases (7.8%). Among symptomatic cases neoplasms were 51 cases, being the highest, and Hand-Schüller-Christian's disease 18 cases, syphilis 16 cases, during pregnancy and following delivery 11 cases, trauma 5 cases, tuberculosis 3 cases and encephalitis 1 case.

結核症に於ける生体の変調に関する研究

——特に塩類熱を指標とした脾臓機能の変調に就いて——

鳥取大学医学部病理学教室（指導 故 徳光教授）

森 正 三，船 田 覚

目 次

緒 言	の作用
実験の方針とその方法	第3項 ツ反応陽転期結核家兎の血清の作用
実験成績	第2節 結核家兎血清内に出現する塩類熱抑制性作用因子の理化学的性状
第1章 正常家兎並びに結核家兎に於ける塩類熱	第1項 エーテル溶解性実験
第1節 正常家兎に於ける塩類熱	第2項 血清蛋白分劃実験
第1項 NaCl 熱	第3章 結核家兎流血中に出現する塩類熱抑制性作用因子の産生臓器
第2項 CaCl ₂ 熱	第1節 結核家兎の脾臓摘出実験
第2節 結核家兎に於ける塩類熱	第2節 結核家兎脾静脈血中の塩類熱抑制性作用因子の出現
第1項 感染初期の場合	第3節 結核家兎脾臓の他健常家兎への移植実験
第2項 ツ反応陽転前期の場合	第4節 結核家兎に於ける健常家兎脾臓の移植実験
第3項 ツ反応陽転期の場合	総括並びに考按
第2章 結核家兎血清が他健常家兎の塩類熱に及ぼす影響並びにその血清内作用因子の理化学的性状	結 論
第1節 結核家兎の耳静脈血清を以て前処置された正常家兎に於ける塩類熱	
第1項 感染初期結核家兎の血清の作用	
第2項 ツ反応陽転前期結核家兎の血清	

緒 言

従来諸疾患の症状を解明するに当つて生体の臓器機能の量的変化のみを重視して、その機能の亢進或いは減退を以て説明して来たのであるが、徳光¹⁾⁹⁾²²⁾³²⁾は斯かる場合生体の臓器機能の質的变化即ち変調を考えなければ説明することが出来ない多数の事実を明らかにした。即ち斯かる着眼より昭和11年以来既に同門の人々によつて 1) 反復刺激（豊田²⁾、森³⁾、佐藤⁴⁾、内山⁵⁾、増田⁶⁾、金子⁷⁾、徳光⁸⁾、岩本⁹⁾、久野¹⁰⁾、中井¹¹⁾、中下¹²⁾、岡本¹³⁾、相馬¹⁴⁾、松田¹⁵⁾等、2) 神経切除（金¹⁶⁾、宮地（正）¹⁷⁾、白川¹⁸⁾等）、3) 全身病（宮地（高）¹⁹⁾、岩下²⁰⁾、白川・結城²¹⁾、徳光²²⁾、笠田²³⁾等）、4) 内分泌臓器の摘出（三輪²⁴⁾、松尾²⁵⁾、栗原²⁶⁾、洪村²⁷⁾、長谷川²⁸⁾、中井²⁹⁾³⁰⁾、中下³¹⁾、徳光³²⁾、松田³³⁾等）によつて諸種臓器の機能に質的变化即ち変調が起ることを証明している。而して斯かる機能変調を証明する方法として、徳光¹⁾⁸⁾²²⁾³²⁾は、1) その個体に或種の刺激を加えた場合に健常個体の反応と異なつて無反応乃至逆反応等の異常反応を呈すること、2) 斯かる個体の血清を以て前処置された他健常個体に同様刺激を加えても、正常反応を示さず無反応或いは逆反応等の異常反応を起す、即ち前処置血清中に斯かる反応を起させるような或種の作用物質の存在が認められ、この作用物質は或臓器の静脈血内に最も多く且早期に現われ、この臓器を摘出すると直ちに一般流血中から消失して生体の現わす反応も旧に復すること、3) 正常時に相拮抗するような二物質を産生してい

るが、その中の一物質が多量で他物質は少量であるような臓器に於てその産生能が逆になること、——の3条件の中2条件を証明すれば、その臓器機能に変調が起つていると言うことが出来る」と述べている。例えば梅毒に於ては己に、宮地¹⁵は紫外線の血小板に及ぼす影響が正常と逆になることから脾臓機能の変調を証明し、岩下²⁰は流血中にクロール上昇性作用物質が出現することを認めて、之は肝臓機能に変調が起つた為であることを明らかにし、金¹⁶は血清カルシウム代謝の変動が起ることから上皮小体機能の変調を証明している。而して梅毒同様に全身病である結核症に於ては、独り同門笠田²³が白血球及び血小板増多性物質を注射することによつて正常とは逆に減少反応を示すことを認め、之は脾臓機能に変調が起つた結果であることを明らかにした。そこで之の追試として著者は、既に伊東²¹、岩本⁹、中井^{29,30}が夫々の実験に於て臓器機能の変調を証明する為の指標とした塩類熱反応を利用して、結核症に於ける特定臓器機能の変調を証明せんと本実験を試みたのである。

実験の方針とその方法

結核家兎に於ける NaCl 熱及び CaCl₂ 熱（以下Na 熱及び Ca 熱と略記）反応が、無反応或いは逆反応等の異常反応を呈するか否かを先ず第1の実験として検索し、若し斯かる異常反応が起ることが分かつたならば、次に第2の実験としてその血清を他個体に静注前処置することによつて異常 Na 熱・Ca 熱反応を積極的に起させるような作用が結核家兎血清に認められるか否かを追及し、若し斯かる作用を確認した場合には更に第3の実験として血清中のこのように積極的に作用する因子が何れの臓器機能の変化に由来するものであるかを究明することとした。

実験には少くとも1週間以上豆腐粕と野菜とに馴致させられた家兎を用いた。元来家兎体温は可成り外界の温度に影響され易いので（若松³⁵、今村³⁶、福田³⁷、鍵山³⁸等）、室温は出来る丈 20~24°C の一定温度に保つた。家兎の検温に際しては、動物を膝の上に軽く抱えて平型1分計を肛門内に3cmの一定の深さに挿入し、水銀柱の安定するのを待って目盛を読んだ。著者の実験に於ける家兎の正常体温は中井^{29,30}の測定値より少々低く、岩本⁹の測定値に略々一致した値、即ち $38.5 \pm 0.4^\circ\text{C}$ が大部分であつた。亦日次的、時間的家兎体温の変動は前2報告者の実験値と一致した値、即ち 0.5°C 以下であつたが、稀に夫以上の変動を見る例は実験から除外した。従つて各実験に於ける 0.6°C 以上の体温変動を有意義とした。亦夏期にあつては、家兎の正常体温が一般に上昇すると共に不安定となつて、稀に 40°C にも達することがあるのみならず、塩類熱特に Ca 熱は屢々不安定となるので、この時期には実験を行わなかつた。

塩類熱反応の刺激源として用いた NaCl 及び CaCl₂ は共に5%溶液として家兎に耳静脈内注射を行つたのであるが、その用量として1.0cc/kgを少量、4.0cc/kgを大量と仮称して以下実験を行うこととした。従つて NaCl 量は大量注射の場合には0.2g/kgとなるから、家兎血液含有量の約 $\frac{1}{2}$ 強である。CaCl₂ 量は少量注射の場合でも0.05g/kgとなつて、家兎血清中の Ca 含有量に比較して極めて大量である。亦塩類熱反応の判定は刺激源 NaCl 或いは CaCl₂ 溶液を家兎耳静脈内に除々に注入して、注射後15分、30分、1時間、1.5時間、2、3、4、5、6時間、時には7時間まで逐時的に検温して、 $\pm 0.6^\circ\text{C}$ 以上の体温変動を有意義値として行つた。而してこの場合時間的或いは食事による体温変動を避ける為、午前8~9時頃の一定時間より実験を開始し、亦前日夕食より実験終了まで飼料を与えなかつた。斯様な塩類による体温の変動は、数回予備実験を行つて常に同一傾向の反応を示す家兎に就いてのみ実験を進めることとしたのである。

結核感染方法；結核菌は米子医大（現鳥取大学医学部）細菌学教室より分与された松本保人型結核菌乳液（1.0cc:5mg）を0.5cc/kgの割合に気管内に注射量を以て徐々に注入した。

実験的結核家兎の症状は客観的には正常家兎と判然と区分することは困難であるが、X線によつてその肺臓に浸潤像を確認すると同時に、ツ反応の陽転したものを以て結核家兎として実験に供した。而して結核菌気管注入法による結核罹患家兎のツ反応陽転は気管注入後22~24日の間であつて、その大部分は注入22日及び23日であつた。この成績は笠田²³の菌静注法と時期は一致している。亦笠田²³は剖検所見並びに生体反応を参照して便宜上次の3期に分類しているので、著者も笠田の実験との対比上この分類に従つた。

1) 感染初期：結核菌気管注入後13日迄にして、ツ反応（10%ツベルクリン液を用う）が陰性であるばかりでなく、その他客観的に全く無症状な時期。

2) ツ反応陽転前期：菌気管注入後14～21日の期間にして、ツ反応は未だ陰性であるが客観的症候として食欲少々減退して軽度の体重減少を見る時期。

3) ツ反応陽転期：菌気管注入後略々22～23日目にしてツ反応は陽転し、以後殊に食欲の減退と共に活動性が衰えて体重の減少も著明となり、X線で肺野に明らかな活動性病巣を認める時期。

実 験 成 績

第1章 正常家兎並びに結核家兎に於ける塩類熱

第1節 正常家兎の塩類熱

第1項 NaCl 熱

狭間³⁷⁾の報告によるとNa溶液は灰白結節に直接作用して体温上昇を起させるものであると言っているが、Freund⁴⁰⁾、伊東³¹⁾によるとNa熱は空腹時には発現し難いと述べている。併しながら伊東³¹⁾、今村³⁶⁾、池上⁴¹⁾、岩本⁸⁾、中井²⁹⁾、³⁰⁾の行つたその後の実験に於て、5% NaCl 溶液1.0～2.0cc/kg注射用量では発熱を見なかつたが、池上⁴¹⁾、岩本⁸⁾、中井²⁹⁾、³⁰⁾の行つた5% NaCl 溶液3.5～4cc/kg（血液内食塩含有の約1/2量）の注射用量に於ては、発熱を明らかに認めている。

著者は以上の報告成績を追試確認する為、以下NaCl溶液注射による塩類熱実験を行つた。即ち正常家兎にNaCl溶液を小量（5%溶液1cc/kg）及び大量（5%溶液4cc/kg）を注射して逐時的に体温変動を検した。その結果は第1表に見られるように（各実験群は家兎10羽宛に就き行つたが、紙面の都合上以下各3例宛の成績を表示した）、小量注射例に於ける7時間に亘る体温の観察に於ては対照の無処置の場合と何等異なることなく $+0.2^{\circ}\text{C}$ ～ -0.1°C の範囲の動揺を見るに過ぎなかつたが、大量注射例に於ては注射後0.5～1時間経つてから同1.5～4時間後に亘る間に於て最高発熱度 $+0.8^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.3^{\circ}\text{C}$ を示す発熱を認めた。従つてこの成績は池上⁴⁾、岩本⁹⁾、中井²⁹⁾、³⁰⁾の実験成績に一致した結果であつた。

第1表 正常家兎の無処置の場合に於ける一日中の体温の逐時的変動（対照）
及び小量並びに大量注射例のNa熱反応（単位 $^{\circ}\text{C}$ ）（室温 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$ ）

家番 兎号	体 重	時間 NaCl量	塩 類 熱											発 熱 度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
1	1900	無 処 置	38.6	38.5	38.6	38.6	38.4	38.6	38.4	38.4	38.5	38.6	38.6	+ 0 -0.2	
2	2000	同 上	38.3	38.3	38.4	38.4	38.1	38.2	38.4	38.4	38.3	38.2	38.2	+0.1 -0.2	
3	2000	同 上	38.5	38.6	38.5	38.5	38.6	38.7	38.7	38.5	38.6	38.6	38.5	+0.2 -0.1	
4	2100	小 量	38.4	38.3	38.3	38.3	38.4	38.4	38.5	38.4	38.4	38.3	38.4	+0.1 -0.1	無反応
5	2000	同 上	38.4	38.5	38.5	38.4	38.5	38.4	38.4	38.3	38.4	38.5	38.4	+0.1 -0.1	無反応
6	2200	同 上	38.3	38.3	38.4	38.5	38.4	38.4	38.4	38.3	38.5	38.2	38.3	+0.2 -0.1	無反応
7	1900	大 量	38.1	38.2	38.4	39.0	39.2	39.3	39.2	39.4	39.0	38.6	38.2	+1.3	発 熱
8	2000	同 上	38.5	39.1	39.3	39.2	39.2	39.2	39.0	39.0	38.8	38.6	38.5	+0.8	発 熱
9	1900	同 上	38.3	38.8	39.1	39.1	38.9	39.0	39.0	38.9	38.7	38.5	38.3	+0.9	発 熱

第2項 CaCl_2 熱

狭間³⁰⁾の報告によると Ca 溶液を実験動物の灰白結節に直接注入するとその体温は下降するし、亦同様に耳静脈内に注射しても体温下降を来たことを明らかにしている。高橋⁴²⁾は CaCl_2 溶液小量注射によつて発熱を認めて之は中枢性のものであると述べ、今村³⁶⁾、伊東³⁴⁾、池上⁴⁾も Ca 熱は中枢性作用機転によるもので1cc/kg用量(小量)で発熱し、2cc/kg用量(大量)で体温下降を起すことを認め、亦岩本⁹⁾、中井²⁰⁾³⁰⁾の成績も之と一致している。著者も之等の報告を追試した結果、第2表に看られるように小量(5%溶液1cc/

第2表 正常家兎に於ける小量及び大量注射例の Ca 熱反応(単位 $^{\circ}\text{C}$)(室温 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	時間 CaCl_2 量	塩 類 熱											発熱度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
10	2300	小 量	38.9	39.3	39.2	39.1	39.8	39.7	39.7	39.6	39.5	39.1	28.8	+0.8	発熱
11	2100	同 上	38.4	38.5	38.7	38.9	39.0	39.0	39.1	38.9	38.6	38.5	38.5	+0.7	発熱
12	2000	同 上	38.4	38.8	39.1	39.2	39.1	39.3	39.4	39.3	39.1	38.7	93.5	+1.0	発熱
13	1800	大 量	38.4	38.0	37.9	37.5	37.6	37.6	37.8	37.9	38.1	38.3	38.4	-0.9	体温下降
14	1900	同 上	38.6	38.2	38.2	37.7	37.6	38.0	37.8	38.1	38.4	38.5	38.5	-1.0	体温下降
15	2100	同 上	38.5	38.3	38.0	37.6	37.6	37.8	37.8	38.0	38.3	38.5	38.5	-0.9	体温下降

kg)注射例では注射後0.5~1.5時間から同3~5時間後に亘る間に於て+0.7~+1.0 $^{\circ}\text{C}$ の最高発熱度を示す発熱を認め、亦大量(5%溶液4cc/kg)注射例では注射後1時間から同3時間後に亘る間に於て最大下熱度-0.9~-1.0 $^{\circ}\text{C}$ を示す体温下降を認めた。この成績も前報告者(今村³⁶⁾、伊東⁴³⁾、池上⁴¹⁾、岩本⁹⁾、中井²⁰⁾³⁰⁾の諸成績と一致した結果であつた。

第2節 結核家兎に於ける塩類熱

第1項 感染初期の場合

前節に於て行つたと同様に結核感染初期家兎(菌気管注入後5日目)に前記同様に Na 溶液の小量及び大量並びに Ca 溶液の小量及び大量を耳静脈内に注射して逐時的にその体温の変動を観察した。その結果は第3表に示されているように正常家兎に於ける同様実験の成績と殆ど差異を認めることが出来なかつた。

第3表 感染初期結核家兎の塩類熱(菌気管注入後5日目)(室温 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$)(単位 $^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	時 間 注 射 物	塩 類 熱											発熱度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
(4)	1900	NaCl (小量)	38.5	38.5	38.4	38.6	38.6	38.5	38.6	38.6	38.4			+0.1 -0.1	正常反応
(5)	1800	同 上	38.5	38.4	38.5	38.5	38.5	38.5	38.6	38.4	38.5			+0.1 -0.1	〃
(7)	1900	CaCl_2 (大量)	38.3	38.6	39.0	38.9	39.2	39.3	39.4	39.2	38.6	38.4	38.3	+1.1	正常反応
(9)	1900	同 上	38.5	38.8	38.9	39.3	39.4	39.2	39.0	38.7	38.4	38.6	38.5	+0.9	〃
(10)	2300	CaCl_2 (小量)	38.8	39.1	39.3	39.5	39.6	39.5	39.2	39.2	39.1	39.2	39.0	+0.8	正常反応
(12)	2000	同 上	38.3	38.6	38.9	39.0	39.0	38.9	39.1	38.7	38.5			+0.8	〃
(13)	1800	CaCl_2 (大量)	38.2	38.2	38.0	37.6	37.5	37.6	37.4	37.4	37.6	38.1		-0.8	正常反応
(14)	1900	同 上	38.4	38.2	38.1	37.9	37.7	37.8	38.0	38.0	38.1	38.3		-0.7	〃

第2項 ツ反陽転前期の場合

結核菌気管注入後18~20日目まで未だツ反応が陽転しない時期（ツ反応陽転は菌気管注入後22~23日目起る）に於て、前述のように塩類熱を検した。その結果は第4表に示されているように、Na熱反応に於ては小量注射例は正常と何等異なることなく無反応であつたが、大量注射例は正常家兎の場合と少々趣を異にして注射後1.5時間前後に於て最大変動差+0.4°Cと有意義値に達しない所謂発熱傾向を示すに過ぎなかつた。亦Ca熱反応に於ても正常家兎の場合と異なつて小量注射例は注射後0.5~3時間の間に於て最大変動差+0.4~+0.5°Cと有意義値に達しない所謂発熱傾向を示すのみであつて、亦大量注射例も注射後1~2時間に於て最大変動差-0.4°Cの所謂体温下降傾向を認めるに過ぎなかつた。従つてツ反陽転前期結核家兎はNa熱及びCa熱に対し共に少々鈍くなる傾向を示すものであると思われた。

第4表 ツ反陽転前期結核家兎の塩類熱（菌気管注入後18~20日目）
（単位°C）（室温20~24°C）

家番 兎号	体 重	時 間 注 射 物	塩 類 熱											発 熱 度	備 考
			前	5'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
(4)	1900	NaCl（小量）	38.3	38.4	38.3	38.5	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.4		+0.2 -0	正常反応
(5)	1800	同 上	38.3	38.4	38.4	38.3	38.9	38.3	38.3	38.2	38.2	38.5	38.3	+0.2 -0.1	〃
(7)	1900	NaCl（大量）	38.2	38.3	38.0	38.5	38.6	38.3	38.4	38.3	38.2	38.1	38.2	+0.4 -0.2	発熱傾向
(9)	1900	同 上	38.3	38.5	38.6	38.7	38.6	38.7	38.5	38.3	38.4	38.2	38.2	+0.4 -0.1	〃
(10)	2300	CaCl ₂ （小量）	38.7	38.9	39.1	39.0	39.0	39.1	39.1	39.1	39.0	38.8	38.7	+0.4 -0	発熱傾向
(12)	2000	同 上	38.4	38.5	38.9	38.8	38.7	38.6	38.9	38.7	38.5	38.5		+0.5 -0	〃
(13)	1800	CaCl ₂ （大量）	38.3	38.2	38.0	37.9	38.0	37.9	38.1	38.2	38.3	38.4		+0.1 -0.4	体温下降傾 向
(14)	1900	同 上	38.3	38.3	38.1	37.9	38.0	37.9	38.2	38.0	38.1	38.3		+0 -0.4	〃

第3項 ツ反陽転期の場合

第5表 ツ反陽転期結核家兎の塩類熱（ツ反陽転後2~3日目）
（単位°C）（室温20~24°C）

家番 兎号	体 重	時 間 注 射 物	塩 類 熱											発 熱 度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
(4)	1900	NaCl（小量）	38.5	38.3	38.2	38.3	38.1	38.2	38.4	38.3	38.4	38.5	38.4	+0 -0.4	無 反 応
(5)	1800	同 上	38.6	38.3	38.4	38.3	38.2	38.3	38.4	38.5	38.3	38.4	38.5	+0 -0.4	〃
(7)	1900	NaCl（大量）	38.4	38.2	38.1	38.0	38.2	38.1	38.2	38.3	38.4	38.3	38.4	+0 +0.4	無 反 応
(9)	1900	同 上	38.4	38.3	38.1	38.2	38.0	38.0	38.2	38.3	38.4	38.5	38.4	+0.1 -0.4	〃
(10)	2300	CaCl ₂ （小量）	38.9	39.0	38.9	38.9	39.0	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9		+0.1 -0	無 反 応
(12)	2000	同 上	38.7	38.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.8	38.6	38.6		+0.1 -0.1	〃
(13)	1800	CaCl ₂ （大量）	38.4	38.6	38.8	39.1	39.2	39.0	39.1	38.9	38.6	38.4		+0.8 -0	異常反応
(14)	1900	同 上	38.5	38.7	39.1	39.3	39.4	39.4	38.9	38.7	38.4	38.6		+0.9 -0.1	〃

結核菌気管注入後22~23日目に於て、大部分のものはツ反応が陽転してX線像に於て肺野に浸潤所見が認められるが、ツ反応陽転後2~3日経過した結核家兎に就いて前述のような塩類熱を検した。その結果は第5表に示されているように、正常家兎の場合と全く異なつて、Na熱反応に於ては小量及び大量注射共に注射後1.5時間に於て最大変動差 -0.4°C を示して有意義性の発熱が認められなかつた。亦Ca熱反応に於ては、小量注射例は殆ど体温変動を示さず $+0.1\sim-0.1^{\circ}\text{C}$ の範囲内に止まるが、大量注射例は注射後0.5~3時間の間に於て最高発熱度 $+0.8\sim+0.9^{\circ}\text{C}$ の有意義性の発熱を示した。即ちCa大量注射例に於ては正常の場合とは逆に発熱を見るが、Ca小量及びNa小量並びに大量注射例は何れも無反応であつた。従つてツ反応陽転期結核家兎はNa及びCa刺激源に対して極めて鈍感となる為、Na熱反応はその小量及び大量注射に対して共に無反応であつて、Ca熱反応は大量注射によつて始めて正常家兎の小量注射例と同様な発熱を示し、小量注射では全く反応を示さなかつた。

本章の小括

正常家兎はNa刺激源の小量注射(5%溶液1cc/kg)によつては発熱を示さないが、大量注射(5%溶液4cc/kg)によつて発熱を示し、亦Ca刺激源の小量注射(5%溶液1cc/kg)によつて発熱を来とし、大量注射(5%溶液4cc/kg)によつて体温の下降を来すことを著者は先づ第一に追試して確認したのである。然るに結核菌を気管内に注入することによつて家兎を結核に感染させると、感染初期に於てはNa熱及びCa熱反応共に正常家兎反応と全く異ならないが、ツ反応陽転前期に至るとNa熱反応に於てはその小量注射に対しては反応を示さないことは前同様であるが、大量注射に対しても発熱の傾向を示すのみとなり、亦Ca熱反応に於てもその小量注射に対して余り体温の上昇は見られず発熱傾向を示すのみであり、大量注射に対しても体温の下降は少くその傾向を見るのみとなる。即ち斯かる時期に於てはNa熱及びCa熱反応はその刺激源に対して稍々鈍感となるものであると考えられた。更にツ反応陽転期になると、Na熱反応はその小量或いは大量の刺激源に対して共に反応を示さず、亦Ca熱反応はその刺激源の小量に対して反応を示さないが、大量に対して正常家兎の小量注射の場合のように発熱するようになる。即ちツ反応陽転期結核家兎に於ては、Na熱及びCa熱反応は共にその刺激源に対して極めて鈍感になつてこのような異常反応を呈するものと思われる。

第2章 結核家兎血清が他健常家兎の塩類熱に及ぼす影響並びに その血清内作用因子の理化学的性状

前章に於て述べたように、家兎は結核症に罹患してツ反応が陽転する時期になると、Na熱反応はその刺激源の小量及び大量に対して共に無反応であつて、亦Ca熱反応もその刺激源の小量に対して無反応であつて大量に対して正常家兎の小量注射の場合のように発熱することを認めた。斯くの如く結核家兎がNa熱及びCa熱反応に於てその刺激源に対する感受性が鈍くなつて異常塩類熱を呈するようになることは、結核症に罹患することによつて個体のNa熱及びCa熱反応刺激源に対する感受性乃至反応性が消極的に量的減退を来した為のものであるか、或いは斯かる個体の反応を積極的に抑制するような作用因子がその血清中に出現する為のものであるかを検索する必要がある。即ち結核家兎の血清に斯かる作用があるか如何かを検索する為に、本章に於て結核各期に於ける耳静脈血を採つて、夫々の血清を他健常家兎に静注前処置して、その家兎の塩類熱反応を観察し、若し斯かる血清に塩類熱反応抑制作用が認められたならば、その血清作用の出現時期並びにその作用因子の理化学的性状の一部を検索することとした。

第1節 結核家兎の耳静脈血清を以て前処置された正常家兎に於ける塩類熱

対照実験 結核家兎耳静脈血清の作用を検索するに当つて、先づ健常家兎及び結核家兎の耳静脈血清を3cc/kgの割合に他健常家兎に静注して逐時的に検温し、以て体温に及ぼす影響のないことを確めた(第6表参照)。次に健常家兎血清を他健常家兎に3cc/kgの割合に静注前処置して、その20分後に前述の方法を以て

塩類熱反応を検した、その結果は第6表に示されているように、健康家兎が血清注射の前処置を受けなかつた時の塩類熱反応と何等相違が認められなかつた、即ち正常家兎血清には夫を静注前処置しても、他健体の塩類熱反応に何等影響を与えるような作用が認められなかつた。

第6表 正常家兎血清を以て前処置された正常家兎の前処置20分後に於ける
塩類熱（単位°C）（室温20~24°C）

家番 兎号	体 重	前処置せ る物質	時 間 注射物	血清注		塩 類 熱											発熱 度	備 考
				前	15'	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°	7°			
(15)	2200	健康家 兎血清	—	38.5		38.6	38.6	38.5	38.5	38.4	38.6	38.5	38.4			+0.1 -0.3	血清のみ	
(16)	2000	〃	—	38.8		38.7	38.6	38.5	38.6	38.7	38.8	38.8	38.6			+0 -0.3	〃	
(17)	1900	結核家 兎血清	—	38.4		38.3	38.2	38.0	38.0	38.1	38.3	38.5				+0.1 -0.4	血清のみ	
(18)	2300	〃	—	38.7		38.6	38.5	38.4	38.4	38.3	38.5	38.5	38.6			+0 -0.4	〃	
(19)	1900	健康家 兎血清	NaCl（小量）	38.4	38.5	38.4	38.4	38.5	38.3	38.5	38.6	38.4	38.3	38.4	38.4	+0.2 -0.1	正 常	
(20)	2100	〃	〃	38.4	38.3	38.5	38.3	38.2	38.1	38.4	38.3	38.4				+0.1 -0.3	〃	
(21)	2000	〃	NaCl（大量）	38.5	38.7	38.8	38.9	39.4	39.2	39.2	39.1	39.0	38.9	38.6		+0.9	正 常	
(22)	1800	〃	〃	38.4	38.4	38.7	39.0	39.3	39.2	39.1	39.0	38.6	38.4	38.3		+0.9	〃	
(23)	2100	〃	CaCl ₂ （小量）	38.5	38.4	38.5	38.8	38.9	39.2	39.4	39.3	38.9	38.7	38.5		+0.9	正 常	
(24)	2200	〃	〃	38.6	38.6	38.7	39.1	39.6	39.6	39.5	39.6	39.3	38.8	38.6		+1.0	〃	
(25)	2200	〃	CaCl ₂ （大量）	38.6	38.5	38.2	37.9	38.0	37.9	38.1	38.2	38.4	38.5			-0.7	正 常	
(26)	2000	〃	〃	38.4	38.6	38.4	38.0	37.7	37.7	37.9	38.0	38.4	38.5			-0.7	〃	

第1節 感染初期結核家兎の血清の作用

正常家兎耳静脈血清及び結核家兎血清を3cc/kgの割合に他健常家兎に注射しても体温に何等変動を与えないし、亦正常家兎血清を同様に他健常家兎に静注前処置しても、その塩類熱反応に何等影響を与えないことを確かめたので、感染初期結核家兎（菌気管注入後5日目）の血清を3cc/kgの割合に他健常家兎に静注前処置して、その20分後にNa熱及びCa熱反応を検したが、正常家兎血清の前処置或いは無処置の場合と何等異ならない正常反応を呈することが分かつた。即ちここでは重複を避ける為に第7表にCa熱反応の大量注射例のみを表示したのであるが、この表に看られるように2羽の実験家兎共に刺戟源注射後1時間から同2~3時間後の間に於て正常家兎のCa大量注射例同様に-0.8~-0.9°Cの最大体温変動差を示す体温下降が見られた。従つてこの時期の耳静脈血清には、他体のNa熱及びCa熱反応に影響を与えるような作用は全く認められないのである。

第7表 感染初期結核家兎（菌気管注入後5日目）の血清を以て前処置された正常家兎の
前処置20分後に於けるCa熱（大量注射例）（単位°C）（室温20~24°C）

家番 兎号	体 重	前 処 置 血 清	時 間 注射物	血清注		塩 類 熱								発熱度	備 考
				前	15'	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°		
27	1900	感 染 初 期	CaCl ₂ (大量)	38.6	38.5	38.4	38.1	37.8	37.9	37.8	38.1	38.4	38.6	-0.8	正 常
28	1800	(5 日 目) 血 清	〃	38.5	38.4	38.4	38.0	37.7	37.9	37.6	37.9	38.3	38.4	-0.9	〃

第2項 ツ反応陽転前期結核家兎の血清の作用

前項と同様の方法で結核感染後17～19日目のツ反応陽転前期結核家兎の耳静脈血清を3 cc/kgの割合に他健常家兎に静注前処置して、その20分後に前記方法を以て塩類熱を検した結果、Na熱反応に於てはその小量注射に対して反応を示さないことは正常反応と同様であつたが、大量注射に対しては正常と趣を異にしてその発熱は低くて傾向を示すのみであつた。亦Ca熱反応に於てはその小量注射に対して発熱は低く傾向を示すのみで、大量注射に対しても体温の下降度の低いところの異常反応の様相が窺えた。即ちこの成績の列挙は重複するところが多いので(第1章、第2節、第2項参照)、Ca熱反応の大量注射例のみを第8表として表示したのであるが、実験家兎2羽の中1例は注射後1～2時間の間に於て最大 -0.8°C の有意義性の体温下降を示したが、他の1例は注射後2時間に於て最大 -0.5°C の正常動揺圏内の体温下降を示したに過ぎなかつた。従つてこの時期に至ると、結核家兎の耳静脈血清にはNa熱及びCa熱を抑制するような作用が軽度ながら出現すると言ふことが出来ると思う。

第8表 ツ反応陽転前期結核家兎(菌気管注入後17～19日目)の血清を以て前処置された正常家兎の前処置20分後に於けるCa熱(大量注射例)(単位 $^{\circ}\text{C}$)(室温 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	前 処 置 血 清	時 間 注射物	血清注		塩 類 熱									発熱度	備 考
				前	15'	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°			
(29)	1800	ツ反応陽転 前期家兎血清	CaCl ₂ (大量)	38.5	38.4	38.2	38.1	37.7	37.8	37.9	38.3	38.4	38.6	-0.8	体温下降	
(30)	1700		//	38.5	38.4	38.3	38.4	38.2	38.1	38.0	38.3	38.5	—	-0.5	体温下降傾	

第3項 ツ反応陽転期結核家兎の血清の作用

前項の実験でツ反応陽転前期結核家兎の耳静脈血清には他健体のNa熱及びCa熱反応を軽度ながら抑制するような作用が認められたのであるが、次にツ反応陽転後3～5日目の結核家兎の耳静脈より採血し、この血清を3cc/kgの割合に他の健常家兎に静注前処置して20分後に前記方法を以て塩類熱反応を検した。その結果は第9表に示されているように、Na熱反応はその小量注射に対して正常動揺圏内の体温変動(1例は+

第9表 ツ反応陽転期結核家兎(ツ反応陽転後3～5日目)血清を以て前処置された正常家兎の前処置20分後に於ける塩類熱(単位 $^{\circ}\text{C}$)(室温 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	前 処 置 血 清	時 間 注射物	血清注		塩 類 熱								発熱 度	備 考
				前	15'	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°		
(31)	2100	ツ反応陽 転期家兎 血清	NaCl (小量)	38.4	38.6	38.4	38.5	38.4	38.3	38.4	38.6	38.7	38.8	+0.4 -0.1	無 反 応
(32)	1700		〃	38.5	38.6	38.3	38.2	38.2	38.4	38.4	38.5		+0.1 -0.3	〃	
(33)	2000		NaCl (大量)	38.6	38.7	38.6	38.4	38.5	38.4	38.6	38.4	38.5	38.7	+0.1 -0.2	無 反 応
(34)	1800		〃	38.4	38.5	38.4	38.1	38.1	38.1	38.2	38.2	38.1	38.3	+0.1 -0.3	〃
(35)	2000		CaCl ₂ (小量)	38.7	38.6	38.9	38.9	38.6	38.4	38.3	38.4	38.3	38.6	+0.2 -0.4	無 反 応
(36)	1900		〃	38.5	38.5	38.7	38.8	38.4	38.2	38.2	38.3	38.4	38.6	+0.3 -0.3	〃
(37)	1900		CaCl ₂ (大量)	38.6	38.5	38.6	38.8	39.1	39.2	39.2	39.1	38.9	38.7	+0.6 -0.1	異常反応
(38)	1900		〃	38.5	38.4	38.6	38.4	38.9	39.2	39.1	38.9	38.4	38.5	+0.7 -0.1	〃

0.4—0.1°C, 他の1例は+0.1—0.3°C)を示すのみでなく, 大量注射に対しても同様正常圏内の体温動揺(1例は+0.1—0.2°C, 他の1例は+0.1—0.3°C)を示すのみで, これは正常家兎の反応と異なつた所謂無反応である。亦Ca熱反応はその小量注射に対して反応を示さず(1例は+0.2—0.4°C, 他の1例は+0.3—0.3°C), 大量注射によつて始めて注射後1.5—2時間の間に於て最大変動差+0.6—+0.7°Cの発熱を示すので, これは正常家兎の反応と趣を異にした所謂異常反応である。

この事実は家兎が結核症に感染してツ反応が陽転する時期になると, その流血中にNa熱及びCa熱反応を積極的に抑制するような作用因子が出現することを意味するものである。但しこの時期に於ても結核家兎血清のみの単独注射では他健体に対して体温の変動を殆ど現わさないから, 本作用因子はNa熱及びCa熱反応に於ける生体の感受性乃至反応性を鈍感にならせるものと思われた。

第2節 結核家兎血清内に出現する塩類熱抑制性作用因子の理化学的性状

前節の実験で結核家兎は一定の時期に至ればその血清中にNa熱及びCa熱反応を抑制するような作用因子を産生するものであることが分かつた。そこで本節に於てその理化学的性状の一端を検索した。

第1項 エーテル溶解性実験

予めその作用の存在を確認したツ反応陽転期結核家兎の耳静脈血清を分液漏斗に容れ, 約5倍量の無水エーテルを加えて数時間強く振盪した後エーテル層を分離する。斯かる操作を3—4回繰返して血清エーテル溶解層と不溶解層に充分分離し, 集め得たエーテル溶解層を低温減圧下にてエーテルを充分に発散させ, 残留した油状物に生理的食塩水を加えて原血清量となし, 之に10%ゲラチン液を血清量5cc:1滴の割合に滴下して均質乳剤とする。一方エーテルに移行しなかつた部分も同様に充分乾燥して粉末となし, 之に原血清量の生理的食塩水を加えてよく振盪しながら2昼夜保存した後, 遠心沈澱してその上澄液を使用した。斯くして得たエーテル可溶性物質と不溶性物質とに就いて, その各々で以て他健常家兎を前処置して20分後に前述の方法でNa熱及びCa熱反応を検したところ, エーテル可溶性成分前処置例では正常塩類熱反応を呈したが, エーテル不溶性成分前処置例ではNa熱反応に於てはその小量及び大量注射に対して反応を示さず, Ca熱反応に於てもその小量注射に対しては反応を示さなかつたが, 大量注射に対して始めて発熱することが分かつた(表略)。即ちツ反応陽転期結核家兎のNa熱及びCa熱反応抑制性作用因子はその血清エーテル不溶性成分中に含まれている。

第2項 血清蛋白分割実験

前項の実験で結核家兎の血清中に出現する塩類熱反応抑制性作用因子が有機溶媒に不溶性の蛋白質内に在ることが分かつたので, 更に之をアルブミンとグロブリンとに別けて実験を行つた。予め本作用因子の存在を確認したツ反応陽転期結核家兎血清に, 飽和硫酸アンモン液を原血清量の約半量程除々に滴下しながら充分に攪拌して加えた後, 之を氷室内に数時間放置するとグロブリン沈澱を生ずる。本沈澱を低温乾燥して予め正確量を検定したコロジウム膜囊内に収容し, 1週間前後流水中で透析して硫酸イオンが全く消失してから囊内の液を採取し, 生理的食塩水で以て原血清量とする。一方グロブリン沈澱を除去した後の濾液に更に硫酸アンモン結晶を充分に飽和する程加えて数時間氷室内に放置し, 生じたアルブミン沈澱を上記のように流水透析を行つて非透析分に生理的食塩水を加えることによつて原血清量とする。

斯くして得たグロブリン分層及びアルブミン分層を原血清量3cc/kgの割合に夫々他健常家兎に静注前処置して20分後に前述のようにNa熱及びCa熱反応を検した結果, アルブミン分層注射前処置例に於ては正常Na熱及びCa熱反応を呈したが, グロブリン分層注射前処置例に於ては恰もツ反応陽転期結核家兎と同様にNa熱反応に於てその小量及び大量注射に対して共に反応を示さず, Ca熱反応に於てその小量注射に対しては反応を示さなかつたが, 大量注射に対して始めて発熱するような異常塩類熱反応を認めた(表略)。即ちツ反応陽転期結核家兎の流血中に出現するNa熱及びCa熱反応抑制性作用因子は中井³⁰⁾の行つた脳下垂体摘

出後のものと異なつたものであつて、血清グロブリン分層に含まれているコロヂウム膜に透析されないところの蛋白体である。

本章の小括

ツ反応陽転期結核家兎の現わす異常 Na 熱及び Ca 熱反応は結核症罹患によつて Na 熱及び Ca 熱反応に於ける個体の反応性が減退した為のものか、或いは Na 熱及び Ca 熱反応を積極的に抑制するような因子が新生されてその作用によつて反応が鈍感となるものであるかを決定する為に、ツ反応陽転期結核家兎血清を他健康家兎に静注前処置してから、その Na 熱及び Ca 熱反応を検したのである。その結果この前処置を受けた家兎はツ反応陽転期結核家兎の現わす Na 熱及び Ca 熱反応と全く同様な反応を呈するが、一方結核家兎血清単独では何等他健体の体温に影響を及ぼさないことから、ツ反応陽転期結核家兎血清内には Na 熱及び Ca 熱反応を積極的に抑制するような作用因子が産生されているものであることが分かつた。而して斯かる作用はツ反応陽転前期結核家兎血清にも多少認められるから、Na 及び Ca 熱反応抑制性作用因子は一般流血中にツ反応陽転前期から少量ながら出現し、ツ反応陽転期に至ると多量に出現するものと考えられる。亦本作用因子はエーテル不溶性で血清グロブリン分層中にあるコロヂウム膜に透析されない蛋白体成分中に含まれていることが分かつた。

第3章 結核家兎流血中に出現する塩類熱抑制性作用因子の産出臓器

前章迄の実験でツ反応陽転期結核家兎の流血中には Na 熱及び Ca 熱反応を積極的に抑制するような作用因子の出現することが分かつたので、本章に於てこの作用因子の産生臓器を追究する第一歩として脾臓と本作用因子の関係を検索することとした。

第1節 結核家兎の脾臓摘出実験

前章迄の実験で結核家兎の現わす異常 Na 熱・Ca 熱反応はその流血中に個体の現わす塩類熱を積極的に抑制するような作用因子が出現することと密接な関係があることが分かつたので、この作用因子と脾臓との関係を追究する為に、先づツ反応陽転期結核家兎で異常塩類熱反応を示すと共にその血清中に他健康家兎を静注前処置することによつて異常塩類熱反応を起させる作用が確認された時期にその脾臓を摘出して、脾摘2日目及び7日目に Na 及び Ca 熱反応を検すると共にその血清を以て他健体を静注前処置して20分後にその Na 熱及び Ca 熱反応に及ぼす影響を検した。その結果、第10表に示されているように脾摘2日目に於ける塩類熱は Na 熱反応に於てその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.4^{\circ}\text{C}$ の体温変動を示すのみで所謂無反応であつたが、大量注射に対しては注射後1.5～2時間に於て最大変動差 $+0.6^{\circ}\text{C}$ の発熱を示した、亦 Ca 熱反応に於てもその小量注射に対して注射後1.5～2時間に於て最大変動差 $+0.6^{\circ}\text{C}$ の発熱を示し、大量注射に対しては注射後1～1.5時間に於て最大変動差 -0.6°C の体温下降を呈した。即ち結核家兎は脾摘によつてその Na 熱

第10表 ツ反応陽転期結核家兎（陽転後14日目）の脾摘後2日目の塩類熱
（単位 $^{\circ}\text{C}$ ）（室温 $20 \sim 24^{\circ}\text{C}$ ）

家番 兎号	体 重	時 間 注射物	塩 類 熱									発 熱 度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°		
(5)	1700	NaCl (小量)	38.7	38.4	38.3	38.6	38.7	38.8	38.7	38.7	38.7	$+0.1$ -0.4	正常
(7)	1700	NaCl (大量)	38.6	38.4	38.7	38.9	39.2	39.2	39.1	38.8	38.7	$+0.6$ -0.2	正常
(10)	2200	CaCl ₂ (小量)	38.9	39.2	39.3	39.4	39.5	39.5	39.2	39.0	38.8	$+0.6$ -0.1	正常
(14)	1800	CaCl ₂ (大量)	38.8	38.5	38.3	38.2	38.2	38.4	38.7	38.8	—	$+0$ -0.6	正常

及び Ca 熱反応共に正常家兎反応に復帰するものであることが分かつた。亦一方当日の血清を以て前処置した他健常家兎の Na 熱及び Ca 熱反応は全く正常家兎の反応を示し、何等該血清による影響を受けないことが分かつた(表略)。即ち結核家兎の血清中に出現する塩類熱反応抑制性作用因子も亦脾摘によつて消失するものと思われた。

而して脾摘7日目に於ては第11表に看られるように、Na 熱反応はその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.2^{\circ}\text{C}$ 、

第11表 ツ反応陽転期結核家兎(陽転後14日目)の脾摘後7日目の塩類熱
(単位 $^{\circ}\text{C}$) (室温 $20 \sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	時 間 注射物	塩 類 熱								発 熱 度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°		
(5)	1700	NaCl (小量)	38.6	38.4	38.5	38.7	38.6	38.5	38.5	38.6	$+0.1$ -0.2	無反応
(7)	1600	NaCl (大量)	38.7	38.9	38.9	38.9	38.7	38.8	38.8	38.7	$+0.2$ -0	//
(10)	2200	CaCl ₂ (小量)	38.7	38.6	38.4	38.6	38.4	38.7	38.8	38.7	$+0.1$ -0.3	//
(14)	1800	CaCl ₂ (大量)	38.7	38.7	39.0	29.1	38.9	39.0	38.8	38.8	$+0.4$ -0	//

大量注射に対しても $+0.2 \sim -0^{\circ}\text{C}$ の正常動揺圏内の体温変動を呈し、亦 Ca 熱反応もその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.3^{\circ}\text{C}$ 、大量注射に対して $+0.4 \sim -0^{\circ}\text{C}$ の正常動揺圏内の体温変動を示すに過ぎなかつた。即ち脾摘7日目に於ては Na 熱及び Ca 熱反応は共に再び鈍くなつて反応を示さなくなる。亦その血清処置によつて他健体は Na 熱及び Ca 熱反応共にその反応を示さないようになる(表略)。この事実は藤村⁽⁴⁾によつて明らかにされたところであるが、脾摘によつて甲状腺及び上皮小体の機能変調が起つて、その変調甲状腺からは Na 熱反応抑制性作用因子が産生される為に生体の Na 熱反応は無反応となり、亦その変調上皮小体からは Ca 熱反応抑制性作用因子が産生される為に生体の Ca 熱反応も無反応となるものと解釈され、結核症とは無関係である。

第2節 結核家兎脾静脈血中の塩類熱抑制性作用因子の出現

結核家兎血清中に於ける Na 熱・Ca 熱反応抑制性作用因子がその脾臓から産生されるものであるとすれば、一般流血中に本因子が多少とも出現するツ反応陽転前期結核家兎の脾静脈血中には本因子が著明に認められる筈であるので、脾臓が本因子の産生臓器である証明の一つとして脾静脈血の作用を検索することとした。即ちツ反応陽転前期結核家兎の流血中には、Na 熱及び Ca 熱を反応多少とも抑制する作用があるが、ツ反応陽転期結核家兎の血清のように、他健体をして Na 熱反応に就いてはその小量乃至大量の刺激に対して無反応で、Ca 熱反応に就いてはその小量刺激源に対して無反応で大量に於ては発熱するような異常反応を惹起さ

第12表 ツ反応陽転前期結核家兎(菌気管注入後18~19日目)の脾静脈血清を以て前処置された
正常家兎の前処置後20分後に於ける塩類熱(単位 $^{\circ}\text{C}$) (室温 $20 \sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	前処置 血 清	時 間 注射物	血 清 注 入										発 熱 度	備 考
				前	15'	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°		
(39)	2000	ツ反応陽 転前期家 兎脾静脈 血清	NaCl (小量)	38.7	38.4	38.5	38.5	38.7	38.6	38.8	38.5	38.7	38.6	$+0.1$ -0.3	無反応
(40)	1900		NaCl (大量)	38.6	38.5	38.3	38.2	38.4	38.5	38.4	38.6	38.5	38.5	$+0$ -0.4	//
(41)	2100		CaCl ₂ (小量)	38.3	38.2	38.2	38.1	38.2	38.4	38.4	38.3	38.1	38.2	$+0.1$ -0.2	//
(42)	2000		CaCl ₂ (大量)	38.5	38.3	38.5	38.8	39.1	39.2	39.2	39.0	38.8	38.6	$+0.7$ -0.2	発 熱

せる程に強力な作用は認められない。斯かる時期（菌気管注入後18～19日目）の脾静脈血を採り、他健常家兎に3 cc/kgの割合に静注前処置して20分後に前記の方法を以てNa熱及びCa熱反応を検した。その結果は第12表に示されているように、Na熱反応に於てはその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.3^{\circ}\text{C}$ 、大量注射に対しても $+0 \sim -0.4^{\circ}\text{C}$ と、共に正常動揺圏内の体温変動を示して無反応であつて、Ca熱反応に於てもその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.2^{\circ}\text{C}$ の正常動揺圏内の体温変動を示し、大量注射に対して始めて注射後1～2時間に於て最大変動差 $+0.7^{\circ}\text{C}$ の発熱を示した。これはツ反応陽転期結核家兎の血清の作用効果と全く同じであつた。即ち一般流血中にはNa熱・Ca熱反応抑制作用が比較的軽度認められるに過ぎないツ反応陽転前期結核家兎の脾静脈血清には本作用が著明に認められることから、本作用因子は脾臓から産生されるものであることが確実となつたと信ずるのである。

第3節 結核家兎脾臓の他健常家兎への移植実験

本章第1節に於てツ反応陽転期結核家兎の脾臓を摘出することによつて、その流血中にNa熱・Ca熱反応抑制性作用因子が一時的に消失して該家兎は或程度正常Na熱・Ca熱反応を呈するようになること、更に亦第2節に於て結核家兎の脾静脈血中にはツ反応陽転前期即ち塩類熱反応抑制作用が著明でない時期に於て既にNa熱及びCa熱反応抑制作用が強力に認められることを明らかにしたので、結核家兎流血中のNa熱・Ca熱反応抑制性作用因子は脾臓から産生されるものであるとの確信を得た。そこでこのツ反応陽転期結核家兎の脾臓を他健常家兎に移植すると、その移植脾成分が一時的に多量に吸収されて在来の正常脾の機能を上廻る為に、被移植家兎には異常Na熱・Ca熱反応が起る可能性がある。

著者はその流血中に塩類熱反応抑制性作用因子が証明されるツ反応陽転期結核家兎（陽転後10日目）の脾臓を摘出して細切し、他健常家兎の腹壁筋膜下に移植して、移植後2日及び4日目に前記の方法を以てNa熱及びCa熱反応を検した。その結果は第13表に示されているように、Na熱反応に於てはその小量注射に

第13表 ツ反応陽転期結核家兎脾臓を移植された健常家兎の塩類熱
(単位 $^{\circ}\text{C}$) (室温 $20 \sim 24^{\circ}\text{C}$)

家番 兎号	体 重	時 間 注射物	塩 類 熱										発 熱 度	備 考
			前	15'	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	4°	5°	6°		
(43)	1900	NaCl (小量)	38.6	38.5	38.3	38.4	38.3	38.5	38.6	38.6	38.5		$+0$ -0.3	無 反 応
(43)	"	NaCl (大量)	38.4	38.5	38.3	38.2	38.4	38.3	38.4	38.5	38.5		$+0.1$ -0.2	異常反応
(44)	1800	CaCl ₂ (小量)	38.3	38.1	38.2	38.0	38.2	38.3	38.4	38.3			$+0.1$ -0.3	異常反応
(44)	"	CaCl ₂ (大量)	38.1	38.6	38.9	39.1	39.6	39.5	39.2	39.2	38.6	38.2	+1.5	異常反応

対して $+0 \sim -0.3^{\circ}\text{C}$ 、大量注射に対して $+0.1 \sim -0.2^{\circ}\text{C}$ の体温変動を示すに過ぎず、Ca熱反応に於てもその小量注射に対して $+0.1 \sim -0.3^{\circ}\text{C}$ の正常動揺圏内の体温変動を示し、大量注射に対して始めて注射後0.5時間より同4時間後に亘る間に於て最大変動差 $+1.5^{\circ}\text{C}$ の有意義値の発熱を認めた。而して移植後10日も経過すると、斯かる異常塩類熱反応は認められない。この際移植片を摘出して鏡検すると、その組織は完全に壊死に陥つて細胞核は殆ど認められなかつた。亦被移植家兎のツ反応を長期に亘つて検査しても陽転は認められなかつたので、移植脾の作用は生体のツ反応陽転作用即ち結核アレルギー作用と同一のものではないと思われる。

第4節 結核家兎に於ける健常家兎脾臓の移植実験

前節迄の実験によつてツ反応陽転期結核異常Na熱・Ca熱反応を現わす時期には、その脾臓の機能に何等かの変化が起つて斯かる異常反応を起せさるような作用因子を流血中に産出するものであることが略々

分かつた。而してこの脾臓の機能変化が量的のものか質的のものであるかを決定する方法として、徳光¹⁾⁸⁾²²⁾³²⁾及びその門下(宮地(正)¹⁷⁾、宮地(高)¹⁹⁾、岩本⁹⁾、久野¹⁰⁾、中井⁹⁾³⁰⁾、相馬¹⁴⁾、笠田³³⁾等)は正常同名臓器移植実験を推奨して、若し機能の質的变化であるならばこれによつて異常反応が正調に復帰する可能性のあることを強調した。

そこで著者はツ反応陽転期結核家兎の腹壁筋膜下に細切した正常脾臓を移植して、移植後2日及び4日目に前記の方法を以てNa熱及びCa熱反応を検した結果、Na熱反応に於てはその小量注射に対して反応を示さないが、大量注射に対しては発熱を来し、Ca熱反応に於てはその小量注射に対し発熱を示し、大量注射に対しては体温の下降を来した(表略)。即ち結核家兎は正常脾臓を移植することによつて正常家兎に於ける塩類熱反応と全く同様な塩類熱反応を示すようになる。而してこの正常反応の復活もその移植片の壊死に陥る移植後約10日迄である。

この移植実験によつて結核家兎の脾臓機能には質的变化が起つていることが確実になつたものと思う。即ち脾臓機能の量的変化のみから考えるならば、異常塩類熱反応を呈する結核家兎に正常脾臓を移植した場合、その移植脾臓成分が一時に多量に吸収されて流血中に汨濫することによつて正常反応に復すると言う事実と前節の正常家兎への結核家兎脾臓移植によつて異常塩類熱反応を呈する事実とは甚だ矛盾した結果となるからである。

本章の小括

ツ反応陽転期結核家兎はNa熱反応に於てその刺激源の小量及び大量に対して共に反応を示さず、亦Ca熱反応に於てもその刺激源の小量に対して無反応で大量に対して発熱するような異常反応を呈するが、斯かる異常反応は結核家兎の一般流血中にNa熱及びCa熱反応を積極的に抑制するような作用因子が産生される為である。而して本作用因子の産生臓器を検索する為に、斯かる時期の結核家兎の脾臓を摘出して脾摘2日目に塩類熱反応を検したところが、略々正常塩類熱反応に復することが分かつた。亦その家兎(脾摘2日目)の血清を以て他健常家兎を前処置しても、該健常家兎の塩類熱反応に何等抑制的な影響を与えることが出来なかつた。即ち結核家兎はその脾臓を摘出すると正常塩類熱反応に復帰すると共に、その流血中の塩類熱反応抑制性作用因子は消失するものであるから、この作用因子は結核家兎の脾臓からその流血中に産生されるものであることが略々確認された。

而して脾摘7日目に於て再び該家兎に就いて塩類熱反応を検したところが、そのNa熱及びCa熱反応はその刺激源の小量及び大量に対して何れも無反応であつたばかりでなく、その血清にも明らかに他健常家兎のNa熱及びCa熱反応を無反応にするような積極的な作用が認められた。而してこの事は同門藤村⁴³⁾の脾摘後の甲状腺(Na熱反応に関与)及び上皮小体(Ca熱反応に関与)の機能変調に関する研究結果に一致するものであつて、結核症とは無関係に起る現象と解釈されるのである。

次に塩類熱反応抑制性作用因子が脾臓から産生されるものであれば、一般流血中にその存在が多少認められるツ反応陽転前期結核家兎の脾静脈血中には多量に出現する筈であるので、斯かる時期の結核家兎脾静脈の血清に就いて塩類熱反応抑制性作用を検討した。その結果、この血清を以て前処置された他健常家兎はツ反応陽転期結核家兎耳静脈血清を以て前処置されたものと同様な塩類熱反応を示すことが分かつたので、本作用因子は脾臓から産生されるものであることは更に確実となつた。

更にこの作用因子は脾臓がその機能の量的或いは質的变化を起した結果産生されるものであるとすれば、その脾臓の機能的変化の種別を検索する必要がある。そこで先づツ反応陽転期結核家兎(ツ反応陽転10日目)の脾臓を他健常家兎に移植して、移植後2日及び4日目にその塩類熱反応を検する実験を行つた結果、被移植家兎は結核家兎自体の現わす異常Na熱及びCa熱反応を呈することが分かつた。而してこの被移植家兎の異常塩類熱反応は移植された結核家兎脾臓成分が一時に多量に吸収されて、その流血中の在来正常脾臓成分を遙かに上廻つて汨濫する為であると解釈される。即ち移植脾臓の壊死に陥る移植後10日にもなると斯かる異常反応は起らなくなるものである。亦被移植家兎は3週間以上経過してもツ反応は遂に陰性に終るので、

斯かる異常反応は結核症に罹患することによるアレルギー反応自体に関係があるものでなく、脾臓が二次的に機能的変化を招来した結果であると言ひ得る。次にツ反応陽転期結核家兎に正常家兎脾臓を移植して移植後2日及び4日目に塩類熱反応を検する実験を行つた結果、被移植結核家兎は正常家兎同様の塩類熱反応を呈することが分かつた。而してこの場合移植された正常脾臓成分が一時に多量に吸収されて流血中に氾濫した為であると考えられる。従つて、若し結核家兎脾臓が唯単なる機能の量的変化を起した為に異常塩類熱反応を起すものであるとするならば、即ちその機能昂進の場合には結核家兎に正常家兎脾臓を移植しても尚異常反応が起る筈であり、亦その逆の機能減退の場合には正常家兎に結核家兎脾臓を移植しても尚正常反応を呈する筈であるので、甚だ矛盾した結果となる。故に結核家兎の流血中に出現を見る塩類熱反応抑制性作用因子は、家兎が結核症に罹患することによつてその脾臓機能に質的变化を招来する結果産生されるものであると言ひ出すことが出来ると思う。

総括並びに考按

緒論に於て既述したように、結核症のような全身病にあつては結核菌毒素がその生体臓器機能に種々影響を及ぼして臨床的一般症候を呈するものであることは周知の事実である。而してこの場合、従来は諸臓器機能の量的変化のみを重視する傾向があつたのであるが、徳光¹⁾⁸⁾²⁵⁾³²⁾は特に機能の質的变化即ち変調を顧慮する必要があることを強調し、同門笠田²⁹⁾は結核家兎及び人体に於て白血球増多性物質注射による反応が正常と逆になることから、これは脾臓機能の質的变化に基因するものであることを明らかにした。著者は結核家兎に於て塩類熱反応を検索したところ、笠田の結果を支持する成績を得たので茲に報告した。

而して塩類熱反応に関しては、Rolly⁴¹⁾、狭間³⁹⁾、伊東³⁴⁾、高橋⁴²⁾等は中枢性であることを明らかにし、Na熱反応に就いては今村³⁶⁾、池上⁴¹⁾、岩本⁹⁾、中井²⁹⁾³⁰⁾等が正常家兎は5%NaCl溶液1.0~2.0cc/kg(小量)注射によつては発熱しないが、同溶液3.5~4cc/kg(大量)注射によつて発熱したと言ひ、亦Ca熱反応に就いては今村³⁶⁾、伊東³⁴⁾、池上⁴¹⁾、岩本⁹⁾、中井²⁹⁾³⁰⁾等が正常家兎は5%CaCl₂溶液1cc/kg(小量)注射によつて発熱し、同溶液2cc/kg(大量)注射によつて体温下降を来たしたと言ひしている。著者も之を追試し、正常家兎に於ては5%NaCl溶液1cc/kg(小量)によつては何等反応を認めなかつたが、同溶液4cc/kg(大量)注射によつて発熱することを認め、亦CaCl₂溶液1cc/kg(小量)注射によつて発熱を来たし、同溶液4cc/kg(大量)注射によつて体温下降を来たすことを予め確認して、之を正常反応と仮称して以下諸実験を行つた。

次いで家兎に結核菌浮游液(1.0cc:5mg)を0.5cc/kgの割合に気管内注入を行つて感染させ、感染後各期に於けるNa熱及びCa熱反応を検した結果、感染初期(菌気管注入後5日目)に於てはNa熱及びCa熱反応共に正常反応を呈したが、ツ反応陽転前期(菌気管注入後19~20日目)に於てはNa熱反応は小量注射の場合は勿論大量注射の場合もその体温上昇度が低く発熱傾向を示すのみとなり、亦Ca熱反応は小量注射によつてその発熱傾向を示し大量注射による体温下降もその傾向を示すのみであつた。即ちNa熱及びCa熱反応共に鈍くなつてその傾向を示すに過ぎなかつた。更にツ反応陽転期(菌気管注入後22~24日目にツ反応は陽転するが、その後3~5日目)に於てはNa熱反応は小量及び大量注射によつて全く反応を示さなくなり、亦Ca熱反応は小量注射の場合無反応であるが、大量注射の場合には逆に発熱することが分かつた。斯かる異常塩類熱反応は伊東³⁴⁾、中井³⁰⁾が松果腺摘出家兎に就いてNa熱反応はその小量及び大量注射共に発熱を示し、Ca熱反応は小量及び大量注射共に体温の下降を来たすことを認めて、松果腺を摘出すると塩類熱反応が過敏になると主張した実験とは全く逆の現象であつて、亦中井³⁰⁾が脳下垂体摘出家兎に於てNa熱及びCa熱反応はその小量及び大量(この場合には2cc/kgの割合であつた)注射共に無反応に終始することを認めて、脳下垂体を摘出すると塩類熱反応が鈍感になると主張した実験と相類以の現象である。即ちツ反応陽転期結核家兎は塩類熱反応に対する反応性乃至感受性が鈍感になると言ひ得るのである。

而してこのような塩類熱反応性が鈍感となることは、結核症罹患によつて個体の感受性が唯単に減退した為のものか、或いは積極的に塩類熱反応を抑制するような機転が起つた為のものかを検討する必要がある。

そこでツ反応陽転期結核家兎の耳静脈血清を採つて、3cc/kg の割合に他健常家兎に静注しても体温に影響を与えないことを確かめた後、同様に該血清を 3cc/kg の割合に他健体に静注前処置して20分後に前記の方法を以て塩類熱反応を検したところが、恰もツ反応陽転期結核家兎自体の現わす塩類熱反応と全く同様な結果となつた。従つて結核家兎血清中には個体に於ける塩類熱の反応性乃至感受性を積極的に抑制するような作用因子の出現が考えられた。而してツ反応陽転前期結核家兎（菌気管内注入後17～19日目）の血清にも斯かる作用が軽度ながら認められたので、該時期にも既に少量ではあるが流血中に斯かる作用因子が産生されているものである。

次に結核家兎一般流血中に証明された作用因子の理化学的性状の一端を知る為に、先ず有機溶媒であるエーテル溶解性実験を行つた。即ち該因子含有血清をエーテル可溶成分と不溶成分とに別け、その各々を以て健体を前処置して同様方法を以て塩類熱反応を検したところが、エーテル可溶成分前処置例は正常塩類熱反応を呈したが、不溶成分前処置例は恰も結核家兎自体に見られるような異常塩類熱反応を示した。従つて本因子はエーテル不溶性の蛋白質成分中に潜んでいることが分かつたので、次に血清蛋白分劃実験を行つたところが、アルブミン分層前処置例は処置しない場合と同様な正常反応を呈し、グロブリン分層前処置例に於てのみ前述のような異常反応が認められた。従つて本作用因子は中井³⁰⁾の脳下垂体摘出後の所謂塩類熱抑制性能働性物質（エーテル不溶性・アルブミン分層に含まる）と相異してエーテル不溶性のコロジウム膜に透析されないグロブリン体に含有されていることが分かつた。

次に斯かる塩類熱反応抑制性作用因子の産生臓器を追及する為に、先ず脾臓との関係を検索した。即ちツ反応陽転期でその血清に塩類熱反応抑制作用があることを確認された結核家兎（陽転後14日）の脾臓を摘出して家兎に移植し、被移植家兎に就きその移植後反応は殆ど正常に復し、亦該家兎の血清を以て前処置しても他健体の塩類熱反応に影響を及ぼさないで、結核家兎に於ける血清の本作用因子は脾臓から産生されるものであることが推察された。而して脾臓7日目になると再びNa熱及びCa反応はその小量及び大量注射に対して共に全く反応を現わさなくなると共に、その血清にも他健体をして塩類熱反応を起させないような作用が証明された。この事実は藤村⁴³⁾が正常家兎の脾臓摘出実験に於て実証したところであるが、脾臓を摘出された家兎に於ては甲状腺及び上皮小体の機能が変調を起して、斯かかNa熱（甲状腺が関与）及びCa熱（上皮小体が関与）反応を積極的に抑制するような因子を血清中に産出する為であることを明らかにしているので、結核症とは無関係である。然らば結核家兎に於ける塩類熱反応抑制性作用因子がその脾臓から産生されるものであるならば、一般流血中に少量ながら作用因子の存在が認められる時期即ちツ反応陽転前期に於て脾静脈血中には既に多量に認められる筈であるので、本因子の産生臓器が脾臓であると言う事実の証明の一端として該時期結核家兎の脾静脈血清の他健体塩類熱反応に及ぼす影響を検した。即ちこの脾静脈血清で前処置された家兎はツ反応陽転期結核家兎の血清で前処置された家兎同様に、Na熱反応に於てはその小量及び大量注射に対して共に無反応であつて、亦Ca熱反応に於てもその小量注射に対しては反応を示さずに大量注射に対して始めて発熱する異常反応を呈した。従つて本作用因子は脾臓から産生されるものであることが確実になつたと信ずる。この事は笠田²⁹⁾が白血球增多性物質の注射による生体の反応を指標として結核症に於ける脾臓機能の変調を証明した事実並びに中井³⁰⁾が脳下垂体摘出後に於て所謂塩類熱反応抑制性能働性物質は脾臓から産生されるものであることを実証したのと類似する結果である。

而して本作用因子の産生は結核症に罹患することによつて脾臓機能が量的変化即ち亢進とか或いは減退とかの変化を起した為のものであるか、或いは機能の質的变化を起した結果であるかを検討する必要がある。元来脾臓が塩類代謝に関係を有することは、Naに就いては脾臓と拮抗的關係にある甲状腺（Asher⁴⁵⁾、辻門下（松岡⁴⁶⁾）、が血清Na量と密接な関係を持つことが明らかにされている、即ち丸野⁴⁷⁾は甲状腺摘出後血清Na量は減少すると言ひ、内田⁴⁸⁾は甲状腺剤の供給或いはBasedow氏病に於ては食塩の排泄が増加するが、その摘出によつて減少することを認めていることから、逆に脾臓はNa代謝に関してはその機能亢進によつて血清Na量が減少することも推測されるのである。亦Ca代謝に関しては脾臓後血中Ca量が増加する（Paolini⁴⁹⁾、Abelous, Moog et Soula⁵⁰⁾、Stschedrowitzky u. Seltzer⁵¹⁾、西村⁵²⁾、三輪⁵³⁾等）、或いは脾臓

質投与により血中 Ca 量が減少する (Nitschke⁵³, Romeis⁵⁴, Reiss, Winter and Halpern⁵⁵, 三輪²⁴, 小林⁵⁶, 佐藤⁵⁷等)との報告があり, 特に三輪²⁴は脾静脈血内に血清 Ca 量低下性物質(エーテル可溶性)を発見して上皮小体機能との拮抗的意義を持つものであるとなし, 之が脾ホルモンであると主張した. 亦一方結核症に於ける塩類代謝に関しては多数の研究報告があるが, Na 代謝に就いては宮井⁵⁸が血清内 Na 量は結核感染及び経過によつて増減を認めなかつた報告し, Böhnheim⁵⁹, 角田⁶⁰は血中食塩量は病勢進行に並行して減少すると報告しているに過ぎない. 亦結核症と Ca 代謝に関しては殊に多数の研究報告があるが, その内 Schönheit⁶¹, Fernandez⁶²は肺結核症に於て血清 Ca 量の減少を認めたと言い, Kosmodemjanskij u. Kobela⁶³, Greisheimer and Winkle⁶⁴, Dolgopol⁶⁵, Kaminsky and Davidson⁶⁶等が血中 Ca 量は進行性病変に於て減少を示すが好転によつて増加するものであると報告し, 本邦に於ても渡辺⁶⁷が血清 Ca 量は病勢の進行に伴つて減少すると言い, 菊池(捷)⁶⁸も亦血清 Ca 量は肺結核の滲出型に於て減少するが硬化型に於て増加することを認めたと報告しているが, 亦一方結核症に於ては血中 Ca 量の変化は認め難いとか, 更に前述の報告とは逆に増加するとの報告もない解ではない. 併しながら若し進行性結核症に於て血清 Na 量及び Ca 量が減少するものであつて, 之に脾臓機能のみが関与するものであると仮定すると, 結核症に於ては三輪²⁴等の所謂血清 Na 量(仮定)及び Ca 量低下性作用を有する脾ホルモンの分泌亢進即ち脾臓機能の量的亢進が起るものであるとも臆測されるのである. 而して著者の実験に於ける結核家兎の脾臓から産生される塩類熱反応抑制性作用因子には他体の血清 Na 量及び Ca 量を減少させる作用があつて, その為に Na 熱及び Ca 熱反応が起り難くなることも推測されるのであるが, 本作用因子は三輪²⁴の所謂エーテル可溶性正常脾ホルモンと異なつたエーテル不溶性の蛋白体であり, 勿論血清内 Na 量及び Ca 量代謝に関与するものであるか如何かは後の実験に俟たなければならない. 唯三輪の所謂正常ホルモンではないことは確かであるので, 本作用因子が脾臓機能の変調産物であることは推測された.

そこで脾臓機能の質的変化即ち変調を証明する為に, その血清に他体をして異常塩類熱を起させる作用があることを確認されたツ反応陽転期結核家兎(ツ反応陽転後10日目)の脾臓を摘出して他健常家兎に移植した後, 被移植家兎に就いて塩類熱反応を検索した. 即ち結核家兎の脾臓を移植されることによつて, 健常家兎は異常塩類熱反応を呈することが分かつたが, この場合被移植家兎は移植後3週間以上経過してもツ反応は陽転しなかつたので, このような異常塩類熱反応は結核アレルギーそのものに関係するものではなく, 結核症罹患による脾臓機能の変化を招来することに基因するものであると思われた. 而して斯かる被移植家兎に於ける異常反応は移植脾臓成分が一時に多量に吸収されて, その血清中に在来の正常脾臓成分を凌駕して氾濫する為であつて, 移植脾臓が壊死に陥る術後10日以後に於ては再び正常塩類熱反応が起るのである. 次に前の移植実験とは逆に, その血清内に塩類熱反応抑制性作用因子の存在が確認されると共に異常塩類熱反応を呈するツ反応陽転期結核家兎に正常家兎脾臓を移植した後, 被移植結核家兎に就いて塩類熱反応を検索した. その結果移植脾臓の壊死に陥る時期迄, 被移植結核家兎は正常塩類熱反応を呈すると共に, その血清には他健体をして異常塩類熱反応を起させるような塩類熱抑制作用も亦認められないことが分かつた. 従つてこの両移植実験は, 一は正常家兎に結核家兎脾臓を移植して異常塩類熱反応を起させ, 他は結核家兎に正常家兎脾臓を移植することによつてその塩類熱反応並びにその血清作用を正常のものに復帰させることを明らかにしている. 即ち移植脾臓成分が一時に多量に吸収されて被移植家兎脾臓から産出されている従来の成分を上廻つて流血中に氾濫するものと解釈されるが, この場合機能の量的変化のみを以て説明することは甚だ矛盾する結果となる. 即ち結核家兎脾臓が機能の量的亢進を起したものであれば, 結核家兎への正常脾臓移植実験に於ても依然として異常塩類熱反応が起る筈であり, 亦逆に機能の量的減退を起したものであれば, 正常家兎への結核家兎脾臓移植実験に於ても依然として正常反応が起る可き筈である. 従つて結核家兎の脾臓が機能の質的変化を起した結果, その流血中に正常脾ホルモンと異なつた塩類熱反応抑制性作用因子を産出するものであることが確かになつた. 而してこの場合結核家兎の血清を以て前処置すると, 正常家兎は異常塩類熱反応を現わすのであるが, これはその血清内に産生されている脾臓変調産物が同名臓器作用(宮川⁶⁹, 徳光⁷⁰)によつてその正常脾臓に作用して機能を一時的に停止させるか, 又は変質方向に傾かせる為に前処置

注射の血清作用がその塩類熱反応実験に於て現われるものと解釈されるのである。

上述のような移植実験による臓器機能の変調証明は、同門宮地(正)¹⁾が脾臓神経切除後の脾臓に就いて、亦宮地(高)¹⁰⁾が梅毒家兎脾臓に就いて行つたところであつて、その他岩本⁹⁾、久野¹⁰⁾、中井²⁰⁾、相馬¹⁴⁾、笠田²³⁾等の多数の実験に於て立証され、徳光¹⁾⁸⁾²²⁾³²⁾は臓器機能の変調事実の証明方法として最も有力且必要なことであると強調した。

以上、結核家兎に於てはその脾臓機能に変調が起つて、流血中に塩類熱反応抑制性作用因子が産生される為に、異常塩類熱反応が起るものであるとの事実を立証することが出来たものと思う。而して結核症の塩類代謝に本作用因子が直接関与するとの証明実験は著者の目的ではないが、唯その症候を解明するに当つて何等かの意義を有するものと確信する。

結 論

1) 正常家兎はNa熱反応に於てはその小量(NaCl 5%溶液1cc/kg)注射に対して無反応であるが、その大量(同溶液4cc/kg)に対して発熱する、亦Ca熱反応に於てはその小量(CaCl₂ 5%溶液1cc/kg)注射に対して発熱するが、その大量(同溶液4cc/kg)に対して体温下降を以て反応する。而してツ反応陽転期結核家兎にあつては、Na熱反応はその小量及び大量注射に対して何れも無反応で、Ca熱反応はその小量注射に対して無反応であるが、その大量注射によつて始めて発熱するような極めて鈍感な塩類熱反応が見られた。

2) 家兎が結核症に罹患すると、一方に於てアレルギー反応が成立すると共に、他方之と並行して脾臓の機能に質的变化(分泌物に関する変化)が起つて、その脾臓から塩類熱反応を積極的に抑制するような作用因子が流血中に産生されるようになる為に、上記のような鈍感な塩類熱反応が起ることが分かつた。

3) 本作用因子はエーテル不溶性で、コロジウム膜に透析されない血清グロブリン成分中に含まれていることまで証明することが出来た。

参 考 文 献

- 1) 徳光美福: 医学通信, 3巻, 115号, 1頁, 1948. 日病会誌, 37巻, 1~6号, 11頁, 1948. 総合医学, 5巻, 206頁, 1948. 日内分泌誌, 26巻, 133頁, 1950.
- 2) 豊田吟次: 朝鮮医誌, 26巻, 937頁, 1936. 日病会誌, 23巻, 44頁, 1933.
- 3) 森有吉: 朝鮮医誌, 27巻, 24頁, 1937.
- 4) 佐藤一雄: 朝鮮医誌, 29巻, 794頁, 同2326頁, 1939.
- 5) 内山一夫: 朝鮮医誌, 30巻, 206頁, 1940.
- 6) 増田練藏: 朝鮮医誌, 30巻, 118頁, 1940.
- 7) 金子雄治: 朝鮮医誌, 32巻, 373頁, 1942.
- 8) 徳光美福: 日病会誌, 38巻, 総会号, 221頁, 同地方会号, 58頁, 1949.
- 9) 岩本維三郎: 米子医誌, 1巻, 58頁, 1949.
- 10) 久野一郎: 米子医誌, 2巻, 70頁, 同95頁, 1950. 日内分泌誌, 26巻, 139頁, 1950.
- 11) 中井剛太: 日内分泌誌, 26巻, 177頁, 1950.
- 12) 中下静夫: 日内分泌誌, 27巻, 14頁, 1951.
- 13) 岡本治: 日内分泌誌, 26巻, 221頁, 1950. 同誌, 26巻, 291頁, 1951.
- 14) 相馬広明: 日内分泌誌, 26巻, 248頁, 1951.
- 15) 松田伸: 日内分泌誌, 27巻, 45頁, 1951.
- 16) 金南鎭: 朝鮮医誌, 29巻, 559頁, 1939.
- 17) 宮地正人: 朝鮮医誌, 32巻, 765頁, 1942.
- 18) 白川竜: 朝鮮医誌, 31巻, 51頁, 同120頁, 1941.
- 19) 宮地高收: 朝鮮医誌, 30巻, 1463頁, 1940.
- 20) 岩下泉: 朝鮮医誌, 33巻, 485頁, 1943.
- 21) 白川竜, 結城郁夫: 朝鮮医誌, 31巻, 229頁, 1941.
- 22) 徳光美福: 日病会誌, 41巻, 総会号, 369頁, 1952.
- 23) 笠田勇: 日内分泌誌, 28巻, 257頁, 1952.
- 24) 三輪太郎: 京城紀要, 1巻, 301頁, 1931.
- 25) 松尾鉄之助: 日病会誌, 23巻, 254頁, 1933.
- 26) 栗原剛: 朝鮮医誌, 31巻, 530頁, 1941.
- 27) 洪村学根: 日内分泌誌, 19巻, 29頁, 同641頁1944.
- 28) 長谷川武敏: 米子医誌, 1巻, 102頁, 1949.
- 29) 中井剛太: 日内分泌誌, 26巻, 42頁, 1950.
- 30) 中井剛太: 日内分泌誌, 26巻, 282頁, 1950.
- 31) 中下静夫: 日内分泌誌, 26巻, 275頁, 1951. 同誌, 27巻, 72頁, 1950.
- 32) 徳光美福: 日本医事新報, 1418号, 1743頁, 1951. 日病会誌, 39巻,

- 総会号, 226頁, 同地方会号, 183頁, 1950. 同誌, 40巻, 総会号, 393頁, 1951. 34) 伊東高麗夫: 朝鮮医誌, 30巻, 22頁, 1940. 35) 若松元三郎: 皮膚紀要, 3巻, 77頁, 1924. 36) 今村豊八: 日内科誌, 17巻, 673頁, 1922. 日病会誌, 20巻, 230頁, 1921. 37) 福田豊: 日内科誌, 19巻, 905頁, 同197頁, 1931. 38) 鍵山俊六: 熊本医誌, 9巻, 440頁, 1933. 39) 狭間: 伊東高麗夫 (朝鮮医誌, 30巻, 22頁, 1940) より引用. 40) Freund: 伊東高麗夫 (朝鮮医誌, 30巻, 22頁, 1940) より引用. 41) 池上賢一: 日内分泌誌, 19巻, 63頁, 同467頁, 1944. 42) 高橋昌夫: 岡山医大誌, 39巻, 256頁, 同850頁, 1927. 43) 藤村顕尙: 日内分泌誌, 31巻, 459頁, 1955. 44) Rolly: 伊東高麗夫 (朝鮮医誌, 30巻, 22頁, 1940) より引用. 45) Asher, L.: Deutsch. Mediz. Wochenschr., Bd. 27, S. 1252, 1911. 46) 松岡謙之助: 日内分泌誌, 5巻, 1949頁, 1929. 47) 丸野保: 実験消化器病誌, 7巻, 251頁, 1932. 48) 内田: 甲状腺論文集, 1巻. 49) Paolini, R.: Kong. Zbl. ges. inn. Med. Bd. 37, 1913. u. Bd. 40, 1941. 50) Abelous, Moog et Soula: Berichte über d. ges. Physiol., Bd. 29, S. 579, 1925. 51) Stschedrowitzky, S.G., Seltzer, S.A.: Zschr. exp. Med., Bd. 52, S. 1892, 1928. Ibid., Bd. 53, S. 920, 1929. 52) 西村俊一: 日内分泌誌, 4巻, 1677頁, 1928. 53) Nitschke: Zschr. f. d. ges. exp. Med., Bd. 65, S. 651, 1929. 54) Romeis: Arch. Entw.-Med. Bd. 39, 1913. Ibid., Bd. 40, 1914. 55) Reiss, Winter, K.A. u. Halpern, N.: Endocrinol., Vol. 5, p. 547, 1932. 56) 小林正義: 大阪医誌, 31巻, 3371頁, 1932. 57) 佐藤安太郎: 朝鮮医誌, 28巻, 1309頁, 1928. 58) 宮井茂吉: 結核, 5巻, 79頁, 1927. 59) Böhnheim: Beitr. z. Klinik d. Tbk., Bd. 49, S. 233, 1922. 60) 角田育之: 結核, 8巻, 528頁, 1930. 61) Schönheit, E.: Amer. Journ. Med. Science, Vol. 170, p. 689, 1925. 62) Fernandez, O.: Zbl. f. d. ges. Tbk.-forschung, Bd. 24, S. 389, 1925. 63) Kosmodemjanskij, S. u. Kobela, K.: Ibid., Bd. 27, S. 474, 1927. 64) Greisheimer u. Winkle, C.V.: Amer. Rev. of Tuberculosis, Vol. 15, No. 2, 1924. 65) Dolgopoi: Ibid., Vol. 20, p. 931, 1929. 66) Kaminsky and Davidson: Ibid., Vol. 23, p. 442, 1931. 67) 渡辺三郎: 結核, 8巻, 528頁, 1930. 68) 菊池捷二, 小田島権五郎, 三浦作次郎: 東北医誌, 15巻, 488頁, 1932. 69) 宮川米次: 実験医誌, 6巻, 291頁, 1922. 治療及び処方, 17巻, 1頁, 同673頁, 1936.