Influence of the Ingestion of the Sea-weeds on the Thyroidal Uptake of I^{131}

By

**Shiro IINO, Kunio MATSUDA, Jun ISHII,
Minoru IRIE & Kazuo SHIZUME**

Department of Internal Medicine, University of Tokyo School of Medicine
(Director : Prof. Shigeo Okinaka)

In Japan sea-weeds are commonly taken as food. As they are relatively rich in iodine content, it is conceivable that the thyroidal uptake of radioactive iodine is inhibited by ingesting them. But there have been no precise reports concerning the effect of the ingestion of the sea-weeds on the thyroidal uptake of radioactive iodine.

In this report the effect of sea-weeds on the uptake of I^{131} by the thyroid gland was studied and the following results were obtained :

1. In ten normal persons tangle (*Laminaria japonica*), which is rich in iodine (0.31% of dry weight), was given between 7 to 16 gms. daily for one to fourteen days. In all cases remarkable inhibition of I^{131} -uptake was observed. Uptake values returned to the previous level about two weeks after discontinuing the ingestion.

2. In seven persons laver (*Enteromorpha compressa*), which contains relatively small amount of iodine (less than 0.03% of dry weight), was given between 1.2 to 3.2 gms. daily for two to fourteen days, but in no cases the inhibition of I^{131} -uptake was observed by these doses.

3. In four patients with Graves' disease 10 gms. of tangle was given for four to six days. In all cases I^{131} -uptake was markedly inhibited, but the uptake values returned to the previous level about two weeks after cessation of the ingestion.

4. In five patients very low uptake values were observed due to the long term ingestion of tangle ranging from three months to ten years. About two weeks after discontinuing the ingestion the uptake values returned nearly to the previous level.

From these results it was stressed to pay special attention for the previous ingestion of sea-weeds in the I^{131} -uptake study in Japan.

Study on the Mutual Transit of Sexual Hormones in Parabiatic Rats

Influence of Hormones in the Pregnancy to Mammary
Gland of Non-Pregnant Rats

By

Tokio NAGATA

Department of Obstetrics & Gynecology, Nippon Medical College (Director : Prof. Dr. S. Mitani)

(1) The following results were obtained by making a parabiatic experiment on pregnant rats and

searching changes appeared in mammary gland of partner sides (non-pregnant rats) day by day histologically.

(a) It is recognized the hormone of pregnant rats is transited to the partner sides and give changes to mammary gland of same.

(b) It is conceivable that excessive hormone is secreted in the body of pregnant rats at the parabiotic experiment.

(c) The changes appeared in mammary gland of the partner sides showed multiplication and status of secretion different from usual pregnant changes.

(d) No difference is recognized in the growth development of mammary gland of the partner sides between mature female and castrated female.

(2) In prior to the experiment, as the basic study of mammary gland of the rats searches were made day by day and histologically as to mammary gland of each physiological period (pregnancy, delivery, lactation, ab lactation), and made endocrinological consideration as to its observation.

Parabiose 白鼠の相互 Hormon 移行に関する研究

(妊娠時 Hormon の非妊側白鼠乳腺に及ぼす影響)

日本医科大学第二医院産婦人科教室 (主任三谷茂教授)

永 田 登 喜 雄

緒 言

妊娠した生体内に循環する Hormon は Progesterone を主として各種 Hormon が集合関連して妊娠という女性特有の生理を営んでいるものであることは云うまでもない。その Hormon は主に胎盤に由来すると云われているが、生体内の各内分泌臓器も妊娠により非妊時とは別な特異な働きを行い複雑な相互関係により妊娠を完全に維持持続させる働きをする¹⁴⁾。

私はこの妊娠時の実際に循環結集される生体内の Hormon を研究すべく、生物学的検索として Parabiose 法 (以下 Parabiose を P と略記する) を用いて実験的研究を行つた。P 法に於ける Hormon の移行に関する研究は、昭和26年以来当教室に於いて、各種の Hormon について研究発表して来た^{17), 18), 23)} 私もこの実験法により、実際に生体内に循環する Hormon を、そのまま利用し得る特徴を生かすべく本実験を行つた。即ち、妊娠した白鼠を用いて、非妊白鼠を相手とした P を行い、相手側に移行する Hormon の標的臓器として特に乳腺を撰んだ。そして考察を組織学的検索によつて行い、その結果について内分泌学的考察を加えて聊か知見を得たので報告する。

尚、白鼠乳腺の基礎的研究として各生理期に於ける乳腺の態度、即ち非妊期、妊娠期、産褥期、離乳期等に於ける乳腺の変化を組織学的に逐日的に検索した。而して各時期に於ける發育乃至機能の関係をも究明した。

第 1 編 組織学的考察による白鼠乳腺の基礎的研究

第 1 章 実 験 要 旨

乳腺は思春期に至り第 2 次性徴として發育が増し、妊娠により更に顕著な増殖が起き、分娩後産褥期に至つて泌乳現象が生ずるが、離乳により再び非妊時の状態に漸次もどるものである。このことは人乳腺のみならず各種の動物にわたつても認め得る、物異的な生理的变化である。白鼠に於いても従来より組織学的研究はなされているが、私は前述の如き実験目的より各時期に於ける乳腺の發育状態を、過去の文献上に見られた粗な時期的分類に代えて、逐日的な検索を行つた。白鼠は短い期間中に著しい Hormon の変動があつて乳腺もそれに相応して組織学的変化を来す。この所見を基本として、本論の P 実験により妊娠白鼠を相手とした、非妊白鼠の乳腺の変化に就いて内分泌学的見地から推察した。

第 2 章 実験材料及び実験方法

1. 実験材料 実験動物として白鼠を使用した。その撰理理由を挙げると次の如くである。
- 1) 白鼠の乳腺は通常 5～6 対あつて¹⁹⁾、この各乳腺間に組織学的に殆どん差異がない。(後述)
- 2) 一部位の乳腺を切除するも他の部位に代償性増殖がない。
- 3) P 実験に於いて白鼠が最も適した動物である。
- 4) 白鼠の生理的諸現象が人類に非常に近い動物である¹⁹⁾。
- 5) 成長期、妊娠期、産褥期、離乳期が短時日である。

- 6) 繁殖が容易で、且つ妊娠日の判定がつく。
- 7) 各内分泌臓器の剔出実験が可能である。

実験に用いた白鼠は昭和28年以降教室で、近親交配した8代以上の近交系 Wistar 系である。これはP実験に於いて近交系及び同腹仔を使用することが原因不明と斃死を防止出来たことによる¹⁸⁾。又、白鼠は原則として処女白鼠を使用した。経産白鼠は時に処女白鼠との実験比較として使用する程度にとどめた。

2. 乳腺の肉眼的観察、肉眼的所見として乳頭の発育状態、授乳形跡の有無、乳腺切除時に於ける腺実質の発育状態及び腺実質切断時の乳汁証明等を挙げることができる。

3. 乳腺切除法及び組織検査法、乳腺切除に際し白鼠にエーテル麻酔を施した。無麻酔でも切除は可能であるが、乳腺を筋膜より分離して切除し且つ摂子等による皮下出血等の副損傷を避けるためには麻酔下に行つた方がよい。又、一部切除しても、尚その白鼠は実験を続けるために切除後皮膚縫合は必要である。乳腺は乳頭直下が必ずしも発達していないため、乳頭を中心として約1.5cm平方の切除は必要である。この際筋膜に乳腺を残さぬ様に注意する。切除した乳腺は10%中性ホルマリン溶液中に固定し、固定後鉛直に二分し、一部は Paraffin 切片を作り Haematoxylin-Eosin 重染色を施した。他の一部は氷結切片を作り Sudan III 染色を施した。切片は皮膚面に対し垂直になる様に切断した。

4. 膣脂膏検査及び妊娠の判定、性週期の分類は小山、中尾の法²⁰⁾によつた。妊娠の判定は膣脂膏中に精糸を発見した日を妊娠第1日とし、P実験に際し側腹部切開時、肉眼的にも妊娠を確めた。

第3章 一個体に於ける各乳腺の組織学的差異に就いて

白鼠乳腺は左右5~6対あり、胸部2対(T₁, T₂)、腹部1対(Ab)、鼠蹊部3対(I₁, I₂, I₃)あり、時に胸部第2乳腺を欠く¹³⁾。実験に際し、乳腺の逐日的観察を行うにあつては一動物の乳腺の一部を切除し、その組織学的差異の有無を検索する必要があつた。実験材料としては乳腺活動の特異的な時期と考えられる妊娠13日、産褥3日、離乳後20日の乳腺を撰んだ。

1. 妊娠13日乳腺所見(第1表)

経産白鼠左側一側6個の乳腺を検索した。処女白鼠乳腺に於いて終胸腔は妊娠16日に出現する(後述)が、経産であると妊娠13日で早くも全例に終胸腔を認めた。

肉眼的所見として、乳頭の発育状態及び切除時乳腺実質は略々同様の所見を得た。乳腺切断時乳汁は認められない。

組織学的所見は第1表に示す如く全例に略々同様の所見を得た。腺葉は皮下脂肪組織の中に分葉著明に存在し拡張した小排泄管、終末装置、終胸腔より構成されている。終胸腔は上皮内に脂肪小顆粒を認め、内腔は中等度に拡張し少量の分泌物を認めた。間質は特に脂肪組織の発育がよく、腺葉内毛細管は同様に拡張していた。

尚、この白鼠で右下顎部に小さな乳頭状に隆起した部分を発見したので切除し検索した所、明らかに乳腺であつたが上記6個の乳腺と全く所見を異にした。(附図1参照)即ち、中・小排泄管を小数認め、その周囲に終末装置が閉鎖して集合している形であるが小葉とは云い難い所見であつた。勿論終胸腔は認められない。

以上の所見から妊娠13日白鼠に於いては、各々の乳腺に組織学的差異は認めれない。しかし、所定以外の部位に乳腺様組織を証明しても、その所見はその時の生理時期の乳腺組織像とは相一致し難い所見である。

2. 産褥第3日乳腺所見(第1表)

左右6対都合12個の乳腺を検索した。

肉眼的所見として、左胸部第Ⅱ乳腺乳頭に糜爛があり、他の乳腺と異つて授乳の形跡が見られなかつた。(授乳された乳腺は、乳頭が淡紅色で長さ3~5mmに発育肥大し、乳頭を中心として径約1cm体毛が乳汁で濡れている。)又、切除時乳腺実質は量的に少く、切断面よりの乳汁は認めない。他の11個の乳腺は授乳の形跡あり、乳頭の発育よく、指圧により乳汁は少量であるが認められた。乳腺実質は乳頭を中心として発

第1表 同一動物乳腺比較

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔			大排泄管		中排泄管		小排泄管		終末裝置			間 質				採 取 部 位						
			數	上 皮 形	核 形	內腔 染色度	內腔 擴張度	內腔 分泌物	數	內腔 擴張度	內腔 分泌物	數	內腔 擴張度	內腔 分泌物	細胞 發育	內腔 擴張度	內腔 分泌物	發育		血管 數	血管 擴張度	毛細管 數	毛細管 擴張度	皮下 脂肪	
230	S 13 T	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	I ₃	
231	"	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	I ₂	
232	"	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	I ₁	
233	"	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	Ab	
234	"	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	T ₂	
235	"	++	+	円	±	楕	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	T ₁	
236	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下顎部	
170	WB 3 T	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LI ₃	
171	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LI ₂	
172	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LI ₁	
173	"	++	++	低	++	楕	±	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LAB	
174	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LT ₂	
175	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	LT ₁	
176	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RI ₃	
177	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RI ₂	
178	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RI ₁	
179	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RAB	
180	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RT ₂	
181	"	++	++	扁	++	卵	—	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	RT ₁	
451	En30 T	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	I ₃
452	"	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	I ₂
453	"	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	I ₁
454	"	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	Ab
455	"	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	T ₂
456	"	—	—	—	—	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	++	±	±	—	++	++	++	++	T ₁

染色度, 淡 (—), 稍淡 (+), 稍濃 (±), 濃 (++)

円 = 円柱上皮, 低 = 低円柱上皮, 扁 = 扁平上皮, 楕 = 楕円形, 卵 = 卵円形, 類 = 類円形

育良好で切断面より乳汁が認められた。

組織学的所見は第1表に示す如く, 左胸部第Ⅱ乳腺 (No. 173) (附図2参照) をのぞく他の11個の乳腺は略々同様の所見であつた。即ち, 乳腺發育状態では最も盛んな時期であり, 終胞腔は高度に拡張し, 上皮内に脂肪顆粒を証明し, 内腔に分泌物を証明した。間質部として証明する部位は少く脂肪組織も殆んど僅かで, 血管が殆んどその位置をしめている状態である。

それに反して左胸部第Ⅱ乳腺は, 腺小葉の像は少数に認められるが, 終胞腔の数は少ない。間質部の發育がよくて, 充血も他の部位より著しい。

以上述べた如く, 授乳期の乳腺を検索するにあつて, 先ず肉眼的所見で, 乳頭の發育及び授乳の形跡の有無を認める必要がある。

3. 離乳後20日乳腺所見 (第1表)

右側の一侧6個の乳腺について検索した。肉眼的所見にて乳頭は殆んど萎縮しており、乳頭下に乳頭下に乳腺実質を僅かに認めるに過ぎない。組織学的所見として第1表 (No. 450~455) に示す如く全例殆んど同様の所見を得た。即ち、腺小葉及び終胞腔を認めず、間質部はよく発育し、その中に排泄管及び少数の終末装置を認めた。

第4章 正常性週期における乳腺所見

白鼠処女乳腺は間質脂肪組織内に比較的大きな排泄管を認めるに過ぎない。時としてその周囲に僅かに小排泄管及び終末装置を認める。併し、経産白鼠は処女白鼠に比較すると腺管の発育よく、小排泄管及び少数の終末装置を認める事が出来る。

性週期の規則正しい処女並びに経産白鼠を5日間毎日同一動物から乳腺を1個づつ切除して検索したが、腺管部に著変なく、間質部に於いて、角化期及び角化期の翌日に充血像、毛細管拡張が見られるがその他の時期には特別に変った所見を認めることが出来ぬ。

第5章 妊娠期に於ける乳腺所見 (第2表)

白鼠の妊娠期間は21~23日で妊娠日を確実に判定しても、妊娠期間は一定しない¹⁹⁾。この実験に於いては遂目的観察を主として行う為、なるべく同一動物を使用したかつたのであるが、前述した如く白鼠乳腺は左右5~6対であつて、妊娠期間中に同一動物を使用出来ない。その為同腹雌を用いた。この雌乳腺を妊娠4日目より2~3日の間隔で切除して観察し、これによつて第2表に示す所見を得た。更に遂目的にその時期の特徴ある所見を次に記載した。(括弧内は乳腺組織の番号を示したものである)。

§ 妊娠4日 間質脂肪組織中に小排泄管が散在して、その周囲に少数の終末装置を認める。腺管周囲に毛細管拡張がある。

§ 妊娠5日 間質脂肪組織の発育がよく、大・中排泄管周囲に小排泄管が数を増している。

§ 妊娠6日 小排泄管周囲に終末装置が数個集団している。排泄管腔にエオデンに均等に染まる分泌物を証明した。

§ 妊娠7日 前日と大差ない所見であるが終末装置がいくらか数を増している。分泌物は証明しない。4例中2例 (222, 374) は経産白鼠乳腺であるが、小排泄管周囲に終末装置が多く集り、不完全ではあるが小葉形成が認められた。小排泄管がよく拡張して分泌物を認めた。

§ 妊娠8日 中排泄管の拡張が著しい。(383) 間質の発育よく浮腫状 (346) である。血管は拡張して充血を認めた。

§ 妊娠9日 腺小葉はまだ不完全である。小排泄管腔に分泌物が認められる。上皮細胞原形質に脂肪小顆粒を認めた。(379)

§ 妊娠10日 小排泄管とその周囲に十数個の終末装置が集り、略々小葉形成と考えられる。その周囲の毛細管の拡張が顕著で間質結合組織の発育もよい。

§ 妊娠11日 分葉は著明であるが皮下は間質組織で大部を占めている。腺小葉は大小の差がある。小葉の周囲に毛細管が数を増し拡張している。(340)

§ 妊娠12日 前日の所見と大差はないが、終末装置が数を増して、分葉は著明に認められる。

§ 妊娠13日 腺小葉は大部が終末装置より成り、妊娠9~10日に比べると小排泄管腔は拡張し分泌物を証明する。No. 231は経産白鼠であつて(第3章1参照) 終胞腔を認め、処女白鼠と全く所見を異にしている。

§ 妊娠14日 間質の発育よく、特に脂肪組織が増殖しているが、血管系はさほど充血を認めない。腺小葉の発育はよいが、まだ終胞腔を認めない。

§ 妊娠15日 終胞腔はまだ認めないが、終末装置の発育よく、特に内腔側の上皮細胞は低円柱状に発育し、核は円形で淡染し、内腔はやや拡張している。而して分泌物を認めるものもある。(348) 小葉内毛細血管はよく、拡張している。

第2表 妊娠期乳腺所見

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔		大管		排泄管		中管		小管		排泄管		終末装置		間 質				備 考							
			数	形	核 形	染色 度	拡張 度	分泌 物	数	形	腔	分泌 物	数	形	腔	分泌 物	数	形	腔	分泌 物		数	形	管	毛細 管	皮 下 脂肪		
336	S 4 T	—	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+	經 産	
344	S 5 T	—	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+		
378	〃	—	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+		
381	〃	—	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+		
337	S 6 T	—	—					+	±	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
382	〃	—	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
374	S 7 T	+	—					+	±	—	+	+	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
222	〃	+	—					+	±	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
212	〃	—	—					+	±	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
245	〃	—	—					+	±	—	+	±	—	+	±	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
346	S 8 T	—	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
383	〃	—	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
339	S 9 T	±	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
384	〃	—	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
379	〃	±	—					+	+	—	+	+	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
347	S 10 T	+	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
375	〃	+	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
213	〃	+	—					+	+	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
340	S 11 T	+	—					+	+	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
376	〃	+	—					+	+	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
385	S 12 T	+	—					+	+	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
386	S 13 T							+	±	—	+	±	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
231	〃	++	+	円	±	卵	++	+	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+	經 産	
387	S 14 T							+	±	—	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
348	S 15 T							+	+	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
214	〃							+	+	—	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
341	S 16 T	++	±	円	±	歪	++	±	±	+	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
349	〃	++	±	円	±	歪	++	±	±	+	+	±	—	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
342	S 17 T	++	+	円	±	類	++	+	±	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
343	〃	++	++	円	±	類	++	±	±	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
389	〃	++	++	円	±	類	++	±	±	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
390	〃	++	++	円	±	類	++	±	±	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
391	S 18 T	++	++	円	±	類	++	±	±	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+		
392	S 19 T	++	++	低	+	類	不定	+	+	+	+	±	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
206	S 20 T	++	++	低	+	類	++	+	+	+	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
393	〃	++	++	低	+	類	++	+	++	+	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
377	S 21 T	++	++	低	+	類	++	+	+	+	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
394	〃	++	++	低	+	類	++	++	+	+	+	±	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
207	S 22 T	++	++	扁	+	卵	—	++	++	+	++	—	++	++	+	++	+	+	±	+	+	+	+	+	+	±		

経産

経産

§ 妊娠16日 終胞腔を認める。一層の円柱上皮で、核は濃染して形は不正形である。終末装置の發育はよく、特に内層の上皮細胞に著しい。小さい小葉が互いに接近しあい、処によつては合一している。前日以前の所見に比べて間質が腺小葉の部分より狭くなっている。間質は殆んどが脂肪組織である。

§ 妊娠17日 終胞腔より成る小葉は、著明に認められるが大小不同である。終胞腔上皮は低円柱状で核は略々円形で濃染する。小葉内毛細血管が著明に認められる。

§ 妊娠18日 前日と略々同様の所見であるが、終胞腔内腔は少々拡張して分泌物を証明する。エオジン好染物質で脂肪反応陽性である。

§ 妊娠19日 大きな腺小葉がその位置を占めて間質は量的に少くなっている。終胞腔上皮細胞中の原形質内に著明に脂肪顆粒が認められる。核は類円形で染色の程度はまちまちである。内腔は拡張して分泌物を認める。

§ 妊娠20日 腺小葉が増殖し、間質脂肪組織は量的に僅かである。終胞腔内腔が拡張している例と(393)未だ拡張の著明でない例(206)が見られる。分泌物は前者に著明に認められ、後者は僅かに認めた。排泄管はまだ拡張していない。間質は充血し、小葉内毛細血管の拡張が著しい。

§ 妊娠21日 腺小葉は全く發育し全視野の大部分を占め、間質は腺葉間を縫う如き状態で僅かである。脂肪組織も少い。第2表に示すこの2例は(附図3, 4参照)前日の例と同様に動物の例によつて終胞腔内腔の拡張度が異なる。又、分泌物の多寡に差がある。No. 394は多量の分泌物を認め、隣接する終胞腔が融合して破綻し大きな腺腔を作る。排泄管もNo. 377に比べて拡張よく、分泌物を多量に証明する。

§ 妊娠22日 (分娩時乳腺所見) 間質は全く亡くし、腺葉は排泄管を中心として拡張した終胞腔で大部を占める。終胞腔上皮は低円柱又は扁平上皮で隣接する隔壁が破れて大きな腺腔を作る。核は卵円形で淡染する。排泄管は拡張しているが、大・中排泄管には未だ内容は認めない。

以上を要約すると、白鼠乳腺の妊娠性変化は妊娠5～6日より小排泄管及び間質部の充血に始まる。続いて終末装置増殖(6～7日)、間質部特に脂肪組織が発達する。(7日)8～9日より中排泄管が少々拡張し、小排泄管及び終末装置が増殖して、10～11日頃に腺小葉が形成される。以後腺小葉が増殖し間質部がその量を減ずる。終胞腔は16日目に至つて認められ、始めて完全な腺小葉が形成される。分泌現象は18～19日に著明となる。終胞腔の増殖、拡張と共に排泄管が拡張する。

第6章 授乳期に於ける乳腺所見(第3表)

白鼠の授乳期間は通常分娩後20日間以後離乳する¹⁹⁾。授乳期の乳腺観察は妊娠期と同じく同一動物にて観察するのが望ましいことは言うまでもない。しかし授乳せる白鼠の乳腺を切除する時、エーテル麻酔を行うと白鼠は授乳を中止することがある。この事より同一動物を用いず個々別々の白鼠の乳腺を切除して観察を行つた。その特徴ある所見を次の第3表に記載する。

分娩時に於ける乳腺は前述の通り(207)拡張した終胞腔による腺葉形成並びに排泄管拡張等授乳に対する準備は既に完了している。

産褥2日には肉眼的に授乳された形跡を認め、乳頭の發育もよく、肥大している。排泄管は総べて大きく拡張し、腺小葉を形成する終胞腔は高度に拡張して大きな腺腔を作る。所謂網目状の腺腔を形成する。上皮細胞は扁平或いは低円柱上皮で原形質の内腔側に脂肪顆粒を証明する。又、内腔縁の上皮細胞には細胞膜を消失したかの如く見られる部を認める。核は大きな卵円又は楕円形で染色度は淡い。間質部は小葉をとり囲む程度に細く認められ、周囲の脂肪組織は極めて僅かである。

産褥3～5日は産褥2日の所見とさほどの変化は認めないが、同一動物でも授乳の前後により、終胞腔上皮の形、質内脂肪顆粒の有無及び量、内腔の分泌量等変化が見られる。

産褥20日、離乳期近い時期の乳腺は、一見して小葉間結合組織の増殖充血が見られる。特に腺小葉周囲、腺小葉内毛細血管の拡張が著明である腺小葉は少々縮小しているが、排泄管には著変を認めない。

産褥21日、No. 350は泌乳現象が盛んで、腺葉の網目状の所見が認められるが、腺葉自体は少々縮小して

いる。又、終胞腔上皮細胞核の形状及び染色度がまちまちである。No. 141 は間質結合組織が増殖し、終胞腔の縮小 No. 350 より著しい。

産褥35日、仔を離乳せずに飼育箱に同居させた産褥白鼠乳腺には泌乳現象を認めなかった。即ち、腺小葉は形成され、終胞腔は認められたが全く閉鎖した形である。一見終末装置との区別は困難であつた。小葉内に結合組織が増殖し、血管特に毛細管の数は多く認められるが拡張は著明でない。

以上の如く、授乳期は妊娠期に发育した乳腺に泌乳作用が現われてくる。これは産褥2日目既に著明に起る。即ち、終胞腔は高度に拡張して大きな腺腔を作り、所謂網目状の腺組織を形成する。上皮細胞は丈の低い細胞になり、内腔側の細胞膜は破綻した如く見られ、内腔にエオジン好染物質及び脂肪顆粒を認める。排泄管は妊娠期にも増殖发育するが、授乳期には更に发育し一層拡張する、授乳前後によつて多少異なるが、通常内腔に分泌物を認める。間質結合組織は亡しく、脂肪組織も僅かである。しかし、離乳期近い産褥20日頃になると、多くは腺小葉の縮小、間質結合組織の増殖が起る。即ち、終胞腔上皮は円柱上皮になり、細胞内脂肪顆粒は少く、核は小さく濃染する。内腔も縮小する。産褥35日では仔と同居しても授乳なく、又乳腺組織にも泌乳現象を認められなかった。

第3表 産褥期及び授乳後離乳期乳腺所見

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔			大排泄管		中排泄管		小排泄管		終末裝置		間 質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			上 皮 形	核 形	內腔 染色 度	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物	數	內腔 分泌 物																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			脂 肪	染 色 度	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物	數	擴 張 度	分 泌 物

第7章 離乳期の乳腺所見

授乳白鼠は通常分娩後21日で離乳する¹⁹⁾。離乳期乳腺といえば一定の授乳期間後に離乳した乳腺をさすのであるが、私は本研究に於いて、分娩後授乳させずに直ちに離乳させた乳腺も検索し比較検討を行った。

材料は授乳後離乳は産褥21日以後、分娩後離乳は分娩後直ちに仔を離した白鼠の乳腺を遂目的に切除して検索した。

1. 授乳後離乳乳腺所見 (第3表)

§ 離乳後2日 離乳時に見られた拡張した腺腔は $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ 位に縮小し、終胞腔上皮は低円柱或いは円柱上皮に変わり、内腔側細胞膜が明瞭に認められるものが多い。細胞内脂肪顆粒は尚かなり大きな顆粒を証明する。内容は終胞腔及び終末装置に見られるが中等度以上の排泄管には認められない。小葉内毛細血管は数を増し著しく拡張する。

§ 離乳後3日 終胞腔はまだ拡張し、分泌物を認める。中には腺腔がかなり閉鎖しているものも見られる。(352)しかし、まだ分泌現象を盛んに認めるものもある。(142)小排泄管内には分泌物が充満している。小葉間結合組織の増殖及び毛細血管の拡張は著明である。

§ 離乳後4日 腺小葉の終胞腔の状態が各小葉により全く異り一定していない。即ち、全く萎縮したものあり、又離乳時の拡大した腺腔を認める。小葉もある小葉間結合組織は益々増殖する。

§ 離乳後5日 終胞腔は閉鎖状で数が少い。終胞腔上皮細胞核は淡染する大きな円形のものと濃染する小さな楕円形の二種が見られる。(143)腺腔の内容は剝脱した上皮細胞を少し認めるもの(143)又、認めないもの(354)もある。小葉間結合組織は増殖して、脂肪組織も著明である。排泄管は小排泄管のみに内容を認める。

§ 離乳後6日 腺小葉は大部分が小排泄管、少数の終末装置で構成されていて、終胞腔を認め得るもの(144)、及び認め得ないものと(355)ある。間質結合組織の増殖著しく、小葉内に結合組織の増殖をみる(144)。

§ 離乳後7日 終胞腔は全く認められず、腺小葉は縮小し数も少い。これに反して間質結合組織は増殖する。排泄管に内容を認めず、閉鎖状である。間質は血管の發育が尚著明である。

§ 離乳後8日以後 腺小葉は益々萎縮し、これに反して間質部は増殖する。腺小葉は小排泄管及び終末装置で構成されている。排泄管は閉鎖状になり、終末装置は發育悪く内腔は閉鎖する。

以上の如く授乳後離乳乳腺は離乳時に既に産褥3～5日の活動期より退潮している。而して離乳翌日には急にその腺腔が縮小する。終胞腔上皮細胞の形状は丈が高くなり、乳汁は大・中排泄管には認められない。終胞腔は遂目的に萎縮するが、内腔の拡張程度は各小葉により異つて様でない。離乳後5日に大部分が閉鎖するようである。離乳後7日以後は終胞腔を証明せず、排泄管の内容は4日目迄は中・小排泄管に著明に認められるが、7日以後には証明出来ない。腺小葉は萎縮、縮小する経過をとるが、これに反比例するが如く間質は増殖し始める。先ず小葉内毛細管の拡張、小葉内の結合組織線維の増殖が起る。間質の増殖は血管系より始まり、結合組織特に脂肪組織が次第に發育し、8～9日頃の間質部の増殖が著しい。10日以降は毛細血管の拡張はさほど著明でなくなる。而して、離乳後14日では腺小葉も認められず、排泄管及び終末装置は閉鎖し数も少くなり、静止状態の乳腺と考えられる。

2. 分娩後離乳乳腺所見 (第4表)

§ 分娩後2日 終胞腔は高度に拡張し、腺組織の網目状構造が見られ、内腔は分泌物で充満する。排泄管も發育よく、内腔にも亦分泌物が充満している。間質部は亡しく主として血管性で、特に毛細血管の拡張が著しい。

§ 分娩後3日 腺腔は少々狭くなっているが前日の所見と大差がない。只間質部の充血が著明である。

§ 分娩後4日 分葉は著明であるが、腺小葉は縮小している。まだ終胞腔の半数位は拡張していて内容を認める。終胞腔上皮細胞の核が前日に比べて濃染している。小葉間結合組織が少々増殖する。充血は益々著明である。

第4表 分娩後離乳期乳腺所見

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔			大排泄管		中排泄管		小排泄管		終末装置			間 質		
			上 皮	核	内腔	内腔	内腔	内腔	内腔	内腔	内腔	細胞	内腔	発	血管	毛細	皮
			数	形	脂	染色	度	度	度	度	度	数	度	度	数	度	度
207	分娩時	++	++	扁	卵	+	++	++	++	+	+	++	++	+	++	++	+
327	G後2T	++	++	低	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
328	G後3T	++	++	低	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
329	G後4T	++	+	低	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
315	G後4T	++	+	低	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
318	G後5T	+	+	低	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
330	G後5T	++	+	円	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
331	G後6T	+	+	円	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
332	G後8T	+	+				++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
333	G後10T	+	+				++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
334	G後11T	+	+				++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
209	G後13T	+	+				++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
335	G後13T	+	+				++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++

§ 分娩後5日 腺小葉は縮小している。終胞腔は殆んど閉鎖している。しかし拡張して分泌物を認めるものもある。(318) 排泄管は閉鎖せず比較的大きな排泄管で乳汁の残留を認める。小葉間の結合組織が増殖し、又毛細組管の拡張著明、間質部は少々浮腫状である。

§ 分娩後8日 腺小葉は認められるが、終胞腔は認められない。排泄管は大・中排泄管は閉鎖状であるが、中排泄管で内容を僅かに認めるものもある。小排泄管及び終末装置は腺小葉を構成するが縮小が著明である。腺小葉内に結合組織が増殖している。間質部は腺小葉の萎縮に反比例して发育する。

§ 分娩後10日 分葉は不明瞭で大・中排泄管周囲に点在する。終胞腔は認められない。排泄管のなかには未だ閉鎖せずに拡張して内容を証明するものもある。間質部は充血している。

§ 分娩後11日 腺小葉は全く萎縮し、これに代つて、間質結合組織が増殖する。中・小排泄管は拡張して内容を証明する。

§ 分娩後13日 分葉は少々著明に認められるものもあるが、各小葉を構成している。小排泄管は少々拡張し、发育の悪い終末装置と一緒になつて腺小葉を構成している。(209) しかし No. 335 は全く分葉不明瞭である。而して排泄管も閉鎖状で内容も認められない。

以上の如く分娩後2～3日は分娩時乳腺に比べて、終胞腔の发育よく、内腔も拡張し、分泌物も多量に認められる。又、いずれの排泄管も拡張し分泌物を充滿している。間質の充血が著明である。併し、分娩後4日に至つて腺葉の縮小、内腔の閉鎖が始り、次第に萎縮経過をとり、分娩後8日以降に終胞腔は認められず、又腺小葉も分娩後11日以後は不明瞭となる。これに対して間質部は分娩後4日以降次第に増殖して、腺小葉とその立場を变ずる如く发育する。排泄管は前項の授乳後離乳の場合と異り、排泄管の閉鎖並びに内腔の分泌物が比較的長期に亘つて証明することが出来る。

以上の如く授乳後離乳と分娩後離乳の乳腺を比較検討すると、腺小葉、腺腔の縮小はさほどの相違点はなく、終胞腔の消失も同じく7日目頃と考察出来るが、排泄管の所見に差異があり、授乳後離乳の場合は大排泄管には離乳後より内容は認められず、中排泄管は4日目、小排泄管は6日目迄分泌物を証明出来るが、分娩後離乳の場合は大排泄管は10日目、中・小排泄管は11日目迄拡張して内容を証明出来た。

第2編 妊娠白鼠を用いたP実験による乳腺の研究

第1章 実験要旨

妊娠時体内に循環する Hormon 研究の一端として、私は従来 P 法を用いた実験的研究を行つて来た。P 実験を行つた 2 匹の動物に体液の交流が起るのは勿論明らかであるが、相互に Hormon の移行が起り、相手側に必ずしも影響を与えるとは限らない。従来よりの研究によるに同性或いは異性間 P に於いては、相互生殖腺に変化を認めぬことになつてゐる^{20,25)}。これは相互の正常成熟動物に於いては、相手側に変化を及ぼす有効量の Hormon 分泌がないと解釈されている。此の点に関して既に当教室に於いて久保田が成熟・幼弱白鼠 P 実験を行い相当の影響のあることを明らかにした¹⁸⁾。また本実験もこの点に関して影響の有無を知る好箇の実験であることは言うまでもない。即ち、相手側（非妊側）に変化を来すことは、妊娠した動物（本実験に於いては白鼠）体内に過剰分泌 Hormon の存在を証明することになり、妊娠側よりの移行した Hormon が、非妊側に影響を及ぼすに足る有効量の Hormon のあることを明らかに知ることが出来た。

この影響を知るために、非妊側の乳腺の変化を遂目的に組織学的に観察を行つたが、乳腺が妊娠により短時日に特異な変化を来し、而して外表より遂目的に観察することが可能で且つ簡易に切除出来る。これ等の利点を利用して相手側非妊白鼠を成熟雌と去勢雌の二通りに分けて観察した。これによつて成熟側の卵巢の態度並びに去勢側の脳下垂体の態度に就いても考察した。

第2章 実験材料並びに実験方法

使用白鼠は前編で記した如く当教室で飼育した Wistar 系処女白鼠を用いた。使用白鼠の体重は一律に平均したものを使用出来ず、100~200g の間のものを使用した。P の組合せをする 2 匹は同腹で体重の近いものを選び、その際、相手側の白鼠を妊娠側より約 20g 重いものを選んだ。これは妊娠が進むことによつて妊娠側の白鼠の体重増加すること、及び P による白鼠の疲労・体重減少が相手側に著しく現われる事等を考慮したためである。

去勢白鼠は去勢手術後 2 週以上の経過したもので、使用前少くとも 5 日間腹腔脂膏検査を行い、間期の持続を確認してから使用した。

P 手術法は小山氏法に準じ¹⁹⁾、皮膚筋肉腹膜縫合法にて行つた。この際、縫合する手術創は皮膚 5cm、腹膜 2cm と定めた。P 手術後の絆創膏固定は脚及び尾部に型の通り行つたが、腹部は実験目的より乳腺を保護するため、巾 2cm の絆創膏を胸部並びに腹部に各々一条行い、腹部の方は妊娠側の腹部圧迫に留意した。手術時の麻酔は Thiopental sodium 5mg/体重 100g 腹腔内注射によつた。

実験方法は予め妊娠させた白鼠が、妊娠 7~8 日になるのを待つて、その相手に妊娠白鼠より体重が略々 20g 重い同腹の雌（成熟及び去勢雌）を撰んで P 手術を行つた。乳腺切除は P 時及び P 後 5 日目より 3~4 日間隔に切除し、妊娠側の分娩前日に 2 匹を離解することを原則とした。

第3章 相手白鼠を成熟雌した実験

1. P 実験成績

妊娠白鼠と成熟雌白鼠との P 組合せは 30 組行つた。（術後 2 日以内に死亡した組合せは含まない。）P 実験には原因不明で斃死する事が多く、30 例中 5 日以内死亡した例は 14 例ある。その死亡は相手側白鼠が 12 例、双方共死亡したものが 2 例、妊娠側白鼠が死亡した例はなかつた。

P 実験が 5 日以上持続した場合は、体重が極度に減少する時をのぞいて、妊娠側が分娩する迄 P は持続した。

妊娠側の妊娠期間の変動は見られない。

P 手術後翌日及び翌々日に、妊娠側白鼠臍口に血性粘液或いは凝血が略々全例に見られたが、これは約 2 日間の持続で止まりそのまま流産した例はない。分娩後、或いは分娩前日頃に P の離解を行つたが、この場

合相手側白鼠は疲労度劇しく死亡した例が多い。

2. P 後の逐日的観察による乳腺所見 (第5表)

第5表 P 実験成熟雌乳腺所見

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔	大排泄管		中排泄管		小排泄管		終末装置		間 質										
				数	内腔	数	内腔	数	内腔	数	細胞 發育	内腔		発 育	血管		毛細管		皮下 脂肪			
					拡張 度		分泌 物		拡張 度			分泌 物	拡張 度		分泌 物	拡張 度	分泌 物	数		拡張 度	数	拡張 度
217	P 後 4 T	—	—	—	±	—	+	±	+	+	±	—	+	±	+	—	+	+	+	+	+	+
226	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	++	+	±	++	+	±	+	+	+	+	+	+	+
229	〃 5 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	+	+	+	+	+	+	+
458	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	++
461	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	+	+	—	+	±	+	—	+	+	+	+	+	+
472	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	+	+	—	++	+	+	—	+	+	+	+	++	++
474	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
302	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	+	±	—	+	±	±	—	+	+	+	+	++	++
320	〃 6 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	+	—	+	±	±	—	+	+	+	+	++	+
475	〃 〃	—	—	+	+	—	+	+	—	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
477	〃 〃	±	—	+	+	—	+	±	—	+	+	—	++	±	±	—	+	+	+	+	++	++
459	〃 9 T	—	—	+	+	—	+	+	+	++	++	+	+	++	+	+	+	+	+	++	++	+
462	〃 〃	—	—	+	+	—	+	++	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	+
218	〃 10T	+	—	+	±	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	+
227	〃 〃	+	—	+	+	—	+	++	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	+
296	〃 〃	±	—	+	+	—	+	+	+	++	+	±	++	±	±	±	+	+	++	++	++	++
321	〃 12T	±	—	+	+	—	+	±	—	++	++	+	+	++	+	+	+	+	++	++	++	±
463	〃 13T	—	—	+	+	—	+	++	+	+	++	+	+	++	++	+	+	+	++	+	++	+
324	〃 〃	±	—	+	+	—	+	±	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	±
219	〃 14T	+	—	+	+	—	+	+	—	++	+	±	++	++	++	+	+	+	++	++	++	++
478	〃 15T	±	—	+	±	—	+	±	—	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	+	+
220	〃 16T	±	—	+	±	—	+	±	—	++	+	—	++	++	+	—	+	+	+	+	+	++
464	〃 〃	++	—	+	+	—	+	+	—	++	+	—	++	±	—	—	++	++	++	+	++	++
303	〃 17T	—	—	+	+	—	+	+	—	++	±	—	+	±	±	—	+	+	++	+	+	±
305	〃 19T	—	—	+	+	—	+	+	—	+	±	—	+	+	+	—	+	+	+	+	++	±
307	〃 23T	—	—	+	+	—	+	±	+	++	±	+	+	+	+	±	+	+	++	++	++	±

§ P 後 4 日

No. 217 特別な所見は見られない。只間質部の血管系の充血毛細血管の拡張が見られる。

No. 226 経産白鼠であるため P 時に小排泄管及び終末装置を認めた。即ちこの乳腺では腺管に特別の変化が見られない。而して No. 217 と同じく間質部に変化を認めたのみである。

§ P 後 5 日

No. 229 間質部の充血の他所見がない。

No. 302 中排泄管の周囲に小排泄管及び終末装置が点在する。間質部毛細血管の増殖及び拡張著明である。

No. 458 小排泄管の増殖著明、その数に比べて終末装置は少い。小・中排泄管の管腔に上皮細胞の剝脱したものを認めた。

No. 461 小排泄管の増殖あり，又終末装置も増殖しているが發育未だし。

No. 474 脂肪組織増殖，終末装置 5～8 個集り，その周囲の毛細血管が拡張している。小排泄管はさほど多くない。

§ P 後 6 日

No. 320 大・中排泄管は閉鎖状，小排泄管は少々拡張して，終末装置も増殖している。

No. 475 小排泄管の増殖著明，内腔に上皮細胞を認める。間質脂肪組織が可良である。

No. 477 脂肪組織の發育良，その中に閉鎖した排泄管が散在している。その周囲に終末装置が小さな集団をなしている。

§ P 後 9 日

No. 459 小排泄管は其の数を増し，内腔に剝脱した上皮細胞を認める。終末装置は No. 458 (P 後 5 日) より数を増しているがさほど多くない。全体の發育よくて，内腔は拡張し，内容を僅かに証明する。(附図 5 参照)

No. 462, No. 459 と同じく中・小排泄管は数を増し，特に中排泄管は高度に拡張し，内腔にエオジン好染物質の存在を認める。しかるに終末装置の数は少い。間質部の充血が著しい。

§ P 後 10 日

No. 218 大・中排泄管を中心として小排泄管が増殖している。分葉は著明で終末装置の發育がよい。内腔拡張し内容を認める。間質部の發育もよく充血し，毛細血管が拡張する。(附図 6 参照)

No. 227 経産白鼠であるが，中排泄管多数あり高度に拡張して内容を有する。大排泄管をのぞく他すべて内容を認める。脂肪染色陽性物質である。終末装置の数は少いが，小葉を形成する。小葉内に結合組織が発達し，血管に富み，毛細血管の拡張が見られる。

No. 296 間質脂肪組織内に小さな腺小葉が散在する。この腺小葉は小排泄管が多い。これを囲んで終末装置が小数集っている。内腔に分泌物を僅かに証明する。

§ P 後 12 日

No. 321 分葉はあまり著明でないが，小排泄管及び終末装置が集つて形成されている。小排泄管は数が多く，高度に拡張し，内容を認める。終末装置の發育はよい。間質部の發育よく充血し，特に腺小葉周囲に毛細血管を多数認める。

§ P 後 13 日

No. 463 中・小排泄管は高度に拡張し，内腔に分泌物を証明する。この中に上皮細胞を認める終末装置は数は少いが發育よく，内腔は拡張する。分葉はあまり著明でない。毛細血管の拡張著しく，間質部の充血が著しい。(附図 7 参照)

No. 324 小排泄管が多く認められて，この周囲に終末装置がある。両方とも内腔の拡張はあまり見られない。内容を証明する。

§ P 後 14 日

No. 219 分葉は著明に認められる。中排泄管を中心として，小排泄管及び終末装置より構成される。腺腔の拡張は終末装置に著明に認められる。内腔に分泌物を証明する。間質脂肪組織可良。

§ P 後 15 日

No. 478 分葉はあまり著明でない。終末装置の数は多く，細胞の發育はよい。排泄管は閉鎖状であるが，内腔に分泌物を証明する。間質部の發育はよいが，あまり充血は見られない。又毛細血管の数も少い。

§ P 後 16 日

No. 220 間質部，特に脂肪組織の發育可良，中排泄管周囲に小排泄管が集合して認められる。内腔に分泌物は証明出来ない。

No. 464 分葉は著明に認められるが，これを構成する排泄管及び終末装置の上皮細胞の發育が不良である。内腔も閉鎖している。又，内容も認められない。間質部の發育可良，充血し，脂肪組織の發育は著明である。

(附図 8 参照)

§ P 後17日以降

第 5 表に示す 3 例は、P 実験をしたまま妊娠側が分娩し、P をそのまま持続した例である。P 実験の状態では授乳は困難であつて、この例は分娩後 8 日迄授乳を続けた例である。

No. 303 (P 期間17日) 中排泄管周囲に小排泄管が多数に認められる。腺小葉形成は認められない。終末装置の数は少ないが、上皮細胞の發育悪く内腔の拡張も著明でない。間質結合組織の發育よく、充血が著しい。

No. 305 (P 期間19日) 腺小葉は認められないが、小排泄管周囲に終末装置を認め、No. 303 と所見に大差はないが、終末装置の發育は、この乳腺の方が可良である。

No. 307 (P 期間23日) 閉鎖した中排泄管周囲に、小排泄管及び終末装置が少数集つている。妊娠 7～8 日の組織像に似ているが、小排泄管の拡張可良で、内容を認める。

3. 実験例の総括

妊娠白鼠と P した相手成熟雌白鼠乳腺は遂日的觀察に於いて、前述の如き組織学的變化を認めた。これは妊娠白鼠よりの移行した Hormon による作用と考えられる。即ち、妊娠白鼠と成熟雌白鼠の P に於いては、妊娠側より相手側の乳腺に變化を及ぼすに足る充分な量の Hormon が移行することが明らかとなつた。この事は妊娠白鼠の体内では妊娠によつて、各内分泌臓器及び胎盤に於いて分泌された Hormon が、正常成熟時に比較して P 方法によつては過剰分泌現象が起つてゐるのではないかと思われる。相手側成熟雌乳腺の變化は、前編で記載した妊娠性變化と聊か組織学的に所見を異にした。即ち成熟雌側に移行した Hormon の作用が現われたのは P 後 5 日である。P 後 4 日には僅かに間質の充血が認められるに過ぎない。P 後 5 日に小排泄管の増殖が著明に認められ、終末装置が僅か出現し、その周囲の毛細血管が拡張した。

排泄管は遂日的に著明に増殖、P 後 9～10 日には小排泄管が中排泄管の周囲に増殖し、数を増すと共に、その内腔が拡張して分泌物を認める。分泌物はエオジン好染物質で脂肪顆粒を証明し、なかに上皮細胞も認められた。腺小葉は P 後 10 日に小さな集団として認めるが、P 後 14 日には著明となつた。しかし終末装置はさほどの増殖は認められず、正常妊娠期の發育とはその組織像を異にし、小排泄管に比し、終末装置の数が少い、P 後 12 日頃より個々の細胞の發育はよいが終末装置の数はさほど増さない。内腔の拡張も見られた。しかし P 後 16 日以後分葉は不明瞭となり、終末装置は萎縮して、發育も悪く、内腔は閉鎖状である。

間質部は P 後 4 日で先づ充血が認められ、6 日目以後は脂肪組織が著明に増殖した。P 後 10 日以後の分葉が著明に見られる時期は、發育よく、腺小葉周囲の毛細血管の拡張が著明である。而して、P 後 16 日以後腺小葉が萎縮するにつれて間質部は更に増殖する傾向が見られた。

第 4 章 相手白鼠を去勢雌にした実験

1. P 実験成績

妊娠白鼠と去勢雌との P 組合せは 15 例行つた。(前章の成熟例に比べて麻酔死等の術後 2 日以内の死亡は多く、この例は省いた。)

P 実験中の死亡は成熟例に比べて多く、これも去勢側の死亡である。

妊娠側白鼠の妊娠期間の変動は見られない。

術後に妊娠側白鼠の膈口に、血性粘液或いは凝血を証明したのは成熟例と同じで、術後 2～3 日間認められた。

2. P 後の遂日的觀察による乳腺所見 (第 6 表)

§ P 後 4 日

No. 465 大・中排泄管は閉鎖状、小排泄管は少々拡張している。終末装置の数は少いが存在する。間質部の發育は不良である。

No. 469 中排泄管周囲に、小排泄管並びに終末装置が散在している。間質は軽度の充血が認められる。

第6表 P実験去勢雌乳腺所見

番 号	時 期	腺 小 葉	終 胞 腔	大排泄管				中排泄管				小排泄管				終末裝置				間 質				皮 下 脂 肪
				數	内腔		數	内腔		數	内腔		數	細胞 發育	内腔		發育	血管		毛細管				
					擴張 度	分泌 物		擴張 度	分泌 物		擴張 度	分泌 物			擴張 度	分泌 物		數	擴張 度	數	擴張 度			
465	P 後 4 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	+	±	—	+	+	±	+	+	±	+		
469	P 後 //	—	—	+	±	—	+	±	—	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+		
309	P 後 5 T	—	—	+	+	—	+	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
240	P 後 7 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	±	+	+	±	±	+	+	+	+	+	+	+		
300	P 後 //	—	—	+	+	—	+	+	—	+	+	—	±	±	±	—	+	+	±	+	±	±		
470	P 後 8 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
467	P 後 //	—	—	+	+	—	+	+	—	+	+	—	+	±	±	—	+	+	+	+	+	+		
466	P 後 9 T	—	—	+	+	—	+	+	—	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
310	P 後 10 T	—	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
468	P 後 11 T	—	—	+	±	—	+	±	—	+	+	—	+	±	+	—	+	+	+	+	+	+		
312	P 後 12 T	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+		
314	P 後 14 T	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+	±		
316	P 後 15 T	—	—	+	+	+	+	+	+	+	±	+	+	±	±	+	+	+	+	+	+	+		

§ P 後5日

No. 309 排泄管，特に小排泄管が多数に認められ，少々拡張する，終末装置は数は少いが發育はよい，間質部には脂肪組織が著明に發育している。

§ P 後7日

No. 240 大・中排泄管周囲に小排泄管が増殖し，終末装置が数多く認められる。排泄管の發育は良好で，拡張は著明でないが少量の分泌物を認める。間質部には特に所見がない。（附図9参照）

No. 300 小排泄管及び終末装置を，中排泄管周囲に僅かに認め，乳腺全体の發育は不良である。又，間質部の發育も不良で，脂肪組織も少く，血管の拡張もない。

§ P 後8日

No. 470 間質脂肪組織の發育よく，その中に排泄管及び終末装置を認める。大・中排泄管は閉鎖状であるが，小排泄管は拡張し，終末装置は数多くあつて，上皮細胞の發育もよく内腔は拡張しているが，内容は認められない。間質部は充血し，毛細血管の拡張が著明である。

No. 467 前例 No. 470 と略々同様の所見であるが，小排泄管及び終末装置の發育は少々不良である。

§ P 後9日

No. 466 中排泄管を中心として小排泄管があり，その周りに終末装置が8～10個集つて存在する。終末装置の数は少いが，上皮細胞の發育よく，核も大きい。内腔は広く拡張し，分泌物を認める。小排泄管も内腔の拡張はさほど著明でないが，分泌物を少量証明する。（附図10参照）

§ P 後10日

No. 310 中並びに小排泄管が多数存在し，發育よく，内腔が高度し，分泌物を多量に認める。分泌物はエオジン好染物質で脂肪顆粒を証明する。しかしこれに比較し終末装置の数は少い。内腔に分泌物を証明する。間質部の充血は著明に認められ，毛細血管の拡張も著しい。脂肪組織の發育もよい。（附図11参照）

§ P 後11日

No. 468 中等度以上の排泄管は閉鎖しているが，小排泄管は發育よく，内腔は拡張している。終末装置は

数多く認められるが、上皮細胞の發育不良で内腔は閉鎖している。間質結合組織の發育はよいが、血管系の拡張はさほどない。

§ P 後12日

No. 312 間質結合組織のなかに高度に拡張した中並びに小排泄管が多数認められる。分泌物も多量に証明される。これに反して終末装置が少く、この發育も不良で内腔も閉鎖している。排泄管周囲は結合組織の増殖が著明で、脂肪組織が少い。毛細血管は拡張し間質全体が充血している。(附図12参照)

§ P 後14, 15日

No. 314及びNo. 316 前述したNo. 312と同一去勢白鼠乳腺で、妊娠側が分娩した後も離解せずにPを持続した例である。妊娠側はNo. 314が分娩後3日、No. 316が分娩後4日である。

No. 312 に比較して排泄管は更に拡張し、終末装置は少く、No. 316では高度に拡張した排泄管を多数認めるが、小排泄管の数は少い。内腔に多量の分泌物を証明し、排泄管上皮は2層の扁平上皮で、核は濃染し紡錘形を呈している。排泄管周囲の結合組織は増殖しているが、間質部の脂肪組織は少い。

3. 実験例の総括

妊娠白鼠とPした相手去勢雌白鼠乳腺は、逐日的観察に於いて、前日の如き組織学的変化を認めた。即ち、前章の成熟雌白鼠を相手としたP実験と同様に、妊娠側より去勢白鼠の乳腺に解剖的にも組織学的にも変化を及ぼす有効なるHormonの移行が明らかに認められた。而して、この乳腺の変化は妊娠性変化と多少異つた増殖であり又分泌像であつた。

去勢側に移行したHormonの作用発現が明確に認められたのはP後7日である。P後4～5日では間質部の充血、小排泄管の増殖が僅かに認められた。P後7日では排泄管の増殖が著明に認められ、内腔も少々拡張し、分泌物を少量であるが証明出来た。P後10日に於いては排泄管内腔の拡張が著明に観察出来、P後12日では更に拡張は高度となり、小排泄管の数は減じた。

終末装置は逐日的に数を増したが、P後9日で小排泄管周囲に8～10個、P後11日では僅かに数を増した程度である。排泄管の増殖に比して、終末装置の数が少いことは前章の実験例と同じであつた。

間質部はP後4～5日で先ず充血を認め、P後8～9日には脂肪組織の増殖が著明であるが、P後12～13日では、量的に少くなる感があつて、排泄管周囲には増殖が著明に認められた。

本実験例と成熟雌P実験例と比較して観察すると、乳腺の増殖並びに分泌像を呈することは同じ様な経過であるが、成熟例と比べてその発現が時間的ずれがあつて3～4日遅れて起る様に考えられた。又、本実験乳腺では腺小葉の形成は全例に殆んど認められず、終末装置が前章の例より更に少く思われた。

全編にわたる概括並びに考按

1. 白鼠乳腺がGreene¹³⁾の記載する様に通常胸腹部に左右6対を数えている。而して、妊娠、産褥期の乳腺の發育著しい時は一部肋骨縁下で中断するが胸腹部に広く發育拡張している。

私の実験に於いて、一定期間実験動物を逐日的観察する事により、各乳腺間の組織学的差異の有無を明らかにする必要があると感じた。各生理時期に於いて1匹の白鼠の全乳腺を切除し、各乳腺を比較検索した所、産褥期を除いて他の時期に所見の差異を認められなかつた。即ち、産褥期に於いては乳頭の損傷等により授乳の行われなかつた乳腺は、その動物の他の乳腺に授乳が行われていても乳腺の所見を異にするものである。泌乳には授乳刺激が必要な条件であることは既に周知のことであるが、この事実を更に同一の動物の乳腺に於いても証明することができた。即ち、乳腺發育並びに泌乳現象が体液により、支配調節されても、授乳の行われない一部の乳腺は、組織学的に異つた所見を呈した。

2. 1922年 Rosenberg²⁹⁾は人乳腺に於ける週期的変化は、子宮内膜と同じで月経過期の黄体期に一致している事を述べ、Ernst⁴⁾はそれを確認し、Turner³⁰⁾も同じく乳腺活動と卵巣変化との相関関係を記載している。藤森⁹⁾によれば人乳腺は月経週期に従つて増殖と退行を繰り返し、増殖は月経終了後2～3日より月経前期

迄続き、月経直前又は開始と共に退行が7～8日間続く。そしてこの内分泌的考察として Estrogen 及び Progesterone 分布の最も濃厚なる時期が、乳腺の増殖に相当すると解釈している。白鼠について西垣²⁷⁾は発情期に於いて少々血管多く充血の感があり、他は週期に於いて大差はないと述べている。

白鼠の性週期は4～5日に反復し¹⁹⁾小山、中尾の分類によれば、間期(57時間)、上皮期(12時間)、上角期(12時間)、角化期(24時間)と規則正して発来する。私の実験に於いて間質部の充血を角化期及びその翌日に認めたが、この時期は白鼠の卵巢に於いて、卵胞成熟、排卵、黄体形成の時期³⁰⁾にあたる。いずれにせよ白鼠乳腺が著明なる変化を来さないのは、その性週期が短時日の反復であり、又乳腺に変化を来す Hormon の有効量が分泌されないか、例え分泌されたにせよ、時間的に短時間であるかとも考えられる。

3. 処女未妊白鼠は腺小葉及び終胞腔は認めないが、西垣²⁷⁾によれば妊娠8日にて腺小葉形成、妊娠14日で僅かの終胞腔を認め、18日以後に終胞腔より成る真の腺小葉を認めた。木村²¹⁾は妊娠10日で腺小葉を認め、16日目に終胞腔より成る腺小葉を認め、管腔中に漿液性分泌物及び初乳球が散在すると記している。

私の実験に於いても略々同様の経過並びに所見を得たが、腺小葉及び終胞腔等の発現時期は白鼠の系統によつて多少異るとも考えられる。腺小葉並びに終胞腔発現時期の問題は乳腺が泌乳を目的とした発育段階に於いて最も重要な時期であることは言うまでもない。本実験に於いて乳腺の発育過程を列記すると次の如くである。間質部充血、小排泄管増殖(5～6日)、終末装置増殖(6～7日)、間質部特に脂肪組織増殖(7日)、中排泄管管腔拡張(8～9日)、腺小葉形成(10～11日)、終胞腔出現(16日)、終胞腔上皮細胞の泌乳現象(18～19日)等、経過をおつて発育し、その後は腺葉の増殖、排泄管の拡張により授乳により授乳に対する準備を完了する。逐日の観察に於いては表で見る如く一様でなく2～3日の相違がある。特に後半期泌乳現象が起きた後は同じ妊娠日数でも分泌の程度が異り、又妊娠日数の浅い乳腺の方が泌乳現象が盛んな所見が見られる。これは白鼠の妊娠期間が一様でなく、21～23日で2～3日の相違がある。この事より乳腺発育を判断する際、分娩前何日の乳腺と考えた方が或いは的確な表現とも考えられる。

経妊白鼠に於いては、その妊娠性変化が早期起り、妊娠7日で小葉形成、妊娠13日で終胞腔が認められた。その発育過程は処女乳腺と同様の経過をたどるが、その相違点は時間的なずれのあることである。(妊娠期間は初妊経妊の差はない。)これはP実験に於いても、相手側白鼠が経妊の場合乳腺の変化が早期に現われる事を知つた。

4. 授乳期は乳腺の最も活動的な機能を発揮する時期であり、又雌性乳腺の本来の目的である泌乳作用が起る時期であることは言うに及ばず。藤井⁸⁾はこの時期の組織像として、腺胞の網目状拡張と腺胞の分泌状態を、泌乳の有無の判定目標とした。かかる時期の Hormon 分泌状態を妊娠期に増量した Estrogen, Progesteron 等が急に正常非妊時以下に下降することに関連を求めている。実際 Estrogen, Progesteron は徐々に正常値に恢復するが、Prolactin のみは増量してくる。この泌乳に対して決定的主役を演ずるのは Prolactin であることは認めざるを得ない。白鼠乳腺に関して木村²¹⁾は分娩時に於いて、乳腺実質の発育及び泌乳に関してのべ、組織学的に腺小葉完成し、終胞腔の開大並びに分泌物証明、及び腺細胞内の脂肪顆粒を証明している。又、西垣²⁷⁾は産褥1日に於いて終胞腔が著明に拡大し、分泌物を充し、妊娠期の数倍の大きさを有することをのべ、且つ産褥末期に於いて、乳腺が腺腔の縮小した萎縮形をとると述べている。

私の実験に於いて産褥2日に、授乳の形跡を証明し、腺小葉は完全な網目状の拡張をなし、その分泌現象として終胞腔内腔の乳汁証明、終胞腔上皮脂肪顆粒、終胞腔上皮核の淡染、並びに細胞内腔側の細胞膜の破壊様所見等がその特徴として挙げられる。しかし、産褥末期になると泌乳現象の退潮として、腺小葉の縮小、並びに間質結合組織の増殖が授乳のあるなしに拘る。即ち、離乳期に認められる組織所見は産褥末期に於いて既に起つて来ることを知つた。

5. 離乳期の乳腺は妊娠期及び産褥期の乳腺の最も活動的な時期を過ぎて静止状態に移行する過渡期の経過をとる。即ち、分泌機能を有する腺胞が消失して、皮下結合組織中に小数の排泄管及び終末装置が認められるに過ぎない状態に移行する。藤森⁹⁾は人乳腺の離乳後の経過について、小葉の破裂、分泌顆粒の消失、基礎膜の中断及び萎縮、終末管の縮小、脂葉組織内外の円形細胞浸潤、含吮現象の順序に起り、而して後に再

び乳管及び周囲結合組織の再生と終末腺管芽の更新、増殖が行われると述べている。Berka²²⁾は乳腺の退縮期に於いては分泌物の鬱滞があり、終胸腔を拡大し、上皮は次第に閉鎖消失する。而して支持結合組織は代償性に腺小葉の空隙補填の為に増加を来す。Michaelis²⁶⁾はモルモットに於いて乳腺の退縮時に間質結合組織は増加し、好酸球、白血球の出現することを認め、退縮時に初乳が再び発露するという。

離乳期に於ける乳腺の退縮現象のうち、特に要なことは泌乳停止、終胸腔の消失である。西垣²⁷⁾は白鼠に於いて、離乳後5日目に終胸腔は小数となり、8日目には終胸腔は認められず腺小葉の萎縮に変つて、血管に富む間質組織が発育する。15日目には腺小葉が明確に認められないと述べている。藤井⁸⁾は離乳10日後には特異分泌像が消失して泌乳が止むと云う。龔受²⁴⁾(家兎実験)は授乳作用の停止と共に、終胸腔は漸次萎縮消失すると云う。而して、その萎縮過程に就いて西垣、Berka が述べた如く、玉川³⁴⁾、竹内³⁵⁾、平田、Rosenburg、Jaschke¹⁶⁾等もその退縮時の特徴として、小葉の消失、終胸腔内の分泌物鬱滞、充血を述べている。

私の実験に於いては、萎縮過程で終胸腔は離乳翌日には急激に縮小するが、それ以後は一時に一樣に閉鎖せず、各小葉により異なるが、5日目には大部分が閉鎖している。7日目以後には終胸腔は証明出来ない。間質部の発育は離乳期に於いて最も着目する点であり、先ず血管系の増殖に始まり、腺小葉の萎縮に反比例して血管系結合組織がその位置を占める。小葉内毛細管の拡張及び小葉内結合組織線維の発育は2〜3日目の比較的早期に起きる。しかし間質部の発育は腺葉が萎縮する迄顕著に残つていて、10日目以後に退縮が見られる。

分娩後離乳乳腺は、授乳後離乳乳腺と比べてその退縮は著明でなく、分娩後2〜3日はさほど腺腔の縮小は見られない。しかし4日目より急激に萎縮し、内腔閉鎖が始まり、8日目以後は終胸腔は証明出来ない。

この分娩後離乳と授乳後離乳を比較検討する際、その各々の体内の内分泌臓器、特に卵巢活動について考察しなければならない。竹脇³³⁾によれば白鼠は分娩後早期に排卵が起き、以後授乳により、排卵は抑制されるが、産褥25日には卵巢活動が始まると云う。藤井⁸⁾の研究によれば授乳と性週期について、分娩直後に離乳すると6〜8日目に性週期が始まり、授乳が不完全になつてから離乳すると、速かに性週期は起る。又、自然のまま授乳を続けても20日以後は不完全授乳になる。この状態では35〜39日頃から性週期が始まると云う。

特に乳腺萎縮期に於いて、腺葉の萎縮縮小、終胸腔の閉鎖並びにその消失等の時期は脳下垂体、卵巢系の活動が大であると考えられるが、これは今後の研究に俟たねばならない。又、分娩後離乳乳腺所見中、排泄管の開大並びにその内腔に分泌物が見られる事は内分泌腺の作用のみを以つては説明できない事で、授乳後離乳乳腺が離乳時に既に自然と萎縮所見が現われた点など授乳による吸引の有無等も考えられる事ではあるが、内分泌腺の作用と密接なる関係のあることは想像に難くないところである。

6. 哺乳動物のP実験に関する研究は1860年 Paul Bert の行つた研究を始めとして、現在に至る迄多方面にわたつてP法は研究方面に利用されている。P方法の定義について小山¹⁰⁾は「2匹の動物を手術により分離出来ない様に癒着して、血行等を互に通じさせ、肉體関係を一緒に共存させたものの事である」と述べている。竹脇はこれを並体癒合と呼称している。その方法は Finerty¹⁰⁾の述べる如く、脳下垂体・性腺、脳下垂体・甲状腺、脳下垂体・副腎等の関係、脳下垂体の生長 Hormon の研究、副腎に対する性の影響、乳腺の研究、糖尿病、腎と高血圧、皮膚移植、神経吻合、腫瘍移植等の多方面にわたつて行われている生物学的研究法の一つである。また内分泌臓器の相関関係を検索する上に於いてもP法は最も興味ある方法であつて、最近では脳下垂体・性腺系の研究が最も進んでいる。

P実験は相互動物の皮膚、筋肉、腹膜を側腹部に於いて縫合することにより、相互間に体液の交流が起ることを目的としたものであつて、体液の交流は一般に確認された事実である。これと同時に相互間に Hormon が移行する事が、相互動物の各種の組合せに於いて証明されている。

しかし Christensen³⁾の実験の如く、成熟雌同志のP実験に於いて、相互間の性週期に影響なく、夫々の雌は独自の性週期を繰り返していると云う。又、成熟雌雄の組合せに於いても、雌側の性週期に変化を見ず、雄側よりの影響は見られなかつたと述べている。Morpurgo²⁵⁾も雌雄異性間P実験に於いて、相互の性腺に変化を証明しなかつたと述べている。谷津³⁶⁾もこの方法を追試してその事実を確認している。これらは正常成

熱動物のP実験に於いて、相手側の各臓器に変化を起すHormonが移行しないか、Hormon量が同じであれば相拮抗するか、或いは変化を起すに足る有効量が移行しないものとも解釈される。即ち、正常生理状態にある動物は常にHormon分泌が均等であつて、P方法によつて見てもその体内で過剰のHormon分泌を起していないとも考えられる。この事より考えると、私の実験に於いて、妊娠白鼠とPした相手側に変化を起した事は、妊娠白鼠がP方法によつて見てもその体内で過剰のHormon分泌を行つてゐることを確認することができる。

7. 妊娠動物を使用したP実験には、川島²³⁾、竹脇³¹⁾、久保田¹⁷⁾、藤井(明)⁹⁾、Zeckwer³⁷⁾、Ernst⁵⁾、Pfeiffer u. Zachel³⁸⁾等の報告が見られる。そのP実験に使用した妊娠動物の妊娠期間について、Ernstは妊娠側鼠の流産を報告し、竹脇は相手側が無処置の時は、妊娠は正常に継続したが、相手側が去勢の場合P実験が妊娠14日以前に行われると妊娠継続は出来ないと述べている。私の実験に於いては、妊娠期間についてその相手が成熟雌或いは去勢雌であつても、さほどの妊娠期間の変化が見られなかつた。

Basch¹⁾、Henneberg u. Stelzner¹⁴⁾の報告した臀部癒合児(Pygophagus) Blazek 姉妹の姉の妊娠によつて両者に起つた変化についての症例報告は、P実験者及び乳腺の研究者にとつて興味ある発表であつた。この姉妹は仙骨部で結合されて、直腸、肛門、外陰部が共通であつて、膈、子宮、卵巢その他の臓器は各々別々にあつたが、月経は常に同時に起きたという。一方の姉が妊娠して無月経が起きたが、妹は分娩前8週迄月経があつた。乳腺については、姉の分娩後8日目に妹に泌乳現象が起つた。乳房の發育は非妊の妹の方が良好で、泌乳も産婦の姉より良好であり、Baschは妹の方が以前より栄養状態よく、又皮下脂肪に富んでゐたことによると記載している。而してBaschはこの症例より泌乳が体液性機構により調節される事を主張した。

P実験による乳腺の研究は、Ernst⁵⁾、Zeckwer³⁷⁾、Granger¹²⁾により行われている。Ernstは妊娠鼠と非妊娠鼠とのP実験に於いて、非妊娠雌女鼠に妊娠性変化が起きたことより、乳腺發育の体液的調節を確認した。Zeckwerは去勢鼠一成熟雌に於いて、去勢側からのGonadotropin移行により、成熟雌側卵巣に過剰のHormon分泌が起き、その事より乳腺に変化を認めたと記している。又、Grangerは去勢下垂体剔除雄又は雌白鼠にEstrogen (Estradiol dipropionate $10\gamma \times 10$) を投与して、その相手白鼠に成熟雌、去勢雌、去勢雄を選びP実験を行つたが、実験対称の単独去勢脳下垂体剔除白鼠乳腺に変化を認めなかつたのに、脳下垂体を有した白鼠とのP実験を行う事により乳腺に変化を来した。そのうちで成熟雌をPの相手とした組合せに於いて特に著しい乳腺の変化を証明した。この事より白鼠乳腺發育に於いてEstrogenと共に脳下垂体の存在を重要視している。

私の実験に於いて、相手白鼠に乳腺の増殖並びに泌乳現象を認めた。その相手白鼠が成熟雌並びに去勢雌共に同じく所見を認めた。双方の比較には特別の差異なく、發育が時間的に遅速を認めたに過ぎない。即ち、成熟雌の方が去勢側より変化が早く起きたが、その發育する過程には組織学的に差異を認めなかつた。この実験に因つて相手白鼠の卵巢の有無には特別の意義を見出し得なかつた。

3. Ernstの実験では成熟雌女鼠に乳腺の増殖及び泌乳を証明したが、私の実験に於いても妊娠白鼠とPした相手側の成熟、去勢雌共に各々同様に乳腺の増殖及び乳管内に乳汁を認めた。この変化を正常妊娠期の乳腺変化と比較すると、一定期間は略々同様の経過をとつたが、その後は聊か所見を異にした。即ち、排泄管特に小排泄管、終末装置の發育が始り、腺小葉形成に至る妊娠10~11日頃迄の發育経過は殆んど同様であるが、それ以後腺小葉増殖、終腔形成の時期となつてもそれを見るに至らない。しかるに排泄管の發育が著しく、内腔が高度に拡張し、内に分泌物を証明するに至る所見は大いに異なるところである。而して妊娠期の如く排泄管増殖につれて、終末装置が増殖することがない。本実験に於いても終末装置の發育が極めて悪く、終腔は全く見出し得なかつた。竹内³⁵⁾が人乳腺に於いて、破瓜期、妊娠期等を衝動増殖期と呼び、その急速の変化を腺増殖、間質の充血、及び乳管外層細胞の水腫状肥大によるものであるとした。本実験に於いても乳腺所見は、成熟雌はP後5日、去勢雌ではP後7日より急速の変化を認め、一定期間、竹内の述べ

9. 白鼠乳腺の發育並びに泌乳に関する内分泌学的考察としてGeschickter¹¹⁾は、乳腺の正常な發育をもた

らす Hormon は, Progesteron 1 単位に対して Estrogen 5 γ が適正比と述べている. 藤井⁹⁾は各 Hormon が乳腺に与える形響について実験を行つて, 白鼠に対して Estrogen は乳管は増殖するが腺小葉を形成する傾向が少く, 乳管は拡張して脂肪染色陽性の分泌物像を示すと云う. 而して Progesterone 単独では殆んど, その作用は認められず, Estrogen と Progesteron の併用投与に於いて乳管腺胞系の増殖があり, 妊娠期に似た腺葉形成, 初乳分泌像を認めたと云う. 私の実験に於いて見られた排泄管の異常増殖, 並びに異常分泌像は, 藤井の述べた Estrogen 単独投与による実験的研究による異常分泌像とその所見を同じうするところである. 即ち妊娠白鼠より特に Estrogen が移行して相手側白鼠に作用した様にも考えられるが, しかし妊娠時に大量に分泌されている Progesteron も当然移行することを考ねばならぬ. それ故に本実験の組織所見のみを以つてその作用 Hormon を推定することは困難である. 又, 妊娠側よりの Gonadotropin が相手側の卵巣を刺激して, これによつて分泌される Hormon も考慮しなければならないが, 去勢雌乳腺にも, 成熟雌と同様の組織所見を呈したことより, 相手側の乳腺の変化は妊娠側より移行した Hormon の作用と考えるのが妥当と思われる.

結 語

1. 妊娠白鼠と非妊白鼠の P 実験を行い, 非妊側白鼠乳腺を遂日的に組織学的検索を行い, 次の如き結果を得た.

- 1) 妊娠側の Hormon が相手側の, 成熟雌並びに去勢雌に移行して乳腺に変化を及ぼす事を認めた.
- 2) 妊娠は P 実験に於いて, その体内で過剰の Hormon が分泌されるものと思われる.
- 3) 相手側乳腺の組織学的変化は正常妊娠時の発育と異なつた, 増殖及び分泌像が認められる. 而して正常妊娠時の泌乳に特有の終胞腔を認め得なかつた.
- 4) 相手側白鼠は成熟雌, 去勢雌共にその乳腺の発育過程は組織学的に差異を認めない.
2. 尚, 白鼠乳腺の基礎的研究として各生理期の乳腺の態度を, 遂日的に組織学的検索を行つた.
- 1) 一白鼠にある各乳腺間には組織学的な差異はない.
- 2) 性週期に於ける乳腺の変化は間質部の充血の他特別の所見を認めない.
- 3) 妊娠期に於いて, 乳腺は一定の発育過程を経て, 妊娠18日以後に泌乳準備を完了する. 経産白鼠は処女白鼠に比べて, 乳腺の発育段階が早く起る.
- 4) 産褥期に於いて産褥 2 日で既に高度の泌乳現象が現われ, 産褥20日頃になると授乳が続けられても, 組織像に退潮が認められる.
- 5) 離乳期に於いて離乳 5 日目に泌乳現象が止み, 15日頃には静止状態に復故する. 尚分娩後授乳を行わずに離乳した場合は授乳後離乳の場合と比較すると排泄管に長期に亘つて乳汁を証明した.

執筆にあたり, 恩師三谷茂教授の御指導並びに御校閲に深謝す. 本論文要旨は第 8 回日本産科婦人科学会総会に於て発表した.

参 考 文 献

- 1) Basch, K. : Deutsche med. Wochenschr. 36, 987 (1910).
- 2) Berka : Frank. Zeits. f. Path. Bd. 8.
- 3) Christensen, M. : Acta Path. et Microbiol. Scand. suppl. XXII (1953).
- 4) Ernst, M. : Frank. Zeitschr. Path. 31, 500 (1925).
- 5) Ernst, M. : Deutsche Zeitschr. f. Chir. 202, 231 (1927).
- 6) 藤森 : 日内泌誌, 31, 618 (1956).
- 7) 藤井 : 日婦会誌, 33, 1, 177, 323, 364 (1938).
- 8) 藤井 : 日産婦誌, 9, 927 (1957).
- 9) 藤井(明) : 日婦会誌, 27, 2 (1932).
- 10) Finerty, J. : Physiol. Rev. 32, 277 (1952).
- 11) Geschickter, C.F. : Diseases of the Breast Lippincott (1945).
- 12) Granger, B.S. : Proc. Soc. exper. Biol. & Med. 58, 320 (1945).
- 13) Greene : The Anatomy of the Rat (1955).
- 14) Hegnauer, H. : Zbl. Gynäk. 75, 22 (1953).
- 15) Henberg u. Stelzner : Berl.

永 田 論 文 附 図 (1)

附図 1 No. 236
妊娠13日、下顎部に発見した乳腺

附図 2 No. 173
産褥3日、乳頭壊爛により授乳されない乳腺

附図 3 No. 377
妊娠21日乳腺、終胞腔があまり拡張していない
(附図4と比較)

附図 4 No. 394
妊娠21日乳腺、終胞腔の拡張が著明、内腔に乳汁
を証明す。

附図 5 No. 459
P後9日目成熟雌乳腺、小排泄管の増殖著明、内
腔に分泌物を認める。

附図 6 No. 218
P後10日目成熟雌乳腺、分葉著明、小排泄管及び
終末装置内腔拡張。

永 田 論 文 附 図 (2)

附図7 No. 463

P 後13日目成熟雌乳腺。中小排泄管腔拡張し、分泌物証明す。

附図8 No. 464

P 後16日目成熟雌乳腺。分葉著明終末装置の發育不良。

附図9 No. 234

P 後7日目去勢雌乳腺。排泄管の増殖を認めるが内腔閉鎖状。

附図10 No. 466

P 後9日目去勢雌乳腺。中排泄管周囲に小排泄管及び終末装置増殖。

附図11 No. 310

P 後10日目去勢雌乳腺。排泄管の高度拡張及び異常分泌像。

附図12 No. 312

P 後12日目去勢雌乳腺。排泄管の異常分泌像及び排泄管周囲の結合組織増殖。

- klin. Wochenschr. 40, 798, 829 (1903). 16) Jachke : Halben u, Seiz Bd V. 17) 久保田他 : 日産婦誌, 6, 30 (1954). 18) 久保田 : 日医大誌, 22, 685 (1954). 19) 小山 : 動物実験手抜, 協同医書 (1955). 20) 小山, 中尾 : 生体の化学, 6, 88 (1954). 21) 木村 : 名古屋医会誌, 51, 73, 111 (1940). 22) 川島 : J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo (Sec2) 2, 141 (1944). 23) 三谷他 : 日産婦誌, 8, 19 (1956). 24) 氈受 : 産婦紀要, 22, 1365 (1939). 25) Morpurgo, B. : Münch. med. Wochens. 55, 2447 (1908). 26) Michaelis : Arch. f. Mikr. Anat 51. 27) 西垣 : 日産婦誌, 4, 241 (1952). 28) Pfeiffer u Zachen : K.W. Nr 33 (1926). 29) Rosenburg, A. : Centralb. f. Gyn. 1912Nr 12 : 1912 Nr3. 30) Turner, C. Donnell : General Endocrinology (1955). 31) 竹脇 : J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo (Sec4) 2, 319 (1931). 32) 竹脇 : 性とホルモン, 日本評論社 (1949). 33) 竹脇 : 性現象とホルモン学 (1947). 34) 玉川 : 近畿婦会誌, 8, 677. 35) 竹内 : 東京医会誌, 30, 669~723~813. 36) 谷津 : Anat. Rec. 21, 217 (1921). 37) Zeckwer : Arch. Path. 38, 99 (1944).