Protein Metabolism in Diabetes Mellitus

I. Urinary Amino Acid Excretion

By

Nobuo SAKAMOTO

3rd Department of Internal Medicine, University of Nagoya, School of Medicine

(Director: Prof. Kozo Yamada)

Although numerous investigations on metabolic disturbances in diabetes mellitus have been made, little is known of abnormalities of protein metabolism especially of amino acid metabolism in diabetics.

As the first step to clarify metabolic disturbances of amino acids in diabetes mellitus, urinary amino acid excretion was investigated. Comparing amino acid patterns of normal subjects with those of diabetics, the author gained following results:

- (1) Urinary amino acid excretion is decreased in diabetics especially those with ketoacidosis.
- (2) Excretion of lysine, arginine, histidine, threonine are strikingly decreased.
- (3) Decreased amino acid excretion is recovered to a normal range by administration of insulin, but not by other therapeutics.

Mode of Action of ACTH on the Adrenal Cortex as Determined by Morphological Observation

By

Atsushi YOKOSUKA

Dept. of Hist. and Embry. Tokyo Jikei-kai School of Med., Minato-ku, Tokyo

(Director: Prof. Fujio Yoshimura)

In present investigation, the maintenance test of ACTH was performed in order to elucidate the mode of action of this principle to the adrenal cortex as determined by the cytological observation. In the first group, the hypophysectomized male adult rats of Wistar strain were sacrificed at the 5th, 10th, 14th and 30th postoperative day as the control. The second group consisting of hypophysectomized rats was subcutaneously injected with ACTH 2.5mg/day/rat from the next day for 5, 10, 14, 30 days respectively. Each day-subgroup of hypophysectomized control consisted of 2-6 rats and hypophysectomized administered day-subgroup consisted of 2-3 rats. Materials removed immediately after the decapitation were fixed with Levi's solution and the paraffin sections obtained were stained with Heidenhain's iron hematoxylin. In preceding paper (1957) the author appointed the automacity of zona glomerulosa which may be responsible for the hyperactivity induced by the hypophysectomy, because of the fascicle formation and the accumulation of proteinic stainable granules within the cell-bodies. Present cytological alterations in the adrenal cortices following the hypophysectomy were reconcile in general with the descriptions in foregoing article, so a references is to be made to those data in it.

The adrenal gland weight could in no cases recover from the severe reduction following the hypophysectomy by means of the administration of ACTH; further the decline in size of whole adrenal cortex was not reverted. However, it was learned that the salient histological feature showing the integral retraction from the atrophy of the adrenal cortex was apparent owing to our detail observations.

Five to 7 days after the withdrawal, zona glomerulosa elongated, in which there were a number of the glomeruli consisting of the numerous cells with obscure contour which were burdened with the abundant fat granules. By the administration the zone became to provide the fasciculata appearance whose cells included a majority of stainable granules instead of fat droplets. In the 10th, 14th and 30th postoperative day, the zone was subject to acquire the thorough fasciculata appearance and to obtain the broad extension amounting to $1/2$ to $2/3$ of the whole size of the adrenal cortex. This may be involved in a sign of active participation in secretory facility. The prolonged administration of ACTH for corresponding days shortened conversely the width of zona glomerulosa, increased the number of stainable granules in its cells and made the glomeruli regenerated with the consequent unequivocal restitution beyond the normal level. The response in zona glomerulosa was interpreted as the atrophy rather resembling caused by the chronic stress. We could neither recognize the clear-cut mitosis there nor the metamorphosis of fibrocytes in capsule to cortex cells.

The transitional zone constantly hypertrophied up to the 5th or 10th day, and thereafter it gradually declined in size and finally disappeared. The injection of ACTH for less than 10 days was in fact capable to make the inanition in this zone which had hypertrophied apparently, in spite of much suppression in reacting capacity in advancing postoperative days more than 10 days.

The zona fasciculata was contracted without an exception in hypophysectomized control group; its constituent cells fell into an atrophy; the cell arrangement forming fasciculata was reliably irregular; most of them included abundant huge fat droplets. The administration failed to prevent the atrophy and subsequent disorder in cell distribution, notwithstanding the precise improvement so far as the internal structure of the cells is concerned. For example, the administration for 5 to 10 days increased conspicuously the number of the proteinic stainable granules. Since the augmentation in number of them is consistent with the pattern of the adrenal cortex cells of the animals exposed by the persistent stressful agents, it naturally afford an explanation concerning the cell function that the participation is enhanced in granulation and discharging activity over the physiological level. Whereas an administration for 14 days was able to stabilize the morphological changes occurred in the fasciculata cells within the standard range. The sinusoids in zona fasciculata as well as in zona reticularis were usually dilated by ACTH injection, showing the hyperemia.

The degenerating or disintegrating course of the cells in zona reticularis was progressive by the hypophysectomy, and in advancing postoperative days the scar tissues was so proliferated that they surrounded the adrenal medulla as its capsule. The cell degeneration was ameliorated to the moderate degree beyond the abnormal condition by the hormone injection. We discussed the acting mechanism of ACTH to the adrenal cortex cells as determined by the cytological observation, with the particular remarks to the different aspects of the hormone to the adrenal cortex, both weight factor and ascorbic acid factor denominated by Young (1951).

ACTH の副腎皮質に対する作用方式に関する

形態学的観察

東京慈恵会医科大学組織学教室 (主任: 吉村不二夫教授)

横 須 賀 篤

緒 言

横須賀は前報告(1958)で、下垂体摘出ラットの副腎皮質球状層は一時肥大するが、やがて時日の経過と共に(14日~30日)束状配列を示し、一方肥厚した移行層は時日の経過と共に消失するので、球状層はそのまま萎縮した束状層と接することを観察し、斯の如く球状層が代償的に活発となり、恐らく多量の cortisol 分泌を営むと考えられる像を呈することから、球状層の自律性を指摘した。最近副腎皮質機能局在論 (Greep Deane 1949, Yoffey と Baxter 1949)に反対する意見が多数現われる様になった。ACTH が糖質コルチコイドばかりでなく aldosterone 分泌をも調節していることが、機能の面ばかりでなく形態学的にも球状層の変化として証明されている (Waxler と Rinfret 1955, Lever 1956, Giroud et al 1959, Rosnagle と Farrell 1959, Sakatskaya 1959, Venning et al 1956, Muller et al 1956, Schaberg 1957, Kovács et al 1957, Mackean et al 1957, Nagy et al 1957)。

この研究は下垂体摘出ラットの副腎皮質が ACTH 投与によつて如何に回復するかを検討するために行われたが特に束状層細胞の萎縮性変化の回復過程は如何にして行われるか、又移行層や球状層の肥大が如何に修復されるかに大きな注意を向けた。その結果 ACTH の副腎皮質細胞に対する作用方式の一面を推察できたので報告する。

材 料 と 方 法

教室で飼育繁殖せしめた Wistar 系雄ラット (体重85~170g) を用い、これを表1の示す如く下垂体摘出群、下垂体摘出及び ACTH 投与の2群に分つた。下垂体摘出群は対照群であり術後5, 7, 10, 14, 30日を経過せるもので成功例2~6づつである。摘出手術後の飼育には特に注意し、0.1%の食塩水を自由に与え、25°Cの保温室に保つた。食飼は教室で常用している餌料 (ふすま6, こめか2, 細麦2, 魚粉1) によつた。次に ACTH 投与群であるが、下垂体摘出ラットは途中で死亡せるものが数例あつたが、成功例は各日数経過群とも2~3例以上を確保した。ACTH は Armour の Acthar (Lot R68350, P46203) を用い、0.8%NaCl 水溶液に溶かして使用した。術後24時間後に2.5mg/rat 1日を皮下注射し、5, 7, 10, 14, 30日間毎日1回づつ注射を続け最後の注射より12時間後に動物を断頭致死せしめた。注射途中に死亡したものが全部で2例あつたが、之は補充して実験を繰返した。摘出した副腎は torsion balance で測量の後、Levi 氏液で固定し、Paraffin 包埋を経て、3~4 μ 部分的連続切片とした。染色は専ら Rabachkin 前処置の後 Heidenhain 氏鉄ヘマトキシリン染色を施した。

実 験 結 果

1) 副腎重量の変化

表1に示すごとく下垂体摘出(I群)によつて体重は減少する傾向がある。又副腎重量(絶対重量及び比体重)は10日迄は対照の約1/2~2/3でありそれ以上の経過日数では更に萎縮した。30日後では約1/3である。一方 ACTH 投与(II群)によつて摘出による副腎重量の減少を殆ど回復させない。殆ど下垂体摘出群(I群)と同じレベルである。

Table 1. Changes in Organ Body Weight Ratio of Adrenal Glands

Groups	No. of Rat	Days after hypophysectomy	Administration	Daily dose (mg)	Injection periods (days)	Body weight (gm)	Adrenal weight (mg)	Organ B. W. ratio	Average
Normal control	5		none			a .170	28	0.016	0.0174
						b .125	25	0.020	
						c .120	22	0.018	
						d .120	21	0.017	
						e .115	19	0.016	
Exp. I	2	2	none			a .130	28	0.021	0.0180
						b .170	26	0.015	
	4	7	none			a .127	24	0.018	0.0145
						b .108	17	0.015	
						c .127	17	0.013	
						d .120	15	0.012	
	3	10	none			a .120	17	0.014	0.0143
						b .123	18	0.014	
						c .118	18	0.015	
	3	14	none			a .110	18	0.016	0.0126
						b .103	11	0.010	
						c .120	15	0.012	
Exp. II	2	30	none			a .120	8	0.006	0.0065
						b .127	10	0.007	
	2	5	ACTH	2.5	5	a .105	23	0.021	0.0205
						b .120	25	0.020	
	2	7	ACTH	2.5	7	a .140	24	0.017	0.0165
						b .85	14	0.016	
	2	10	ACTH	2.5	10	a .110	19	0.017	0.0175
						b .118	22	0.018	
	2	14	ACTH	2.5	14	a .110	12	0.011	0.0120
						b .105	14	0.013	
	2	30	ACTH	2.5	30	a .120	8	0.006	0.0075
						b .110	10	0.009	

2) 組織学的所見

1. 下垂体摘出5日間 ACTH 投与群:

下垂体摘出5日後の所見は ACTH 投与群の対照となるべきものである。術後5日, 7日, 10日を経過した摘出所見は大たいにおいて似ているが, 反応の強弱には動物の個体差がかなりある。7日後の所見に就いては私は前報告でくわしく述べたので参照されんことを望む。しかしここで順序として一応述べておく。図1, 3, 5は術後5, 7, 10日をそれぞれ経過したラットの副腎皮質を示すのであるが, それで理解される様に, 球状層は幅が広く, それを構成する個々の細胞は肥大し, 多数の脂肪顆粒を含んでいる。被膜下に小さい糸球が正常無処置ラット副腎にはしばしば見られたのであるが, 下垂体摘出によつて之等の幼若な糸球はなくなり, 大きな糸球ばかりになっている。10日頃より球状層は束状配列を示す傾向が少し出てくる。胞体内では可溶性顆粒や mitochondria(mt)はほんの少数しか脂肪顆粒の間に介在して出現するに過ぎない。次に移行層は幅を増し, そこでは脂肪顆粒が乏しく, 弱染色性顆粒成分にとむ。境界のあまりはつきりしない細胞が縦に列をなして並び細胞索を形成するのが見られる(図5)。束状層は短くなり細胞索の配列は不規則に乱れ, 又細くなっている。個々の細胞が明かに萎縮したため, 類洞腔の周囲には結合組織が増す。個々の細胞は術後5, 7日では, 割合不正形の脂肪顆粒を充滿させているが, 10日では可溶性顆粒が増してくる。術後明かに暗調細胞も増加し, 巨大な不正形の脂肪滴を封入したまま萎縮に陥つた細胞となつている。網状層は, とくに束状層の深層とは区別されないが, 細胞の退縮が目立ち, 崩壊, 濃縮に陥つた細胞の近くでは結合組織が増生し, 髓質の近くに於ける密生した結合組織の集団が目立っている。以上が下垂体摘出後5, 7, 10日の共通した所見である。

さて, 下垂体摘出によつて生じた副腎重量の減少は先に述べた如く ACTH 投与で回復はしないけれども, 組織学的には ACTH の効果は大いに現われている。尤も皮質全層の厚さが特に増大し回復したわけではな

Fig. 11. Hypophysectomized, ACTH(2.5mg/day, for 5 days) administered rat(maintenance test). The glomerulosa consists of the cell-strands which extend themselves to the capsule, beneath which the cells contain numerous stainable granules, whereas at the profound area the cells are pack with the fat granules. C. capsule ; Er, erythrocyte ; Si, sinusoid. Levi, ironhemat.

Fig. 12. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day, for 5 days) administered rat(maintenance test). The superficial area of zona fasciculata. The fascicules are somewhat irregular, whose cells are, however, laden with a lot of fat granules of uniform size. Si, sinusoid ; En, endothelial cells ; Er, erythrocyte Levi, ironhemat.

い。先ず球状層であるが、図2にみられる如く、糸球の形成は失われ、細胞索を形成する傾向が強くなっていく。強拡大でよくみると、下垂体摘出群では粗大な脂肪顆粒ばかりであつたものが、こんどは蛋白性可染顆粒が著しく増加している(図11)。とくに被膜近くの細胞は可染顆粒が充満し、脂肪顆粒の形成が全く停止している。個々の細胞の境界も或る程度わかり得るが、それをみると細胞が小型であり、幼若型である。即ち増殖面でも或る程度影響を受けていることが察せられる。しかし ACTH 投与によつて球状層細胞が活発に被膜より新生されることを確実に証明は出来なかつたが、その可能性を示すが如き幼若細胞の附加的生成がみられたのである。球状層の深層では脂肪顆粒が豊富にみられるが、その形は小さく、又その間に可染顆粒と mt とがかなり見られた。

次に移行層は下垂体摘出群ではあれ程厚く明瞭であつたものが ACTH 投与によつて完全に消失し(図2)、球状層は直接束状層に続いている。束状層は一般に暗調であり、摘出群でみられた如き脂肪顆粒の充満している像はなく、類洞腔は拡張し、血球が一ぱいつまつており、充血像を示している。強拡大で束状層細胞をみると、細胞の萎縮像及び配列の乱れはそれ程回復していないことがわかる(図12)。個々の細胞には勿論一定の大きさを保つた球状の脂肪顆粒が豊富にみられるが、不定形の癒合した脂肪滴はみとめられない。弱染色性顆粒は一般に増加し、或る細胞では脂肪顆粒の代りに細胞を充していることが多い。吉村(1954)の見解では皮質細胞内で mt の参与によつて蛋白性可染顆粒が生成されるのであり、更にこのものがその化学的組成を変え、やがて脂肪粒子が沈着し、その量が増すと osmium を還元する性質を備えた脂肪顆粒が形成される。一般に脂肪顆粒は勿論 corticoid を含むホルモンの担体であると考えられているけれども、蛋白性顆粒も、いわゆる lipoprotein の型で脂肪成分を多少含んでおり、これも又ホルモンの担体である可能性がある。

Fig. 13. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day, for 5 days) administered rat (maintenance test). At the vicinity of medulla the reticularis cells are atrophic and the proliferation of connective tissue is shown. Bd, connective tissue; RC, reticularis cell. Levi, ironhemat.

Fig. 15. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day, for 7 days) administered rat (maintenance test). In the fasciculata cells, the stainable granules appear numerous, instead of the reduction in number of fused fat granules. Levi, ironhemat.

Fig. 14. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day, for 7 days) administered rat (maintenance test). By the hormone therapy, the hypertrophied glomerulosa diminishes in size and simultaneously the transitional zone which had been broadened by the hypophysectomy has been apparently atrophic. C, capsule; T, transitional zone. Levi, ironhemat.

Fig. 16. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day for 7 days) administered rat (maintenance test). The reticularis cell becomes to be atrophic, where the connective tissue grows progressively. Si, sinusoid; Bd, connective tissue; M, medulla. Levi, ironhemat.

正常ラットの一侧の副腎をとつたり、ACTH を投与すると、脂肪顆粒が形成されないで、蛋白性可染顆粒が増加して胞体を満すことも吉村(1954)によつて指摘された。この研究でも下垂体摘出後 ACTH を投与するとやはり脂肪顆粒が減少し可染顆粒が増加することが見出されたので、ACTH の作用は形態学的には蛋白性顆粒の新生促進であると云えよう。次に網状層は、下垂体摘出群では結合組織の増生を伴う細胞の崩壊がみられたが、ACTH 投与によつて結合組織の増生は確かによく阻止されている。しかし細胞の退化現象は依然として残り、暗調になった原形質を有する濃縮性細胞が脂肪滴を含有したまま退化している(図13)。ここでも充血像を示すことは ACTH 投与群の特徴である。

2. 下垂体摘出、ACTH 7日間注射群：

7日間の投与によつて生ずる変化は5日群と大同小異である。しかし ACTH がそれだけ多量に注射されたのであるから、ACTH の作用が前よりも一そう顕著に現われてくる。例えば球状層における脂肪顆粒は殆どなくなり、可染顆粒ばかりになっている(図4と図14)。又束状層の細胞索配列の乱れ、細胞の縮小等は回復していないにも拘らず、脂肪顆粒は著しく減少し、強染性顆粒が豊富に現われている(図15)。従つてこの層は全体的に大そう暗調にみえる(図4)。網状層に於ける結合組織の増生は下垂体摘出7日でははげしいが、こんどは殆どなくなつていのは印象的である(図3と4とを比較せよ)。この程度の ACTH 投与によつては網状層の退化を阻止できなく、やはり正常ラットよりもひどい崩壊現象がおきているが、それでも、可染顆粒が相当にみとめられる点は5日投与群とは異なる所である(図16)。

3. 下垂体摘出、ACTH 10日間投与群：

前に述べた如く、下垂体摘出10日群の球状層は5～7日群とくらべて徐々に束状配列を示す様になる。ACTH 投与によつて球状層はやはり束状配列を示すが、その厚さは反つて短縮している(図6)。

7日群と同様可染顆粒が極めて豊富であるがその多寡にはかなり動物差がある。球状層は束状層と一続きであり、束状層がそのまま上方に伸びている感を与える。即ちストレス曝露時の所見と似ている。束状層、球状層の細胞には脂肪顆粒が少く、弱染性及び強染性可染顆粒が増加しているのは前と同様であり、又束状層細胞索の配列の乱れ縮小等が未だ回復されないのも前と同様である。網状層の退化も7日群と同様であり、

結合組織の増生はよく阻止されている(図5と6を比較せよ)。

4. 下垂体摘出、ACTH 14日間投与群：

下垂体摘出14日群では球状層は更に長くなり、一方移行層は短くなる傾向がみられる(図7)。

球状層は術後14日には、脂肪顆粒は少くなり、反つて可染顆粒が増加し、束状をなして配列する細胞は暗調を呈している。ところが、ACTH を注射した場合には球状層は短縮する傾向が現われる(図8)。そこには可染顆粒が著しく減少し、わずかに被膜直下に微細な顆粒として存在するに過ぎない。一方粗大な形の一定した脂肪顆粒が充満し、豊富にみとめられるようになる(図17)。斯の如き脂肪顆粒の出現頻度におけるレベルは正常ラットのそれに近い。それのみならず ACTH 投与によつて球状層の束状配列は次第に不明となり糸球の形成さえみられるようになる(図17)。かかる所見は球状

Fig. 17. Hypophysectomized, ACTH(2.5mg/day for 14 days) administered rat(maintenance test). The fascicle-like cell-trands are distinct in the superficial parts of adrenal cortex. Beneath the capsule the cells are immature, containing abundant stainable ; Si, sinusoid, Levi, ironhemat.

Fig. 18. Hypophysectomized, ACTH(2.5mg/day, for 14 days) administered rat (maintenance test). The fascicules in the fasciculata arrange regularly, whose cells are packed with the non-fused fat granules of the uniform size as well as a few stainable granules, representing the comprehensive recovery to the normal pattern. Levi, ironhemat.

Fig. 19. Hypophysectomized, ACTH(2.5mg/day, for 30 days) administered rat (maintenance test) the broader glomerulosa is reduced in size, where the cell-strands compactly arrange. The fat granules decrease in number in cell-bodies. Er, erythrocyte; C, capsule; Ed, endothelial cell; Si, sinusoid, Levi, ironhemat.

Fig. 20. Hypophysectomized, ACTH (2.5mg/day, for 30days) administered rat (maintenance test).

The fasciculata remains to show the irregular arrangement of cell-strands, whose cells are atrophic in some degree, but avoid of huge fat droplets as large as in the 30th day after the hypophysectomy. Er, erythrocyte; Ed, endothelial cell; Levi, ironhemat.

層の正常像への復帰を意味し、誠に興味ある所見と云わねばならない。移行層は下垂体摘出群では次第に消失して行くが、ACTH 投与によつて一たん消失したものを再現させることはできない。束状層の細胞の萎縮は摘出後14日にはかなり高度となるが、ACTH 投与によつてやはり回復しない。しかし内部構造は相当に回復してくる。即ち一定の大きさを持つた規則正しい脂肪顆粒が増加し、胞体を満することが多く、可染顆粒は少い(図18)。この点が5~10日群とは異なる所である。かかる脂肪配列は正常ラットのそれと同じであり、内部構造の点では束状層は明かに回復しているが、過剰の ACTH によつて、ストレスに曝された時と同じような所見を具備することはない。

網状層の結合組織の増生はやはり阻止できた。

5. 下垂体摘出, ACTH 30日間投与群:

下垂体摘出30日群では球状層は皮質全層の1/3~2/3に達し束状層と等しい細胞配列を示している(図9)。前報告で私は代償的に肥大した球状層が積極的な分泌を営んでいるのではないかと述べた。30日間のACTH投与によつて球状層における束状配列が典型的ではなくなり、糸球を形成する様になり、細胞境界が不明である。摘出群では被膜直下に幼若な細胞が出現しており、そこには微細顆粒が多数現われ、それより下方は脂肪顆粒が豊富につまっているが(前報告の図7参照)、こんどは細胞の新生像が殆んどなく、可染顆粒を多数含む細胞もあるにはあるが、一般に脂肪顆粒を満す細胞が絶対多数を占めている。この球状層の所見は正常ラットのそれに近く回復しているとみるべきである(図19)。

束状層の細胞配列の乱れ及び萎縮性変化は30日に亘る長期投与によつても回復しない。しかし個々の細胞の内部構造は14日間投与群と同様よく回復している。即ち粗大な規則正しい脂肪顆粒が豊富に出現しており(図20)、巨大な癒合した脂肪滴は存在しない。又5, 7, 10日間の注射によつて生じたストレス曝露時類似の所見、即ち可染顆粒の豊富な出現はもはやみられない。大体において正常ラットの束状層細胞のレベルまで達している。網状層は下垂体摘出群よりも退化崩壊像が軽く、結合組織の増生も微弱である。しかしそれでもかなりの退化現象があり、本層は正常レベルまでに回復しない。

考 察

ACTH は名前の示す如く副腎皮質における corticoid の分泌を支配している前葉の trophic hormone に相異ないが、その調節機構の全貌は未だわかつていない。ACTH の bioassay は最近副腎 ascorbin 酸減少を基準として定量することが Sayers, Sayers と Woodburg (1948) によつて実施され、一般に採用されるようになった。下垂体摘出後22~27時間内のラットを用いた場合、比較的安定した数値が得られるので、現在では専らこの方法を用いて0.2 γ 程度の微量なる ACTH を敏感に反応せしめ bioassay することが出来る。この様に ascorbin 酸減少度を指標として副腎皮質 corticoid の分泌を判定すると、たしかに ACTH は下垂体摘出ラットの副腎皮質機能の低下を防止出来る力があると云われている。一方 ascorbin 酸法が一般に採用される以前は、専ら副腎重量や組織学的所見に頼つた検定が行われていた。Moon (1937) は正常生後21日の雄ラットを用い、3日間注射して副腎重量を対照の50%増加させる量を1単位としていた程である。下垂体摘出技術が確立されて以来、自己の ACTH や他の trophic hormone の分泌を持たざるラットで ACTH の反応態度をしらべる方がより正確であることが知られるようになり、Collip 等(1933) は術後8~23日後の様々のラットを用い、検体を1日2回1週間腹腔内に注射し、注射前後の副腎の重量と組織学的所見を比較して正常レベルに戻る最小有効量を1単位とした。之を repair test と呼ぶ。Simpson, Evans と Li (1903), Sayers, White と Long (1943) は生後26~28日の雌ラットを用い、下垂体摘出後14日たつてから検体を4日間腹腔内に注射し、その後組織検鏡した。下垂体重量は術前18mgであつたものが術後9mgに減じ、組織学的にはリポイドの分布に著しい変化がおこつた。ACTH 投与によつて先ずリポイドの分布が回復し次いで重量が回復する。純 ACTH の最小有効量は10~25 γ であると述べた。

次に下垂体摘出後直ちに検体を与えて副腎を正常状態に維持させる力をみる方法はいわゆる maintenance test である。Simpson 等(1943)がはじめて実用に供した。下垂体が摘出されている生後40日のラットでは副腎重量の正常値28mgが12mgに減少した。それが注射によつて正常レベルに維持できる量を測定したところ、1日0.2mg、13日間、即ち全量2.6mgを要し、この一日量0.2mgを1単位とした。

以上の repair test 及び maintenance test は検定に長期間を要し、短期間に決定できる ascorbin 酸法との間にその測定値に大きな距りがあり、必ずしも検定値は一致しない。私の今回行つた方法は maintenance test に属すべきものである。

これらの報告から明らかなる如く、ACTHは下垂体摘出ラットの副腎重量及びリポイドの分布上の変化を回復すると信じられているが、早川等(1956)は下垂体摘出14日後の雌ラットを用い、0.5mg/100gr 7日間腹

腔内に注射したところ、副腎重量の回復はみられず依然正常値の1/2であつたと報告した。これは Simpson 等の報告とは一致しない。Waxler と Rinfret (1955)の研究では0.33~0.67 U.S.P/100gを下垂体摘出24時間後の雄ラットに21日間連続皮下注射したところ、球状層に充滿していた脂肪顆粒は完全に放出したが、1.0~3.0 U.S.P. では球状層の顆粒は放出されないが、束状層、網状層では放出されたと述べた。私の行った実験条件は彼等の採用した実験条件とよく類似している。用いた ACTH は一日1回2.5mg per rat で5~30日間の連続注射である。

私の実験結果によれば副腎重量は ACTH 投与によつても正常レベルを維持することは出来なく、やはり下垂体摘出群と同じレベルであつた。これは注射方法に原因があるか(持続的注射法によるか suspension にして作用時間を長からしめる必要がある)、用いた ACTH の純度に関係があるかどうかであろう。又本質的に重量を維持出来ないことが真実であることも否定できない。しかし組織学的並びに細胞学的には ACTH はよい回復力を示した。但し勿論副腎皮質全層の厚さは回復しない。而も下垂体摘出後の日数によつて大いに回復力は異なってくる。それに関しては前葉の trophic hormone の内、ACTH だけが向副腎皮質性の活動力を示すものではないと云う可能性も当然考察さるべきである。さて、ACTH の副腎皮質細胞に対する作用力を細胞学的に分析すると次の様になる。即ち下垂体摘出後初期5~7日に亘る投与では球状層は束状配列を示し、脂肪顆粒の代りに蛋白性可染顆粒が増加して胞体を満す。之れはストレス曝露時の如き機能亢進時に現われる所見であり、蛋白性顆粒は成熟して脂肪顆粒に転化することなく、脂肪粒子を含んでいる lipoprotein の形で可染顆粒の中にホルモン物質が含まれていると云う吉村(1954)の見解を是認できる像であつた。一方対照下垂体摘出10, 14, 30日群の球状層は非常に厚くなり全層の1/2にも達する厚さを獲得し、細胞は束状配列を示し、可染顆粒が増加するのであり、私の前報告によれば球状層は組織学的には自律性をもっており、代償的に肥大して、corticoid 分泌を旺盛に履行している像を示すのであるが、ACTH の同期間の投与により、こんどは逆に短縮して、可染顆粒は少くなり、脂肪顆粒がふえ、のみならず束状配列はなくなり、糸球の形成がみられる様になり、要するに正常ラットの球状層に近くなつた。斯の如き ACTH の矛盾した反応態度は、ACTH が本質的に球状層だけに作用するのではなく、束状層の実態と大いに関係があり、寧ろ統発的現象であることを考えなければならない。

次に移行層であるが、移行層は下垂体摘出後5~10日では広くなるが、後次第に減少して消失する。ACTH 投与による本層への作用力は摘出初期において肥厚したものが完全に消され、球状層の細胞索と束状層とが一続きになる。しかし ACTH は摘出後期において自ら消失しかけた移行層には殆ど作用力をもたない。この事実も ACTH が移行層の消失のみに働くものではないことを意味し、恰もストレス曝露時の反応態度を思わせるものであり、やはり束状層細胞の活動力に対する二次的反影ではないかと推察される。

束状層に対する ACTH の反応態度に関しては細胞の萎縮性変化、細胞索の配列の乱れ等を如何なる場合も回復させることは出来ない。しかしその内部構造は大いに回復させることが出来る。特に摘出後の日数の差異によつて、内部構造への反応は大いに異なる。即ち5~10日は脂肪顆粒が少く、可染顆粒が多くなり、形態的には機能亢進を思わせる像であり、恐らく、corticoid の分泌は下垂体摘出レベルをはるかに上回っているものであろう。同時に球状層も機能亢進像に陥っていると判断されるからには尚更である。然るに14日~30日では束状層細胞には可染顆粒が前ほどではなく、脂肪顆粒が豊富に出現し、正常レベルの内部構造であつた。このことは下垂体摘出後長期に亘る期間中に、副腎皮質細胞が ACTH に対する感受性を低下させたのか、又は ACTH と協調的に作用する他の trophic hormone の消失のために、前程著明に作用しなくなつたこと等が原因として挙げられる。ACTH 投与によつて束状層のみならず網状層の血管は拡張し、充血像を示すことも共通した所見であり、之れ又機能亢進像を物語る1つの所見である。網状層は下垂体摘出によつて高度の退化崩壊に陥り、とくに髄質の近くでは崩壊場所に結合組織の増生がおこるが、ACTH は崩壊を軽減し、結合組織の増生を強力に防止する。このことも ACTH の注目すべき働きの一つである。

抑、ACTH の副腎皮質に対する作用として一般に承認されている所見は次の通りである。それは主として正常ラットに投与した副腎について判断されたのであるが、束状層細胞の肥大、増殖、脂肪顆粒の放出、

塩基好性顆粒の出現等である (Greep と Deane 1949, Selye と Stone 1950). しかし一方球状層に対しても ACTH は機能亢進的に働くことがマウス (Jones 1949) 及びラット (Caster と Stack-Dunn 1953, Waxler et al 1955) において報告されている. かつて Selye (1947) も ACTH による球状層の肥大をみとめていた. 直接間接 ACTH の球状層に対する作用に言及した人は多数にのぼっている (吉村の綜説 1959 参照). Baker (1952) は 3 mg/日の ACTH 投与ラットの副腎皮質を詳しくしらべ, 束状層の肥大, とくにその浅層における脂肪顆粒の微細化, 中層以下の巨大脂肪顆粒の出現, 球状層細胞の mitosis, 及び被膜細胞から皮質細胞への転化 (metamorphosis) の促進等の変化をあげている. 私の場合は下垂体摘出ラットを用いたがとくに mitosis の像は見出し得なかつた. 私の観察によれば被膜細胞の皮質細胞への転化は, 下垂体摘出初期に ACTH を注射すれば行われる可能性は否定できない. 以上の如き考察の結果, 今回の研究では ACTH の凡ての作用機序を解明することは出来なかつたけれども, 今まで気づかれていなかった幾つかの作用点を明かにし得たと思う.

最近 ACTH の皮質細胞に対する作用機序が酵素活性の面から分析される様になつた. 例えば Haynes と Berthet (1957) は ACTH の注射によつて細胞に於ける合成が先行しておこり, その結果つづいて放出に導かれることを推定したが, 彼等によれば ACTH は細胞の phosphorylase 活性を増し, このため glycogen は glucose-1-phosphate にどんどん転化せしめられ, 遂にこのものが glucose-6-phosphate にかわり, 脱水素過程がおこる. この過程では TPN の減少がおこり, このことが corticosteroid 合成を刺激するのである. かかる細胞内 steroid 合成素の化学的反應過程は勿論形態学的にはわからないが, 正常動物では吉村の指摘した如く mitochondria の参与による蛋白性顆粒→脂肪顆粒の転化又は変転が光学顕微鏡を用いた簡便では合成系の形態像として理解され, 而も慢性の ACTH 投与によつて顆粒形成の急転と放出との促進とが招来される様に思う. 代謝面ではたしかに回復するにも拘らず, 増殖面では回復しない. Young (1951) は副腎重量での定量と ascorbin 酸での定量値とが平行しないことから adrenal weight factor (AWF) と adrenal ascorbic acid factor (AAF) とを区別しているが, 私の所見からは ACTH は細胞の絶対数を回復させないにも拘らず, 個々の細胞の内部構造より判断して機能面では大いに改善されていることを知つた. 尚球状層の自律性はこの研究でも否定することは出来なく, やはり支持する立場に立つているが, それは ACTH の調節を全く受けないと云うわけではなく, 下垂体を摘出されたと云う異常環境の場合でも, 独立性をもつて, 束状層のホルモン合成の減退を代償すると云うのが恐らく真実であり, 而も束状層の態度によつて球状層の反応状態が副次的に異なつてくるものと理解せられる. 機能局在論に関してはこの研究では云々する根拠は充分ではない. 最後にこの研究における不備は恐らく投与方法にあることを自ら認め, この点もう一度実験をやり直したいと考えている.

総 括

成熟雄ラットを用い, 下垂体摘出 5, 7, 10, 14, 30 日をそれぞれ経過した副腎皮質を対照として, ACTH 2.5mg/rat 1 日, 摘出手術 24 時後より同じく, 5, 7, 10, 14, 30 日間連続皮下注射し, ラットの副腎皮質における組織学的変化を追及して ACTH のいわゆる maintenance test を企てた結果を得た.

1) ACTH 投与によつて如何なる場合も副腎重量は回復しない. 又副腎皮質全層の厚さも摘出群と全く異ならない. しかし組織学的には顕著な回復像が窺える.

2) 下垂体摘出 5~7 日には球状層は厚くなり, 大きな糸球には豊富な脂肪顆粒が現われるが, ACTH 投与によつて束状配列を示すようになり, 蛋白性可染顆粒が脂肪顆粒にとつてかわる. 術後 10, 14, 30 日には球状層は自ら束状配列を示し, 皮質全層の 1/2~2/3 にも達し, 積極的な分泌活動を示す像を示すが, ACTH の同じ期間の投与によつて短縮し, 多かつた可染顆粒は少くなり, 又糸球の配列も再現する様になり正常ラットのレベルに戻る. ACTH 投与によつて球状層に mitosis が多数みられることはない.

3) 移行層は術後 5~10 日までは肥大するが, その後次第に消失する. ACTH 投与によつて 10 日までは肥大した移行層を消失させることが出来るが, 10 日以後には殆ど作用力をもたない.

4) 束状層は下垂体摘出群では凡て短縮し、細胞は萎縮し、配列は乱れ、胞体内には巨大な脂肪滴を封入する細胞が多いが、ACTH 投与によつて根本的に萎縮と配列の乱れを防止することはできない。しかし内部構造の上では大いに回復する。5~10間の投与によつて反つて可染顆粒が増加し、正常レベルを上回る活動力が察せられるが、14日間以上の投与では大体正常レベルに回復するに止まる。ACTH 投与によつて類洞腔は拡張し充血像を呈す。

5) 下垂体摘出によつて網状層細胞の退化崩壊過程は進行し、経過日数の増加と共に結合組織が特に髄質の近くに於て増生するが、ACTH 投与によつて退化は正常レベルに維持せられ、結合組織の増生は殆ど消失する。

6) ACTH の副腎皮質細胞に対する作用機転を論じ、とくに増殖面と機能面における反応態度の差異に注目した。

文 献

- 1) Baker B. L. : Recent Progr. Hormone Research 7, 1952.
- 2) Carer D. B. and M. P. Stack-Dunn : J. Path. Bact. 66 ; 119, 1953.
- 3) Collip J. B., E.M. Anderson and D.L. Thomson : Lancet 2 ; 347, 1933 a.
- 4) Collip J.B., H. Selye and D.L. Thomson : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 30 ; 544, 1933b.
- 5) Giroud C.J.P., J. Stachenko and E.H. Venning : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 92 ; 154, 1956.
- 6) Greep R.O. and H.W. Deane : Ann. N.Y. Acad. Sci. 50 ; 596, 1949.
- 7) 早川和夫, 田所作太郎, 斉藤引一, 花岡功 : 北関東医学. 6 : 274, 1956.
- 8) Haynes Jr. R. C. and L. Berthet : J. Biol. Chem. 225 ; 115, 1957.
- 9) Jones I. C. : Endocrinology 45 ; 514, 1949.
- 10) Kovács K., B. M. Kovács, C. G. Kovács and G. Petri : Naturwissenschaften 44 ; 241, 1957.
- 11) Lever J. D. : Endocrinology 58 ; 163, 1956.
- 12) Moon H. D. : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 35 ; 649, 1937.
- 13) Muller A. F., A.M. Riondel and E. L. Manning : Lancet 271 ; 6951, 1021, 1956.
- 14) Nagy, A., A. Olah and S. Karady : Nature 180 ; 1481, 1957.
- 15) Rosnagle R. S. and Farrell G. L. Amer. J. Physiol. 187 ; 7, 1956.
- 16) Sakkatskaya T. S. : Profl. Endokr. 2 ; 51, 1956.
- 17) Sayers M. A., G. Sayers and L. A. Woodburg : Endocrinology 42 ; 279, 1948.
- 18) Sayers M. A., W. F. White and C. N. H. Long : J. Biol. Chem. 149 ; 425, 1943.
- 19) Schaberg A. : Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. 60 ; 464, 1957.
- 20) Selye H. : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 76 ; 510, 1950.
- 21) Selye H. and H. Stone : On the exper. morphology of the adrenal cortex. 1952.
- 22) Simpson M. E., H.M. Evans and C. H. Li : Endocrinology 33 ; 261, 1943.
- 23) Venning E. H., I. Dyrenfurth and J. C. Beck : J. Clin. Endocrinol. 16 ; 1541, 1956.
- 24) Waxler B. C. and A. P. Rinfret : Endocrinology 57 ; 608, 1955.
- 25) Waxler B. C., A. P. Rinfret, A. C. Griffin and H. L. Richardson : Endocrinology 56 ; 120, 1955.
- 26) Yoffey J. M. and J. S. Baxter : J. Anat. 83 ; 89, 1949.
- 27) 横須賀篤 : ホルモンと臨床, 6 : 251, 1958.
- 28) 吉村不二夫 : 内分泌, 2 : 191, 1955.
- 29) 吉村不二夫 : ホルモンと臨床, 7 : 95, 1959.
- 30) Yoshimura, F. : Endocrinol. Jap. 1 ; 147, 1954.
- 31) Young F. G. : J. Clin. Endocrinol. 11 ; 531, 1951.

Explanation of the plate

Fig. 1. The 5th day after the hypophysectomy. The glomerulosa becomes broader and the transitional zone containing a small amount of fat granules is also elongated in width. The cell-strands of the fasciculata arrange irregularly and the proliferation of the connective tissue occurs at the vicinity of medulla.

Fig. 2. Maintenance test of ACTH, a hypophysectomized rat. The transitional zone almost disappears, and consequently the fascicles of the fasciculata extend themselves to the capsule. The

fasciculata cells include a lot of stainable granules instead of fat droplets (compare with Fig. 1.). The connective tissue is no longer prosperous near the medulla.

- Fig. 3. The 7th day after the hypophysectomy. The size of the adrenal cortex is remarkably reduced. The hypertrophy of the glomerulosa and transitional zone is extensive (compare with Fig. 1.) The evidences are present that the shrinkage or degeneration of the cortical cells is progressive.
- Fig. 4. Maintenance test of ACTH for 7 days, a hypophysectomized rat. The fascicules elongate directly up to the capsule, because of the complete deprivation of transitional zone, whose cells contain the abundant stainable granules. This figure is able to illustrate not only the recovery from the symptoms of the ablation, but also the augmentation in the function of adrenal cortex, resembling the pattern under the stressful stimuli.
- Fig. 5. The 10th day after the hypophysectomy. The degenerative sign of the cortex is same with Fig. 3. Also the connective tissue is pronouncedly proliferated.
- Fig. 6. Maintenance test of ACTH, for 10 days, a hypophysectomized rat. The restitution of the adrenal cortex is advanced (see Fig. 4). The superficial area of the cortex is dark-shadowy on account of the package of stainable granules.
- Fig. 7. The 14th after the hypophysectomy. The reduction in size of the cortex is more progressive, in spite of the broader thickness of the glomerulosa which is full of the stainable granules. The transitional zone is not so much thick as in the 5th or 7th day. The proliferation of the connective tissue is exaggerated near the medulla.
- Fig. 8. Maintenance test of ACTH for 14 days, a hypophysectomized rat. The atrophic cortex is not wholly recovered to the normal size, nevertheless the connective tissue disappears.
- Fig. 9. The 30th day after the hypophysectomy. The glomerulosa occupies the larger part of the cortex, and the proliferation of the connective tissue is the most prominent.
- Fig. 10. Maintenance test of ACTH for 30 days, a hypophysectomized rat. The severe atrophic pattern of the cortex is precisely recovered; the shrinkage of the fasciculata cell is no longer seen, containing the abundant fat granules of the uniform size as well as the stainable granules. The fascicules are ranging from the medulla to the capsule.

横須賀論文附图