The results were summarized as followings.

- (1) In the experimental hyperthyroidism by the thyradin injection, QO_2 of erythrocyte is remarkably enhanced, but QCO_2 does not show any variation.
- (2) On the other hand, in the experimental hypothyroidism by bilateral thyroidectomy, the erythrocyte respiration decreases after long times. (about thirty days).
- (3) By the injection of cortisone acetate, QO_2 does not show any variation distinctly, but QCO_2 and RQ are suppressed.
- (4) By the injection of desoxycorticosterone acetate, the erythrocyte respiration is remarkably suppressed.
- (5) By the bilateral adrenalectomy, the erythrocyte respiration decreases remarkably.
- (6) When a small quantity of testosterone propionate was injected on the male rabbits, the erythrocyte respiration is enhanced, but on the female this tendency is not distinct.
- (7) By the extirpation of the testicles, the erythrocyte respiration decreases after long time. (about fifty days).
- (8) When a small quantity of estradiol benzoate was injected, the erythrocyte respiration is suppressed. Especially, this tendency is remarkable on the males.
- (9) By the extirpation of the ovaries, the erythrocyte respiration was not influenced after long time. (about fifty days).
- (10) From the overmentioned results, I can presume that the erythrocyte respiration was influenced by endocrine functions excepting the effects of the blood regeneration showed by the variations of reticuloocyte count.

Measurement of Serum Insulin Activity and the Investigation about the Nature of Diabetes Mellitus

By

Kentaro OKUMURA

1st Department of Medicine, Kyoto Pref. Univ. of Med. (Director: Associate Prof. H. Yoshida, M.D.)

- 1) The author investigated about the measurement of serum insulin activity, on the basis of Gemmill's observation, that the isolated rat diaphragm uptakes glucose in the glucose containing solution and the glucose uptake is increased by the addition of insulin to the solution.
- 2) Wistar strain rats were bred about for 7 days with solid food (Oriental Co. made) under the condition of temperature $22 \pm 5^\circ C$, and were abstained from the food for 15 hours before experiment.
- 3) These rats were sacrificed by decapitation, and the diaphragms were immediately removed, each of them were dissected in 4 pieces. So-called "quartardiaphragm technique of pooled method" was used for this investigation.
- 4) Phosphate buffer solution containing 200mg/dl. sugar was used for medium. For the incubator, the author used the manometer flask of Warburg's apparatus. The flask contains one-fourth of diaphragm, medium and 95~100% O_2 , incubated for 75 minutes at $38^\circ C$, 90 rounds shaking per minute.

5) Glucose uptake of diaphragm per 1 gram (dry weight) in the medium before and after incubation, the mean values of four quartardiaphragms from four rats were used. This value means basal uptake.

The difference between glucose uptake in the medium containing test solution and basal uptake means extraglucose uptake. When used insulin solution of known concentration to medium, this difference called as "insulin effect".

6) It became clear from the experiment, that the relation between insulin effect (Y) and insulin concentration (X) could be expressed by means of next equation.

$$\log Y = 3/10 \log X + \log 40$$

7) Insulin value (insulin activity in sera) in normal subjects and diabetic patients, resulted as follows.

normal subjects	0.339 ± 0.08 mu/ml.
diabetic patients	0.125 ± 0.115 mu/ml.
normal rabbits	0.355 ± 0.125 mu/ml.
alloxan diabetic rabbits	$0.00 \sim 0.082$ mu/ml.
normal dogs	0.158 ± 0.082 mu/ml.
pancreatectomized dogs	$0.00 \sim < 0.01$ mu/ml.

these values were the averages of 5~10 cases.

8) The remainings of injected insulin in blood of diabetic patients retarded than those by normal bodies, and moreover, these insulin in blood still retained its activity. Same results were obtained from the experimental diabetic animals.

9) Glucose uptake and insulin effect of the diaphragm from alloxanized rat decreased than those of controls.

10) From the result described in 7), 8), and 9) the author proved that insulin in blood decreased on diabetic patients, and diabetes mellitus is not caused by decreasing of activated insulin, but rather by decreasing of insulin utilizing ability.

11) Glucagon decreases glucose uptake and insulin activity in peripheral tissues, and so it acts as insulin inhibitor.

横隔膜法に依る血中 Insulin 測定と糖尿病の本態に関する検討

京都府立医科大学第一内科教室 (指導 吉田秀雄助教授)

奥村 賢太郎

(本論文の要旨は昭和34年4月第32回日本内分泌学会に於て発表した。亦昭和34年6月第2回日本糖尿病学会に於ける、吉田助教授の宿題シンポジウム「インシュリンの測定法と代謝」の一部をなすものである)

目次

緒言

第1章 Insulin 測定法

第1節 実験方法

- 1) 使用動物及び飼育条件
- 2) 実験手技
- 3) 計算法
- 4) Insulin 効果測定
- 5) 血漿 Insulin 量の測定
- 6) 酸素消費量測定

第2節 実験成績

- 1) Insulin 作用濃度曲線
- 2) 血漿中の Insulin 量

第3節 小括及び考按

第2章 血中 Insulin 量測定値

第1節 実験方法及び実験対照

第2節 測定成績

- 1) 正常人及び糖尿病患者
- 2) 正常家兎及び Alloxan 家兎
- 3) 正常犬及び除腺犬

第3節 小括及び考按

第3章 Insulin 負荷時に於ける血中 Insulin 量の変動

第1節 実験方法及び実験対照

第2節 実験成績

- 1) 正常人と糖尿病患者
- 2) 正常家兎と Alloxan 家兎
- 3) 正常犬と除腺犬

第3節 小括及び考按

第4章 Insulin 作用機序に対する 2・3 の検討

第1節 Alloxan ラット横隔膜の Insulin effect

第2節 Insulin effect に及ぼす Glucagon の影響

第3節 小括及び考按

結語

参考文献

緒言

Insulin は最近 Sanger¹⁾ に依り、その構造式が決定されたとは云え、未だ之を物理化学的に定量する事は不可能な状態にある。血中の Insulin 量を適確に測定し得るならば、Insulin の分泌、代謝、作用機序を明らかにする事が出来るのみならず、糖尿病の原因探究に、病型分類に、治療に、臨床分野への応用価値は真に大きなものがある。最近10数年の間 Insulin 測定に関する研究が重ねられ、現在血中 Insulin は in vitro と in vivo の2つの方法に依り行われている。Insulin は蛋白ホルモンであるので両方法とも、Insulin の特異作用を利用した生物学的測定法である事は勿論である。

in vitro の方法は剔出せられたラット横隔膜が一定の Medium より葡萄糖を uptake する速度を Insulin が促進する事に着目した方法である。

即ち、Gemmill²⁾³⁾ がラットの剔出横隔膜の葡萄糖摂取能は、Medium 中に Insulin を添加する事に依り促進されると云う事実を発見して以来、この現象を利用して血中 Insulin 量を測定しようとする試は多く

の学者に依つて報告されている。Stadie 及び Zapp⁴⁾, Krahl 及び Park⁵⁾, Permuter⁶⁾等は Medium 中に存在する Insulin 量とラット横隔膜の Glucose uptake 促進効果との間には、一定関係が成立し、Insulin 量を一応検出出来る事を認めたが、血中の Insulin 定量に関しては懐疑的であつた。その後 Groen⁷⁾, Randl⁸⁾, Vallance-Owen¹⁰⁾¹¹⁾, 竹内¹²⁾¹³⁾, 等は夫々種々検討を加え、本現象を利用した血中 Insulin 量の測定に一応成功した。【併し血中 Insulin の定量に成功した諸家の間にも、その最低検出濃度、精密度、測定した血中 Insulin 濃度などに関しては、相当な差違が認められる。この原因は Willebrands et al¹⁴⁾は今日尚不明であるとしているが、竹内¹⁵⁾は測定に必要な基礎条件が充分確立されていないことに最大の原因がある事を指摘し、この方法が厳密に規定された諸条件に従つて行われるならば、在来の諸方法に比較して優るとも劣らない優秀な方法であると云つている。著者は Gemmill⁹⁾⁸⁾, 竹内¹⁶⁾等のラット横隔膜法に準じて血中の Insulin 量を測定する事に成功した。

又糖尿病の核心をなす高血糖惹起原因は、Insulin の相対的欠乏¹⁶⁾に依る代謝調節障碍¹⁷⁾と考えられているが、之は Insulin の分泌が障碍せられるのか、抗 Insulin ホルモンによるのか、或はインシュリナーゼ等に依り Insulin が分解せられる為か等種々論議せられて来た。一方糖尿病患者の中には Insulin の大量投与に対しても、比較的効果の少ない Insulin 耐性を現わす患者が存在する。我々は糖尿病患者の体内に於て Insulin は存在するが、何等かの処理を受けて活動し得なくなつたものか、或は Insulin が本当に少ないのかさえ確実に云い得ない状態にあつた。本研究に於ては、Insulin の測定成功に次いで、この点を究明する為正常体と糖尿病体の血中 Insulin 量を測定比較検討し、更には生体内に投与せられた Insulin 活性の変化を観察し、糖尿病の原因解明に重大なる鍵を握る Insulin の代謝及び作用機序に若干の考察を加えた。

第一章 Insulin 測定法

第1節 実験方法

1) 使用動物及び飼育条件

22±5°Cの温度下に於て Oriental 固型飼料を以て、1週間飼育せる体重 120g 前後の Wister 系の Rat を使用した。動物の発育度に関しては、Willebrands et al¹⁸⁾は幼若白鼠横隔膜が糖利用に最も Sensitivity が良いと云つているので著者も之に準じた。

2) 実験手技

横隔膜使用実験方法は Gemmill⁹⁾⁸⁾の変法に従い個体差を少なくする為、Pooled method の Quartardiaphragm technique を採用した。上記の Rat を15時間絶食後、断頭屠殺し、速かに横隔膜を剔出する。その後直ちに 5°C 以下に冷却せる Phosphate buffer (pH 7.4) に浸す。Phosphate buffer は 0.9% NaCl 80容に 0.1 mol K₂HPO₄ 20容を混合し、HCl を少量加えて pH 7.4 になる様調製したものである。剔出した横隔膜は液中に於て周囲の結合組織をピンセットで取り除いた後、Phosphate buffer で充分湿めらせた濾紙上に伸展し、鋏で手早く濾紙と共に背側の三角部を切除し、又周辺のギザギザになつた部分を滑らかに切り整える。左右前後略々等重量なる様 4 分し、序め 0.2% の葡萄糖を含む Phosphate buffer 2cc を Incubation medium として用意した Flask 内に 1 個ずつ入れるのであるが、その前に別の容器に用意した同液に一応浸し、良く水分を除いてから移し入れる。Rat 4 匹を以て 1 組となし、第 1 図に示す如く 4 分法となし、各 Flask に夫々異つた横隔膜片を入れ、4 個を 1 組として、出来る限り個体差及び部分差を無くする様にした。横隔膜片を移し入れた後、各 Flask を軽く振盪混和して 0.1cc を取り、糖濃度測定に供する。

次い Manometer につなぎ酸素を充填する。以上横隔膜剔出後、Incubation する迄の時間は約 60 分とした。12 個の Flask を Warburg 検圧装置¹⁹⁾に連結し、38°C 毎分 90 回転で 75 分（容器内液が恒温槽と等温になる迄の 15 分と酸素消費測定定の 60 分の和）Incubation した。充填ガスには 95~100% の O₂ を使用した。尚

Fig. 1 Quartardiaphragm technique

副室には10% KOH 0.2cc を入れ、併せて酸素消費量も測定した。Incubation 前後の Medium 中の糖濃度を Hagedorn-Jensen 氏法に依り測定し、Medium 中の横隔膜片は 90°C にて24時間乾燥後重量測定を行った。

3) 計算法

横隔膜の葡萄糖摂取量は Incubation medium 中の糖濃度の減少及び横隔膜の乾燥重量より、次式を以て算出し、各組4個の計算値を平均した値を以てそれとした。

$$\text{Glucose uptake} = \frac{\text{Incubation 前の糖濃度} - \text{Incubation 後の糖濃度 (mg/dl)}}{\text{乾燥重量 (mg)}} \times 20$$

上式は

横隔膜重量を Wmg とすると、

Incubation 前の糖濃度 : a mg/dl

Incubation 後の糖濃度 : b mg/dl

Medium は 2.0cc

$$\frac{a \times 2}{100} \text{ mg} \dots \dots \dots 2\text{cc 中の糖量 (前)}$$

$$\frac{b \times 2}{100} \text{ mg} \dots \dots \dots 2\text{cc 中の糖量 (後)}$$

$$\therefore \left(\frac{2a}{100} - \frac{2b}{100} \right) \text{ mg} \dots \dots \dots \text{Incubation 後に 2 cc 中の減少した糖量}$$

∴ 乾燥重量 1 mg の糖摂取量は

$$\frac{2(a-b)}{100} \div W = \frac{2(a-b)}{100W}$$

$$\therefore 1\text{g では } \frac{2(a-b)}{100W} \times 1000 = \frac{a-b}{W} \times 20$$

Incubation medium に葡萄糖加 Phosphate buffer のみを使用した場合の糖摂取量をその横隔膜の Basal uptake とした。3組の Manometer flask の中第1組には 200 mg/dl Sugar-Phosphate buffer のみ、他には被験液を夫々添加した場合、後者の Glucose uptake より Basal uptake を差引いた値を以て、被験液による Extraglucose (Δuptake) 殊にその被験液に Insulin 溶液を使用した場合には、Insulin effect とした。

4) Insulin 効果測定

前述の3組の Flask に Medium 1.6cc を入れ結晶 Insulin を 0.2%葡萄糖含有の Phosphate buffer にて稀釈し、0.5cc 中に 2000mu. 200mu. 20mu. 2.0mu. 0.2mu. 0.02mu. 含有液を作り、之を加えて 2.1cc

となし、その中 0.1cc は Incubation 前の糖濃度測定に供し、medium 1cc 中に Insulin 含有量が夫々 1000mu. 100mu. 10mu. 1mu. 0.1mu. 0.01mu. となる如くした。夫々の濃度に於ける Glucose uptake より Basal uptake を差引いたものを各濃度に於ける Insulin effect として作用濃度曲線を画いた。尚 Insulin は結晶 Novo Regular Insulin (1mg 23 unit) のみを使用した。

5) 血漿 Insulin 量の測定

採血した静脈血に極く少量の弗化ソーダを加え、遠心血漿を分離し、予めその一部を以て糖濃度を測定しておき、次で Flask 中に 1.6cc の Medium に 0.5cc の血漿を加え、糖濃度が 0.2% になる様 Phosphate buffer に溶解する葡萄糖の量を調節し、かくして得た 0.2% の葡萄糖濃度を有する混合液 4 倍稀釈血漿を Medium として、他の組の Flask に入れて Incubation を行い、第 1 組の Basal uptake を差引いた量を被験稀釈血漿に依る Extraglucose uptake (Δ uptake) とした。

この Δ uptake に匹敵する Insulin 量を Insulin 作用濃度標準直線より求め、4 倍したものを血漿 1cc 中の Insulin 量とした。

6) 酸素消費量測定

横隔膜の QO_2 測定には Warburg 直接法¹⁰⁾ に依り 38°C の恒温槽中にて Incubation を行い、Flask 中の内圧が外気圧と平衡に達した後 (15 分後) 活栓を閉じ、60 分後の横隔膜の消費せる酸素量 (H) を Manometer の分圧差に依り測定し次式より計算した。

$$QO_2 = \frac{H \cdot KO_2}{Wt}$$

H : Manometer の分圧差

KO_2 : 酸素に関する容器恒数

W : 横隔膜の乾燥重量

t : 測定時間 (1 時間)

Table 1 Promotion of Glucose uptake by Insulin

Medium	Flask Number	Number of Quartar-Diaphragm alone	glucose conc. before Incubation (mg/dl)	glucose conc. after Incubation (mg/dl)	glucose uptake (mg/dl)	dry weight of Diaphragm (mg)	QO_2	glucose uptake / 1gr dry weight diaphragm. (mg/dl/gr)
200mg/dl Sugar Buffer Solution without Insulin	1	A ₁	205	190	15	13.25	6.34	22.64
	2	B ₂	205	193	12	12.16	6.21	19.74
	3	C ₃	205	195	10	8.75	6.03	22.86
	4	D ₄	203	192	11	11.03	6.31	19.94
	Average (Basal uptake)						6.22	21.29
200mg/dl Sugar Buffer Solution with Insulin 0.01mu/cc	5	A ₄	210	195	15	12.38	6.41	24.22
	6	B ₁	204	191	13	11.56	7.02	22.49
	7	C ₂	208	192	16	13.01	6.86	24.57
	8	D ₃	209	197	12	11.50	6.84	20.86
	Average						6.78	23.03
200mg/dl Sugar Buffer Solution with Insulin 0.1mu/cc	9	A ₃	206	191	15	11.67	7.01	25.71
	10	B ₄	208	196	12	11.25	6.36	21.32
	11	C ₁	209	196	13	10.37	8.01	25.07
	12	D ₂	205	191	14	11.01	7.01	25.42
	Average						7.097	24.38

第2節 実験成績

1) Insulin 作用濃度曲線

Medium 中の Insulin 濃度を種々変化せしめ、その際の Glucose uptake を第1表の如く現わした。即ち各 Rat 横隔膜の4分片を前述の如く組合せて、個体差、部分差を勘くし、各組4個の平均値を以てその Medium に於ける Glucose uptake とした。第1表より Basal uptake は 21.29mg/dl/g, lcc 中 0.01mu の Insulin を含有せる場合は 23.03mg/dl/g, lcc 中 0.1mu の場合は 24.38mg/dl/g と増大し、0.01mu /cc 濃度に於ける Δ uptake は 1.74mg/dl/g, 0.1mu/cc 濃度に於ける Δ uptake は 3.09mg/dl/g となる。その場合に於ける QO_2 は夫々 6.22, 6.78, 7.097 である。各濃度に於ける Δ uptake は第2表(A)

Fig. 2(A) The effect of increasing concentrations of Insulin upon the glucose utilization of the isolated rat diaphragm expressed as a logdose of Insulin response curve.

Fig. 2(B) Standard regression line

の如くである。各成績の平均値は 0.01mu/cc で 1.37mg/dl/g, 0.1mu/cc で 2.66mg/dl/g, 1.0mu/cc で 4.74mg/dl/g, 10mu/cc で 10.44mg/dl/g, 100mu/cc で 19.66mg /dl/g, 1000mu/cc で 39.91mg/dl/g であり、 QO_2 は Insulin を Medium に加えない場合は第2表Bの如く、6.30 各濃度の Insulin が添加された場合は夫々 6.32, 6.21, 6.39, 6.36, 6.38, 6.39 で有意の差を認めない。夫々の標準偏差は0.53, 0.47, 0.50, 0.39, 0.55, 0.54, 0.60 である。この成績より Insulin effect は Insulin の対数濃度に対して第2図(A)の如く拋物線状となる。従来横隔膜法に於ては Insulin 濃度 0.01mu より 10mu の範囲に於て直線回帰を認め⁷⁾¹⁹⁾²⁰⁾測定しているが、Insulin 濃度の幅を広げた成績から見ると之はあく迄曲線であり、この曲線は両対数にて直線的回帰が成立する。この回帰直線は $\log y = 3/10 \log x + \log 40$ (1.602) にて現わされる。之を以てInsulin作用濃度標準直線とした(第2図B)。尚直線からの隔りに基く標準偏差(S)は 0.7081 である。

2) 血漿中の Insulin 量

此処に於ては血漿中の Insulin 活性(以下之を Insulin 量とする)測定の一実験成績を示した。(第2章以下の実験成績は、第3表の如くして求めた成績のみを挙げた)即ち Basal uptake は 21.82mg/dl/g, 被験血漿加 Medium に於ける Glucose uptake は第1例に於て 24.50mg/dl/g, 第2例に於ては 25.16mg/dl/g となり夫々の Δ uptake は 2.68, 3.34, であり、標準直線より、夫々 0.12, 0.26 を得る。之に稀釈倍数の4を乗じて、血漿 lcc 中の Insulin 量は 0.48mu/cc, 1.04mu/cc を得る。尚血漿を加えた場

Table 2 (A) Δ uptake of rat diaphragm in 200mg/dl sugar-phosphate buffer solution with variety concentration of insulin by quart-diaphragm technique.
(Basal uptake : 20.85mg/dl/gr. dry weight)

conc. of added Insulin u/cc	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^0
Δ uptake	1.45	2.90	5.62	10.84	19.61	41.08
	1.52	3.41	4.68	10.80	18.93	39.86
	0.77	2.46	4.65	9.36	20.38	40.35
	1.32	2.26	5.08	9.60	21.21	38.95
	0.60	2.67	4.82	11.13	19.69	39.27
	1.23	3.47	4.79	10.21	21.13	40.80
	2.09	2.76	3.99	11.36	19.70	40.87
	1.20	2.30	4.50	9.93	21.50	40.76
	1.65	3.05	4.80	9.27	20.15	38.35
	1.97	2.86	4.83	10.16	19.55	38.57
		2.68	4.88	9.13	20.17	41.23
		2.84	5.67	9.58	19.36	40.59
		1.87	5.15	11.16	20.34	39.20
		2.33	5.77			39.89
		2.79				
Average	1.37	2.66	4.74	10.44	19.66	39.91

合の QO_2 は 8.45, 8.41 と増加を見た。之は第 2 章以下の成績には挙げないが血漿を加えた場合の QO_2 は加えない場合の QO_2 に比べて平均 23.78% の増加を見た。

第 3 節 小括及び考按

Insulin の定量にあたっては、厳密に規定された測定条件を忠実に履行せねばならぬ。以下著者が Insulin 量の測定にあたり用いた方法に文献的考察を加味して述べる。

横隔膜法は生物学的作用に依るものであるから、使用ラットの条件に依つても甚だしい差違がある。著者は体重 120g 前後の Wister 系ラットを使用した。文献的には Wistar 系 (Randle)⁸⁾, Hishaw 系 (Stadie et al)⁴⁾, Sprague-Dawley 系 (Hansen et al)²¹⁾, Anheuser-Busch 系 (Krahl et al)²²⁾ 等がある。Krahl and Cori²²⁾ は Anheuser-Busch 系と Sprague-Dawley 系との横隔膜の Insulin effect には殆んど差違はないと云っている。著者は Wister 系以外は使用していないが之で充分と思われる。次に雌雄の別については考慮する事なく使用したが、雌は雄に比して葡萄糖利用能が低い (Deuel and Davis)²³⁾ と云うもの、或は Glucose oxydation の能率から、組織内に摂取された葡萄糖が糖原に合成される場合と Glycolysis を受けて Pyruvate になる経過とを考えると、雌では前者は雄より盛んであり、雄は後者の割合が多い (Kerly and Ottaway)²⁴⁾ と云うもの等があるが、竹内等¹²⁾ は Basal uptake 及び Insulin effect に有意差を認めないと云っている。体重に関しては、Willebrands¹⁴⁾ の幼若白鼠が Sensitivity が良いと云っている事より、標本作製に必要な成長度と考え合わせて 120g 前後とした。尚体重を一定にする事は、横隔膜標本の表面積、厚さ、重量等を、更には Medium 中に於ける代謝表面積或は酸素供給を一定にする為にも当然の事である。

次に使用ラットの飼育条件に依る横隔膜の Insulin effect の中、飼料の影響については云うまでもなく、糖質、脂質、蛋白質の三大栄養素が大きな役割を持ち、それに関しては、Gilmore and Samuels²⁵⁾, Hansen et al²¹⁾, Lundbaeck and Stevesen²⁶⁾, 等の報告があるが、Kerly and Ottaway²⁴⁾ は特にこの三大栄養素の割合を種

Table 2 (B) Influence of the added Insulin upon QO_2 of rat diaphragm
(Medium : 200mg/dl sugar-phosphate buffer solution with variety conc. of insulin)

conc. of added Insulin u/cc	0	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^0
QO_2	6.22	6.78	6.09	5.98	6.75	6.71	6.71
	7.51	7.01	6.03	6.24	5.96	5.73	6.14
	6.10	6.99	6.58	7.10	5.81	5.81	6.68
	6.48	5.76	6.74	7.01	6.26	7.06	6.61
	6.37	6.55	5.76	6.23	5.83	6.92	7.21
	5.89	6.01	6.64	5.98	7.32	6.11	7.01
	5.87	6.21	5.19	6.88	7.21	6.03	6.86
	6.19	5.39	6.22	6.35	5.99	5.36	5.39
	6.60	7.01	6.10	6.81	6.41	5.91	5.96
	5.40	6.21	6.98	6.59	6.86	5.84	7.48
	7.09	5.96	6.50	5.84	7.02	6.36	5.92
	6.76	5.83	6.19	6.36	6.03	7.04	6.31
	6.30	6.06	6.77	6.16	5.84	7.10	6.66
	5.51	6.31	5.86	6.07	6.22	6.84	6.18
	6.21	5.99	5.21		6.23	6.91	5.24
		6.87	7.01		7.03		6.01
		6.40			5.36		
Average	6.30	6.32	6.21	6.39	6.36	6.38	6.39
standard deviation	0.53	0.47	0.50	0.39	0.55	0.54	0.60

々変えた飼料を用い、基礎実験を行つているが、之等の実験成績より云える事は、高糖質食では Basal uptake が高値を示し、高脂肪食、高蛋白食では Basal uptake, Insulin effect 共に変動する事である。この変動については増大或は減少と一定しないが、結論的には著者の如く各栄養素の平衡を保つた Oriental 固型飼料を使用するのが、最も安定した結果を得るのに容易である。高脂肪食、高蛋白食に於て、各研究者の成績が一定していない事は、横隔膜の Glucose uptake に直接影響を及ぼすので無く、横隔膜の筋細胞の代謝全体に影響を与え、その2次的な結果であると思われる。この間の事情は、同時に起る酸素消費量の消長、及 Acetate, Pyruvate を基質として用いた場合の実験成績に徴しても充分うなずける事であり、飼料の組成の影響は、Insulin effect よりもむしろ Basal uptake に及ぶものであると思われる¹⁵⁾。ラット環境飼育温度の条件と飼料組成の問題との組合せについて、同一条件に於て飼育されたラットの横隔膜の Basal uptake と Insulin effect とは一定範囲内で反比例する²⁴⁾。著者も Oriental 固型飼料、自由雑食、環境温度の違い等に於ける場合の Basal uptake 及び Insulin effect の差違について同様の経験を持つている。環境温度については、各一定温度で得られる相関直線は夫々略々平行と見做す事が出来る¹⁵⁾。唯17°C以上の温度の場合とそれ以下の場合とではラットの代謝の様相に全然異つたものが現われると云うので¹⁵⁾、17°C以下にならぬ様 $22 \pm 5^\circ\text{C}$ とした。更にこの環境温度に関連して考えられるのは、一年を通じて温度差の甚だしい冬期と夏期に於て、この Insulin effect は如何なる影響を受けるかの問題であるが、 $22 \pm 5^\circ\text{C}$ の条件下に於て室温に放置出来るのは、著者の研究室では4~6月、9~10月（之も厳密に云えば春秋に於ける生体の代謝状況は異なるが）で11~3月は保温を要すが、人工的には簡単に9月より翌年6月位の間はこの条件下に於て実験

が出来る訳である。馬場等²⁸⁾に依れば糖利用率に対する季節的影響は、夏期の方が冬期より高くなると云っているが、著者は夏期の(6~9月)実験は行っていない。夏期、冬期に於ける利用率の差違は、個体の全代謝或はホルモン調節の終結像を示していると考えられる。Colowick, Cori and Stein²⁹⁾はホルモンが組織の Hexokinase の Activity に直接影響するかも知れない事を指摘し、この Hexokinase は crude pituitary extracts に依つて抑制され、更に副腎皮質抽出物に依つてこの抑制作用は増加されると報告した。又 Park³⁰⁾, Villee and Hastings³¹⁾はラット横隔膜の糖利用は下垂体摘出に依り促進され更に下垂体抽出物注射に依り抑制をみる事を認めたが、更に ACTH 或は成長ホルモンに依り抑制する事も報告されている³²⁾³³⁾。その他各種ホルモンに依り横隔膜の糖代謝に種々影響のある事が実証されているが、要するに夏期冬期の差違にはホルモン調節状態が重大な関連性を持つと考えられ、此の種の実験は比較的短期間に同一条件、同一環境下に実施する事が最良の基本的条件となるであろう。以上使用ラットの種類、成長度、性別、飼育条件について、Kerly and Ottaway³⁴⁾, Stadie and Zapp⁴⁾は使用前の絶食時間についても検討を加えている。この点に関しても、各研究者により成績を異にしているが、初めから持っている糖原量と Insulin effect との関連性に絶食時間が関係する⁴⁾ばかりでなく、食事摂取時に行われたと考えられる横隔膜の体内に於ける Insulinization の程度をも考慮に入れなければならぬと思われるので、この相互に相反する条件のどちらかが表面に現われて来るかに依っているものであらうと考えている。従つて絶食時間について Basal uptake, Insulin effect がどの様な変化が起るにせよ、何等かの影響を受ける事は確かであるから 12~24 時間の絶食時間は厳守されねばならぬ¹⁵⁾。この点からも著者の 15 時間は妥当である。

次に以上の諸問題以上に Glucose uptake, Insulin effect に影響を及ぼす実験手技について若干考察を加える。先ず最初に横隔膜標本の作り方であるが、之に関しては Gemmill et al³⁴⁾ Gey and Gey³⁵⁾, Stadie and Zapp⁴⁾等は Single method を即ち横隔膜を二分し、一つは Incubate 前の、一つは Incubate 後の糖原量を測定し、その前後の差が Insulin 添加により増加する事を利用する方法を採用した。一方 Willebrands et al¹⁸⁾或は Permuter et al⁶⁾は Pooled method を、即ち一つは Insulin を含有しない、一つは Insulin を含有せる Medium 中に Incubate し、その前後の横隔膜が uptake せる Glucose 量を測定し、Insulin を添加せる場合の Glucose uptake が促進せられる事を利用する方法を採用した。両者何れを選択するかについては、①定量指標としてどちらが動揺の少ない測定値が得られるか。② Insulin は組織内へ葡萄糖を摂取せしめるのか、或は摂取せる葡萄糖を組織内に於て糖原に合成する機転を促進させるのか、即ち Insulin の本質的な作用は何処にあるか等の問題が起つて来る¹⁵⁾。

①に関しては、動物の個体差を少くする事及び糖原定量法の信頼度と葡萄糖定量法の信頼度などより pooled method が良い。②に関しては、Villee and Hastings³¹⁾, Villee et al³⁶⁾等の Insulin の作用は組織の糖摂取の速度を増加させるものであると言う事よりも Pooled method を可とする。勿論筋糖利用能と糖原合成は或程度平衡するものであり、Walaas and Walaas³⁷⁾は Basal uptake の約 75% の糖原合成量を認め、Insulin を添加した時には、Insulin effect に略々匹敵する Extraglycogen Synthesis を証明している。従つて糖原合成量を定量指標とする事も本質的には否定出来ない。又 Pooled method には Hemidiaphragm 法と Quartardiaphragm 法がある⁷⁾。この両者の可否を論ずるに当つては、先ず同一の横隔膜でも部分差のある事に注目しなくてはならない³⁸⁾。著者は腹部側と背側部に於て、更には左右の比較に於ても多少の差違のある事を見出し、又 4 分法が 2 分法に比べて能率の高い為あえて 4 分法を採用したが、4 分法で得られる Insulin effect は 2 分法に比べて絶対値が低い場合もある³⁹⁾ので実際には何れでも良いと思われる。次い Incubation でに移る訳であるが、この時の条件で問題になるのは、Medium の種類或はその pH、糖濃度、更には Incubation time、使用ガス等が主なものである。従来 Medium として使用されているのは、Phosphate buffer と Bicarbonate buffer である。何れを取るかについては、従来採用されているのを見るに、両者の何れかを使用しているが、文献的にも半々位で、この条件により特に著明な差違は無い様である。之はむしろ pH に重大な意味を持つと思われる。著者は pH 7.4 としたが、之は体液の pH と略々同様にすべき事からも妥当であらう。Stadie and Zapp⁴⁾は pH 6.3~7.4 の範囲内では、横隔膜

の糖原合成能及び Insulin 促進能に変化が見られなかつたとしている。一方竹内¹⁵⁾は Stadie と同じ Phosphate buffer にて pH を酸性にすると Basal uptake に殆んど変化が見られないのに反し, Insulin effect は次第に減少して行く傾向を示し, 殊に pH 7.0 以下に於ては相当著しい抑制を見, pH がアルカリ側に傾く時は Glucose uptake に大きな変化は見られないと云っている。辻もこの点に関し, initial pH 7.45 を中心に酸性側及びアルカリ性側の Medium は何れも Incubation 後には pH 7.45 に近づき, pH 7.45 附近では変動は少ない。又 initial 6.1~7.3 の間では Medium が酸性化する程 Glucose uptake は悪くなると云っている事より, pH は 7.3~7.5 が適当と判断して良い。次いで Medium に溶解する葡萄糖濃度の選択に関しては, Stadie and Zapp¹⁾ に依れば 0.1~1.0% の範囲内に於ては横隔膜の糖原合成能に現われる Insulin の促進能は一定であつたとしている。Krohl and Cori²²⁾ は 0.1% より 0.2% の場合が Basal uptake, Insulin effect 共に大であると云っているが, Basal uptake, Insulin effect 共に最大である濃度, 即ち最大公約数的な併も安定せる成績が得られる濃度が理想である。Soskin and Levine⁴⁰⁾ は葡萄糖濃度が極めて高い環境に於ては Insulin の作用が殆んど現われないと云っているし, Hechter et al⁴¹⁾ は 0.1% に於ける Insulin effect は 0.4% に於ける略々 3 倍に達した。即ち葡萄糖濃度が高くなるにつれて, 糖原合成能に及ぼす Insulin effect は減少すると云っている。竹内¹⁵⁾ は 0.1~0.3% の間で適当な濃度を選択するのが妥当であろうと述べ, 0.2% を採用している。著者はかかる検討を行っていないが横隔膜の組織呼吸が 0.1~0.5% の間に於て, 0.2% で最も増加を見た事からも 0.2% が一番適当な濃度である事の何ものかを暗示している様に思う。更に横隔膜の Incubation time に関しては, Groen et al¹⁷⁾ は最も安定した Insulin effect を得る為には 90~120 分としており, 竹内¹⁵⁾ も又 90 分以上の Incubation time が必要であろうと云っている。著者の経験では 60 分以下に於て Insulin effect も不安定である事を認めたが 60~90 分で殆んど安定して来る事を知り, 75 分を Incubation time とした。之は短時間内では横隔膜の反応速度がまちまちである為で, 60 分以上になれば, 夫々の反応が終りに近づくものと考ええる。辻等³²⁾ も Incubation time は 60~90 分としているし, この時間で充分目的は達成出来るものと思う。Incubation に際し, 充填するガスは, 教室で従来組織呼吸用に使用して来た 95~100% の O₂ を使用し, この O₂ の消費量測定により, Medium 中の横隔膜の反応が充分行われているか否かの一指標とした。以上簡単乍ら横隔膜法実施にあたり, 著者の規定せる測定条件を述べて来たが, その結果得られた実験成績即ち Insulin effect に対する Insulin 作用濃度標準直線

Fig. 3 Variability of the Concentration Action Curve of the Quantitative Effect of Insulin upon the Glucose Utilization of the Isolated Rat Diaphragm. Groen, Kamminga, Willebrands and Blickman : J. Clin. Invest., 31 : 98, 1952

Fig. 4 The effect of increasing concentrations of insulin upon the glucose utilization of the isolated rat diaphragm expressed as a log-dose (of insulin) response curve. Randle : Brit Med. J. 1 : 1238, 1954

について検討を加えよう。ラット横隔膜法に依る Insulin の作用濃度曲線は Groen et al¹⁷⁾, Randle⁸⁾, 竹内 et al¹⁸⁾ 等を始め多くの報告を見るが、その曲線の性質は種々様々である (第3図, 第4図, 第5図)。

直線回帰を証明すべきメタメーターも Groen et al¹⁷⁾, 竹内他¹⁸⁾等は, Insulin effect と Insulin の対数濃度に, Randle⁸⁾は Insulin effect の立方根と Insulin の対数濃度に, 著者は Insulin effect の対数及び Insulin の対数濃度との間に於て証明している。この理由は著者にも解らないが, 各研究者の実験操作上の違いが原因するのでは無いかと思う。何れにしろ著者は自分の成績を最も信じ以下実験を行ったものである。勿論前述の Insulin 作用濃度標準直線を元に血漿中の Insulin 量測定も行ったが, 然らば血漿の示す Δ uptake が果して血漿中の

Insulin に依るものか否か。又 Insulin に依るものとしても, それ以外の物質即ち, Insulin 様作用物質 (Glucose uptake 促進物質) 或は抗 Insulin 様作用物質 (Glucose uptake 阻害物質) が存在しないか等, 重大な問題が残されている。血漿の示す Δ uptake が血漿中の Insulin に依るものであるとする論拠は,

a) 正常犬の血漿で認められた Glucose uptake 促進作用は豚膵犬血漿では殆んど或は全く認められない。

Fig. 5 log-Concentration response curve of Insulin in Krebs-Ringer phosphate buffer solution on the extragluucose uptake ordinate by the isolated rat diaphragm.

Takeuti et al.

膵臓と内分泌 P 242 より

Conc. of Insulin units/ml.

Table 3 Promotion of Glucose uptake by serum

Medium	Flask Number	Number of Quarter-diaphragm alone	glucose conc. before Incubation (mg/dl)	glucose conc. after Incubation (mg/dl)	glucose uptake (mg/dl)	dry weight of Quarter-diaphragm alone (mg)	QO ₂	glucose uptake /lgr. dry weight diaphragm (mg/dl/gr.)
200mg/dl Sugar Buffer solution without serum	1	A ₁	201	190	11	10.56	6.32	20.82
	2	B ₂	200	189	11	9.83	7.01	22.38
	3	C ₃	201	186	15	13.53	7.04	22.18
	4	D ₄	199	187	12	10.96	6.87	21.89
	Average (Basal uptake)						6.81	21.82
200mg/dl Sugar buffer solution with serum No. 1	5	A ₄	201	186	15	13.03	7.98	23.04
	6	B ₁	199	184	15	11.58	8.96	25.90
	7	C ₂	198	182	16	13.11	8.63	24.40
	8	D ₃	202	188	14	11.35	8.21	24.66
	Average						8.45	24.50
200mg/dl Sugar buffer solution with serum No. 2	9	A ₃	202	188	14	11.24	8.32	24.90
	10	B ₄	204	190	14	11.03	8.91	25.38
	11	C ₁	198	183	15	11.17	8.36	26.84
	12	D ₂	199	186	13	11.05	8.04	23.52
	Average						8.41	25.16

(第2章, 第2節) この事は Groen et al⁷⁾ も認めている.

b) 正常体に Insulin を注射すると短時間の間, 血漿中の Glucose uptake 促進作用は増大する事を Vallance-Owen et al¹⁰⁾⁴⁹⁾ は報告しているが, 著者も正常体に Insulin 筋注後約30分に Glucose uptake が増大し, この増大せる Δ uptake 相当値の Insulin 量は, 之に循環血液量を乗ずると大略投与量に近いものになる (第3章第2節).

c) 稀釈血漿が Insulin 溶液と同様 Glucose uptake を促進させると同時に ADHR ラットの血糖降下作用を有する.

d) 自発性低血糖症の場合 (Vallance-Owen et al⁴⁹⁾) Insuloma の場合 (Kelly⁴⁴⁾) には Insulin 効果は強く手術により剔出すると弱くなる. 又 Insulin Mangel Diabetes の血漿は Insulin 効果が弱い事を著者は経験している.

e) Bioassay の一般に於て行われている Similary test を標準 Insulin 溶液と稀釈血漿を用いて実施すると, 両者の間には平行関係が成立する (Randle⁹⁾ 竹内 et al¹⁵⁾).

以上血漿の示す Δ uptake が血漿中の Insulin に依ると云う論拠であるが, 反面 Park⁴⁶⁾, Bornstein and Park⁴⁷⁾, Bornstein⁴⁸⁾ 等は血漿中の Insulin 量とは無関係であるとしているし, Park and Krah⁴⁹⁾, Ottaway⁵⁰⁾ は Growthhormon に Insulin 様作用があると報告しているが最近 Randle and Young⁵²⁾ は之を否定している. 辻等³²⁾ は内分泌ホルモンについて検討を加え, ACTH は極く僅かではあるが Insulin 様作用を認め, Growth hormon は Insulin 様作用に拮抗すると云っている. 又先に述べた Δ uptake が血中の Insulin 量と無関係である理由の一つとして, Bornstein は Glucose uptake 阻害因子が血漿蛋白分劃中 β -Lipoprotein 一恐らくこれは脳下垂体から分泌されると目されるが (Bornstein and Krah⁴⁹⁾) 一が存在し, 之を除去しなくてはならぬとしている. 以上定説は見あたらないが, 何れにしろ内分泌腺ホルモン及び血漿蛋白分劃中の特に β -Lipoprotein などは Glucose uptake に重大な関係を持つ様に思われるが, 今後の検討に

Table 4 各種操作条件によるラット横隔膜標本の糖摂取能及び酸素消費能の変化傾向 (竹内)

	糖 摂 取 能			O ₂ 消費量	摘 要
	基礎摂取能	Insulin 効果	最大摂取能		
横隔膜標本作製法					
損 傷	増 加	減 少	減 少 (?)	増 加	横隔膜収縮の状態 でInsulin 効果は1時 間前後で最大
Soaking time の延長	減 少	一時増加後減少	減 少	減 少	
培養の組成					
pH の 減 少	不 変	減 少	減 少	不変又は減少	濃少0.1~0.3%の範 囲で損傷時に略同じ 10 ⁻⁴ g/cc濃度に於て
葡萄糖濃度の増加	増 加	不 変	増 加	不 変	
K ⁺ の 増 加	増 加	減 少	不 変 (?)	増 加	
重金属(zn ⁺⁺)の混入	減 少	減 少	減 少	減 少	
ラット飼育条件					
体 重 15g 以上	不 変 (?)	減 少	減 少	減 少	温度12~30°C範囲で 2~48時間の範囲で
飼育環境温度の上昇	増 加	増 加	増 加	増 加	
絶食時間 の 延長	?	最初増加後減少	不 変 (?)	不 変 (?)	
高 糖 質 食	増 加	減 少	不 変	増 加 (?)	

? 印は一定の傾向を示さないか, 一定の傾向を有しているらしいが有意の変化と判定し難い場合

待ちたい。

最後に同時に測定せる横隔膜の酸素消費量との関係については、著者は QO_2 を実験成績に加え、Flask 内に於ける横隔膜の Glucose uptake の一指標とした。組織呼吸に有意の差を認めた場合は、第4表¹⁵⁾の何れかに相当し、実験条件に重大な相違を来したものと推察し、実験成績より除外する事にした。 QO_2 は実験成績の如く Insulin により影響を受ける事は殆んどない。之は Gemmill²³⁾²⁴⁾ に依り既に広く知られた事実である。尚時として理由不明のまま可成り飛び離れた成績を見る事があり、実験成績より除外せざるを得なかつた事を附記する。

第二章 血中 Insulin 量測定値

第1節 実験対照及び実験方法

実験対照は健康者、糖尿病患者、正常家兎、Alloxan 家兎、正常犬及び除腺犬とし、夫々の空腹時血中 Insulin 量及び血糖値を測定比較した。実験方法は人間に於ては早朝空腹時に肘静脈より採血し、家兎は耳神経、交感神経を予め切断しておいて、空腹時に耳静脈より採血した。Alloxan 家兎は、Eastman-Codak 社製 Alloxan-Monohydrate 170~200mg/kg を静注、糖尿病を発症せしめ5日以後のものを実験に供した。犬は桃側皮静脈よりやはり空腹時に採血した。除腺犬は脾臓の 1/30 以上残さぬ様剔出し⁵⁴⁾、約1週間後に実験に供した。その間食飼は雑食にしたが、パンクレアチンを之に混じ与えた。採血した血液には極く少量の弗化ソーダを加え、遠心血漿を分離し、得られた血漿について、血糖は Hagedorn-Jensen 氏法にて、Insulin 量はラット横隔膜法にて測定した。

第2節 測定成績

1) 正常人及び糖尿病患者

Table 5 Insulin amounts of normal human blood and blood sugar levels

No.	name	age	sex	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)
1	H. S.	26	♂	50.1	100	0.27
2	K. O.	29	♂	60.5	108	0.42
3	M. I.	30	♂	78.0	92	0.40
4	S. N.	21	♀	54.5	90	0.26
5	H. K.	24	♀	50.1	80	0.38
6	M. I.	32	♂	61.0	98	0.258
Average					95	0.338

第5表は6例の健康者早朝空腹時血糖値及び血中 Insulin 量である。血糖値は 80~103mg/dl、平均 95 mg/dl、血中 Insulin 量は 0.26~0.42mu/cc 平均 0.338mu/cc であつた。(第1例は軽度の甲状腺腫を認めたが、自他覚的症状殆んど無く、単純性甲状腺腫で、第3章の実験に於ても健康者と同様の成績を示した例である。)第6表は糖尿病患者の早朝空腹時血糖値及び血中 Insulin 量である。測定当時未治療の者、治療中の者等まちまちであるが、治療中の者は (Insulin 又は抗糖尿病剤) 3~5日前より治療を中止して測定した。

10例の血糖値は 128~241mg/dl、平均 193mg/dl、血中 Insulin 量は 0.01~0.24mu/cc 平均 0.12mu/cc であり健康者に比べて低値を示した。この中第1例、第2例は共に Insulin 耐性を示すものであるが、(両者共約6ヵ月間 Regular Insulin 40~50 unit/day 投与されていた) 0.08mu/cc と極めて低値であつ

Table 6 Insulin amounts of diabetics blood and blood sugar levels

No.	name	age	sex	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)	complication	urine sugar
1	U. S.	41	♀	45.5	241	0.08	high blood pressure	(+)
2	H. K.	52	♂	52.0	240	0.08	nephrose	50~70g/day
3	M. M.		♀	51.0	236	0.13	neuralgia	(+)
4	S. K.	55	♂	50.5	222	0.01	heart disease	80~100g/day
5	A. Y.		♀	49.1	209	0.192		(+)
6	E. H.	40	♀	56.5	209	0.128		1~10g/day
7	S. K.	55	♂	50.5	161	0.10	heart disease	5~10g/day
8	F. H.	20	♀	48.0	144	0.04		0~5g/day
9	H. I.	43	♀		143	0.17		(+)
10	T. K.	48	♂	52.0	128	0.24	high blood pressure	14~25g/dl
Average					193	0.12		

た。第4例, 第7例は同一患者である。第4例は入院時, 治療前の測定成績であり, その後 Insulin 治療により軽快した例である。入院時の主訴口喝, 多食, 多尿, 全身倦怠感等も消失し, 尿量1600~2200cc/day 尿糖80~100g/day であったのが尿量 1200~1600cc/day 尿糖 5~10g/day となり, 血糖値は 222mg/dl より 161mg/dl となつたものであるが, この例に於ては, 糖尿病の改善と共に血中 Insulin 量も 0.01mu/cc より 0.1mu/cc と10倍の増加を認めた。又第8例は若年性の Insulin Mangel Diabetes と思われるものであるが, Insulin 量は 0.04mu/cc と低く, 治療によるも, 血中 Insulin 量の増加を認めなかつた。第3例, 第5例, 第6例, 第9例は治療に依り次第に症状及び血糖値の改善されて行つた者である。

2) 正常家兎及び Alloxan 家兎

第7表は正常家兎の空腹時血中 Insulin 量及び血糖値である。10例の血糖値は 95~106mg/dl 平均 101mg/dl 血中 Insulin 量は 0.23~0.48mu/cc 平均 0.327mu/cc であり, 人間の正常値と略々同様の値である。一方 Alloxan 家兎の血中 Insulin 量及び血糖値は第8表に示す如くで, 血糖値は 308~652mg/dl 平均 359mg/dl で血中 Insulin 量は 0.01mu/cc 以下が多く, 適確な測定は困難で, 第1例及び第6例に於て夫々, 0.02mu/cc, 0.084mu/cc を認めたが, 正常家兎に比べて極度の減少を認めた。

Table 7 Insulin amounts of normal rabbit blood and blood sugar levels

No	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)
1	2.5	102	0.317
2	2.6	106	0.48
3	2.7	98	0.248
4	2.6	105	0.23
5	2.45	95	0.36
6	3.1	98	0.36
7	3.5	96	0.28
8	2.9	104	0.29
9	3.0	105	0.39
10	2.8	102	0.315
Average		101	0.327

3) 正常犬及び除腺犬

正常犬の6例の空腹時血糖値は第9表の如く 75~98mg/dl 平均 81mg/dl, 血中 Insulin 量は 0.076~0.24mu/cc 平均 0.178mu/cc で正常人及び正常家兎より低値を示した。一方この6例の正常犬の膵臓剔除後約1週間に於ける測定成績は第10表の如く血糖値は 198~330 mg/dl 平均 278mg/dl, 血中 Insulin 量は零乃至 0.01mu/cc 以下である。Insulin は殆んど或は全く認めない。

第3節 小括及び考按

以上正常体及び糖尿病体の血中 Insulin 量を測定比較して、前述の如き成績を得、糖尿病の本態である高血糖が血中 Insulin 量の相対的欠乏にある事を、更にアロキサン家兎或は除腺犬に於ては血中 Insulin 量の絶対的欠乏を来している事を認めた。

第11表は健常体の血中 Insulin 量を測定した諸家の成績である。空腹時或は糖負荷後の末梢血中 Insulin の濃度は各報告者に依り可成りの相違があるが、in vivo の方法に依る成績を通覧するに、略々 0.1~0.4mu/cc の間にある事がうなずける。一方ラット横隔膜法に依る成績はまちまちであるが、之は測定法の不備に依るものと考えられる。即ち近年この方法が非常に厳密に規定された諸条件のもとに於て測定可能な事より、それを提唱した竹内等¹⁸⁾を始めそれに準じた、辻等²²⁾の成績が略々信頼されるものと思う。即ち横隔膜法に依る測定値は 0.1~0.5mu/cc のあたりにあり、之等の成績より、著者の成績も、著者の測定法に従えば適確な血中 Insulin 量を現わしているものと確信する。

一方糖尿病体の血中 Insulin 濃度は、糖尿病患者、アロキサン家兎、除腺犬共に正常体より僅かに或は極度の低値を示したが、糖尿病患者についての諸家の成績を通覧するに、Bornstein and Lawrence^{26), 27)}が下垂体、副腎剔除アロキサンラットを用いて、ブドウ糖 50g を経口投与し、2時間後の末梢血漿中の Insulin 濃度を測定した結果に依れば、(彼等の測定法に依れば、正常人空腹時血中 Insulin 濃度は 0.1mu/cc で、それより低い糖

Table 8 Insulin amounts of alloxan rabbit blood and blood sugar levels

No	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)
1	2.5	380	0.02
2	2.6	652	0
3	3.2	416	0
4	2.6	603	<0.01
5	3.1	351	0
6	2.8	308	0
7	3.4	352	0.084
8	3.3	314	<0.01
Average		359	

Table 9 Insulin amounts of normal dog blood and blood sugar levels

No	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)
1	16.0	70	0.076
2	16.5	75	0.192
3	7.2	86	0.24
4	7.5	81	0.20
5	10.3	98	0.19
6	11.6	75	0.17
Average		81	0.178

Table 10 Insulin amounts of depancreatized dog blood and blood sugar levels

No	body weight (kg)	blood sugar level (mg/dl)	serum Insulin (mu/cc)
1	16.0	292	0
2	15.5	330	0
3	7.0	198	<0.01
4	6.0	320	<0.01
5	8.1	231	0
6	10.1	286	<0.01
Average		278	

Table 11 各研究者の健常体血中 Insulin 量

	報 告 者	年 代	測 定 法	血中「イ」量 mu/cc	検 体
in vivo	Allen et al	1941	HAd	ca 0.1	人 間 全 血
	Gellhorn et al	1941	HAd	ca 0.2	人 間 血 全
				0.1	犬 家 兎 空 腹 時
	Bornstein	1950	DHA	0.1	人 間 空 腹 時
	Bornstein et al	1951	DHA	0.34	人間50%葡萄糖経口負荷2時間後
	小 坂 他	1955	HAd	0.2~0.3	人間食後1 $\frac{1}{2}$ ~2時間血漿
				0.3~0.4	犬20%葡萄糖静注1 $\frac{3}{4}$ 時間血漿
				<0.15	人間 犬 空 腹 時
in vitro	Groen et al	1952	R D	0.0625<<0.625	正常人末梢血清
	Vallance-owen	1954	R D	0.04~0.08	正常人空腹時血漿
	Randle	1954	R D	13.0	正常人末梢血清
	竹内 et al	1956	R D	0.12~0.24	犬 空 腹 時 血 漿
	辻 et al	1958	R D	0.292~0.528	正 常 人

H : 下垂体剔除

Ad : 副腎髓質剔除

A : 副腎剔除

D : アロキサン糖尿病

RD : ラット横隔膜法

尿病患者の血中 Insulin 濃度は測定不能なる為、葡萄糖を負荷後測定した) Ketosis を伴う15例の糖尿病患者では血中 Insulin は全部零であり、Ketosis を伴う13例の血中 Insulin 濃度は 0.1~0.32mu/cc 平均 0.23mu/cc であり、対照7例平均 0.34mu/cc より低値を示した。尚 Insulin 零であつた例でも Insulin 治療により病状改善を見た4例では 0.20~0.26mu/cc と血中 Insulin を証明出来る様になつたと云つてゐる。又 Groen et al⁷⁾, Willebrands et al⁵⁸⁾は横隔膜法に依り Insulin で調節されている糖尿病患者の血清中 Insulin activity は正常者と変りないが、糖尿病昏睡時には Insulin を認めなかつたと述べている事等より、糖尿病患者の血中 Insulin 量は正常人より低い事は事実である。又逆に(著者は測定する機会を持たなかつたが) Willebrands et al⁵⁸⁾は空腹時に低血糖ショックに陥つた既往歴のある15例の Hyperinsulinism の血漿 Insulin 濃度を出来るだけ発作中を選んで測定した。手術を受けた13例中11例にラ氏島腺腫を認めたが、内7例の Insulin 濃度は彼等の正常値0.1~0.3mu/cc の上界に、4例は正常値以上であつた。2例は腺腫様組織を認めなかつたが、術後発作は消失し、この2例の術前の Insulin 濃度は 5.0, 4.5mu/cc であり、手術を受けなかつた2例は子供で 3.4, 5.0mu/cc 更にラ氏島癌の例では 3.6mu/cc と夫々正常人よりはるかに高値を示したと述べている。小坂等⁶⁹⁾は肝転移を伴つた胃癌患者の自発性低血糖の発作中並びにラ氏島腺腫を疑われた特発性低血糖症の空腹時に於ける末梢血漿の Insulin 量は(下垂体、副腎髓質剔除ラットによる定量法)それぞれ 0.60mu/cc, 0.75mu/cc であり、健康者の 0.2mu/cc 以下より極めて増量していた。又 Kelly⁴⁴⁾は術前値 0.3mu/cc であつたラ氏島腺腫患者が、同腺腫剔除後 0.05mu/cc と減少したと云つてゐる。尚彼の正常値は横隔膜法で 0.031~0.082mu/cc である。我国で、糖尿病患者の血中 Insulin 量が正常人より低いとするものに峰下等⁵⁹⁾, 山田等⁶⁰⁾, などがあるが時には正常者と変らぬものも認めている。勿論糖尿病の病型に依り異なるであろう事は想像に難くないが、著者の測定値の如く(僅か1例に過ぎないが)、若年性の Insulin Mangel Diabetes と考えられるものに於ては Insulin 量の低下が殊に著明なるのは当然であるが、老人性の Gegen Regulations Diabetes と考えられる者に於ても血中 Insulin 量は低下しており、血中 Insulin 量の低下が、糖尿病の核心をなす高血糖惹起の一大原因たる事は否めな

い。又正常家兎の血中 Insulin 量は $0.355 \pm 0.125 \text{ mu/cc}$ で正常人と略々同じ濃度を示すが、Gellhorn et al⁽⁶¹⁾⁽⁶²⁾ に依れば（下垂体、副腎髄質剔出ラット法）ウサギの空腹時血中 Insulin 量は 0.1 mu/cc であり、彼等の人間の血中 Insulin 量が食後 2 時間半で $\text{ca } 0.2 \text{ mu/cc}$ なる事より、人間と兎の血中 Insulin 量は大きな差に見受けられる。次いで家兎に Alloxan を静注する事に依り、ラ氏島の β 細胞が選択的に破壊される事は、周知の事実である⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾⁽⁶⁵⁾。Insulin が β 細胞より分泌されている事⁽⁶⁴⁾⁽⁶⁶⁾ より、Alloxan 家兎の血中 Insulin 量が激減している事は当然である。Alloxan 糖尿病の豚の Insulin 含有量については 2・3 の報告がある。Goldner and Gomori⁽⁶⁷⁾ は 3 例の Alloxan 注射後 18~60 日持続した糖尿病犬は、正常の 1/4 に減少していると云っている。小坂等⁽⁶⁸⁾ は一過性の糖尿病犬では正常の 1/8 に減少し、持続性糖尿病犬では 1/36 に激減したと云っている。之等の事よりも血中 Insulin 量の減少は如何にも事実らしく考えられる所であるが、著者は実際に血中 Insulin 量の減少を直接測定して証明した。更に正常犬の血中 Insulin 量は $0.158 \pm 0.082 \text{ mu/cc}$ で正常人及び正常家兎より低値を示したが、諸家の報告を見るに、Gellhorn et al⁽⁶¹⁾⁽⁶²⁾ (in Vivo) は兎と同様 0.1 mu/cc と云い、竹内 et al⁽¹³⁾ (横隔膜法) は空腹時血漿 Insulin 量は $0.12 \sim 0.24 \text{ mu/cc}$ であったと云っている。又小坂⁽⁶⁹⁾ は健康者 8 例及び正常犬 5 例の空腹時血漿 1 cc 中の Insulin 量は下垂体副腎髄質剔出ラット法に依り測定出来なかつた。即ち 0.2 mu/cc 以下であったと云っている。Waters and Best⁽⁷⁰⁾ が諸家豚犬に於ける実験成績より推論して、空腹犬の血中 Insulin 量はおよそ 0.5 mu/cc で種々の条件を考え合わせると多分この 1/2~1/3 であろうとしたのは、著者の測定値に大略一致している。一方除腺犬については、Insulin 分泌の根源である膵を殆んど剔出するのであるから、血中 Insulin 量も零或はそれに近い成績を得たのも当然であろう。

第三章 Insulin 負荷時に於ける血中 Insulin 量の変動

第 1 節 実験対照及び実験方法

実験対照は前章と同様、実験方法は、人には Novo Regular Insulin 5~20 unit。家兎には $0.5 \sim 2.5 \text{ unit/kg}$ 犬には 0.3 unit/kg 筋注し、注射前及び注射後、30分、60分、120分、180分、240分後の血中 Insulin 量及び血糖値を前章と同様に測定比較した。

Table 12 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time (30, 60, 120, 180 min) after i.m. injection of Novo Regular Insulin 5 units to normal human bodies.

No.	name	sex	age	body weight (kg)		before injection	after injection (min)			
							30	60	120	180
1	H. S.	♂	26	56	Insulin blood sugar	0.27 100	1.10 75	1.00 71	0.68 86	0.48 108
2	K. O.	♂	29	60	Insulin blood sugar	0.40 108	2.10 82	0.68 86	0.19 90	— —
3	M. I.	♂	30	78	Insulin blood sugar	0.40 92	1.14 68	1.04 79	0.60 83	0.40 83
4	S. N.	♀	22	55	Insulin blood sugar	0.26 90	2.08 69	2.30 73	0.24 78	0.28 78
Average					insulin (mu/cc) blood sugar (mg/dl)	0.33 98	1.61 74	1.25 77	0.43 84	0.39 93

第2節 実験成績

1) 正常者と糖尿病患者

正常者に Novo Regular Insulin 5 unit 筋注した場合の4例の血中 Insulin 量及び血糖値の時間的変動は第12表の如くである。この4例の平均値を見るに注射前の血中 Insulin 量は 0.33mu/cc, 血糖値は 98 mg/dl であり, 注射30分後 1.61mu/cc, 74mg/dl 60分後 1.25mu/cc, 77mg/dl, 120分後 0.43mu/cc, 84mg/dl, 180分後 0.39mu/cc, 93mg/dl となり, 血中 Insulin 量は注射後30分にして最高となり, 之は循環血液量と乗ずると注入量に近いものとなる。3時間後に於て略々元に戻り, 血糖はそれに従い減増する。之を図示すれば第6図の如くなる。Insulin 5 unit 投与により平均血糖値は30分後に於て 24mg/dl の降下を見た。一方糖尿病患者に Insulin を注射した時の成績は第13, 14表の如くである。正常人と同様 Novo Regular Insulin 5 unit 筋注時に於ける血中 Insulin 量及び血糖値の変動は13表の如く4例の平均値は注射前 0.102mu/cc, 194mg/dl で注射後30分では 1.80mu/cc, 188mg/dl 60分では 1.51mu/cc, 169mg/dl 120分では 1.20mu/cc, 148mg/dl 180分では 0.67mu/cc, 152mg/dl となり, 之を図示すれば第7図の如くなる。又 10~20 cmit 筋注した場合の成績は第14表の如くである。5例の血中 Insulin 量及び血糖値の平均値は注射前 0.10mu/cc, 189mg/dl で注射後30分では 4.26mu/cc, 150mg/dl 60分後では 4.16mu/cc, 104

Fig. 6 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 5 units to normal human bodies. Values are the average of four cases.

Table 13 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time (30, 60, 120, 180min) after i.m. injection of Novo Regular Insulin 5 units to diabetics.

No.	name	sex	age	body weight (kg)		before injection	after injection (min)			
							30	60	120	180
1	E. H.	♀		55.1	insulin blood sugar	0.06 143	1.76 135	1.92 98	1.52 92	0.72 94
2	S. K.	♂	55	50.0	insulin blood sugar	0.10 191	2.00 175	1.16 170	0.64 163	0.27 165
3	M. M.	♀		41.1	insulin blood sugar	0.13 236	1.48 240	1.44 221	1.92 166	1.28 178
4	K. T.	♀	23	45.8	insulin blood sugar	0.12 204	1.96 200	1.52 187	0.73 169	0.39 169
Average					insulin (mu/cc) blood sugar(mg/dl)	0.102 194	1.80 188	1.51 169	1.20 148	0.67 152

Fig. 7 Changes of insulin concentration in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 5 units to diabetics. Values are the average of four cases.

Fig. 8 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 10~20 units to diabetics. Values are the average of five cases.

Table 14 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 10~20 units to diabetics.

No	name	sex	age	body weight (kg)		before injection	after injection (min)			
							30	60	120	180
1	T. K.	♂		50	insulin	0.24	4.00	2.80	2.84	1.20
					blood sugar	128	116	96	72	54
2	F. H.	♀	20	48.0	insulin	0.04	1.52	6.00	2.72	1.04
					blood sugar	144	113	78	84	84
3	E. H.	♀	40	56.5	insulin	0.13	5.80	4.40	2.80	1.00
					blood sugar	209	183	159	121	93
4	U. S.	♀	41	45.5	insulin	0.07	4.00	1.00	1.74	1.84
					blood sugar	241	194	104	58	96
5	S. K.	♂	55	50.5	insulin	0.01	6.00	6.60	5.40	1.04
					blood sugar	222	144	83	91	91
Average					insulin (mu/cc)	0.100	4.26	4.16	3.10	1.22
					blood sugar (mg/dl)	189	150	104	85	84

mg/dl, 120分後では 3.10mu/cc, 85mg/dl 180分後では 1.22mu/cc, 84mg/dl となり之を図示すれば第8図の如くなる. Insulin 5 unit 注射せる場合の血中 Insulin 量は30分後に於て正常人と略々同量の 1.88 mu/cc と最高になるが, 60分, 120分, 180分後に於ては正常者に於ける場合よりも血中停滞遅延を認める.

Table 15 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 1/unit/kg to normal rabbits.

No	body weight (kg)		before injection	after injection (min)				
				30	60	120	180	240
1	2.9	insulin blood sugar	0.32 102	／ 77	5.11 55	2.48 68	0.71 85	0.28 91
2	2.5	insulin blood sugar	0.48 106	6.01 92	4.00 59	1.04 66	0.21 99	0.24 109
3	2.7	insulin blood sugar	0.248 98	／ 46	6.97 51	3.20 53	0.45 58	0.17 65
4	2.8	insulin blood sugar	0.36 96	10.70 76	／ 54	0.58 69	0.164 86	／ ／
5	3.0	insulin blood sugar	0.23 105	7.80 52	4.80 63	1.36 72	0.56 115	／ ／
Average		insulin (mu/cc) blood sugar (mg/dl)	0.324 101	8.17 69	5.22 56	1.73 66	0.42 89	0.23 88

この血中停滞は Insulin 活性のままである点を強調したい。又血糖の降下は血中 Insulin 量の山より遙かに遅れる。即ち 2~3 時間後に最低となる。5 unit の Insulin に対して 30 分後の血糖降下量は正常者の 24 mg/dl なるに對して、僅かに 6mg/dl であり、2~3 時間後に於て正常者は略々元に復するに反し、最高の 46mg/dl の降下を見る。10~20 unit 筋注せる場合も 5 unit 投与時と同様の型をとる。

2) 正常家兎と Alloxan 家兎

正常家兎に Novo Regular Insulin 1 unit/kg 筋注した場合の血中 Insulin 量及び血糖の時間的変動は第15表の通りである。即ち 5 例の平均値は注射前 0.324mu/cc, 101mg/dl であり、注射後 30分では 8.17mu/cc, 69mg/dl 60分後 5.22mu/cc, 56mg/dl 120分後 1.73mu/cc, 66mg/dl 180分後 0.42mu/cc, 89mg/dl, 240分後 0.23mu/cc, 88mg/dl となり、血中 Insulin 量は 30分後最高となりその後漸次減少して 3~4 時間後に略々元に復する。血糖値は 60分後に於て最低となり、32mg/dl の低下を見、4 時間後には略々元に復する。之を図示すれば第 9 図の如くなる。之は正常人の場合と類似する。一方アロキサン家兎に Insulin を注射した場合の成績は第16, 17表の通りである。Novo Regular Insulin 1 unit/kg 筋注時に於ける血中 Insulin 量及び血糖値の時間的変動は第16表の如くで 4 例の平均値は注射前 0.025mu/cc, 318mg/dl で注射後 30分では

Fig. 9 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 1/unit/kg to normal rabbits.

Values are the average of five cases.

Table 16 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regula Insulin 1/unit/kg to alloxan rabbits.

No	body weight (kg)		before injection	after injection (min)				
				30	60	120	180	240
1	2.8	insulin	0.084	/	4.70	3.68	/	1.60
		blood sugar	308	290	282	275	261	253
2	3.5	insulin	0	6.41	5.00	3.47	1.16	/
		blood sugar	352	340	335	330	321	310
3	3.3	insulin	0	9.20	/	3.62	2.15	1.12
		blood sugar	314	312	310	288	225	223
4	2.9	insulin	0.02	9.29	8.30	/	2.12	1.93
		blood sugar	296	288	243	221	209	200
Average		insulin (mu/cc)	0.025	8.30	6.00	3.59	1.81	1.55
		blood sugar (mg/dl)	318	308	293	279	254	249

Table 17 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 2.5 units/kg to alloxan rabbits.

No	body weight (kg)		before injection	after injection (min)				
				30	60	120	180	240
1	2.5	insulin	0.02	/	6.40	3.02	2.40	2.35
		blood sugar	380	288	198	132	98	86
2	2.3	insulin	0	14.0	11.12	/	2.80	3.21
		blood sugar	452	321	142	101	61	61
3	3.2	insulin	0	15.20	12.80	7.88	1.24	/
		blood sugar	416	352	310	179	102	/
4	2.9	insulin	0	13.6	/	3.70	2.70	2.00
		blood sugar	303	221	150	104	90	81
5	3.2	insulin	<0.01	20.88	18.0	5.00	5.61	41.0
		blood sugar	351	350	310	234	15	414
Average		insulin (mu/cc)	<0.01	15.92	12.08	4.90	2.95	1.72
		blood sugar (mg/dl)	380	310	222	150	101	92

は 8.30mu/cc, 308mg/dl 60分後では 6.00mu/cc, 293mg/dl 120分後では 3.59mu/cc, 279mg/dl 180分後では 1.81mu/cc, 254mg/dl 240分後では 1.55mu/cc, 249mg/dl となり之を図示したのが第10図である。即ち正常家兎に比して Insulin の血中停滞は遅延する。之は糖尿病患者に於ける場合と類似する。又 2.5 unit/kg筋注時の成績は第17表の如くで5例の血中 Insulin 量及び血糖値の平均値は、注射前 0.01mu/

Fig. 10 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regula Insulin 1 unit/kg to alloxan rabbits. Values are the average of four cases.

Fig. 11 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regula Insulin 2.5 units/kg to alloxan rabbits. Values are the average of five cases.

cc以下, 380mg/dl で注射後30分では 15.92mu/cc, 310mg/dl 60分後では 12.08mu/cc, 222mg/dl, 120分後では 4.90mu/cc, 150mg/dl 180分後では 2.95mu/cc, 101mg/dl 240分後では 1.71mu/cc, 92mg/dl であり之を图示すれば第11図の如くなる。即ち投与 Insulin 量の多少に拘わらず同じ様な型を示す。血糖は正常家兎が注射後60分後に於て最低となり 45mg/dl の降下を示すに反し, Alloxan 家兎では 4 時間後に於て最も低く, 69mg/dl の降下を見た (1 unit/kg 筋注射時)。

3) 正常犬及び除腺犬

正常犬及び之に脾臓を行つた糖尿病犬に, Novo Regular Insulin 0.3 unit/kg 筋注射時に於ける血中 Insulin

Table 18 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regula Insulin 0.3 unit/kg to normal dogs.

No	body weight (kg)		before injection	after injection (min)			
				30	60	120	180
1	10	insulin blood sugar	0.08 91	3.12 62	1.44 65	0.05 78	0.08 86
2	16	insulin blood sugar	0.19 75	3.44 56	0.27 52	0.28 59	0.23 78
3	7.2	insulin blood sugar	0.24 86	4.00 51	— 59	0.23 68	0.12 79
4	7.5	insulin blood sugar	0.20 81	4.20 49	2.00 58	0.58 79	0.10 83
Average		insulin (mu/cc) blood sugar (mg/dl)	0.18 83	3.69 55	1.23 59	0.29 71	0.13 82

Table 19 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regula Insulin 0.3 unit/kg to depancreatized dogs.

No	body weight (kg)		before injection	after injection (min)				
				30	60	120	180	240
1	10	insulin blood sugar	0 292	2.72 201	2.54 138	2.50 76	0.80 81	— 139
2	16	insulin blood sugar	<0.01 330	2.80 251	1.84 210	0.76 181	1.52 198	— —
3	7	insulin blood sugar	<0.01 198	5.60 111	2.24 99	1.52 81	2.32 103	— —
4	7.5	insulin blood sugar	0 320	5.20 306	4.00 285	0.36 209	0.44 279	0.16 331
Average		insulin (mu/cc) blood sugar (mg/dl)	<0.01 285	4.08 217	2.66 183	1.29 137	1.27 165	— —

Fig. 12 Changes of insulin concentrations circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 0.3 unit/kg to normal dogs. Values are the average of four cases.

Fig. 13 Changes of insulin concentrations in circulating blood and blood sugar levels in each time after i.m. injection of Novo Regular Insulin 0.3 unit/kg to depancreatized dogs. Values are the average of four cases.

量及び血糖値の時間的変動は第18, 19表の如くで、4例の平均値は、正常犬に於ては注射前 0.18mu/cc, 83mg/dl であり、注射後30分では 3.69mu/cc, 55mg/dl となり、更に60分後には 1.23mu/cc, 59mg/dl 120分後には 0.29mu/cc, 71mg/dl 180分後には 0.13mu/cc, 82mg/dl となり、之を図示すれば第12図の如くなる。一方除臓犬に於ては、注射前 0.01mu/cc 以下、285mg/dl であり、注射後30分では 4.08mu/cc, 217mg/dl 60分後には 2.66mu/cc, 183mg/dl 120分後には 1.29mu/cc, 137mg/dl 180分後には 1.27mu/cc, 165mg/dl となり之を図示すれば第13図の如くなる。即ち正常犬の場合は、正常人或は正常家兎と同様30分後に於て血中 Insulin 量は最高となり、その後漸次減少して3時間後には全く元に復する。血糖

はそれに従い減増する。除膝犬に於ては正常犬に比して、Insulin の血中停滞は遅延する。之は糖尿病患者或は Alloxan 家兎に於ける場合と類似する。即ち糖尿病体に於て、Insulin が速やかに破壊又は不活性化せられるのではなからうかと云う予想は見事に裏切られて、かえつて之等に於ては Insulin の血中停滞が遅延する事が明らかになった。

第3節 小括並びに考按

Banting 及び Best⁷¹⁾ により Insulin が発見されて以来現在迄、その生物学的作用に関しては、極めて多くの研究が発表され、広く糖、脂質、蛋白質等の代謝迄その影響を受けている事が明らかになり、Insulin それ自体の代謝に関しても、最近に到る迄殆んど不明であつたが、近年放射性物質の利用が広く応用され、次第に解明されつつある。更に Insulin の作用機序に関しても種々論議されているが、未だに従来の多くの実験成績を総括的に説明し得る定説を要出し得ない現状である。此処に著者の実験成績と諸報告を基にまとめをかねて小考を加える。

Stadie et al⁷²⁾, Elgee et al⁷³⁾, Welsh et al⁷⁴⁾⁷⁵⁾, Solmon et al⁷⁶⁾ 等は放射性物質で label した Insulin を利用して、Insulin の生体内に於ける代謝或いは作用機序に大きな進歩をもたらした。

人間に於ける Insulin I^{131} を与えての血中濃度の変化については、Welsh et al⁷⁴⁾⁷⁵⁾, Williams⁷⁷⁾, Solmon et al⁷⁶⁾ 等の成績に依れば、非糖尿病体に Insulin I^{131} を静注すると速やかに血中から消失するばかりで無く、速やかに組織に於て分解され、放射能は分解終末産物 I^{131} となつて尿中に排泄される事に一致を見る。一方糖尿病患者に於ける場合は、Welsh et al⁷⁴⁾⁷⁵⁾, Williams⁷⁷⁾等の成績に依れば、Insulin 治療を受けた事のない6例では、非糖尿病対照例と差違を認めなかつた。又6週間以上 Insulin 治療を受けた糖尿病患者57例を、24時間 Insulin 投与を中止しての成績では、12例は対照例と大差を認めなかつたが、45例は Insulin の分解が遅れて血中停滞を示すと云う。即ち Insulin の血中停滞遅延は、Insulin の分解遅延であり、その原因は長期 Insulin 治療の有無に存し、糖尿病の存否と関係なしとしているが、著者の実験成績では、之と異り、糖尿病患者に注射せられた一定量の Insulin が、Insulin 治療の有無に関係なく、健康者におけるよりも、血中停滞の遅延を、併もその血中停滞が Insulin 活性のままで維持せられる事を認めた。更に正常家兎と Alloxan 家兎、正常犬と除膝犬に於ても同様の結果を認めた。之は糖尿病患者の体内に於て Insulin がより早く分解される事により、糖尿病が惹起せられるものでないと云う事を明らかにする。この糖尿病体に於ける血中停滞遅延に関しては、Stadie et al⁷²⁾, Haugaard et al⁷⁸⁾ 等の説を基に、Insulin が作用を発揮するには、その作用の場に Insulin と結合して Insulin 活性を作り出す受容者が必要であり、高血糖惹起原因が Insulin の絶対的欠乏でなく、相対的欠乏¹⁶⁾にある事より、此の受容者即ち末梢の Insulin を利用すべき機能が低下していると考えれば理解出来る。

故に糖尿病は血中に於ける活性 Insulin の低下にその原因を発するものでなく、血中に於ける Insulin を利用すべき末梢に於ける変化、例えば補体結合反応に於ける障碍の如く、Insulin を取入れるべき能力を減弱せしめる点に求められなければならない。若し末梢に於ける Insulin を取入れる能力が1/10に減少したと仮定するならば、10倍量の或はそれ以上の Insulin がやつと糖消費を等量に補い得べく、此処にも Insulin 産生促進の強要による β 細胞の疲労、従つて Gegen Regulations Diabetes に於ける Insulin 量低下の原因を想像する事が出来る。事実 β 細胞の機能を亢進せしめるが如き条件 (Insulin 分泌促進) 下に於ては、最初 β 顆粒の減少が起り、次いで細胞の肥大と増殖とが起るが、遂には細胞は水腫性変性に陥つて疲労退化する事が明らかにせられ (Woerner⁸⁰⁾, Dunn⁸¹⁾)、これに随伴して生体の Insulin 量が低下して来るのは当然であり、更には Insulin が少ないと云う事も末梢組織に於ける Insulin 利用能の低下を惹起すると云う悪循環を想像せしめる。

第四章 Insulin の作用機序に対する 2.3 の検討

第1節 Alloxan ラット横隔膜の Insulin 効果

Oriental 固型飼料を以て飼育せる、体重 120g 前後の Wister 系ラットの腹腔内に、Alloxan 20mg/100g

Table 20 Insulin effect of alloxan rat diaphragm.

Insulin conc. mu/cc	glucose uptake mg/dl/gr. dry weight		Insulin effect mg/dl/gr. dry weight	
	normal diaphragm	alloxantized diaphragm	normal diaphragm	alloxantized diaphragm
0	21.21	17.89		
0.1	24.40	20.38	3.19	2.49
1.0	25.46	21.51	4.25	3.62
10	29.61	24.20	8.40	6.31
100	40.48	35.21	19.27	17.32
1000	60.75	50.13	39.54	32.24

(blood sugar average 208mg/dl)

Table 21 Insulin effect of rat diaphragm of administed with glucagon

normal rat diaphragm	40.17 mg/dl/gr. dry weight
rat diaphragm of administed with glucagon	39.28 mg/dl/gr. dry weight

(Medium : 200mg/dl sugar phosphate buffer solution with Insulin 100mu/cc)

Table 22 Influences of the added glucagon upon Insulin effect of normal rat diaphragm

glucagon conc.	medium	200mg/dl sugar buffer solution without Insulin	difference	200mg/dl sugar buffer solution with Insulin 100mu/cc	difference
0		21.40mg/dl/gr.		39.04mg/dl/gr.	
5 γ /cc		20.30mg/dl/gr.	-1.10	34.21mg/dl/gr.	-4.83
50 γ /cc		15.29mg/dl/gr.	-6.11		

を注射して糖尿病を発生せしめ、約1週間高血糖を持続せるものを選び実験に供した。使用 Alloxan ラット12匹の血糖値は 138~245mg/dl 平均 208mg/dl であった。実験方法は第1章で述べた横隔膜法と同様に行い、正常ラット横隔膜の糖摂取能、Insulin 効果と比較検討した。実験成績は第20表の如くで、各濃度の添加 Insulin に対する Alloxan ラット横隔膜の Insulin effect は正常ラット横隔膜のそれより明らかに低下しており、Alloxan 糖尿ラットの末梢組織に於ける糖摂取能及び Insulin 利用能は、可成り減弱しているものと思われる。

第2節 Insulin effect に及ぼす Glucagon の影響

1) Glucagon 100 γ を筋注せるラットを、30分後断頭屠殺した横隔膜の、Insulin 100mu/cc 含有 Medium 中に於ける Glucose uptake は第21表の如くで、Insulin 利用能は正常のものと殆んど変わらない。尚 Glucagon 筋注30分後に於けるラットの血糖値は 108~110mg/dl と正常より高値を示した。Glucagon は Glucagon-Lilly を使用した。

2) Glucagon を in vitro で作用させた場合の実験成績は第22表の如くで、Insulin を含有しない Medium 中に於て、Glucagon を添加しない場合の Glucose uptake は 21.40mg/dl であり、Glucagon 5 γ /cc 添加せる場合は 20.30mg/dl と 1.10 の、50 γ /cc 添加せる場合は 15.29mg/dl と 6.11 の糖摂取能の

Table 23 Influences of prepared glucagon upon Insulin effect of normal rat diaphragm.

medium glucagon conc.	200mg/dl sugar buffer solution without Insulin	difference	200mg/dl sugar buffer solution with Insulin 100mu/cc	difference
0	22.42mg/dl/gr.		39.48mg/dl/gr.	
10 γ /cc	20.64mg/dl/gr.	-1.78	34.77mg/dl/gr.	-4.71
100 γ /cc	16.71mg/dl/gr.	-5.71	31.17mg/dl/gr.	-8.31

低下を見る。一方 Insulin 100mu/cc 含有せる Medium 中に於て、Glucagon を添加しない場合の Glucose uptake は 39.04mg/dl なるに対し、Glucagon 5 γ /cc 添加せる場合は 34.21mg/dl と 4.83 の、Insulin 利用能の低下を認める。

3) 更に正常ラットの横隔膜を Glucagon 10 γ /cc, 100 γ /cc 含有液中に15分間、38°Cに保存した場合 (15分後取出し Glucagon をよく洗い落す) の成績は第23表の如くで、Insulin を含有しない Medium 中に於ては、夫々 1.78, 5.71 の、又 Insulin 100mu/cc 含有せる Medium 中に於ては、夫々、4.71, 8.31と糖摂取能及び Insulin 利用能の減弱を認める。

第3節 小括及び考按

前章に於て糖尿病体の末梢に於ける血中 Insulin 利用能の低下を主張して来たが、この事実を証明すべく本実験を行つた。即ち Insulin が存在しない場合の Alloxan ラット横隔膜の Glucose uptake 及び Insulin が存在する場合の Insulin effect は明らかに低下している。Villie and Hastings⁸¹⁾ は Alloxan 糖尿病ラット横隔膜の糖原合成が対照に比して著明に減弱している事を、又 Glock⁸²⁾, Bloom⁸²⁾, Milstein⁸³⁾ 等は肝切片に於ても同様の報告をしている。糖原合成と糖摂取能が或程度平衡するものである事³⁷⁾より、糖尿病体の糖利用能は正常より低下しているものと判断して差支えない。更に Insulin を添加した場合の uptake の減少より、Insulin 利用能の低下を証明したが、Insulin の直接作用が組織内への葡萄糖侵入の階段にのみ (その後の糖の運命は問わず) 限られている事⁸⁴⁾⁸⁵⁾⁸⁶⁾⁸⁷⁾より考え合わせれば、糖尿病体の末梢組織の利用能の低下は、Insulin を取入れるべき末梢組織が或る原因で正常に機能していない、即ち Insulin を利用すべき末梢の変化を想像せざるを得ない。

糖尿病動物に於ける中間代謝反応系の速度の低下も、恐らくこの一時的作用の遅延に従属するものであろう (例えば Glycogenolysis の変化)⁸⁸⁾。

古来、糖尿病病態生理については、肝臓での糖成生過剰説⁸⁹⁾と末梢の糖利用障害説⁹⁰⁾が対立して来たが、近時放射性同位元素の利用に伴い、糖尿病動物の代謝異常が解明されるに及び、糖尿病に於ては組織の糖利用能乃至酸化障害の存在を証明する成績が相次いで現われ、糖利用障害説が積極的に支持される様になつたが、著者も益々その感を深くしたものである。

次で Insulin が末梢組織に取入られて作用すると考えるならば、Insulin に似た構造のものが Insulin inhibitor としての働きをするかも知れないと考えて、Glucagon の影響を検討した。

又別な意味に於て、Glucagon の糖代謝に及ぼす作用の中で確認されているものは、肝の Glycogenolysis の速度を促進して、一過性ではあるが、急激に発生する高血糖惹起作用⁹¹⁾であるから、血糖降下を主な作用とする Insulin との拮抗性に関しても興味ある問題である。

Bürger⁹¹⁾, Erlick⁹²⁾⁹³⁾, Rossi⁹⁴⁾, 吉岡⁹⁵⁾等は Glucagon Insulin との協調作用を主張しているが、これに対して、Ferner⁹⁶⁾, Drury et al⁷⁸⁾, Young⁹⁵⁾等は、Glucagon は Insulin の作用に拮抗すると云つている。更に Candela⁹⁷⁾⁹⁸⁾はラット横隔膜法により、各濃度の Insulin に対して、一定量の Glucagon (200 γ /cc) を添加し、Insulin effect が Glucagon に依り抑制される事を報告している。一方阿部等⁹⁹⁾はラット横隔膜法に準拠して、Glucagon 5 γ /cc の添加に依り Insulin 効果の促進を認めている。之は Candela の報告と相反する。この両者の差違について問題になるのは Glucagon の濃度であるが、著者は阿部等と同様 5 γ /cc 添加

実験に於ても、Insulin effect の抑制を認めた。更に予め Glucagon 液中に浸した横隔膜片に於ても、同様 Glucose uptake 及び Insulin effect の抑制を認めた。依つて Glucagon は肝の Glycogenolysis を促進する他、末梢に於ては Insulin の利用を抑制し、Insulin inhibitor と見なされる如く作用して、血糖を上昇せしめるものと考えらる。

結 語

1) 横隔膜法に依る Insulin 測定法について検討し、測定条件に若干の考察を加え、Insulin 作用濃度標準曲線が、Insulin 濃度と Δ Glucose uptake の両対数に於て直線回帰が成立し、Insulin 量は Δ uptake より回帰方程式 $\log y = 3/10 \log x + \log 40$ に依つて算出される事を明らかにした。

2) 正常体と糖尿病体の血中 Insulin 量は次の如くであつた。正常人 $0.339 \pm 0.081 \text{ mu/cc}$ 、糖尿病患者 $0.125 \pm 0.115 \text{ mu/cc}$ 、正常家兎 $0.355 \pm 0.125 \text{ mu/cc}$ 、Alloxan 家兎 $0 \sim 0.08 \text{ mu/cc}$ 、正常犬 $0.158 \pm 0.082 \text{ mu/cc}$ 、除腺犬 $0 \sim 0.01 \text{ mu/cc}$ 。即ち糖尿病体に於ける Insulin activity の低下を明らかにした。

3) 負荷 Insulin が正常体より糖尿病体に於て血中停滞の遅延する事を確認し、Insulin 代謝に若干の検討を加えると共に糖尿病の原因が血中 Insulin 活性の低下に根源を発するもので無く、末梢に於ける Insulin 利用能の低下に原因するとの説に根拠を与えた。

4) Alloxan ラット横隔膜により、糖尿病体の末梢組織の Insulin 利用能が低下している事を証明した。

5) Glucagon が末梢に於ける糖摂取能及び Insulin 利用能を抑制し、Insulin inhibitor として働く成績を得 Insulin の作用機序並びに糖尿病発生機序に若干の考察を加えた。

稿を終るに臨み、本研究に対して終始御指導を仰ぎ、御校閲を賜つた吉田助教授に衷心より感謝致します。

参 考 文 献

- 1) Sanger, F.: Ciba Foundation Colloq. on Endocrinol. 9: 110, 1956.
- 2) Gemmill, C.L.: Bull. Johns Hopk. Hosp. 66: 232, 1940.
- 3) Gemmill, C.L.: Bull. Johns. Hopk. Hosp. 68: 329, 1941.
- 4) Stadie, W.C. and J.A. Zapp.: J. Biol. Chem. 170: 55, 1947.
- 5) Krah, M.E. and C.R. Park: J. Biol. Chem. 174: 939, 1948.
- 6) Permuter, M. et al.: Endocrinology. 30: 442, 1952.
- 7) Groen, J. et al.: J. Clin. Invest. 31: 97, 1952.
- 8) Randle, P.J.: Brit. Med. J. 1: 1237, 1954.
- 9) Randle, P.J.: J. Endocrinology. 14: 82, 1956.
- 10) Vallance-Owen, J. et al.: Lancet, 1: 68, 1954.
- 11) Vallance-Owen, J. et al.: Ibid., 1: 583, 1955.
- 12) 竹内節弥他: 日薬理誌, 53: 740, 1957.
- 13) 竹内節弥他: 日内泌誌, 32: 176, 1956.
- 14) Willebrands, A.F. et al.: Ned. Tsch. Genesk, 100: 817, 1956.
- 15) 竹内節弥: 日内泌誌, 34: 13, 1958.
- 16) Duncan, G.G.: Disease of Metabolism, 3rd Edition, P 858, 1952.
- 17) Soskin, S.: 糖代謝, 吉岡訳, P 276, 1956.
- 18) Willebrands, A.F. et al.: Science, 112: 277, 1950.
- 19) 吉川他: ワールブルグ検圧計, 化学の領域増刊, 13: 101, 1941.
- 20) 中山他: 第31回日内泌会発表, 1958.
- 21) Hansen, R.G.: J. Biol. Chem. 192: 243, 1951.
- 22) Krah, M.E. et al.: J. Biol. Chem. 170: 607, 1947.
- 23) Deuel, H.J. and A. Davis: J. Biol. Chem. 146: 649, 1942.
- 24) Kerly, M. and J.H. Ottaway: J. Physiol, 123: 534, 1954.
- 25) Gilmore, R.C. and L.T. Samuels: J. Biol. Chem. 181: 812, 1949.
- 26) Lundbaeck, K. and J.A.F. Steveson: Federation Proc. 7: 75, 1948.
- 27) Kerly, M. and J.H. Ottaway: J. Physiol, 123: 516, 1954.
- 28) 馬場茂明他: 日内泌誌, 35: 54, 1959.
- 29) Colowick, S.P., G.T. Cori and M.W. Stein: J. Biol. Chem. 168: 583, 1947.
- 30) Park, C.R.: Carbohydrate Metabolism, Johns Hopkins Press. P. 43, 1952.
- 31) Villee, C.A. and A.B. Hastings: J. Biol. Chem. 197: 673, 1949.
- 32) 辻昇三他: 日内泌誌, 34: 31, 1958.
- 33) 小島正守: 日内泌誌, 33: 915,

1957. 34) Gemmill, C.L. et al : Bull. Johns Hopkins Hosp. 68 : 50, 1941 35) Gey, G.O. and M.K. Gey : Am. J. Cancer, 27 : 45, 1936. 36) Vilee, C.A. et al : J. Biol. Chem. 195 : 287, 1952. 37) Walaas, E. and O. Walaas : J. Biol. Chem. 195 : 367, 1952. 38) Kahl, M.E. : Am. New York Acad. Sc. 54 : 649, 1951. 39) Glock, G.E. : Biochem. J. 63 : 520, 1956. 40) Soskin, S. and R. Levine : Carbohydrate Metabolism, 1952. 41) Hechter, O.R. et al : Proc. Soc. Exp. and Med. 46 : 390, 1941. 42) 竹内節弥他 : 膝臓と内分泌, 阿部他著より P242. 43) Vallance-Owen, J. et al : Lancet. II : 983, 1954. 44) Kelly, J.D.C. : Lancet, I : 668, 1956. 45) Vallance-Owen, J. et al : Lancet, II : 583, 1954. 46) Park, C.R. : Phosphorus Metabolism, Johns Hopk. Press, 2 : 634, 1952. 47) Bornstein, J. and C.R. Park : J. Biol. Chem. 205 : 503, 1953. 48) Bornstein, J. : J. Biol. Chem. 205 : 513, 1953. 49) Park, C.R. and M.E. Kahl : J. Biol. Chem. 181 : 247, 1949. 50) Ottaway, J.H. : Nature, 167 : 1064, 1951. 51) Ottaway, J.H. : Brit. Med. J. 2 : 257, 1953. 52) Randle, P.J. and F.G. Young : J. Endocrinol. 13 : 335, 1956. 53) Bornstein, J. and M.E. Kahl : Nature, 173 : 949, 1954. 54) 吉田秀雄他 : 日内泌誌, 34 : 705, 1958. 55) Young, F.G. : Recent. Prog. Hormone Res. 8 : 471, 1953. 56) Bornstein, J. and R.D. Lawrence : Brit. Med. J., 1 : 732, 1951. 57) Bornstein, J. and R.D. Lawrence : Brit. Med. J., II : 1541, 1951. 58) Willebrands, A.F. et al : Diabetes, 5 : 378, 1956. 59) 峰下鍬雄他 : 日内泌誌, 33 : 815, 1957. 60) 山田弘三他 : 日内泌誌, 34 : 379, 1958. 61) Gellhorn, E. et al : Endocrinology, 29 : 137, 1941. 62) Gellhorn, E. et al : Endocrinology, 29 : 849, 1941. 63) Dunn, J.S. et al : Lancet, 1 : 484, 1943. 64) Goldner, M.G. and G. Gomori : Endocrinology, 33 : 297, 1943. 65) Bailey, C.B. et al : Amer. J. Med. Sci. 208 : 450, 1944. 66) Bailey, C.B. : J. Amer. Med. Assoc. 122 : 1165, 1943. 67) Goldner, M.G. and G. Gomori : Endocrinology, 35 : 24, 1944. 68) 小坂樹徳他 : 最新医学, 8 : 714, 1953. 69) 小坂樹徳他 : 日内泌誌, 33 : 571, 1957. 70) Waters, E.T. and C.H. Best : Proc. Amer. Diabetes, Ass. 7 : 169, 1947. 71) Banting, F.A. and C.H. Best : J. Labor. Clin. Med. 7 : 251, 1922. 72) Stadie, W.C. et al : J. Biol. Chem. 199 : 729, 1952. 73) Elgee, N.J. et al : J. Clin. Invest. 33 : 1252, 1954. 74) Welsh, G.W. et al : Amer. J. Med. 21 : 324, 1956. 75) Welsh, G.W. et al : Diabetes, 5 : 15, 1956. 76) Solomon, A.B. et al : J. Clin. Invest. 35 : 170, 1956. 77) Williams, R.H. : Metabolism, 5 : 128, 1956. 78) Drury, D.R. et al : Diabetes, 3 : 129, 1954. 79) Haugaard, N. et al : J. Biol. Chem. 211 : 289, 1954. 80) Woerner, C.A. : Anat. Rec. 71 : 31, 1939. 81) Dunn, J.S. et al : J. Path. Bact., 55 : 245, 1943. 82) Bloom, B. : J. Biol. Chem. 215 : 467, 1955. 83) Milstein, S.W. : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 92 : 632, 1956. 84) Soskin, S. and R. Levine : Am. J. Physiol., 120 : 761, 1937. 85) Soskin, S. and R. Levine : Am. J. Physiol. 129 : 782, 1940. 86) Best, C.H. et al : Proc. Roy. Soc. London, B. 100 : 55, 1926. 87) Best, C.H. et al : Proc. Roy. Soc. London, B. 100 : 32, 1926. 88) Soskin, S. : 糖代謝, 吉岡訳. P202, 1956. 89) Noorden, C. : Die Zuckerkrankheit. Berlin. Springer 1928. 90) Naunyn, B. : Der Diabetes Mellitus. Wien. Hölder, 1899. 91) Bürger, H. and W. Brandt : Z. Ges. Exp. Med. 96 : 375, 1935. 92) Erlick, H. et al : J. Clin. Invest. 34 : 1830, 1955. 93) Erlick, et al : J. Clin. Invest., 35 : 757, 1956. 94) Rossi, E. et al : Schweiz. Med. Wschr. 87 : 1009, 1957. 95) 吉岡一 : 日内泌誌, 3 : 97, 1956. 96) Ferner, H. : Das Inselsystem des Pankreas, Georg Thieme, 1952. 97) Candela, J.L.R. : Ciba Foundation Colloq. on Endocrinol. 6 : 233, 1953. 98) Candela, J.L.R. and R.R. Candela : Ciba Foundation Colloq. on Endocrinol. 9 : 194, 1956. 99) 阿部正和他 : 内分泌, 3 : 299, 1956.