and biuronic acid in the local tissue were all markedly increased. Mercapto-imidazole in daily dose of 30 mg for 3 months could make a marked reduction of the local myxedema in size as well as a remarkable improvement of the general thyrotoxic condition. Furthermore, application of elastic bandages on the lesions after several local injections of hyaluronidase with oral mercapto-imidazole administration induced almost complete disappearance of the local myxedema.

2. The authors, therefore, believe that the exophthalmos and the localized myxedema in this case are caused by a similar pathogenesis, i.e., a marked local accumulation of the strikingly increased acid mucopolysaccharide in the tissues, particularly of hyouronic acid in the retroorbital and pretibial regions, resulting possibly from the longstanding TSH hyper-excretion of the anterior pituitary hormones.

Clinical and Experimental Studies on Diabetic Renal Disorder

I. Clinical Studies

By

Mutsumi NISHIGUCHI

Department of Internal Medicine, Division II, Kobe Medical College (Director : Prof. Shozo Tsuji)

Control of diabetes mellitus in recent years has become less difficult even with complicated with infection, however, the general vascular disorders, especially diabetic nephropathy, as a result of long standing metabolic disturbance will present a serious problem in the prognosis of diabetes. In spite of voluminous reports on the subject appearing in foreign countries, our domestic reports have been limited to a few. Present investigation is the report on the behaviours of renal circulation and glucose reabsorption from renal tubules by means of measuring renal plasma flow (RPF), renal blood flow (RBF), glomerular filtration rate (GFR) and tubular reabsorptive mass (TmG) in 50 diabetic patients. Then an attempt was made to analyze the relations between these findings with sex, age, severity, duration of the disorder, blood pressure, proteinuria, retinal finding and insulin sensitivity. In addition, renal biopsy was carried out on some of 50 diabetic cases. With the methods mentioned above diagnosis, severity, prognosis and etiology of the renal disorders have been studied. In brief, the disorders could be classified into three groups from the view point of glomerular function.

1. A group with normal glomerular function. (with RPF. 410~600 ml/min, including cases with GFR over 90 ml/min and RPF between 400~410 ml/min)

Among these cases, 58 percent belonged to this group. Many of them showed a short history of the disease with normal insulin sensitivity, negative proteinuria, normal blood pressure except a few cases of slight hypertension, and normal ophthalmoscopic finding except two cases which showed either high normal value or high value in TmG. Extremely high value of TmG were encountered in the cases of severe and moderately advanced diabetics. The GFR/TmG ratio showed low value in large number.

2. A group with glomerular hyperfunction. (with RPF over 600 ml/min)

Among these cases 16 percent belonged to this group. These cases were usually juvenile diabetics

and no one was over the age of 50. This group showed a short history of the illness with increased resistance to insulin.

Many cases of this group belonged to moderately advanced diabetes. Proteinuria and mild hypertension were seen in two of 8 cases. In two cases there were extensive retinal hemorrhages with renal hyperfunction and few histological findings of the kidney. This makes us to presume that the retinopathy has accrued prior to the onset of diabetic nephropathy. The TmG was elevated in all the cases. It is very interesting that the TmG is elevated in all the severe and moderately severe diabetics with normal or hyperglomerular function.

3. A group with glomerular hypofunction (with RPF below 410 ml/min)

Among the cases 26 percent belonged to this group. This group showed the highest age in average and the longest duration of the disease in three groups. 84.6 percent of this group showed a history of more than 5 years.

Many of these cases showed increased resistance to insulin, particularly cases with marked hypofunction of the glomeruli showed stronger resistance to insulin. Proteinuria was observed in all cases and hypertension as well as diabetic retinopathy were found in nearly all of them. TmG values were decreased in almost all cases exclusively to this group, and GFR/TmG ratio was decreased in all cases. Renal biopsy was carried out in cases showing remarkable hypofunction of glomeruli and revealed the nodular lesion or generalized hyalinization of the glomeruli as described by Kimmelstiel-Wilson.

Clinical and Experimental Studies on Diabetic Renal Disorder

II. Experimental Studies

By

Mutsumi NISHIGUCHI

Department of Internal Medicine, Division II, Kobe Medical College (Director : Prof. Shozo Tsuji)

For the purpose of studying the causal relationship between diabetic nephropathy and pituitary-adrenocortical function, alloxan diabetic dogs were treated with ACTH, prednisolone and cortisone respectively and their renal function was investigated on the glomerular and tubular function. Furthermore, morphological studies of the kidney were carried out to see correlation between functional and structural disorder.

The results are summarised as follows :

1. To analyze the impairment of renal function, which is induced by alloxan alone, 5 alloxan treated dogs without appearance of diabetes were investigated with clearance method. One week after alloxan treatment, 3 out of the 5 dogs showed a slight decrease of renal plasma flow (RPF), renal blood flow (RBF), glomerular filtration rate (GFR) and tubular reabsorptive mass (TmG), filtration fraction (FF) also showed a tendency to decrease. The remaining 2 cases showed little or no change on the first week after the treatment. The value in the second or third week revealed somewhat increased value than that of the first week, suggesting gradual restoration of the damaged renal function. Morphological changes were of little in these instances.

2. In the alloxan diabetic dogs the morphological changes of the kidney differed not so much from that of the alloxan treated non diabetic dogs. But the glomerular function showed tendency to increase. Particularly the TmG showed increase without exception thus causing a decrease of GFR/TmG.

3. Five cases of the alloxan diabetic dogs were fed with daily 2 mg/kg of prednisolone by a gastric tube for one week and then their renal function was investigated. The value of RPF, RBF, GFR and TmG all showed decrease, particularly in 2 dogs of this group. On histological examination, swelling of the glomeruli with thickening of the glomerular capillary wall, occasionally well circumscribed nodular formation in the capillary loop and aneurysm-like dilatation of the glomerular capillary loops were observed.

4. In case of the alloxan diabetic dogs treated with daily intramuscular administration of ACTH-depot, 2 mg/kg, for a week, the glomerular and tubular functions were remarkably depressed with the marked pathological changes showing of glomeruli and nodular change in the glomerular capillary tufts. In the advanced stage, aneurysm-like dilatation of the capillary with hyalinization of the nodular lesions resulting in generalized hyalinization were observed in some cases.

These findings resembled closely to the intercapillary glomerulosclerosis described by Kimmelstiel-Wilson.

5. In case of the alloxan diabetic dogs treated with daily intramuscular administration of cortisone, 5 mg/kg, for a week, in two of the 5 cases the glomerular and tubular function tests showed a slight fall in value, and in two of the other three cases the tests revealed higher in value than those in the pretreatment period, but lower than that of after the appearance of the diabetics. In the remaining case the renal function showed an increased value as compared with that in diabetic stadium. In the morphological studies, slight swelling of glomeruli, partial thickening and localized hyalinization of the capillary loops were observed.

6. The results of these experimental studies seemed to point out strongly the possible causal relationship between diabetic nephropathy and pituitary-adrenocortical hyperfunction, which will be superimposed on a longstanding pancreatic diabetes.

“Studies on the Separation and the Extraction of Anterior Pituitary Hormone by Paper-electrophoresis.”

By

Matsuto MOCHIZUKI

Department of Obstetrics and Gynecology, Kobe Medical College (Director : Prof. Yasuo Ueda)

Studies on the apparatus of horizontal paper-electrophoresis and continuous paper-electrophoresis with cooler. (1st Report)

a) Employing the paper-electrophoresis of natural cooling system, the experiment at temperature higher than 25°C in summer was found to be difficult for obtaining the clear separating figures.

b) Utilizing the cooler, even under the room temperature higher than 25°C., which keeps it lower than the normal temperature. Freezing mixture, if employed, make experiments possible by its effect of lowering temperature ten more degrees.

糖尿病性腎障害に関する臨床的並に実験的研究

第1編 臨床的研究

神戸医科大学第二内科学教室（指導 辻 昇三教授）

西 口 睦

第1章 緒 論

1936年 Kimmelstiel 及び Wilson¹⁾ は浮腫、蛋白尿、高血圧を合併した糖尿病患者の糸球体に、結節型硝子様物質が毛細管間質に存在するのを認め、これを“Intercapillary glomerulosclerosis”と名付け、糖尿病に於ける特有の病態としたが、同年我が国に於ても村上²⁾は、糖尿病腎に於ける腎小体の変化に関する知見を発表し、Kimmelstiel 及び Wilson の述べたと同様の病変を認めている。さらに遡つて昭和3年和久³⁾は糖尿病に於ける腎糸球体の変化について発表しており、糖尿病糸球体の病理組織学的変化に注目した初の記載は本邦の学者によつてなされている。その後多くの研究者により糖尿病性腎症 diabetic nephropathy を含めた糖尿病性血管障害に就いての病理組織学的或は臨床的検索がなされ、Kimmelstiel 及び Wilson の云う Intercapillary glomerulosclerosis が糖尿病に特有のものであるか^{4)~13)}、結節型硝子様塊のみでなく、瀰漫性病変をも糖尿病性の病変と見做すべきか⁵⁾⁸⁾¹⁰⁾¹³⁾¹⁴⁾⁵⁶⁾、或は硝子様結節は毛細管間質 (intercapillary) に存在するのではなく、糸球体毛細管壁 (intramural) にあるのではないか⁷⁾¹⁵⁾等の問題が提起され検討されると共に、病理組織学的所見と臨床症状との関連⁵⁾¹⁰⁾¹³⁾¹⁴⁾並びに臨床症状の統計的観察^{8)~10)13)14)17)18)20)22)}、さらには成因要素に就き種々の報告を見ている。

近年糖尿病の代謝障害の調節が食餌療法及びインシュリン療法の改善により、さらには糖尿病治療内服剤の発達により、可成り容易に調整せられる様になつた為、糖尿病罹患後の生存年数は延長し且つ糖尿病性昏睡による死亡は著しく減少した。又糖尿病患者の重要な死因であつた肺結核、肺炎、肺壞疽並びにその他の細菌感染症は種々の抗結核剤、スルファミン剤及び抗生物質の長足の進歩と共に激減した。これに代つて長年月に渉る代謝障害の結果として現われる血管病変による心冠状動脈疾患、脳血管障害、腎障害による死亡の頻度が益々増加しつつある傾向は、種々の統計的観察によつても明かにされている。この様に多発傾向を示す糖尿病性血管障害の成立に対しては長期罹患が最も重視されているが、腺内分泌障害以外の多腺性内分泌障害も亦大いに重視されている。又これらの中糖尿病性腎症に関しては、本邦に於ても臨床面よりの報告も次第に集積しつつある現況である。然し乍ら糖尿病全般に於ける腎血流動態並びに尿細管の葡萄糖再吸収に対する態度に就いては未だ組織的な検索も少く、且つ剖検による組織学的研究はなされていても、臨床的に糖尿病性腎症の診断の決定は必ずしも容易ではない。又従来の検査所見のみでは、臨床症状と腎の組織学的病変の程度の不一致を見る事も屢々である。著者はここに於て、本邦人に於ける糖尿病性腎症の発生過程を明かにするために、従来の一般的検査法に加うるに、クリアランス法に依る腎臓機能検査を併用し、殊に腎糸球体機能と尿細管機能中特に糖代謝に關係のある尿細管の葡萄糖再吸収極量の変化と同時に追求し、これと性、年齢、重症度との關係並びに罹病期間、血圧、尿蛋白、眼底所見、インシュリン感受性との関連を検討した。さらに腎機能低下著明で臨床的に Kimmelstiel-Wilson 氏症候群と診断されたものには、腎生検を行つて病理組織学的所見を観察し臨床所見との対比を行なつた。以下これ等の結果を報告する。

第2章 実験対象並に実験方法

検査対象としては既往に腎疾患、高血圧のない糖尿病入院患者を無選択に選び、糸球体機能として腎血漿流量（以下 RPF と略す）、腎血流量（以下 RBF と略す）、糸球体濾過量（以下 GFR と略す）、濾過率

(以下 FF と略す) 及び尿細管葡萄糖再吸収極量 (以下 TmG と略す), 並びに GFR/TmG 比を測定し, 年令, 性別, 重軽症別, 罹病年月, 尿蛋白, 血圧, 眼底所見, インシュリン感受性との関連を検索した.

人に於ける糸球体機能測定法としては, RPF 測定にはパラアミノ馬尿酸ソーダ (以下 PAH と略す), を用い²⁷⁾²⁸⁾, GFR 測定にはチオ硫酸ソーダ (以下 STS と略す) を使用し²⁹⁾³⁰⁾, 実施には Smith の変法を用いた²⁷⁾³¹⁾. 即ち通常入院時に諸種一般検査終了後で未だ治療を行なはない以前に測定し, 必要によつては治療中にも実施したが, この際には少くとも24時間インシュリン注射, 抗糖尿病剤の服用を禁じ, 又検査前日は, パス, サルファ剤等 PAH 測定に支障を予想される薬剤の投与を中止し, 勿論葡萄糖, ペニシリン注射を禁止し, 且つ其他にも循環系に影響のある薬剤の投与は行はなかつた. 検査当日は, 朝食の絶食を行なはしめたが, 前夜の食餌はその時の自然の状態を観察する為制限を加えなかつた.

試験前1時間に水 500cc を飲用せしめ, 試験 5 分前にヘマトクリット測定用及び盲検用として採血, イルリガートル中に10%を PAH 20cc, 10% STS 100cc 容れ, 生理的食塩水を加えて300ccとし, 初めの5分間は10 cc/min, その後は3~4 cc/min の速度で点滴静注を行なう. 20分後各薬液は血中に一様に分布されるから, カテーテルを以て排尿せしめ, クリアランスの開始とする. 25分後採血, 38分採血, 40分採尿, 55分採血, 60分採尿と順に行なう. カテーテルによる採尿不能の際は, 止むを得ず Foà の方法³¹⁾³²⁾に従い簡易法を用いた. 採血, 採尿終了次第速に夫々の材料についての PAH, STS 定量を行なつた.

TmG の測定には, 50%葡萄糖を血糖に応じて増減したが, その120~300ccに10% STS 80ccを加え, 生理的食塩水をもつて500ccとし, 初めの5分は 20cc/min, その後は6~8 cc/min の速度で点滴静注し, 注射開始より20分後排尿, 22分採血, 40分採尿, 58分採血, 60分採尿と順に行なつた. 採尿, 採血後各材料につき直ちに葡萄糖及び STS の定量を行なつた.

排, 採尿はカテーテルを検査中留置とし, 排, 採尿後20ccの滅菌蒸留水をもつて2回洗滌, 次で約20ccの空気を送入して吸引, 膀胱を完全に空虚ならしめた. 採血の際はヘパリンを以て血液凝固を防いだ. 排, 採尿, 採血終了時刻は正確に秒迄記入した. なお糸球体機能並びに尿細管機能測定にあたり, 腎機能障害が, 他の検査によつて知られている際は, PAH, STS の注入量を減じ, 検査中 PAH の血漿中濃度が 5 mg/dl 以下にある様加減し, 又試験前数日の血糖値より, 血漿糖量が500~800mg/dlになる様, 葡萄糖の量を増減した. 検査中は, 点滴速度の一定なる事, 膀胱を完全に空虚にする事, 採尿, 採血の時刻を正確に記入する事に特に留意した.

PAH 定量は²⁷⁾²⁸⁾³⁴⁾硫酸カドミウム液及び苛性ソーダにて除蛋白し, 1.2N塩酸, 0.1g/dl亜硝酸ソーダ, 0.5g/dlスルファミン酸アンモンと順次加え, 0.1g/dlN-(1-ナフチル)-エチレンジアミン重塩酸塩にて発色せしめ, コールマン光電比色計でフィルター540mμを以て比色定量した.

STS 定量には, Brun の方法を用いた. 即ち Folin-Wo 法に従い除蛋白を行い, 塩酸酸性に於て澱粉を指示薬とし沃度を以て滴定した.

血糖はSomogi 氏法³³⁾を用い, 尿酸定量には Pavy-隈川氏法を用いた.

ヘマトクリット値はヘマトクリット管を用い, 30分3,000回転せしめ, その時の目盛を読みさらに10分間回転せしめ, 前回と同じ読みが得られた時, その目盛の読みを以て Ht 値としたが, この際白血球の層をも含めた.

RBF は $RPF \times \frac{100}{100 - Ht}$ なる式にあてはめた. なお身長, 体重より Du-Bois, Boothby, Sandiford のモノグラムをもつて体表面積を求め, 日本人の標準体表面積 $1.48m^2$ について補正を行なつた.

重軽症別の判定には, 使用インシュリン量によつて定める人もあるが, 著者は経口的葡萄糖二重負荷試験に於て, 血糖の最高値が100~200mg/dlの間にあるものを軽症, 200~300mg/dlの間にあるものを中等症, 300~400mg/dlの間にあるものを亜重症, 400mg/dl以上のものを重症とした.

罹病年月は患者の訴えを元とした為いささか正確を欠くが, 口喝, 多飲, 多尿, るい瘦, 齒槽膿漏を初めとする細菌感染症等々, 自覚症状の数種が合併した時, 或は殆んど自覚症状を有しないものでは, 初めて尿

糖を発見せられた時を以て糖尿病の初発としたので、実際よりは潜伏性にあつた期間だけ短く記録されている。

尿蛋白は最も鋭敏で多少定量的意味もあるズルフォサリチル酸試験の結果を記した。

眼底検査所見は、本学眼科受診の際の所見を記載したが、散瞳せしめないで検査した例が殆んどであり、且つ白内障により眼底を透視し得なかつた例もあり、その眼底異常の濃度は実際よりは少くなつてゐる。

インシュリン降下試験は一率に単純インシュリン10単位

第1図 全症例年令別分布

第3図 全症例重軽症別年令分布

第2図 全症例重軽症別分布

第4図 全症例年令別重軽症分布

皮下注射の際の降下の割合を百分率を以て示した。

なお臨床的に尿蛋白陽性で、高血圧(最高血圧150mmHg以上,最低血圧90mmHg以上を算えるもの)を見、且つ眼底に動脈瘤、出血、滲出像等所謂糖尿病性網膜症 diabetic Retinopathy を有するものの一部には腎生検を行なつたが、これには Needle-Biopsy を用い可及的に糸球体を数多く、且つ数カ所より採取する事に努めた。

第3章 実験成績

I 全症例の展望

1. 糖尿病患者総数50例中、男は72%,女は28%であつた。
2. その年齢分布は図1の如くで、50才代に最も多く、40~60才代の総計は74%で圧倒的に多かつた。
3. 重症別分布は図2に示したが、中等症、亜重症のものが比較的多かつた。
4. 重症別の年齢分布(図3)と、年齢別の重症別分布(図4)を見ると、若年者には、重症、亜重症の多い事が知られた。

第1表 全症例のインシュ

リン降下率分布

降下率	%
-10% 以下	0
-20% 代	20.4
-30% 代	22.5
-40~-45%	6.1
-46~-49%	12.3
-50~-55%	16.3
-56~-59%	6.1
-60% 代	14.3
-70% 代	2.0

第5図 高血圧合併の年齢別分布

全症例との対比

第2表 高血圧合併と
推定罹病年月

推定罹病年月	%
1ヶ月~4年	10.5
5 ~ 9年	31.6
10 ~ 20年	47.4
21年以上	10.5

5. インシュリン降下率の分布は表1の如くで、-45%以下のものは49.0%, -45%以上のものは51.0%で、インシュリン感性については正常例と低下例とが略々相半ばした。

II 高血圧との合併

入院時又は入院経過中に、最高血圧150mmHg以上を算えたものの頻度は全症例の34%であつた。

1. 高血圧合併患者中、男は52.9%,女は47.1%で、患者総数の男女比より見て女に高率に現われている。
2. 高血圧合併と年齢との関係を図5に示したが、50才代で最高となり、50才代60才代の総計は63.1%あつた。20才代で10.5%を示した事は、若年者糖尿病にも血管障害の発現する事を示し、先の若年者糖尿病には重症型が多い事と共に興味ある事であつた。
3. 高血圧合併と推定罹病年月との関連を表2に示したが、その89.5%は5年以上で、罹病経過が5年を超えると高血圧合併の頻度は増加する。
4. 高血圧合併と重症別との関係は図6の如く、中等症に最も多く次で亜重症に多かつた。
5. 高血圧と尿蛋白並びに糖尿病性網膜症との関係を表3に示したが、最高血圧150mmHg以上のものには、尿蛋白、糖尿病性網膜症の発生の頻度が多くなり、高血圧と蛋白尿又は糖尿病性網膜症合併は略々平行した。
6. 高血圧合併とインシュリン降下率との関係は表4に見られる如く、-45%以下を示したものは66.6%

第6図 高血圧合併の重軽症別分布
全症例との対比

第3表 血圧と尿蛋白及び糖尿病性網膜症との関係

血圧 mm Hg	尿蛋白%	糖尿病性網膜症%
99 以下		
100~149	31.6	33.4
150~159	15.8	20.0
160~169	26.3	13.3
170~179	5.3	6.7
180~189	10.5	13.3
190 以上	10.5	13.3

第4表 高血圧合併とインシュリン
降下率との関係(全症例との対比)

降下率	高血圧合併の分布%	全症例の分布%
-10 %以下	0	0
-20 % 代	33.4	20.4
-30 % 代	16.6	22.5
-40~-45%	16.6	6.1
-46~-49%	11.1	12.3
-50~-55%	11.1	16.3
-56~-59%	5.5	6.1
-60 % 代	5.5	14.3
-70 % 代	0	2.0

第7図 蛋白尿合併の年齢別分布
全症例との対比

を算え、高血圧を合併したものは、全症例のそれに比し、インシュリンに抵抗性を有するものが多かった。

Ⅲ 蛋白尿の合併

入院時及び入院経過中に、尿にズルフォサリチル酸試験で陽性を示した頻度は40%であつた。

1. これを男女別に見ると、男は60%，女は40%で、患者総数の男女比より見ると多少女の比率が高くなっている。

2. 蛋白尿を合併するものを年齢別に見ると図7の如く、50才代で最も多く、50才代、60才代の総計は60%となつている。

3. 蛋白尿合併と推定罹病年月との関係は表5に示したが、5年以上の総計は75%で、罹病経過が5年を超えると蛋白尿合併の頻度が増す事を示した。

4. 蛋白尿合併と重軽症別の関係は図8の如く、中

第5表 蛋白尿合併と
推定罹病年月

推定罹病年月	%
1ヶ月～4年	25.0
5～9年	35.0
10～20年	30.0
21年以上	10.0

第8図 蛋白尿合併の重軽症別分布
全症例との対比

第6表 蛋白尿合併とインシュリン

降下率との関係(全症例との対比)

降下率	蛋白尿合併の分布 %	全症例の分布 %
-10 %以下	0	0
-20 %代	37.1	20.4
-30 %代	15.8	22.5
-40~-45%	10.5	6.1
-46~-49%	10.5	12.3
-50~-55%	15.8	16.3
-56~-59%	0	6.1
-60 %代	10.5	14.3
-70 %代	0	2.0

第9図 糖尿病性網膜症合併の年令別分布
全症例との対比

等症のものに最も多く、亜重症が之に次いだのは高血圧合併の場合と同様であつた。

5. 蛋白尿合併とインシュリン降下率との関係は表6に見られる如く、-45%以下のものは63.4%あり、蛋白尿を合併するものは、全症例のそには比し、インシュリンに抵抗性を有するものが多かつた。

IV 糖尿病性網膜症の合併

入院時及び入院経過中に糖尿病性網膜症を合併した頻度は28%であつた。

1. 糖尿病性網膜症合併の男女比は、男は71.4%、女は28.6%で、患者総数の男女比と大差なかつた。

2. 糖尿病性網膜症合併を年令別に観察すると、図9の如く、50才代で最高を示し、50才代、60才代の総計は58.1%で、高血圧並びに蛋白尿合併がやはり50才代、60才代に多い事と同様であつた。

第10図 糖尿病性網膜症合併の
重軽症別分布
全症例との対比 第7表 糖糖尿病性網膜症
合併と推定罹病年月

推定罹病年月 %	%
1ヶ月~4年	14.3
5 ~ 9年	35.7
10 ~ 20年	35.7
21年以上	14.3

3. 糖尿病性網膜症合併と推定罹病年月との関係は、表7に示したが、85.7%は5年以上の罹病経過を有し、高血圧並びに蛋白尿合併が5年以上の経過のものに高率に見られる事と共に興味ある点であつた。

4. 糖尿病性網膜症合併と重軽症別の関係は図10の如く、中等症に最も多く、亜重症がこれに次ぎ、軽症には最も少なかつた。

5. インシュリン降下率との関連は、表8に示した様に-45%以下は76.9%あり、インシュリン抵抗性を有するものが多い事を示した。

V 高血圧、尿蛋白、糖尿病性網膜症の三者を同時に合併せるものの頻度は20%

1. このうち男は80%、女は20%で、女に高率に見られる事はなかつた。

2. 三者合併と年令との関係は、50才代に最高で、60才代が之に次ぎ、その合計は60%であつた。

3. 三者合併と推定罹病年月との関係は表9に見られるが、その90%は5年以上の経過を有している。

4. 三者合併と重軽症との関係は図12の如く、中等症、亜重症に多く、軽症のものにも20%あつたが、三者が合併したものでは軽症が多いという結果は得られなかつた。

第8表 糖尿病性網膜症合併と
インシュリン降下率との関係
(全症例との対比)

降下率	糖尿病性網膜症合併の分布 %	全症例の分布 %
-10 %以下	0	0
-20 % 代	38.4	20.4
-30 % 代	23.1	22.5
-40~-45%	15.4	6.1
-46~-49%	7.7	12.3
-50~-55%	0	16.3
-56~-59%	0	6.1
-60 % 代	15.4	14.3
-70 % 代	0	2.0

第9表 高血圧、尿蛋白、
糖尿病性網膜症合併と
推定罹病年月

推定罹病年月	%
1ヶ月～4年	10.0
5～9年	30.0
10～20年	50.0
21年以上	10.0

第10表 高血圧、蛋白尿、糖尿病性網膜症合併と
インシュリン降下率との関係
(全症例との対比)

降下率	高血圧、尿蛋白、糖尿病性網膜症合併の分布 %	全症例の分布 %
-10 %以下	0	0
-20 % 代	44.5	20.4
-30 % 代	11.1	22.5
-40~-45%	22.2	6.1
-46~-49%	11.1	12.3
-50~-55%	0	16.3
-56~-59%	0	6.1
-60 % 代	11.1	14.3
-70 % 代	0	2.0

第11図 高血圧、蛋白尿、糖尿病性
網膜症合併の年齢別分布
全症例との対比

第12図 高血圧、尿蛋白、糖尿病性
網膜症合併の重症別分布
全症例との対比

5. 三者合併とインシュリン降下率との関係は、表10に見られる如く、77.8%は-45%以下であつた。

Ⅵ 糖尿病患者の腎機能

正常人に於ける腎クリアランス値は表11に示したが、23～50才の男8例、18～48才の女5例、総数13例の値である。RPFの測定範囲は、484.8～619.3cc/min，平均545.3±14.3cc/min であり、RBFの測定範囲は、874.5～1124.0cc/min，平均値は983.1±

26.4cc/min，GFRは96.6～122.8cc/min，平均値は、109.2±9.6cc/min，FFは、0.182～0.236，平均値は、0.201±0.014であつた。これらの値は、諸家の本邦人に就ての測定値⁽³¹⁾⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾と大差はない。

糖尿病患者に於ける腎クリアランス値は、RPFは最低113.9cc/minより最高863.6cc/min，RBFは最低174.3cc/minより最高1514.9cc/min，GFRは最低23.0cc/minより最高166.8cc/min，FFの測定範囲は、0.159～0.290，TmGは、最低166.8mg/minより最高579.6mg/min迄種々あつたが、著者は便宜上RPF及GFRを参照して、これを3群に分類した。即ち第1群は糸球体機能正常群で、RPFが、410cc/min以上600cc/min迄のものとしたが、RPFが410～400cc/minの範

第11表 正常人腎クリアランス値

No.	年令	性	RPFcc/min	RBFcc/min	GFRcc/min	FF
1	23	♂	520.9	946.9	122.8	0.236
2	24	♂	560.8	1015.0	113.3	0.202
3	28	♂	486.0	874.5	104.6	0.215
4	29	♂	484.8	881.3	98.3	0.203
5	31	♂	595.6	1091.2	117.2	0.197
6	32	♂	619.3	1124.0	124.1	0.200
7	36	♂	603.4	1086.1	113.3	0.188
8	50	♂	492.1	890.7	104.3	0.212
9	18	♀	529.9	942.3	97.8	0.185
10	23	♀	532.7	932.8	105.9	0.199
11	28	♀	586.6	1044.1	114.9	0.196
12	33	♀	544.9	986.3	106.8	0.196
13	48	♀	531.9	964.8	96.6	0.182
平	均		545.3±14.3	983.1±26.4	109.2±9.6	0.201±0.014

図にあるものでも GFR が90cc/min を超えるものは、この群に含めた。

第二群は糸球体機能がかえつて亢進している群で、RPF が600cc/min 以上のものを集めた。第三群は、糸球体機能低下群で、RPF が410cc/min 以下のものである。

A. 第一群即ち糸球体機能正常群

表12に示したが、29例あり全症例の58%であつた。

そのうち男は22例、75.9%、女は7例、24.1%で、全症例の男女比と較べて大差はなかつた。

第12表 糸球体機能正常群

番号	氏名	年令	性	重症軽別	推定罹病年月	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	尿蛋白	血圧 mmHg	眼底所見	インシュリン降下率 %
1	丸○	55	♂	亜重	1年	553.3	863.1	85.4	0.16	338.3	0.252	(-)	133/76	(-)	-5.13
2	三○	48	♀	中等	1年	500.8	831.3	108.5	0.21	386.2	0.281	(-)	126/80	(-)	-36.7
3	大○	58	♂	中等	5年	554.7	1004.0	98.4	0.18	327.2	0.264	(-)	160/100	(-)	-28.4
4	野○	52	♀	中等	2年	487.7	802.0	80.4	0.16	324.3	0.248	(±)	166/78	(-)	-50.7
5	森	49	♀	重	4ヶ月	458.8	835.0	103.9	0.22	429.4	0.242	(-)	130/88	白斑 少数	-31.4
6	奥○	52	♂	中等	20年	426.0	852.0	79.9	0.20	311.9	0.256	(±)	168/98	(-)	-51.0
7	安○	58	♂	亜重	2ヶ月	407.6	933.4	92.0	0.22	422.6	0.218	(-)	114/74	(-)	-39.5
8	岡○	53	♂	重	5年	536.1	1011.0	125.4	0.31	579.6	0.216	(±)	114/85	(-)	-66.7
9	増○	52	♂	重	2年	406.6	767.2	101.5	0.25	457.1	0.222	(-)	135/74	(-)	-28.4
10	本○	41	♂	軽	6ヶ月	555.7	974.6	116.7	0.21	316.6	0.369	(-)	110/80	(-)	-58.3
11	三○	59	♀	亜重	2年	496.8	903.2	144.4	0.29	439.3	0.329	(-)	150/78	(-)	-63.2
12	林	18	♂	重	1年	386.4	694.8	96.0	0.24	416.1	0.231	(-)	106/70	(-)	-37.0
13	形○	52	♂	軽	6ヶ月	562.3	991.8	125.4	0.22	507.9	0.247	(-)	142/96	(-)	-62.3
14	崎	36	♂	亜重	2年	568.5	1033.6	121.8	0.21	490.2	0.248	(-)	132/68	(-)	-53.6
15	岡○	51	♂	中等	1ヶ月	450.3	818.7	108.9	0.24	432.7	0.257	(-)	104/80	(-)	-48.0
16	原○	46	♂	亜重	25年	530.9	965.2	134.5	0.25	470.2	0.286	(±)	140/80	(-)	-51.0
17	中○	66	♀	中等	1年	416.6	759.4	93.4	0.22	323.3	0.289	(-)	110/68	(-)	-35.9

18	中	○	36	♂	亜重	2 年	492.8	895.9	111.8	0.23	482.3	0.232	(-)	115/80	(-)	-78.9
19	牛	○	45	♂	重	3 年	596.2	1045.7	140.1	0.24	479.5	0.292	(-)	100/70	(-)	-58.0
20	塚	○	60	♂	中等	25 年	518.7	910.8	104.6	0.20	308.4	0.339	(-)	128/50	出血斑少数 白内障	-62.0
21	榊	○	30	♀	軽	2ヶ月	426.6	735.4	98.2	0.23	371.1	0.264	(±)	110/60	(-)	-35.0
22	森	○	56	♂	亜重	30 年	524.0	988.4	92.2	0.18	418.8	0.220	(-)	142/76	(-)	-64.0
23	清	○	53	♂	中等	1.5年	599.2	1152.2	115.0	0.19	391.6	0.293	(-)	126/72	(-)	-58.3
24	日	○	45	♂	亜重	9ヶ月	563.2	1099.5	109.9	0.20	386.6	0.284	(-)	122/62	(-)	-48.0
25	高	○	44	♂	軽	5ヶ月	430.5	780.6	105.6	0.24	347.3	0.304	(-)	142/70	(-)	-27.6
26	泉	○	41	♂	亜重	3ヶ月	536.4	970.9	102.0	0.19	373.0	0.273	(-)	132/70	(-)	-69.2
27	○井	41	♂	軽	7ヶ月	569.4	1032.3	106.7	0.19	367.4	0.290	(-)	122/60	(-)	-53.4	
28	井	○	48	♀	亜重	9ヶ月	493.5	902.2	105.2	0.21	341.7	0.308	(-)	158/70	(-)	-45.6
29	松	○	32	♂	軽	1 年	503.2	914.8	99.1	0.20	312.9	0.317	(-)	114/66	(-)	-37.4

1. 第一群の平均年齢は47.5才で、その年齢別分布は、図13の如く、50才代、40才代に多く、40才代に34.4%見た事は、先の高血圧、蛋白尿、糖尿病性網膜症合併並びに三者同時合併のものは、50才代、60才代に多かつたのと較べて、高令になる程血管障害の頻度が増す事を裏付けた。

2. 推定罹病年月との関係を見ると平均4.2年で、その分布は表13の如く、4年以下のものが79.4%と大半を占めていた。なお20年を超えた4例では、糖尿病の調節が必ずしも良好であつたとは云えなかつた。

3. 軽重症別に之を見ると図14の如くで、亜重症が最も多かつたが略々平均して分布されている。

4. インシュリン降下率は平均-49.3%で、その関係は表14に示したが、-45%以下のものに37.9%であ

第13図 糸球体機能正常群の年齢別分布

全症例との対比

第13表 糸球体機能正常群の罹病年月分布

推定罹病年月	%
1ヶ月～4年	79.4
5～9年	6.9
10～20年	3.4
21年以上	10.5

第14図 糸球体機能正常群の

軽重症別分布

全症例との対比

第14表 糸球体機能正常群と

インシュリン降下率との関係

(全症例との対比)

降下率	糸球体機能正常群の分布 %	全症例の分布 %
-10 % 以下	0	0
-20 % 代	10.3	20.4
-30 % 代	24.1	22.5
-40～-45%	3.5	6.1
-46～-49%	6.9	12.3
-50～-55%	20.7	16.3
-56～-59%	10.4	6.1
-60 % 代	20.7	14.3
-70 % 代	3.4	2.0

第15表 軽症別による

TmG 平均値

重 軽 症	平均 TmG mg/min
重 症	472.3
亜 重 症	416.3
中 等 症	356.3
軽 症	370.5

つた。即ち罹病経過の短い糸球体機能正常のものでは、未だ多腺性の要素の加味が少い事を物語っている。

5. FF は0.16~0.31の範囲にあり、略々正常のものが多く、平均は0.217であつた。

6. TmG は最低311.9mg/min より最高579.6mg/min 迄あり、殆んどが正常値より高値は示し、特に重症、亜重症のものは高値をとつた。重軽症別に TmG の平均値を見ると表 15の如く、病状の重い程 TmG の平均値は高かつた。

7. GFR/TmG を見ると測定範囲は0.329~0.216であつたが、平均値は0.271で Smith の示した正常値^(*)より低いものが多く、この群では TmG とGFR が必ずしも平行しない事を示した。

8. 尿蛋白はズルフォサリチル酸試験で痕跡程度のもの5例を除き、総て陰性であつた。

9. 血圧は150mmHg以上のものは5例あつたが、いずれも170mmHgを超えず、その他は略々正常であつた。

10. 眼底所見に就ては、少数の眼底滲出像を見た2例を除き総て所見を有しなかつた。

B. 第二群、糸球体機能亢進群

糸球体機能亢進群は8例あり全症例の16%であつた。そのうち男は6例、75%、女は2例、25.0%で、全症例の男女比と較べ大差はなかつた。この群のものは表16に示したが、著者の予想に反し亢進例を見た事は特異であつた。

第16表 糸球体機能亢進群

番号	氏名	年令	性	重症軽別	推定罹病年月	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	尿蛋白	血圧 mmHg	眼底所見	インシュリン降下率 %
1	末○	18	♂	重	7 年	677.2	1225.7	107.6	0.16	550.6	0.195	(-)	120/68	出血斑多数	-30.3
2	魚○	25	♀	亜重	5 年	729.4	1167.0	152.1	0.20	461.6	0.329	(+)	150/103	出血斑多数	-26.1
3	伊○	45	♂	亜重	4 年	812.7	1396.0	152.6	0.18	392.0	0.389	(-)	126/66	(-)	-31.0
4	清○	48	♂	中等	3 年	706.9	1279.5	147.5	0.28	398.2	0.370	(+)	142/92	(-)	-27.0
5	朴	37	♂	亜重	3 ヶ月	863.6	1514.9	155.9	0.18	402.1	0.388	(-)	110/80	(-)	-49.4
6	有○	38	♂	亜重	1 年	676.5	1219.8	109.3	0.16	426.5	0.228	(-)	124/62	(-)	-41.4
7	宮○	48	♀	中等	6 ヶ月	674.7	1229.2	163.9	0.24	407.3	0.402	(-)	158/92	(-)	-59.1
8	橋○	16	♂	重	9 ヶ月	649.7	1181.2	158.4	0.24	439.4	0.361	(-)	120/70	(-)	-52.0

1. 糸球体機能亢進群の平均年令は34.4才で、三群中最も低く、その年令分布は図15に示した如く、62.5%は40才以下で、50才以上のものは皆無であつた。

2. 推定罹病年月との関係は表17に見られる様に、75.0%は5年以下であり、10年を超える長期罹病経過をもつものはなかつた。

第15図 糸球体機能亢進群の年令別分布

全症例との対比

第17表 糸球体機能亢進群と罹病年月

推定罹病年月	%
1ヶ月～4年	75.0
5～9年	25.0
10～20年	0
21年以上	0

第16図 糸球体機能亢進群の
重軽症別分布
全症例との対比

第18表 糸球体機能亢進群とインシュリン
降下率との関係全症例との対比

降下率	糸球体機能亢進群の分布 %	全症例の分布 %
-10 %以下	0	0
-20 % 代	25.0	20.4
-30 % 代	25.0	22.5
-40~-45%	12.5	6.1
-46~-49%	12.5	12.3
-50~-55%	12.5	16.3
-56~-59%	12.5	6.1
-60 % 代	0	14.3
-70 % 代	0	2.0

3. 重軽症別分布は図16に示したが、重症，亜重症のものが殆んどで，血糖も高く尿糖排泄量も多いものが多く，亢進群中には軽症者は見られなかった。

4. インシュリン降下率との関係は表18の如く，62.5%は-45%以下で，全例平均は-39.5%であり，インシュリンに抵抗性を有するものが多い事がうかがえた。

5. FF は略々正常範囲にあり，一定の傾向は見られず，その平均は0.205であつた。

6. TmG に関しては全例亢進しており，平均値は434.7mg/min であつた（表16参照）。

7. GFR/TmG は，平均0.333で，2例は除き他は GFR と TmG の平行関係が見られた。3 群中平行の見たれたのは，この亢進群のみであつた。

8. 尿蛋白は2例に陽性であつた。

9. 血圧は2例に軽度上昇が見られた。

10. 眼底所見は No. 1 及び No. 2 に於て入院経過中眼底に多数の出血斑を見たが，眼底出血後に測定した値も，糸球体機能亢進並びに TmG の高値を見ており，糖尿病性網膜症と糖尿病性腎症といずれが先行するか，或は同時に発生するかの問題に関して，尠くともこの例の成績から判断すると，腎機能面より見る場合，腎機能障害よりは糖尿病性網膜症が先行すると考えられた。No. 2 は関しては眼底出血後旬日にして腎生検を行つたが，その病理組織学的所見は（写真1参照）糸球体は軽度に腫大し，毛細管壁の軽度の肥厚あり，細胞増生は少く，ボーマン氏嚢と蹄系の癒着があり，ボーマン氏嚢中に硝子様物質を容れるものがあつたが，全般として腎変化は極軽微であつた。腎機能並びに腎組織学的所見より，糖尿病性網膜症が腎血管障害に先行したとの印象を受けた。

C 第三群，糸球体機能低下群

表19に示したが13例あり，全症例の26%であつた。

そのうち男は9例，69.3%，女は4例，30.7%で全症例の男女比と較べ，女にやや高率に現われているが，特に女に多いという結果は得られなかつた。

1. 年令よりこれを見ると平均年令は54才で，3 群中最高を示し，その年令分布図は図17の如く，69.2%は50才代，60才代であつた。

2. 推定罹病年月との関係は表20に示したが，平均罹病経過は10.3年で3 群中最高であり，その84.6%は5年以上の経過を有していた。即ち高年者で5年以上の経過を有する糖尿病患者では，血管障害合併の瀬度が増す事を示している。

3. 重軽症別より見ると図18の如く，中等症に最も多く，重症，亜重症が之に次ぎ，軽症はわずかに15.4%であり，これは Zubrod⁽⁴⁹⁾，Zins⁽¹⁸⁾，Goodof⁽⁸⁾ の云う様に軽症のものに多いか，或は腎障害を合併したものは一見軽症に見えるという説には合致しなかつたが，従我の重軽症の区別に多少の差があることも考慮しな

第19表 糸球体機能低下群

番号	氏名	年令	性	重症 軽別	推定罹 病年月	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/ TmG	尿蛋 白	血 mmHg	眼底所見	インシュ リン降下率 %
1	周	63	♂	中等	30 年	113.9	174.3	31.1	0.27	189.6	0.164(++)	192/86	出血斑多数		-24.4
2	山○	30	♂	中等	5 年	117.8	202.6	23.0	0.19	172.3	0.133(++)	206/100	出血斑白斑		-26.8
3	福○	53	♂	亜重	10 年	182.2	313.0	39.9	0.22	不能	/ (++)	164/80	出血斑白斑 虹彩ルベオーシス		-35.7
4	谷○	48	♀	重	6 年	206.8	362.0	43.7	0.21	166.8	0.262(++)	172/96	出血斑多数		-43.0
5	藤○	23	♀	重	8 年	164.1	328.2	47.6	0.28	279.4	0.170(++)	160/90	白内障の為 眼底不明		-27.0
6	二○	63	♂	中等	6 年	120.9	251.4	34.1	0.26	不能	/ (±)	164/88	白内障眼底(-)		-34.2
7	諸○	54	♀	亜重	6 年	272.7	454.6	70.5	0.23	277.3	0.254(±)	147/88	出血斑白斑多数		-23.3
8	日○	72	♂	中等	12 年	326.2	601.2	64.2	0.20	305.3	0.210(+)	158/104	白内障 眼底動脈硬化		不 能
9	長○	67	♂	軽	20 年	325.3	611.5	66.0	0.20	338.5	0.195(+)	150/68	出血斑少数		-46.3
10	平○	58	♂	亜重	20 年	395.9	730.8	83.7	0.21	301.1	0.278(±)	160/80	眼底動脈硬化		-41.1
11	河○	56	♂	軽	10 年	362.2	634.9	78.5	0.21	338.0	0.232(+)	180/98	出血斑1ヶ		-26.3
12	山○	52	♂	重	1 年	331.7	675.8	88.3	0.26	302.6	0.292(+)	132/72	白斑		-64.4
13	井上	63	♀	中等	4ヶ月	326.9	546.7	87.5	0.23	331.3	0.264(±)	182/102	白内障		-47.0

第17図 糸球体機能低下群の年令別分布
全症例との対比

与をうかがえた。

第20表 糸球体機能低下群と
推定罹病年月

推定罹病年月	%
1ヶ月～4年	15.4
5～9年	38.5
10～20年	38.4
21年以上	7.7

ければなるまい。

4. インシュリン降下率との関係は表21に示したが、75.0%は-45%以下であつた。

糸球体機能、尿細管機能の著明に低下した例では総てインシュリンに抵抗性を有しており、他の内分泌腺の関

第18図 糸球体機能低下群の
重軽症別分布
全症例との対比 第21表 糸球体機能低下群とインシュリン
降下率との関係 全症例との対比

降下率	糸球体機能低下群の分布 %	全症例の分布 %
-10 %以下	0	0
-20 % 代	41.6	20.4
-30 % 代	16.7	22.5
-40～-45%	16.7	6.1
-46～-49%	16.7	12.3
-50～-55%	0	16.3
-56～-59%	0	6.1
-60 % 代	8.3	14.3
-70 % 代	0	2.0

5. FF の測定範囲は0.19~0.28, 平均値は0.228で3群中では最高を示し, 13例中4例即ち30.7%は明らかに高値であつた。

6. TmG については, 糸球体機能低下群に於て始めて低下を見た。

7. GFR/TmG は全例低下を示し, 腎障害があつても尿細管活動力が糸球体活動力に比し優位にある事を示し, 糖尿病性腎症の際は, 糸球体障害の方が, 尿細管の障害より著明である事が, 腎機能の面からもうかがい得られた。

8. 尿蛋白は全例に陽性で, 腎機能障害の強いものは大量の蛋白を尿中に排出していた。

9. 最高血圧は殆んどが150 mmHg以上を算え, 腎機能障害の強いものには常に必ず高血圧が存在していた。

10. 糖尿病性網膜症も殆んど全例に陽性であつた。

11. なおこの症例中, No. 1, 2, 3, 4に腎生検を行つたが, いずれも糸球体は腫大せるものが多く, 結節状硝子化及び毛細管の動脈瘤様拡張を来すものがあり, ボーマン氏嚢は肥厚硝子化を示し, 蹄係との癒着を見る。さらに病変が進んだものでは, 糸球体全般が完全硝子化せるものもあつた。

尿細管では上皮の変性萎縮を示すものが多く, 又腔の拡張が見られ, 硝子様物及び蛋白様絮状物を容れている。間質は増殖し小動脈の壁の肥厚を見た。これらは, Laipplyの分類に従うといずれも(++)~(+++)に属するものであつた(写真2, 3, 4, 5参照)。

第4章 論議及び考察

以上の実験に就て二, 三の考察を行つてみると, 先ず測定方法に就ても若干の注意が必要である。即ち RPF の測定には PAH を用い, GFR の測定には STS を用いたが, Newman 等²⁹⁾及び Gilman 等³⁰⁾の方法に依ると, PAH が遊離の沃度と反応して STS 定量を妨害し, GFR が高値を取るという Elliott 及び Scott³⁷⁾の説に従い Brun の方法³⁵⁾³⁶⁾を用いた。血糖測定には沃度法である Hagedorn-Jensen 法では, 同時に注入した STS の存在があるので, Somogyi 氏法³⁸⁾を用いた。

正常腎クリアランス値は表11に示したが, 本邦人の正常値に就ては, 金子の報告³⁹⁾を始め種々報告されており⁸¹⁾⁴⁹⁾⁴¹⁾, 最近本邦諸地方より集められた大島⁴²⁾の値を参考とした。

実験成績中に述べた様に著者は糖尿病患者の腎クリアランス試験の中特に RPF 及び GFR 値から1. 糸球体機能正常群: (RPF 410~600cc/min 但し 400~410cc/min でも GFR が90cc/min 以上のものを含む)。

2. 糸球体機能亢進群: (RPF 600cc/min 以上のもの)

3. 糸球体機能低下群: (RPF 410cc/min 以下のもの)

の3群に分けて観察したが, 其の各群の年齢, 性, 罹病年月, 尿蛋白, 血圧, 眼底所見並びはインシュリン降下率, TmG 及び GFR/TmG 等に就ての特徴を述べると,

第一の糸球体機能正常群は全症例の58%あり, 年齢より見ての特殊性は他の群に比しては40才代に多いが, 全症例の年齢別分布と略々同様であつた。罹病経過は短く, 5年以下のものが約80%あつた。インシュリン降下率は正常範囲にあるものが多かつた。これは罹病経過の短い糸球体機能正常群では, 未だ他の内分泌腺の関与の少い事を物語っている。特に TmG は関しては, 29例中22例が高値を示し, 殊に重症, 亜重症者は高値を取り, 且つ GFR/TmG が殆んど下降を示した事は, GFR は必ずしも TmG と平行関係はなく, 尿細管活動力が糸球体活動力に較べて優位で, 糸球体より濾過された葡萄糖を極力尿細管で再吸収し, 体外への排出を防がんとする合目的な生体防衛機転が発現しているものと解すべきであろう。

第二の糸球体機能亢進群は全症例の16%に見られたが, 亢進例を見出し得た事は予想に反し特異であつた。亢進群の平均年齢は34.4才で3群中最も低く, 50才以上のものには皆無であつた事は特徴的であつた。罹病経過も10年を超えるものはなく, 殆んどが重症, 亜重症で, 血糖値も高く, 一日の尿糖総排泄量も多いものであつた。眼底所見は2例に著明な糖尿病性網膜症を合併した。インシュリン降下率は, 62.5%がインシュリ

ンに抵抗性を有していた。糖尿病性網膜症を有する2例は入院経過中に、眼底に多数の出血斑を初発し、一時は殆んど盲目に近くなつた症例で、顕著なインシュリン抵抗性を有するものであつたが、眼底出血後も糸球体機能並びに尿細管機能も著明な低下があるであろうとの予想を裏切り、出血前値と殆んど同じ程度の高値を示した。この2例の経験から糖尿病の際の血管病変は眼底の血管に先行し、腎血管はそれに遅れるか、或は殆んど同時に発症するかの問題に関して不計も重要な指唆を得た。即ち腎機能上より見る時は、糖尿病性網膜症が腎組織変化に先んずる事がうかがえた。さらにその1例は眼底出血後旬日にして腎生検を行なつたが、これによると極く軽微な組織変化を見出し得たのみで、腎生検を以て論ずるには多少の危険はあつても、腎機能上及び腎生検上より、眼底血管障害の先行が推察された。FFについては、略々正常で一定の傾向は見られず、TmGは全例著明な亢進を見た。これは糸球体機能正常群中、重症、亜重症のものがTmGの高値を示す事と共に、尿細管の合目的な防衛的機能の現われとして興味があつた。

GFR/TmGはこの群に於てのみ正常であつた。糸球体機能として糖尿病患者の中比較的若年の高血糖、多尿、糖尿の激しい患者にRPFが650cc/min以上のものを見たことは、予想外の事実であつたが、この現象は今少し深く考えてみると、RPFの算出法として患者の体重を参考として体表面積で補正をする場合、これらの患者の理想体重で補正をすれば或は今少しく変つた値を得たかも知れない。これらの患者はいずれもやせ形で従つてRPFは実際値を上廻る値となつて出て来る傾向を示す可能性がある。然し何れにしても糸球体機能正常群及び亢進群の中、糖尿の激しい高血糖の強い患者群でTmGが高い値を示す事実は疑いを容れない。

第三の糸球体機能低下群では、尿蛋白は全例陽性で殆んどが高血圧を有し、且つ大部分が眼底に糖尿病性網膜症の像を有していた。

即ち臨床的に所謂Kimmelstiel-Wilson氏症候群を有するものでその瀬度は全症例の26%あつた。臨床的にKimmelstiel-Wilson氏症倒群発現瀬度を調査した報告は、Root²³⁾の18%、Keiding²⁴⁾の22%、Wilson¹⁹⁾²⁵⁾の25%があり、本症例の26%という数字と略々同じであつた。

糸球体機能低下群の男女比を見ると、男は69.3%、女は30.7%で、全症例の男女比と較べると、やや女に高くなつてゐる程度であつた。この男女比に就ては色々の値が挙げられている。Kimmelstiel and Porter¹⁴⁾は、女は男の2倍と云い、Goodof⁸⁾は、男35%、女55%あつたと述べ、Herbut⁹⁾は9例中5例が女、Newburger and Peters¹⁷⁾は7例中5例が女であつたとし、Horn and Smetana⁵⁾は82%が女であつたと記載している。しかしZins¹³⁾やKeiding and Root²⁴⁾は男女の差はないと述べている。

年令については、平均年令は54才で3群中の最高を示し、50才代で最も多く日野²²⁾の報告と合致し、その69.2%は50才代、60才代であつた。Kimmelstiel and Porter¹⁴⁾も50~70才代に多いとし、Robertson²⁴⁾は50才以上にあると述べ、Goodof⁸⁾も年令と共に増加すると云つてゐる。然し若年者にも発現することも認められてゐる⁸⁾¹⁰⁾²³⁾が、本症例中にも23才と30才のもので夫々8年と5年の罹病経過をもつものがあつた。

重症症別について見ると、蛋白尿、高血圧、糖尿病性網膜症の個々の合併も中等症に多かつたが、糸球体機能低下群も中等症が多く、重症、亜重症が之に次ぎ、15.4%のみが軽症であつた。Zins¹³⁾は剖検例の調査で、糖尿病性腎症のあつた50%は軽症であり、重症患者の14.7%に糖尿病性腎症を見、重症のものでは糖尿病性腎症になる瀬度も少く、又進行せる病変を見る事は少いと述べている。Goodof⁸⁾も軽症で長期罹病患者に多いとし、Zubrod¹⁸⁾、Root²³⁾、Keiding²⁴⁾もそれに賛成しているが、Mann²⁹⁾は重症糖尿病にもくると述べ、Gilland²¹⁾は重症にも軽症にもくると記している。この関係の判断には彼我糖尿病の重症の判定に多少の差のあることを考慮に容れる必要がある。

罹病年月は平均10.3年で、3群中の最高を示し、84.6%は5年以上の経過を有し、罹病経過が長くなり、少くとも5年以上になると腎障害の瀬度を増す事を示した。Zins¹³⁾は15年以上になると全部腎障害を起すと云つており、Gilland²¹⁾は5.2年以下には腎障害はなく、8.1年以上では軽度に、11.2年以上になると進行せる病変を見ると云つてゐる。Goodof⁸⁾は5年以下には30~40%、6年以上になるとその瀬度は急に上昇し、10年以上になると86%、16年では90%、18年以上になると100%出現すると云つてゐる。Laipplyは6年で腎病変

が現れ、12年以上になると高度になるとし、Mann⁵³⁾は若年者では14.8年でくと述べている。Croom and Scott⁵²⁾は15年以上の罹症経過のある糖尿病患者に就て調査し、15例には退行性病変はなかつたと記している。本症例に於ても20年以上の経過をもつた4例に腎機能障害を認めなかつた。

尿蛋白に就ては、Kimmelstiel-Wilson¹⁾の記載した最初の8例には大量の尿蛋白を見た報告され、Laipply¹⁰⁾も進行した病変があると通常大量の尿蛋白を見ると述べ、Goodof⁸⁾は病変が軽い時には、尿蛋白は少いか、或は全くこれを欠く事もあり、病変が進むと18例中の15例に大量の尿蛋白を見た述べ、病状と尿蛋白量が略々平行する事を示した。又 Newburger and Peters¹⁷⁾は、病初には種々の程度の蛋白尿があり、末期には通常大量になるとしている。しかし Henderson¹⁸⁾や Kimmelstiel and Porter¹⁴⁾は尿蛋白は通常少いとし、Zins¹⁵⁾は低蛋白血漿による浮腫があるのに尿蛋白の少い事があることを指摘し、Robertson⁶⁴⁾も蛋白尿は必発の症状であるが、顕著な高血圧並びに糖尿病性網膜症があつても、尿蛋白が極くわずかな事もあるとしている。Bell⁵⁰⁾は軽症型の29%は尿蛋白は陰性か痕跡程度であつたと述べ、Laipply¹⁰⁾は腎障害を合併した際の蛋白尿の陽性率は81%で、腎組織障害がなくても尿蛋白陽性例がある事を記している。著者の症例では、全症例中痕跡程度のもを含めて尿蛋白陽性例は40%で、茶谷、坂野⁵³⁾の35.2%、海藤⁶⁰⁾の37.8%、黒川⁶¹⁾の26.8%、及び先年辻及び著者等⁶⁴⁾が、159例の糖尿病患者に就て調査した34.7%より多少上廻っているが、腎機能障害と合併したものは26%であつた。糸球体機能低下例に於ては全例に蛋白尿を変え、機能低下の著しいものには大量の尿蛋白を証明し、軽度低下の2例は、痕跡程度のものであつた。即ち尿蛋白量は腎機能面より見た場合機能障害の程度と平行するが、機能低下がなくても極くわずかな尿蛋白を証明するものもあつた。尿沈渣については、Kimmelstiel and Porter¹⁴⁾は、大量の血尿はなく、Rifkin⁵⁷⁾は二重屈折性物質が診断の根拠になるとしているが、著者も大量の血尿は見出し得ず、硝子様円柱を診断の一助とした。

血圧については、全症例の34%が150mmHg以上の高血圧を示した。本邦報告例では茶谷、坂野⁵³⁾の20.9%、高木等⁵⁰⁾の23.0%、海藤等⁶⁰⁾の31.6%、黒川⁶¹⁾の31.0%、佐々木等⁶³⁾の26.0%、斉藤等⁶²⁾の30.1%、辻及び著者等⁶⁴⁾の21.6%がある。Zins¹⁵⁾は50%に、Stearns⁶⁵⁾も同程度に認めており、Goodof⁸⁾は43%にあると述べている。本症例中には糸球体機能低下群中に、高血圧を示さない2例があつたことも記しておく必要があろう。Laipply¹⁰⁾は糖尿病性腎症のあるものの64.6%に、Goodof⁸⁾も同病変のある50%に高血圧があつたと述べている。本症例中では高血圧があるにも不拘腎機能上異常のないものが7例あり、腎機能障害がなくても高血圧を示すか、或は腎機能障害があつても必ずしも高血圧を伴わない症例があるが、腎機能障害のあるものには高血圧を合併する頻度が非常に高いので、血圧の診断的価値は矢張り大きいと云える。

眼底所見に就ては、全症例中糖尿病性網膜症の像を示したものの頻度は28%で、斉藤等⁶²⁾は23.6%、韓⁶⁶⁾は2.5%、辻及び著者等の前の調査⁶⁴⁾では15.1%に認められている。糸球体機能低下例中、白内障の為眼底不明のもの1例と、全く眼底に変化を認めないもの2例即ち15.3%があつた。しかし眼底に著明な病変を有するのに腎機能上かえつて高値をとつたもの2例、及び少数の眼底滲出像があるのに、腎機能は正常であつたものが2例あつた。Henderson¹⁸⁾は糖尿病患者で糖尿病性腎症を有しないものの22.8%に糖尿病性網膜症を見た述べ、Ashton³²⁾は腎障害のある糖尿病患者の70~90%に糖尿病性網膜症を有するとしているのは本報告と合致する。Newburger and Peters¹⁷⁾は糖尿病性腎症の総てに網膜症が合併すると云い、Kimmelstiel and Porter¹⁴⁾は腎症を伴つたものの86%に網膜症があり、且つ網膜病変が腎変化に先ずるとしたが、前述の如く著者もこの意見に同感である。

第三の糸球体機能低下群では、機能低下の強いもの程インシュリンに抵抗性を有しており、インシュリンに抵抗性のあるものは、腎機能が著しく亢進しているものと低下しているものと両者あつた。低下例中の1例では、単純インシュリン5単位皮下注射で低血糖症状を起すものがあつたが、Zubrod⁴⁹⁾が云う様に必ずしもインシュリン需要量が少いものが多いとは云えなかつた。

FFに就てはCorcoran⁶⁷⁾は25%に下昇を見た述べ、糸球体機能低下群でも30.7%は高値を取つた。Allen⁶⁰⁾はこれを輸出管硬化による糸球体毛細管圧の上昇のためであろうとしている。

TmGはこの群に於て低下を見た。しかしGFR/TmGを見ると低値を示すものが多かつたが、これは糖

尿病性腎症の際には、尿細管より糸球体の障害の大きい事を物語っており、この事は腎症を合併した際の腎組織所見によつても裏付けられる所である。

腎機能亢進例で眼底出血後のもの1例及び腎機能低下例の4例について腎生検を行つたが、腎機能の著明に低下した4例では何れも顕著な病変を呈し、Laipplyの分類に従うと、総て(卅)~(卅卅)に属するものであつた。

糖尿病性腎症の病理に関しては1936年 Kimmelstiel and Wilson¹⁾が記載して以来、1938年 Anson⁵¹⁾が追加し、その後 Derow, Altschule and Schlesinger⁴⁾は腎障害組織の特異性について発表し、Newburger and Peters¹⁷⁾は血管障害の病因の要素に就て検討している。続いて Allen⁷⁾, Herbut⁹⁾の研究調査があり種々の問題を提起している。即ち Kimmelstiel and Wilson¹⁾は糸球体毛細管の間の結合組織 Mesangium より硝子化が起るとし、Intercapillary glomerulosclerosis と名付け、Mc Manus⁶⁹⁾もこの説を取り、Churge⁶⁸⁾は位相差顕微鏡的に追求してこれに賛成しているが、Allen⁷⁾はこの説に疑問をもち、毛細管壁に硝子様物質が沈着する、即ち Intramural であると主張し之に賛同する人も多い。この問題に対し近年電子顕微鏡学的解明がこころみられている。かかる硝子化は糸球体毛細管のみではなく輸出入管に迄拡がる。又糸球体に現われる結節状硝子化のみを以て糖尿病特有の変化と見做さないで、Bell⁹⁰⁾は瀰漫性の病変をも加えるべきであると最初に指摘し、Laipply¹⁰⁾, Goodof⁸⁾, Zins¹⁸⁾も瀰漫性病変も糖尿病性病変であるとした。糖尿病に於ける糸球体組織変化の特異性については、Siegel and Allen⁶⁾は非糖尿病患者200例中1例に、Zins¹⁸⁾は2%に硝子化を見たと言報告している。Horn and Smetana⁵⁾は腎硬化症、動脈硬化症、糸球体腎炎の約10%に糖尿病の糸球体変化と同じものを見たと言述べている。又 Goodof⁸⁾は70才以上の非糖尿病患者の30%に Intercapillary glomerulosclerosis を発見している。しかし Allen⁷⁾, Goodof⁸⁾, Herbut⁹⁾, Laipply¹⁰⁾, Spühler¹¹⁾, Zollinger¹²⁾及び Horn and Smetana⁵⁾もそろつて非糖尿病患者の腎組織変化には、糖尿病患者に見られる様な進行した病変を見る事がない事に同意している。

又糖尿病コントロールの面から見ると、Wilson, Root and Marble²⁵⁾や Gilland²¹⁾は、血管障害の発生は糖尿病コントロールに関係が深いと言述べ、Keiding²⁴⁾もコントロールを適切に行うと10年を経過しても発症しないと云つている。Goodof⁸⁾は腎障害のある83名中、50名は治療を受けていなかったのものであると言述べ、Dolger⁷⁰⁾は25年以上の経過で治療に無関心であつたものの100%に糖尿病性網膜症を見たと言記している。Jackson⁷¹⁾⁷²⁾も10年以上の罹病経過のある若年者糖尿病を調査し、網膜出血とコントロールとの間に相関を見出している。Spoon²⁹⁾も発生因子の重大要素としてコントロールの良否を採り上げ、貧弱なコントロールのもの程発生率が高いと言報告している。糸球体機能低下群の症例でも殆んどが単に不十分な食餌療法を行なつていたものであつた。しかし又20年以上を経過した機能正常の4例も何ら積極的治療を行つていないものであつた。

糖尿病に於ける腎障害の発症要因としては、重症度は差程関係はなく罹病経過の長い事が一つの要素で、コントロールの良否も問題になる事を知つたが、糖尿病それ自体の発症を考えて見ても、 β 細胞の障害のみで解決しようとするのは適当でなく、下垂体副腎系ホルモンを初めとし、血糖上昇作用のあるホルモン、糖代謝に係るホルモンの異常が合併している事は容易に想像出来、特に下垂体副腎系ホルモンは糖尿病性血管障害発生に重大な役割を演ずる事は、種々の文献^{44)~48)}によつても、又第2編で述べる著者の実験によつて明かであるが、下垂体副腎系機能亢進が合併し始め、また著明な代謝障害を起すに至らない当初には糸球体機能並びに尿細管機能の亢進が見られ、罹病経過が長期に渉り長く下垂体副腎系機能亢進に曝されていると、糖尿病自体の代謝異常にさらにそれら各種ホルモンによる代謝障害が加わつて、代謝異常の程度も大となり、又代謝異常の様相も複雑となり、血液の化学的組成も変動を来し、遂には全身血管系障害を起すに至るのであらうと考えられる。実際に著者等が糖尿病患者で糸球体、尿細管機能正常者に、他の疾患の治療の目的で、プレドニゾンの薬用量を短期間止むを得ず使用した少数例での腎機能は、各種糸球体機能並びに尿細管葡萄糖再吸収能の増加を認めている。大量或は長期投与例はないが、第2編の大量投与により腎機能並びに腎組織に障害を起し得た動物実験の結果によつても、或は Green, Wortham and Headstream,

Poulsen, Malin 等が糖尿病性血管障害の治療の目的で、副腎剔除をこころみている成績、又は実験的に下垂体副腎系ホルモンを用いて、腎に Kimmelstiel-Wilson の述べたと同じ様な硝子様結節を発見したと報告している Becker⁴⁴⁾や Rich⁴⁵⁾⁴⁶⁾, Bloodworth⁷³⁾の結果によつても、糖尿病性血管障害に下垂体副腎系ホルモンの関与が重大な要素である事が知られている。

糖尿病患者の尿糖の発現は、糸球体より濾過される葡萄糖の量が尿細管の再吸収能を起えるか、或は糸球体よりの濾過糖量が正常でも尿細管の再吸収能が低下しているかの二つが考えられ、糸球体機能と尿細管機能が密接に相互に関連している。Mirsky and Nelson⁷²⁾, Yardumian and Alphen⁷⁴⁾ は、高血糖があるのに尿糖を見ない例を報告し、Mirsky and Nelson はこの現象は GFR が減少しているか、又は尿細管の葡萄糖再吸収能が増加している為とし、Corcoran⁶⁷⁾はこれを尿細管再吸収量の増加であると述べている。逆に血糖が正常で尿糖を証明するのは腎性の糖尿に於て見られるが、Friedman⁷⁵⁾は尿細管再吸収能の低下であるとしている。しかしこれらを単に糸球体並びに尿細管機能のみから解明しようとするのは、葡萄糖の処理が腸管からの吸収或は肝臓その他の臓器の処理機能或は各種酵素による転送機転等が組合されて関連しているので危険を伴うが、糸球体機能、尿細管機能が大きい役割をはたしている事は確実である。従つて、糖尿病患者の腎機能測定によつて、糖尿病時の腎の血流動態を知り且つ葡萄糖に対する糸球体及び尿細管の態度を知ると共に、糖尿病性腎障害の発見並びに障害の程度を確め、予後、治療の判定に役立たしめる事が出来る。

本編中の症例の腎機能検査成績中特異であつたのは糸球体機能亢進群を見た事で、Robertson and Gray⁷⁷⁾も糖尿病患者の GFR は正常上昇か、或は高値を示すものがあつたと述べている。又糸球体機能低下のない特に重症、亜重症患者に TmG の高値を見たが、Robertson and Gray⁷⁷⁾, Farber⁷⁶⁾ も血糖が上昇している時は高値を示すと述べている。GFR/TmG 比は糸球体機能正常群と低下群で低値を示したが、Farber⁷⁶⁾も糖尿病患者では低下すると述べている。Robertson⁶⁴⁾は臨床的に Kimmelstiel-Wilson 症候群を有するものの腎機能を検し諸機能の著明な低下を見たが、FF は略々正常範囲にあり、TmG は GFR と平行したと述べている。本成績では臨床的所見に腎機能は略々平行し、TmG と GFR は平行せず GFR/TmG は低下した。

Henderson¹⁸⁾, Newburger and Peters¹⁷⁾, Rifken⁶⁷⁾ は前歴に腎疾患がなく長い経過を有している糖尿病患者に、臨床症状があると剖検による腎組織変化が想像されると云い、一方 Goodof⁸⁾, Laipply¹⁰⁾は臨床症状がなくても剖検により、腎組織障害のある事があるとしているが、何れにしても従前の一般検査に腎クリアランス測定を加えると一層腎障害合併の発見を容易且つ確実ならしめ、同時に腎障害の程度を知り得る。さらに腎生検を行うならば組織障害の実態を把握出来る。従つて腎クリアランス検査と腎生検は糖尿病性腎症の診断には欠くべからざるものであると信ずる。

第5章 総 括

糖尿病患者50例につきクリアランス法に依る腎機能検査を行い、年齢、性、重症症別、罹病年月、蛋白尿、血圧、眼底所見、インシュリン降下率との関係を検討した。主として腎糸球体機能の強弱を目標として、之を3群に区分する事が出来た。これ等3群に就て夫々以下に述べる様な特徴を見出した。

1. 糸球体機能正常群。(RPF 410~600cc/min, 但し RPF 400~410cc/min でも、GFR が90cc/min を超えるものを含む)

全症例の58%あり、年齢は50才、40才代に多く、推定罹病年月は平均4.2年で、3群中最低で、5年以上経過せるものは20.6%であつた。重症症別とは相関なく、インシュリン降下率も正常範囲にあるものが多かつた。FF は特記すべき点はなく、TmG は殆んどが正常高値或は高値を示し、殊に重症、亜重症のものは高値を示した。GFR/TmG は総体に低下した。尿蛋白は痕跡程度のものを認めるものがあつたが殆んど陰性であつた。血圧に関しても軽度上昇を認める少数例以外は正常範囲にあつた。眼底には少数の滲出像を2例に見たのみであつた。

2. 糸球体機能亢進群。(RPF 600cc/min 以上のもの)

全症例の16%に見られ、平均年齢は34.4才で3群中最も低く、50才以上のものには全く見られなかつた。推定罹病年月は75%は5年以下であつた。重軽症別に見ると重症、亜重症のものが多かつた。

インシュリン降下率より見ると、62.5%はインシュリンに抵抗性を有していた。FFは略々正常範囲にあり一定の傾向は見られなかつた。TmGは全例亢進しており、GFR/TmGはこの群に於てのみ正常範囲にあり、GFRとTmGの平行が見られた。尿蛋白は2例に陽性を示し、血圧も2例は軽度上昇していた。眼底所見は2例に顕著な網膜出血を見、網膜血管障害が腎血管障害に先行することがうかがえた。

3. 糸球体機能低下群 (RPF 410cc/min 以下のもの)

全症例の26%あり、平均年齢は54才で3群中最高を示し、そのうちの69.2%は50~60才代であつたが、23才と30才のものが2例あり、若年者にも腎障害が合併する事を示した。罹病年月は平均10.3年で、3群中最高で、その84.6%は5年以上の経過を有していた。重軽症別では中等症のものがやや多かつた。インシュリン降下率との関係は低下せるものが多く、腎機能高度低下例では、総てインシュリンに強い抵抗性を有していた。FFに就ては30.7%は明らかに高値であつた。TmGはこの群で始めて低下を見た。GFR/TmGは例外なく低下していた。尿蛋白は全例に陽性で、腎クリアランス値の低いもの程大量の尿蛋白を証明した。血圧は殆んどが高血圧を示し、糖尿病性網膜症も殆んど全例に証明し得た。この群中著明な機能低下を見たものでは、腎生検により明らかな Kimmelstiel-Wilson の云う所謂糸球体の硝子様結節或は糸球体の全般の硝子化を見た。

参 考 文 献

- 1) Kimmelstiel, P. and Wilson, C. : Am. J. Path., 12 : 83, 1936.
- 2) 村上 : 日本病理学会誌, 26 : 657, 昭和11年. 東京医学会誌, 55 : 529, 昭和16年.
- 3) 和久 : 日本病理学会誌, 18 : 413, 昭和3年.
- 4) Derow, H.A., Altschule, M.D. and Schlesinger, M.J. : New. Engl. J. Med. 221 : 1021, 1939.
- 5) Horn, R.C. and Smetana, H. : Am. J. Path. 18 : 93, 1942.
- 6) Siegal, S. and Allen, A.C. : Am. J. Med. Sci. 201 : 516, 1941.
- 7) Allen, A.C. : Arch. Path. 32 : 33, 1941.
- 8) Goodof, I. : Ann. Int. Med. 22 : 373, 1945.
- 9) Herbut, P.A. : Arch. Path. 31 : 501, 1941.
- 10) Laipply, T.C., Eitzen, O. and Dutra, F.R. : Arch. Int. Med. 74 : 354, 1944.
- 11) Spühler, O. : Schweiz. Med. Woch. 73 : 1430, 1943.
- 12) Zollinger, H.V. : Schweiz. Med. Woch. 73 : 1432, 1943.
- 13) Zins, E.I. : Am. J. Med. Sci. 218 : 408, 1949.
- 14) Kimmelstiel, P. and Porter, W.B. : New Eng. J. Med. 238 : 876, 1948.
- 15) Bell, E.T. : Renal Dis. Lag & Febiger, Philadelphia, 1950. [(68)より引用].
- 16) Mellinghoff, K. : Deut. Med. Woch., 78 : 126, 1953.
- 17) Newburger, R.A. and Peters, J.P. : Arch. Int. Med. 64 : 1252, 1939.
- 18) Henderson, L.L., Sprave, R.G. and Wagner, H.P. : Am. J. Med. 3 : 131, 1947.
- 19) Wilson, J.L., Root, H.F. and Marble, A. : Am. J. Med. Sci. 221 : 479, 1951.
- 20) Joslin, E.P. and Wilson, J.L. : Brit. Med. J. 4692 : 1293, 1950.
- 21) Gilland, J. : Brit. Med. J. 4712 : 916, 1951.
- 22) Ashton, N. : Brit. J. Ophth. 33 : 407, 1949.
- 23) Root, H.F., Sinden, R.H. and Zanca, R. : Am. J. Digest. Dis. 17 : 179, 1950.
- 24) Keiding, N.R., Root, H.F. and Marble, A. : J.A.M.A. 150 : 964, 1952.
- 25) Wilson, J.L., Root, H.F. and Marble, A. : New Eng. J. Med. 245 : 513, 1951.
- 26) Spoonst, S., Deyer, W.W., Day, R. and Blazer, H. : Am. J. Med. Sci. 221 : 490, 1951.
- 27) Smith, H.W., Finkelstein, N., Alimnosa, L., Crawford, B. and Graber, M. : J. Clin. Invest. 24 : 388, 1945.
- 28) Chasis, H., Redish, J., Goldring, W., Ranges, H.A. and Smith, H.W. : J. Clin. Invest. 24 : 583, 1945.
- 29) Newman, E.V. and Gilman, A. : Bull. Johns Hopk. Hosp. 79 : 229, 1946.
- 30) Gilman, A., Philips, F.S. and Koelle, G.S. : Am. J. Physiol. 146 : 348, 1946.
- 31) 大島金子 : 日本臨床, 9 : 575, 昭和26年.
- 32) Foà, P.P. and Foà, N.L. : Proc. Soc. Exper. Biol. and Med. 51 : 375, 1942.
- 33) Kalant, N. and McAuther, C.S. : J. Lab. and Clin. Med. 35 : 836, 1950.
- 34) 齊藤 : 光電比計による臨床化学検査, 南山堂, 1952.
- 35) Brun, C. : Acta

西口論文附図(第1編)

写真1. 魚○, 眼底出血後腎生検所見

強拡大, H.E. 染色

糸球体は若干腫大し, 糸球体毛細管壁は軽度な浮腫状肥厚を示しているが, 著明な硝子化又は限局性の毛細管腔の拡張などは見られない。

写真2. 周

弱拡大, H.E. 染色

完全に硝子様硬化している糸球体も見られるが, 所謂結節状硝子化を示すもの, 又糸球体が全般的に硝子化傾向にあり, ボーマン氏囊壁に著明な硝子様肥厚のあるものなどがある。間質の小動脈に, 屢々壁肥厚を認める。

写真3. 山○

中等拡大, H.E. 染色

定型的な結節状硝子化を示すもので, ボーマン氏囊壁も一部に於て肥厚を示し, 毛細管蹄係との癒着を見る。

写真4. 山○

弱拡大, H.E. 染色

殆んど糸球体は硝子様硬化を示し, 尿管壁にも著明な硝子様変性を見る。間質は増殖し所々に小円形細胞の浸潤がある。

写真5. 谷○

中等拡大, H.E. 染色

糸球体には若干核陰影を認めるが, 殆んど完全に硝子様硬化を示し, ボーマン氏囊と癒着しボーマン氏囊も著明に肥厚し硝子化している。

- Med. Scandinav. 234 : 68, 1949. 36) Brun, C. : J. Lab. and Clin. Med. 35 : 153, 1950. 37) Elliott, S.R. and Scott, H.W. : Bull. Johns Hopk. Hosp. 83 : 213, 1948. 38) Somogi : J. Biol. Chem. 160 : 69, 1945. 39) 金子 : 日新医学, 38 : 290, 昭和26年. 40) 上田 : 日本臨床, 12 : 885, 昭和29年. 41) 木下 : 最新医学, 11 : 3041, 昭和31年. 42) 大島 : 日内会誌, 46 : 852, 昭和32年. 43) Smith, H.W. : Univ. Extension Div., Univ. of Kansas Laurence Kansas 1943. [(76)より引用]. 44) Becker, B. : Ann. Int. Med. 37 : 273, 1952. 45) Rich, A.R., Burthrong, M. and Bennett, I.L. : Bull. Johns Hopk. Hosp. 87 : 549, 1950. 46) Rich, A.R. : Johns Hopkins Hospital Clinical-Pathological Conference, February, 1952.¹ (Friedenwald, J.S. : J.A.M.A. 150 : 969, 1952より引用). 47) Lukens, F.D.W. and Dohan, F.C. : Arch. Path. 41 : 19, 1946. 48) Con, J. W. : Ciba Foundation Colloquia on Endocrinol. IV 1952. (山口 : 最新医学, 11 : 2143, 昭和31より引用). 49) Zubrod, C.G., Eversole, S.L. and Dona, G.W. : New Eng. J. Med. 245 : 518, 1951. 50) Allen, A.C. : Am. J. Med. 18 : 277, 1955. 51) Anson, J.L. : South. Med. J. 31 : 1272, 1938. 52) 日野他 : 最近医学, 10 : 2051, 昭和30年. 53) Mann, G.V., Gardner, C. and Root, H.F. : Am. J. Med. 7 : 3, 1949. 54) Robertson, J.A., Gray, C.H. and Baynes, A.H. : Arch. Int. Med. 87 : 570, 1951. 55) Croom, J.H. and Scott, G.I. : Lancet 1 : 555, 1949. 56) Bell, E.T. : Am. J. Path. 18 : 744, 1942. 57) Rifkin, H., Parker, J.G., Polin, E.B., Berkman, J.I. and Spiro, D. : Medicine, 27 : 429, 1948. 58) 茶谷, 坂野 : 十全会誌, 41 : 2208, 昭和11年. 59) 高木他 : 日本消化機病学会誌, 7 : 141, 昭和17年. 60) 海藤他 : 東北医学雑誌, 47 : 113, 昭和27年. 61) 黒川 : 日本内分泌学会誌, 27 : 141, 昭和26年. 62) 齊藤他 : 日本内科学会誌, 44 : 996, 昭和31年. 63) 佐々木他 : 日本消化器病学会誌, 36 : 412, 昭和12年. 64) 辻, 西口他 : 内科の領域, 5 : 14, 昭和32年. 65) Stearns, S., Schlesinger, M.J. and Rudy, A. : Arch. Int. Med. 4 : 463, 1947. 66) 韓 : 日本消化器病学会誌, 40 : 502, 昭和16年. 67) Corcoran, A.C., Taylor, R.D. and Page, I.H. : Ann. Int. Med. 28 : 560, 1948. 68) Churg, J. and Grishman, E. : Am. J. Path. 29 : 199, 1953. 69) McManus, J.F.A., Lupton, C.H. and Graham, L.S. : Anat. Rec. 110 : 57, 1951. [(68)より引用]. 70) Dolger, H. : J.A.M.A. 134 : 1289, 1947. 71) Jackson, R.L. and Kelly, H.G. : J. Pediat. 29 : 316, 1946. [(26)より引用]. 72) Jackson, R.L., Hardin, R.C., Walker, G.L., Hendricks, A.B. and Kelly, H.G. : Proc. Am. Diab. Ass. 9 : 307, 1947. [(26)より引用]. 73) Mirsky, I.A. and Nelson, [N. : Arch. Int. Med. 71 : 827, 1943. 74) Yardumian, K.Y. and Alpern, A.N. : Am. J. Clin. Path. 11 : 425, 1941. 75) Friedman, M., Selzer, A., Sugarman, J., Sokolow, F. : Am. J. Med. Sci. 204 : 22, 1942. 76) Farber, S.J., Berger, E.Y. and Earle, D.P. : J. Clin. Invest. 30 : 125, 1951. 77) Robertson, J.A., Gray, C.H. : Lancet. 6775 : 12, 1953. 78) Bloodworth, J.M.B., Hamwi, G.J. : Am. J. Path. 33 : 67, 1955.

糖尿病性腎障碍に関する臨床的並に実験的研究

第2編 実験的研究

神戸医科大学第二内科学教室 (指導 辻 昇三教授)

西 口 睦

第1章 緒 論

糖尿病それ自体の発症は、単に膵β細胞障碍による、膵インシュリン分泌異常のみによるものではなく、他の内分泌腺、殊に血糖上昇作用のある、下垂体前葉、副腎皮質、甲状腺、膵高血糖作用因子等の機能異常が、種々組合されて関与しており、且つ糖尿病発症後もそれらの内分泌臓器が正常状態を脱して、糖質或は脂質代謝に介入して、病状を修飾している事は近來次第に明らかとなつて來た。一方第1編にも述べた様に、近年糖尿病患者は次第に長命となり、昏睡、感染症による死亡は著減して、之に代つて、糖尿病性血管障碍が次第に多発する傾向を示し、これが新しい死因となりつつある。第1編ではこれらの糖尿病性血管障碍の中、特に腎病変は、経過が長く、インシュリン感性の低い、所謂多腺性関与の疑いの多い症例に比較的に多発する傾向のある事を述べた。蓋し糖尿病の長い経過の中には、上記した他の内分泌腺異常が介入して来る可能性の大きいことは、本教室従來の研究よりも疑いを容れない。又糖尿病性血管障碍、殊に腎症(Diabetic Nephropathy 或は Kimmelstiel-Wilson 症候)の発症に対して、下垂体副腎系の関与が重視されている事は、人体の絶望的な Kimmelstiel-Wilson 症候に対して、副腎剔除が行われていたり、或は実験的に下垂体副腎ホルモン投与によつて、糖尿病性血管病変の再現をはかると云う様に^{1)~6)}、臨床的並びに実験的研究が行われている所からも明らかであろう。又実験的事実としては、何よりも有名な Houssey⁷⁾及び Long and Lukens⁸⁾、並びに Hartmann and Brownell⁹⁾の動物では、除膵糖尿が輕症に経過する事実も、これ等の試みの根拠となつている。

然し乍ら、糖尿病性腎症の発病機転に就ては、上記の様に色々の推論を受けているが、未だ定説はない状態である。

著者はここに於て、臨床的研究から糖尿病性腎症の発見に有力な示標を与えることを知つたクリアランス法に依る腎機能検査法を応用して、下垂体副腎ホルモンである ACTH、コーチゾン及びプレドニゾロン等の影響下にあるアロキサン糖尿犬に就て腎障碍の發展を機能的方面から逐時検査し、次で病理組織学的検索を通じて、形態学的所見との相関を研究して、糖尿病性腎症の發生機転を明らかにせんと試みた。

第2章 実験方法

実験動物としては、導尿の容易な、成熟した、良く馴れた、体重5~15kgの雜種雌犬を用いた。RPF測定には、10%を PAH 0.5cc/kg GFR 測定には内因性クレアチンクリアランスを応用した。

実験方法は、動物を固定台に仰臥せしめて固定し、精神的、肉体的影響を考慮して、イソミタールを以て、動物が睡りに就く最少量を静注麻醉し、尿量増加をはかる為、試験の1時間前に40~50cc/kgの水を胃管にて飲用せしめた。糸球体機能測定には、PAH 静注は頸静脈より行い、点滴静注によらず、1回静注法とし、採血は反対側の頸静脈よりヘパリンでしめした注射器をもつて、血液凝固を防止して行い、排尿、採尿はクリアランス値の正確を期する為、カテーテルを以て採尿し、後10ccの滅菌蒸留水で2回洗滌し、最後に10ccの空気を送入して吸引し、膀胱が完全に空虚になる様に努めた。静注後20分目、薬液が血中に平均して分布された時排尿せしめ、25分採血、48分採血、50分採尿、75分採血、80分採尿と順に行い、夫々排尿及び採血終了時刻を秒迄正確に記入し、採血採尿後直ちに除蛋白を行ひ、PAH、クレアチンを測定した。尿細管葡萄糖再吸収極量測定には、糸球体機能検査後約1.5~2時間の間隔を置き、血糖に応じて、50%葡萄糖の量

を加減し、やはり1回注射法を行い、第1回、第2回採血値共血漿糖量が400mg/dl以上、約800mg/dl以下になる様にした。注射後20分排尿、22分採血、40分採尿、55分採血、60分採尿し、夫々の材料につき、クレアチニン、葡萄糖量を測定した。

PAH 測定には、Kalant and McAurther の方法¹⁰⁾¹¹⁾で行い、クレアチニン測定は Jaffe の方法により、血漿糖量は Hagedorn-Jensen 氏法に従い、尿糖は、Pavy-隈川氏法により定量した。片対数方眼紙の縦軸に血漿中濃度の対数を取り、横軸に時間をとつて、排尿と採尿及び採尿と採尿の中央にあたる時間の血漿濃度を読み、これを検査中の平均濃度とし、夫々クリアランス値を算出し、1回値と2回値とを平均し、Meeh-Rubner の式に従つた体表面積で補正を行つた。

糖尿病発症には、アロキサンを使用し、80~100mg/kg 静注した。プレドニゾロンはプレドニン(塩之義製)を使用し、2mg/kg、毎日胃管をもつて注入内服せしめ、ACTH は ACTH-Depot (シエーリング社製)を2mg/kg 毎日筋注し、コーチゾンは、アドレゾン水性懸濁液(オルガノン社製)を毎日5mg/kg 筋注した。

以上の方法を用い、アロキサンにより発症しなかつたものでは、処置前及びアロキサン注射後1週間目及び2~3週後に腎クリアランスを測定して比較した。アロキサンにより発症したものでは、処置前及び糖尿病発症後1週間目に、及び夫々のホルモンを1週間投与し、その直後に測定して夫々の値を比較し、最後に動物を屠殺して腎を取り、ヘマトキシリン、エオジン及びパス染色を行つて、病理組織学的変化を観察した。

第3章 実験成績

1. アロキサンのみによる腎障害の程度を見る為、アロキサンにより、糖尿病を発症しなかつたものの腎クリアランスを測定したが、第1表に示した様に、1週間後の値は、RPF, RBF, GFR, TmG 共3例に於て下降を見たが、1週間後の1例と、2週間後の1例は、殆んど前値と差違を認めなかつた。2~3週間後の値は、1週間後の値より多少増加の傾向にあり、アロキサンにより障害された腎が、次第に機能を恢復するものと思われる。FF は、アロキサン注射後わずかに低下の傾向が見られた。GFR/TmG に関しては、一定の相関は認められなかつた。病理組織学的変化は、糸球体は全般に腫大し、蹄係壁に肥厚あり、軽度の核変性が見られ、ボーマン氏囊中には時に蛋白様物質を容れているものがあつた。

ボーマン氏囊の癒着はなく、又ボーマン氏囊壁の肥厚はない。所謂 juxta-glomerular aparate には著変は

第1表 アロキサンにより発症しなかつたもの

番号	体重 kg	処 置	RPFcc/min	RBFcc/min	GFRcc/min	FF	TmGmg/min	GFR/TmG
No. 1	9.0	前	94.8	175.5	24.9	0.263	68.2	0.365
	9.0	Allox 後 1 W	80.4	143.6	19.9	0.248	51.0	0.390
	8.9	// 3 W	89.2	159.7	23.8	0.267	62.1	0.383
No. 2	5.0	前	84.7	162.9	26.5	0.313	59.2	0.447
	5.0	Allox 後 1 W	78.7	142.4	23.9	0.304	52.5	0.455
	5.0	// 3 W	82.3	148.1	27.9	0.295	62.3	0.448
No. 3	8.0	前	96.8	173.4	37.5	0.388	91.5	0.410
	8.2	Allox 後 1 W	87.3	154.4	31.7	0.363	77.6	0.408
	8.2	// 2 W	90.3	161.6	34.5	0.382	83.7	0.412
No. 4	5.0	前	80.6	149.2	21.9	0.272	53.6	0.408
	5.0	Allox 後 1 W	82.4	148.3	21.9	0.266	50.8	0.431
No. 5	5.2	前	95.8	174.2	31.7	0.331	86.8	0.365
	5.2	Allox 後 2 W	96.5	173.2	31.0	0.322	87.5	0.354

見られない。直及び曲尿管上皮には、腫大変性は殆んどないが、腔内に時に蛋白様絮状物を見るものがあつた(写真1, 参照)。

2. アロキサンにより糖尿病を発症したもの。アロキサンにより発症しなかつたものでは、糸球体機能及び尿管機能は低下の傾向を示していたが、組織所見でも発症例と非発症例とは大差がないのに、発症例の多くは、糸球体機能は、前値と変化がないか、或は増加の傾向を示している。FF には一定の傾向は見られないが、最も特異な点は、TmG が殆んど例外なく上昇している事で、而も GFR/TmG は、処置前値より低くなつていた。即ち発症例では、GFR の増加より TmG の増加が顕著であつた事を意味するものである。病理組織学的変化としては、糸球体は全般的に腫大し、蹄係壁に軽度の肥厚を見た。ボーマン氏嚢には変化なく、絮状物も容れていなかった。所謂 juxta-glomerular aparate には変化はなかつた。尿管管では、中枢尿管管で、腔体内空胞形成を見るものが若干あり、末梢尿管管にも同様の所見が見られた。直尿管管は、全般に腔拡張が見られ、上皮の脱落を示すものが若干あり又腔内には蛋白様硝子様物質を充滿しているものがあつた(写真2, 参照)。

第2表 アロキサンにより発症したもの

番 号	体重 kg	処 置	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	血糖mg/dl
No. 6	8.5	前	133.3	229.8	38.8	0.288	101.6	0.382	
	8.1	Allox 後 3 日	137.3	240.2	40.6	0.296	122.2	0.332	220
	7.7	" 1 W	139.5	249.0	38.0	0.273	114.9	0.331	240
No. 7	9.3	前	135.9	238.5	49.7	0.368	132.2	0.376	
	8.8	Allox 後 3 日	130.2	232.0	49.7	0.382	143.6	0.346	200
No. 8	12.3	前	198.6	348.5	74.8	0.377	181.5	0.412	
	11.9	Allox 後 3 日	202.5	361.5	73.9	0.365	211.9	0.349	310
No. 9	7.5	前	70.6	128.3	29.0	0.411	71.4	0.406	
	7.0	Allox 後 3 日	86.6	157.0	34.1	0.394	86.7	0.392	290
No. 10	5.0	前	107.8	198.2	29.8	0.277	73.9	0.403	
	4.6	Allox 後 1 W	101.8	182.1	28.8	0.283	81.7	0.352	240
No. 11	4.7	前	54.2	102.9	18.9	0.348	50.5	0.374	
	4.4	Allox 後 1 W	50.1	90.2	17.2	0.343	50.7	0.338	300
No. 12	7.5	前	114.6	216.4	35.5	0.310	86.6	0.409	
	7.1	Allox 後 1 W	151.9	281.0	46.2	0.304	125.2	0.369	260
No. 13	6.3	前	84.8	148.8	25.6	0.302	60.1	0.426	
	6.0	Allox 後 1 W	96.9	169.6	31.8	0.328	83.2	0.382	320
No. 14	7.0	前	108.0	203.6	33.9	0.314	87.8	0.386	
	6.8	Allox 後 1 W	121.2	220.3	37.4	0.309	103.6	0.360	270
No. 15	10.0	前	127.3	232.3	37.6	0.294	96.4	0.390	
	9.0	Allox 後 1 W	139.8	254.2	41.8	0.299	114.2	0.366	460
No. 16	8.3	前	99.6	181.2	30.3	0.305	75.0	0.404	
	7.8	Allox 後 1 W	114.6	208.1	36.1	0.315	108.7	0.332	310
No. 17	8.5	前	122.5	218.9	43.8	0.358	150.0	0.298	
	8.1	Allox 後 1 W	131.1	235.9	47.6	0.362	165.8	0.288	230

No. 18	6.5	前	98.8	179.5	26.9	0.273	76.2	0.353	290
	6.2	Allox 後 1 W	89.6	160.5	25.6	0.286	78.1	0.327	
No. 19	9.0	前	143.7	257.2	38.5	0.268	93.3	0.402	300
	8.2	Allox 後 1 W	151.1	268.9	41.8	0.277	106.6	0.392	
No. 20	9.0	前	155.3	279.5	44.7	0.288	128.8	0.346	390
	8.5	Allox 後 1 W	178.5	321.3	46.0	0.258	147.9	0.311	
No. 21	7.5	前	125.4	226.9	30.6	0.244	97.4	0.314	330
	7.1	Allox 後 1 W	169.2	304.5	39.1	0.231	111.1	0.352	
No. 22	6.0	前	82.4	148.3	26.2	0.318	71.8	0.365	250
	5.6	Allox 後 1 W	103.1	188.5	33.4	0.324	97.1	0.374	
No. 23	7.2	前	96.8	173.4	37.5	0.388	91.5	0.410	320
	6.8	Allox 後 1 W	87.3	154.4	31.7	0.363	77.6	0.408	
No. 24	6.5	前	91.8	165.2	33.8	0.368	88.5	0.382	240
	6.2	Allox 後 1 W	125.3	224.3	46.6	0.372	124.3	0.375	

3. アロキサン糖尿病犬に、プレドニゾロンを 2 mg/kg 毎日 1 週間胃管をもつて注入内服せしめたものでは、第 3 表に示す様に、RPF, RBF, GFR, TmG 共に低下し、2 例に於ては著明な下降を示した。FF には一定の傾向はなく、GFR/TmG 比は、糖尿病発症時よりやや増加の傾向が見られた。血糖は、プレドニゾロン内服後は全例上昇した。病理組織学的変化としては、全般に糸球体の腫大があり、毛細管壁肥厚を見、時にアノイリス様様の毛細管拡張を示すものがあり、一部は、Wire-loop 状を呈し、又限局性の軽度の結節状肥厚を見るものもあつた。輸入管は稀に壁肥厚を示し、ボーマン氏嚢には著変なく、若干の糸球体には、蹄係とボーマン氏嚢の癒着を見るものがある。尿細管では、主部に若干顆粒状変性を見るものがあり、ヘンレ氏

第 3 表 アロキサン糖尿病犬に Prednisolone 2mg/kg 内服せしめたもの

番 号	体重 kg	処 置	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	血糖 mg/dl
No. 10	5.0	前	107.8	198.2	29.8	0.277	73.9	0.403	240
	4.6	Allox 後 1 W	101.8	182.1	28.8	0.283	81.7	0.352	
	4.2	+ Pred. 1 W	61.6	109.9	18.4	0.299	48.0	0.382	
No. 11	4.7	前	54.2	102.9	18.9	0.348	50.5	0.374	300
	4.4	Allox 後 1 W	50.1	90.2	17.2	0.343	50.7	0.338	
	4.0	+ Pred. 1 W	47.5	84.5	14.3	0.302	39.6	0.361	
No. 12	7.5	前	114.6	216.4	35.5	0.310	86.6	0.409	260
	7.1	Allox 後 1 W	151.9	281.0	46.2	0.304	125.2	0.369	
	6.7	+ Pred. 1 W	82.2	146.3	26.4	0.320	71.3	0.370	
No. 13	6.3	前	84.8	148.8	25.6	0.302	60.1	0.426	320
	6.0	Allox 後 1 W	96.9	169.6	31.8	0.328	83.2	0.382	
	5.6	+ Pred. 1 W	68.3	122.9	20.2	0.296	50.6	0.399	
No. 14	7.0	前	108.0	203.6	33.9	0.314	87.8	0.386	270
	6.8	Allox 後 1 W	121.2	220.3	37.4	0.309	103.6	0.360	
	6.5	+ Pred. 1 W	72.4	129.2	20.8	0.288	55.9	0.372	

管は拡張し、一部に絮状物及び硝子物を容れている。集合管には細胞体内の空胞形成及び腫大が見られる(写真3, 参照)。

4. アロキサン糖尿病犬に、毎日7日間 ACTH-Depot を2 mg/kg 筋注したものでは、表4に示す如く、RPF, RBF, GFR, TmG 共に著明に低下し、コチゾン群は勿論プレドニゾン群に比し、腎機能低下並びに腎組織障害も高度であつた。FF には、一定の傾向は見られず、GFR/TmG 比は、糖尿病発症時のそれよりは低下の傾向が見られた。血糖は、ACTH-Depot 注射後総て高くなつた。病理組織学的変化も顕著で、糸球体は著明に腫大し、篩係は結節塊状になり、細胞増生及び壁肥厚が著明であつた。さらに病変の進んだものでは、毛細管のアノイリスマ様拡張及び結節状塊が硝子化し、特に著しいものでは、篩係全般が硝子化に陥っているものがある。ボーマン氏嚢腔中には蛋白様絮状物を容れるものも多く、ボーマン氏嚢壁の肥厚を見るものがある。間質には若干の結合組織増生があつた。尿細管では、曲尿細管に若干上皮細胞萎縮と、細胞の顆粒状変性があり、腔内に硝子様滴を見る。直尿細管には一部腔の拡張、細胞の萎縮があり、時に腔は著明に拡張し、硝子様円柱及び硝子様物質を容れている。この所見は、Kimmelstiel-Wilson¹³⁾ の云う糖尿病性症腎の組織所見と極めて酷似せるものであつた(写真4, 参照)。

第4表 アロキサン糖尿病犬に ACTH-Depot 2mg/kg 注射したもの

番 号	体重 kg	処 置	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	血糖mg/dl
No. 15	10.0	前	127.8	232.3	37.6	0.294	96.4	0.390	
	9.0	Allox 後1W	139.8	254.2	41.8	0.299	114.2	0.366	410
	8.2	+ACTH 1W	64.2	116.1	19.3	0.301	50.6	0.381	450
No. 16	8.3	前	99.6	181.2	30.3	0.305	75.0	0.404	
	7.8	Allox 後1W	114.6	208.1	36.1	0.315	108.7	0.332	310
	7.2	+ACTH 1W	61.2	111.1	18.2	0.299	45.6	0.329	350
No. 17	8.5	前	122.5	218.9	43.8	0.358	150.0	0.298	
	7.9	Allox 後1W	131.1	235.9	47.6	0.362	165.8	0.288	230
	7.3	+ACTH 1W	58.3	103.6	20.1	0.344	78.1	0.261	290
No. 18	6.5	前	98.8	179.5	26.9	0.273	76.2	0.353	
	5.7	Allox 後1W	89.6	160.5	25.6	0.286	78.1	0.327	270
	5.3	+ACTH 1W	44.6	78.9	10.9	0.244	33.4	0.326	290
No. 19	9.0	前	143.7	257.2	38.5	0.268	93.3	0.402	
	8.2	Allox 後1W	151.1	268.9	41.8	0.277	106.6	0.392	300
	7.6	+ACTH 1W	79.8	104.6	22.5	0.282	58.1	0.387	340

5. アロキサン糖尿病犬に、コチゾンを毎日7日間5 mg/kg 筋注したものでは、処置前値より糸球体機能及び尿細管機能の低下したものは2例で、他は糖尿病発症時よりは低下していても、糖尿病発症前値よりも高値を取り、1例は、糖尿病発症後の値より高かつた。FF にも特記すべきものではなく、GFR/TmG にも有意な関係は認められなかつた。血糖は、糖尿病発症前値より上昇したもの4例、1例はかえつて減少した。腎病理組織学的変化としては、糸球体は腫大し、篩係壁には、若干の糸球体に於て肥厚が見られ、時に限局性の硝子化傾向にあるものがあつた。ボーマン氏嚢には著変なく、尿細管は、全般的に見て変化は少ないが、時に主部に細胞の腫大が見られた(写真5, 参照)。

第5表 アロキサン糖尿犬に Cortisone 5mg/kg 注射したもの

番号	体重 kg	処 置	RPF cc/min	RBF cc/min	GFR cc/min	FF	TmG mg/min	GFR/TmG	血糖mg/dl
No. 20	9.0	前	155.3	279.5	44.7	0.288	128.8	0.346	
	8.3	Allox 後 1 W	178.5	321.3	46.0	0.258	147.9	0.311	390
	7.9	+Cort. 1 W	166.4	316.2	45.4	0.273	117.5	0.387	450
No. 21	7.5	前	125.4	226.9	30.6	0.244	97.4	0.314	
	7.2	Allox 後 1 W	169.2	304.5	39.1	0.231	111.1	0.352	330
	6.8	+Cort. 1 W	186.7	336.1	42.2	0.226	137.9	0.306	260
No. 22	6.0	前	82.4	148.3	26.2	0.318	71.8	0.365	
	5.6	Allox 後 1 W	103.1	188.5	33.4	0.324	97.1	0.374	250
	5.1	+Cort. 1 W	78.6	141.5	23.5	0.296	61.5	0.382	280
No. 23	7.2	前	96.8	173.4	37.5	0.388	91.5	0.410	
	6.8	Allox 後 1 W	87.3	154.4	31.7	0.363	77.6	0.408	320
	6.2	+Cort. 1 W	85.6	154.1	32.7	0.382	79.3	0.412	340
No. 24	6.5	前	91.8	165.2	33.8	0.368	88.5	0.382	
	6.0	AllFx 後 1 W	125.3	224.3	46.6	0.372	124.3	0.375	240
	5.3	+Cort. 1 W	112.3	200.2	40.2	0.358	102.8	0.391	250

第4章 考 按

本実験の経過に就て、二、三の論議を試みると次の如くである。

測定方法に関しては、GFR 測定にクレアチニンを用いる事に就ては、種々問題があるが、犬に於ても、人間に於てもチオ硫酸ソーダクリアランスとクレアチンクリアランス値とは略々等しい事が認められている¹³⁾¹⁴⁾。RPF, TmG の測定には、1 回注射による Foà の簡易法¹⁵⁾を用いたが、この方法による測定誤差は、採尿の不確実なる事が主たる要素であるので、これを除外する為、排採尿にはカテーテルを用い、且つ 2 回洗滌、及び空気挿入後吸引により完全排採尿に努めた事は前述の通りである。なお PAH は検査中、血漿中濃度が 5 mg/dl 以内に、TmG 測定の際は、血漿糖量が検査中、400mg/dl 以上になる様、PAH 並びに葡萄糖使用量を加減した。以上の如く実験方法では大した問題はない。

実験成績に就ては、糖尿病を発症しなかつたものの 5 例中 3 例に、腎クリアランス値の軽度低下を認め、2 週間後には機能は回復の徴を見た。Ruben and Yardumian¹⁶⁾ は、アロキサンにより、糸球体に軽度の充血から膨化に至る迄の種々の組織変化があると云い、Bailey and Hagen は¹⁷⁾、長期生存アロキサン動物では、腎糸球体変化は少ないと述べているが、本報告の結果ともよく合致する。又 Joslin¹⁸⁾ によると、アロキサンにより副腎皮質の壊死、及び下垂体前葉に退行性変化がくると Thomas and Emerson が報告していると記しているが、アロキサンによる腎クリアランスの低下には、これらの要素も加味されていると思われる。

しかるに、アロキサン糖尿発症例では、発症しない動物と同程度の組織変化を見ながら、糸球体機能は、処置前と同値か、或はやや増加の傾向が見られ、TmG も殆んど全例に増加を示し、GFR/Tm も低くなつた。人の糖尿病で、重症、亜重症に属するものでは、糸球体機能の亢進と、TmG の高値を見るものがある事は、第 1 編の成績に於ても見られ、Robertson and Gray¹⁹⁾ も糸球体機能の亢進のある事を報告している。又 TmG が高値を取る事は、Robertson and Gray¹⁹⁾、Farber²⁰⁾ の認める所である。アロキサンによる糖尿病発症後 GFR/TmG が低下する事は、第 1 編に於て著者が人の糖尿病に於て見たと同様で、Farber²⁰⁾ も同じ結果を記載している所であつて、糸球体より濾過された葡萄糖を極力再吸収し、体外への排出を防がんとする生体の防禦機転は、動物の実験的糖尿病に於ても見られた。

さらに糖尿病性血管障害に、下垂体副腎系ホルモンの関与が、重大な要素である事は、糖代謝、脂質代謝の面から考えても推測されるが、実際に Rich¹¹⁾は、馬血清を以て感作された家兎にコーチゾンを使用する事により、Kimmelstiel-Wilson の云う腎組織変化¹²⁾を認め、Becker⁹⁾は、アロキサン糖尿動物に、ACTH、コーチゾンを用いて、糖尿病性血管障害を惹起せしめ、Bloodworth⁶⁾は、アロキサン糖尿動物にコーチゾンを使用して、糖尿病性腎症を実験的に発症せしめている。又 Green は、糖尿病性悪性高血圧患者の副腎を98%剔出する事により、血圧は正常にもどり、血糖の下降した例を報告しており、Wortham and Headstream, Poulsen, Malin 等も糖尿病性血管障害の治療として、副腎の剔出をこころみている。本実験でも、アロキサン糖尿犬に、ACTH、プレドニゾロン、コーチゾンを投与した所、プレドニゾロン、ACTH 投与例で、糸球体機能並びに尿細管機能の低下を見、組織学的所見でも明らかな腎組織病変を見た。特に ACTH では腎クリアランスの著明な低下を見、殆んど処置前値の 1/2 程度に減少し、さらに組織学的にも顕著な病変を証明し、Kimmelstiel-Wilson の記載したと同様の硝子様結節状塊の出現が見られた。プレドニゾロンによつても、毛細管壁の肥厚、アノイリスマ様拡張並びに結節状肥厚が見られた。しかし最も期待をもつたコーチゾンでは、腎機能低下を見たものは 2 例で、それも軽度減少であり、腎組織変化も軽く、処置前値より亢進するものさえあつた。

これは与えられたコーチゾンの量が少なく、且つ 1 週間の投与では短期間に過ぎた為か、或は副腎皮質ステロイド中の糖尿病性腎症発生に関係する因子は、コーチゾンとは甚しく異つたものであるか等の関係によると考えられるが、尚将来の研究を要する。

第 5 章 総 括

糖尿病性腎症の発症に、下垂体副腎系ホルモンの演ずる役割を検する為、アロキサン糖尿犬に、プレドニゾロン、ACTH、コーチゾンを投与し、腎クリアランス及び腎の病理組織学的所見よりそれを追求し、併せて実験的糖尿病時の腎の血流動態並びに尿細管の葡萄糖に対する態度を検索し次の如き結果を見た。

第 6 表 処置前値と処置後値の総合比較

	RPF	RBF	GFR	FF	TmG	GFR/TmG
アロキサン非発症犬	低下傾向	低下傾向	低下傾向	低下傾向	低下傾向	不 定
アロキサン発症犬	不 変 或は 軽度増加	不 変 或は 軽度増加	不 変 或は 軽度増加	不 定	増 加	低 下
アロキサン糖尿犬 + プレドニゾロン	低 下	低 下	低 下	不 定	低 下	低 下
アロキサン糖尿犬 + ACTH	著明低下	著明低下	著明低下	不 定	著明低下	低下傾向
アロキサン糖尿犬 + コ ー チ ゾ ン	不 定	不 定	不 定	不 定	不 定	不 定

1. 先ず、アロキサンのみによる腎障害を検する為、アロキサンにより発症しなかつたものの腎クリアランスを測定したが、5 例中 3 例は、糸球体機能並びに尿細管機能共軽度低下を示し、FF も低下の傾向があり、病理組織学的にも軽度の病変を認め、アロキサンによる腎障害が、極く軽度にある事を知つた。

2. アロキサンにより糖尿病を発症したものでは、糸球体機能並びに尿細管機能は、処置前値と比べて変化がないか或はやや高値を示し、殊に GFR/TmG が低下した事は特異であつた。病理組織学的には、非発症群と略々同程度の変化を見た。

3. アロキサン糖尿犬にプレドニゾロンを毎日 1 週間 2 mg/kg 内服せしめたものでは、RPF、RBF、GFR、TmG 共明らかに低下を示した、FF には一定の傾向はなく、GFR/TmG は糖尿病発症時よりやや増加の傾

西 口 論 文 附 図 (第2編)

写真1. アロキサンにより発症しなかつたもの
(No. 1)

強拡大 H.E. 染色

糸球体は、毛細管壁の軽度の肥厚及び核の変性を見るのみで顕著な変化はない。尿細管上皮にも著変は見られない。

写真2. アロキサンにより発症したもの
(No. 7)

強拡大 H.E. 染色

糸球体の病変は、写真1と同程度で、軽度の蹄係壁の肥厚を見る。尿細管には、上皮細胞の腫大変性が見られるものがある。

写真3. アロキサン発症犬にプレドニゾロン
を内服せしめたもの (No. 10)

強拡大 PAS 染色

糸球体毛細管壁特に基底膜の肥厚を見る。又一部に動脈瘤様毛細管拡張を示すものがある。

写真4. アロキサン発症犬に ACTH を
注射したもの (No. 15)

中等拡大 H.E. 染色

糸球体は著明に腫大し、蹄係間の癒着を示し、結節状塊形成があり、一部は硝子化を示している。又ボーマン氏囊壁の肥厚が見られる。

写真5. アロキサン発症犬にコーチゾンを
注射したもの (No. 23)

中等拡大 H.E. 染色

糸球体は著明に腫大し、毛細管壁はあたかもWire-loop 状の肥厚を示すもの及び限局性の硝子化傾向にあるものが見られる。

向が見られた。腎組織変化も著明で、毛細管壁の肥厚及び毛細管のアノイリスマ様拡張あり、一部に軽度の結節状肥厚を見た。

4. アロキサン糖尿犬に、ACTH-Depot を毎日1週間2 mg/kg注射したもので、糸球体機能、尿細管機能低下は顕著で、アロキサン注射前値の約1/2に低下した。GFR/TmG は低下の傾向があつた。病理組織学的変化も高度で、糸球体蹄係は結節状塊となり、さらに病変の進んだものでは、毛細管の動脈瘤様拡張及び結節状塊が硝子化し、特に著しいものでは、蹄係全般が硝子化に陥っているものがあり、Kimmelstiel-Wilson の記載した組織所見と極めて酷似していた。

5. アロキサン糖尿犬にコーチゾンを毎日1週間5 mg/kg注射したもので、糸球体機能並びに尿細管吸収能が5例中2例に軽度低下を示したが、他は糖尿病発症後よりは減少していても、処置前値よりは高く、GFR/TmG にも有意な関係はなかつた。腎組織変化も総体に軽度であつた。

6. 以上の成績から実験的アロキサン糖尿病に下垂体 ACTH 及び副腎皮質ホルモン投与を併用すると、腎臓には機能的にも亦組織学的にも糖尿病性腎障害と極めて近い所見が招来されると結論し得る。この結果は又糖尿病性腎障害の発生には下垂体副腎系の機能異常が関係していることを示唆する。

擧筆にあたり、本研究に対し、御指導御鞭撻を給つた辻昇三教授に深甚なる感謝を表すると共に、種々御支援御助力を惜しまれなかつた神戸医科大学第二内科学教室員諸兄に対し衷心より謝意を表します。

参 考 文 献

- 1) Rich, A.R., Burthrong, M. and Bennett, I.L. : Bull. Johns Hopk. Hosp. 87 : 549, 1950.
- 2) Friedenwald, J.S. : Am. J. Ophth. 33 : 1187, 1950.
- 3) Becker, B. : Ann. Int. Med. 37 : 273, 1952.
- 4) Luckens, F.D. and Dohan, F.C. : Arch. Path. 41 : 19, 1946.
- 5) Mann, G.V. and Goddard, J.W. : J. Clin. Invest. 28 : 797, 1949.
- 6) Bloodworth, J.M.B., Hamwi, G.J. : Am. J. Path. 33 : 67, 1955.
- 7) Houssay, B.A. and Biasotti, A. : Compt. Rend. Soc. Biol. 104 : 407, 1930.
- 8) Long, C.N.H. and Lukens, F.D.W. : J. Exp. Med. 63 : 465, 1936.
- 9) Hartmann, F.A. and Brownell, K.A. : Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. 31 : 834, 1934.
- 10) Kalant, N. and Mac Arthur, C.S. : J. Lab. and Clin. Med. 35 : 836, 1950.
- 11) 斎藤：光電比色計による臨床化学検査，南山堂。
- 12) Kimmelstiel, P. and Wilson, C. : Am. J. Path. 12 : 83, 1936.
- 13) Gilman, A., Philips, F.S. and Koelle, G.S. : Am. J. Physiol. 146 : 348, 1946.
- 14) Pitts, R.F. and Lotspeich, W.D. : Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. 64 : 224, 1947.
- 15) Foà, P.P. and Foà, N.L. : Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. 51 : 375, 1942.
- 16) Ruben, J.A. and Yardumian, K. : Science, 103 : 220, 1946.
- 17) Bailey, C.C., Bailey, O.T. and Hagen, W.H. : Am. J. Med. Sci. 208 : 450, 1944.
- 18) Joslin, E.P. : New Engl. J. Med. 234 : 443, 1946.
- 19) Robertson, J.A., Gray, C.H. : Lancet. 6775 : 12, 1953.
- 20) Farber, S.J., Berger, E.Y., and Earle, D.P. : J. Clin. Invest. 30 : 125, 1951.