groups are low compared with those of the people living in the lower reaches, and the difference is significant for statistics. The Author found out two periods when growth was slow, in their periods of development. One is about the fourth month after birth, and the other is about the age of 10.

There is nothing peculiar about the drinking water of the upper reaches. The food they eat is insufficient in protein and calories. The intermarriage of cousins is 29.2 per cent in the upper reaches, 12.6 per cent in the lower. The mean age, when menarche takes place is fourteen years and eight months in the upper reaches, thirteen years and three months in the lower.

The mean serum total protein of the adults living in the upper reaches is 6.00 g/dl in male, 7.08 g/dl in female. These values are lower than those of the people in the lower reaches (7.58 g/dl in female). The people in the upper reaches have latent hypoalbuminemia.

Endocrinological tests revealed that the people belonging to the group of lowest height in the upper reaches have hypofunctions of the ductless glands, especially in the 11 to 13 age groups.

It is reasonable therefore to presume that the prime cause of the low stature is latent hypoalbuminemia.

β -Glucuronidase Activity of the Blood and Tissue in Endocrinological Experimental Conditions

Iwao TOKUYAMA

The First Department of Internal Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine

(Director : Prof. H. Yoshida)

The role of β -glucuronidase in tissues is still not defined exactly and is a subject of controversy.

The behaviours of mouse and rat tissue and rabbit serum β -glucuronidase activity in various experimental conditions such as hormone administration, castration, adrenalectomy, glucose administration etc. were observed.

β -glucuronidase activity was determined by the modified method of Fishman Springer and Brunetti (1948).

Results are summarized as followings;

1) In female mice, castration resulted in a marked decrease of uterine β -glucuronidase and the enzyme is returned to normal or higher level by estradiol administration.

Progesterone showed no effect on the castrated uterine β -glucuronidase.

2) In male mice, castration caused a reduction of the kidney β -glucuronidase activity. Testosterone propionate produced marked elevations in kidney β -glucuronidase activity in intact and castrated mice.

In rat, testosterone propionate gave no effect upon the kidney β -glucuronidase.

3) In rabbit, epinephrine and cortisone caused elevation in serum β -glucuronidase activity, nor-epinephrine and estradiol benzoate were less effective.

Testosterone propionate and thyroxine injection caused no definite change in serum β -glucuronidase activity.

Progesterone administration resulted in a decrease in serum β -glucuronidase activity.

4) In rabbit, castration in either sex caused no expected change in serum β -glucuronidase activity and bilateral adrenalectomy produced marked reduction in it.

5) Chlorpromazine and acetylcholine administration caused marked elevations in rabbit serum β -glucuronidase activity and the former produced increase in mouse kidney and muscle β -glucuronidase.

6) By glucose, alloxan, and insulin administration, rabbit serum β -glucuronidase activity fluctuated in parallel with the change of the blood sugar level. The fluctuation was more sensitive and uniform than that of glucuronidogenic hormone administration.

7) From these results, though direct evidence to connect β -glucuronidase and glucose is lacking, glucose and related sugar metabolism may be one of the major components influencing the change of the β -glucuronidase activity, and glucuronidogenesis per se' is presumably not a major factor affecting the β -glucuronidase activity and elevation in the β -glucuronidase activity induced by hormone administration might be due to their action upon sugar metabolism.

It is undoubtedly premature to make any conclusion about β -glucuronidase action in vivo and at present, it would be proper to consider the main action of β -glucuronidase is a hydrolytic one, and in some cases it may be associated with the change of the sugar metabolism.

A New Method of Urinary ACTH Determination and its Clinical Application

Hiroshi IBAYASHI, M.D. and Takuo FUJITA, M.D.

Prof. Okinaka's Clinic, University of Tokyo School of Medicine (Director : Prof. Shigeo Okinaka)

A new benzoic acid absorption method and Sayers, Sayers, Woodbury's bioassay method was successfully used for quantitative determination of urinary ACTH in healthy subjects as well as patients with pituitary-adrenal disorders and under synthetic steroids therapy.

The recovery experiments showed about 76% by this method.

In 25 normal subjects the adrenal ascorbic acid depletion in hypophysectomized rat (AAD) caused by 26 extracts from 24 hr urine was 51 ± 6.5 ($M \pm SE$) mg/adrenal 100g, while ten samples corresponding to 12 hr urine from 4 patients with Addison's disease gave highly significant increase of the AAD ($p < 0.001$).

In both hypopituitarism (12 samples in 7 cases) and patients under steroid therapy (18 samples in 12 cases), significant decreases were noted (the former aver. 22 ± 8.7 $p < 0.02$, the latter aver. 15 ± 7.9 $p < 0.01$).

In 5 cases of anorexia nervosa, 5 samples showed no significant difference both from normal or hypopituitarism.

In 10 samples from 6 cases of Cushing's syndrome with conclusive evidence of adrenal hyperplasia only 2 cases gave high ADD values, and one case with unilateral adenoma showed low AAD, followed by normal level postoperatively. Possible explanations for this are discussed. It was concluded that our new method of urinary ACTH determination was of great clinical usefulness.

β -Glucuronidase 活性変動についての内分泌学的研究

京都府立医科大学第一内科学教室 (主任 吉田秀雄教授)

研究科学生 徳 山 石 夫

(本研究の要旨は昭和33年4月第31回日本内分泌学会総会及び昭和34年11月第7回日本内分泌学会西日本地方会に於て発表した。)

目 次

第1章 緒 論	第7節 Insulin と β -glu.
第2章 実験方法並びに実験動物	第8節 本章小括考按
第3章 予備実験	第5章 自律神経剤と β -glu.
第1節 正常 (ddS系) マウス臓器 β -glu. 活性値	第1節 Chlorpromazine と β -glu.
第2節 正常 (Wistar系) ラット臓器 β -glu. 活性値	第2節 Acetylcholine と β -glu.
第3節 正常家兎血清 β -glu. 活性値の日内変動及び経日的変化	第3節 Vagostigmin と β -glu.
第4章 Hormone と β -glu.	第4節 Pilocarpine と β -glu.
第1節 Estrogen と β -glu.	第5節 本章小括考按
第2節 Progesterone と β -glu.	第6章 糖代謝と β -glu.
第3節 Androgen と β -glu.	第1節 Glucose と β -glu.
第4節 ACTH, Cortisone と β -glu.	附 I Fructose と β -glu.
第5節 甲状腺製剤と β -glu.	附 II アミノ酸と β -glu.
第6節 Epinephrine, Norepinephrine と β -glu.	第2節 Alloxan と β -glu.
	第3節 本章小括考按
	第7章 総括考按
	第8章 結 論
	引用文献

第1章 緒 論

1934年正宗¹⁾により開拓された β -glucuronidase (以下 β -glu. と略記) の研究は、其の後多くの研究者、特に W.H. Fishman, G.A. Levvy 等により著しい進展を示した。殊にその生化学的性質に関する研究の進歩と共にその作用の本態も漸次解明されつゝある。現在では β -glu. とは幾かの極めつて類似した酵素のグループをさすものと考えられている²⁾。

その作用は in vitro では特定のものを除く多くの β -glucuronide を加水分解することにあるとされている。更に最近 Levvy 等³⁾は β -glu. 製剤が β -galacturonidase 作用を有する事を見出して後、inhibitor その他の生化学的性質に関する研究の結果、 β -glu. と β -galacturonidase は同一のものであると結論している。

一方 Fishman 等⁴⁾は in vitro で β -glu. に glucuronyl transfer 作用のある事を報じ、現在の段階では純粹な酵素蛋白は得られないが、触媒する酵素は多分 β -glu. であり、或いはそれと非常に密接な関係を持つ蛋白であろうと述べている。

これについては Bollét, Goodwin 等⁵⁾は若し β -glu. による glucuronyl transfer が in vivo で行なわれるならば、glucuronosyl transferase は上述の反応の基質となる glucuronide を形成するのに与るのであると述べている。

in vivo に於ては、その広範な分布、即ち殆んどすべての組織、体液中に存し、又殆んどあらゆる動物、一部植物、バクテリア中にも存在し、特に哺乳動物では肝、脾、内分泌臓器、子宮内膜に活性の高い事、性ホルモンを含む glucuronidogenic compounds²⁾³⁾ に対する反応、細胞有糸分裂及び生長との関係、悪性腫瘍組織にその活性の高い事、遺伝との関係、等々が注目され研究されて来た。

内分泌との関連性に就いては先づ Fishman⁷⁾⁸⁾ が estrogen と β -glu. との関係に注目し、 β -glu. は estrogen の作用と代謝とに根本的な役割を果すと提議し、更に進んで borneol, menthol⁹⁾ 等の glucuronidogenic compounds を動物に与えて、一定臓器(肝等)に β -glu. 活性の上昇を観察し、 β -glu. は in vivo に於ては glucuronide 合成にも関与すると云う彼の所謂 "working hypothesis" を提出し、estrogen 等の抱合を metabolic conjugation と名付けて所謂解毒反応と区別した。

これに対して Levvy¹⁰⁾ は幾つかの実験成績の結果から、glucuronide 合成は β -glu. とは全く異なつた機構で行なわれると述べている。この点に関しては現在尚議論のある所であり、 β -glu. の in vivo に於ける作用については現在広く認められる一致した見解はない。

かゝる現況にかんがみ私は実験動物に steroid hormone を含む種々の内分泌腺ホルモン投与、或いは内分泌臓器剔除等を行ない、内分泌機能の失調を来すことによつて本酵素と各種ホルモンとの関係を追求し、又種々の対自律神経剤を投与して本酵素活性値に及ぼすこれら薬剤の影響を観察し、更には alloxan, glucose 等の糖代謝に関連する物質を投与して、本酵素活性値との関連を検討し、以て β -glu. の本態に関して何等かの知見を得る為以下の実験を企図した。

第2章 実験方法並びに実験動物

1) 実験方法

β -glu. 活性値測定は W.H. Fishman, B. Springer, R. Brunetti 等¹¹⁾ の方法に依った。基質として phenolphthalein glucuronide (米国 Sigma Chemical Co. 製) を用いた。臓器酵素活性を測定する場合、生の homogenate そのまゝ、或はその上清、或いは一定の方法で抽出した液を用いるかで活性度の現われ方が異なつてくる訳であり、且つ又本酵素活性に対しては稀釈の度合も重要な意義を持つ。私は本実験では Fishman¹¹⁾¹²⁾ の方法に従い、臓器ではよく浮游した 1% の whole homogenate を用い、血清はそのまゝ測定に供し、常に信頼し得るべき成績を得た。

基質、被験液、Acetate buffer を 36°C で一定時間 incubate した後、遊離した phenolphthalein を pH 10.2~10.4 にて発色せしめ、光電比色計を用いて比色定量した (535 m μ filter 使用) 遊離した phenolphthalein の γ 数より単位を次式により計算した。(Fishman 単位)

$$\begin{aligned} & \text{血清, その他の体液} \\ & \text{遊離 Phenolphthalein } \gamma \text{ 数} \times \frac{1}{\text{incubation の時間}} \times \frac{100}{\text{被検液 cc 数}} = \text{units/100cc} \\ & \text{組 織} \\ & \text{遊離 Phenolphthalein } \gamma \text{ 数} \times \frac{1}{\text{incubation の時間}} \times \frac{\text{homogenate cc 数}}{0.1} \times \frac{1}{\text{被験臓器 gm}} = \text{units/gm} \end{aligned}$$

臓器 β -glu. 活性の測定にはマウス、ラット、血清 β -glu. 活性の測定には家兎を用いた。

2) 実験動物

マウス: ddS 系の生後約 2 ヶ月、体重約 20gm で一定飼料で飼育した。

飼料は 1 日 1 匹当り、小麦全粒約 4gm、野菜約 5gm、煮干約 0.5gm を与えた。

ラット: Wistar 系の体重約 150gm のものを一定飼料にて飼育した。

飼料は 1 日 1 匹当り、小麦全粒約 13gm、野菜約 15gm、煮干約 2gm を与えた。

家兎: 体重約 2kg の成熟家兎を一定飼料にて飼育した。

飼料として 1 羽 1 日当り、豆腐粕約 300gm、生野菜約 50gm を与えた。

臓器酵素活性の測定にはほぼ均一な臓器活性度を示す inbred strain を用いる事が必要であり、マウスは

dds 系を, ラットでは Wistar 系を用いた. 家兎では均一な系統を得る事は困難であり, 臓器本酵素活性値の測定には個体差が大きく, 不適当と思われる. しかるに家兎血清本酵素活性値は, 個体差は示すが, 同一個体は同一条件にては月余の経過にわたり, 常にはほぼ均一な値を示し, 増減率を見る場合には十分測定の用に供し得られる.

第3章 予 備 実 験

第1節 正常マウス臓器 β -glu. 活性値

第1表 一定飼料にて2週間飼育後の正常 dds 系マウス (生後2ヵ月)
臓器 β -glucuronidase 活性値 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎	精 囊
雄	1	3125.0	3750.0	1000.0	2250.0
	2	3000.0	4593.7	1250.0	
	3	3187.5	3750.0	1312.5	2000.0
	4	3937.5	4250.0	1312.5	1812.5
	5	3775.0	3987.5	1125.0	2125.0
	平均	3405.0	4066.2	1200.0	2046.8
		肝	脾	腎	子 宮
雌	6	3437.5	3437.5	937.5	1625.0
	7	3312.5	3500.0	1000.0	1656.1
	8	3625.0	4062.5	875.0	1875.0
	9	3500.0	3593.8	1062.5	1437.5
	10	3000.0	3187.5	875.0	2000.0
	平均	3375.0	3556.2	950.0	1718.7

(第1表) は正常マウスを上記飼料にて2週間飼育後の各臓器 β -glu 活性値を示している.

同一飼料にて更に一週間飼育した後述実験の対照値との間に有意の差異なく, 上記飼料にてはほぼ一定の値を取っている事を示す.

雌腎 β -glu. 活性値は雄のそれに比して低値を示す.

第2節 正常ラット臓器 β -glu. 活性値

(第2表) は正常ラットを上記飼料にて2週間飼育後の各臓器 β -glu. 活性値である.

同一飼料投与で更に1週間飼育した場合(実験第6表対照値)との間に有意の差異をみなかった.

第2表 正常雄性 Wistar 系ラットを一定飼料にて2週間飼育後の臓器 β -glucuronidase 活性値 (units/gm)

No.	肝	脾	腎
1	22125.0	24687.0	3500.0
2	21500.0	19000.0	3250.0
3	18500.0	20125.0	2750.0
4	23562.5	24187.5	3062.5
5	24125.0	21750.0	3312.5
平均	21962.5	21949.9	3175.0

第3節 正常家兎血清 β -glu.

活性値の日内変動及び
経日的変化

上記飼料にて2週間飼育後の家兎を12時間絶食せしめた後, その血清 β -glu. 活性値を時間的に測定した, (第1図) の如く

第1図 正常家兎血清 β -glucuronidase 活性の日内変動 (4例平均)

軽度の日内変動を示し、昼間やゝ高値を取る様であるが、変動は10%以下である。

(第2図)の如く同一動物を更に同一飼料にて飼育し、前回の2週及び4週後、同一条件にて測定を行なつたが、その血清 β -glu. 活性値は、個体差を示すに拘らず、同一動物では変化は5%前後に止まる。

以下の実験はすべて12時間絶食せしめた動物を使用して行なつた。

第2図 正常家兎を一定飼料にて飼育した場合の血清 β -glucuronidase 活性の変動 (4例平均)

第4章 ホルモンと β -glucuronidase

第1節 Estrogen と β -glu.

〔実験方法〕臓器 β -glu. 活性測

定にはマウスを用いた。雌マウスを4群に分ち、第1群は対照とし、第2群は測定3週前に前処置として去勢を行つた。第3群、第4群は第2群と同時に去勢を行ない、去勢2週後より第3群には estradiol benzoate 水性懸濁液 (0.2mg/cc) を 2mg/kg 隔日に3回筋肉注射、最終注射24時間後に屠殺、測定を行なつた。第4群は去勢2週後より estradiol benzoate 水性懸濁液 2mg/kg と testosterone propionate 水性懸濁液 (1mg/cc) 15mg/kg を交互に夫々3回筋肉注射、最終注射24時間後に屠殺、測定を行なつた。

血清 β -glu 活性の測定には雌正常家兎を用いて実験を行なつた。estradiol benzoate 0.2mg/kg 宛隔日に6回筋肉注射し、注射後24時間目毎に採血を行ない、その血清を測定に供した。更に雌家兎の去勢を行ない、その前後に於ける血清活性値を測定した。

〔実験成績〕第3表に示した様に去勢によりマウス子宮 β -glu. 活性値は著明な減少を示すが、肝、脾、腎に於ては有意の変化を認めない。estradiol benzoate 投与により子宮 β -glu. 活性値は著明な活性上昇を示したが、肝、脾、腎では著変を認めなかつた。

estradiol benzoate + testosterone propionate 投与群に於ては子宮活性値の上昇が見られるが、estradiol 単独投与群よりも上昇度は低い。腎及び脾で軽度の活性値の増加を示しているが、肝に於ては著変をみない。

第3図、第4表に示す如く雌正常家兎に estradiol benzoate 隔日 0.2mg づゝ6回投与の場合、10日以後血清 β -glu. 活性値にごく軽度の上昇傾向を認めた。去勢前後に於て血清 β -glu. 活性値に有意の変化を認めなかつた。

第2節 Progesterone と β -glu.

〔実験方法〕正常雌及び去勢2週間後の雌マウスに progesterone (2mg/cc) を 10mg/kg 隔日に4回注

第3表 2.2 カ月 dds 系雌性マウス臓器 β -glucuronidase 活性 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎	子宮
対照群	1	4250.0	3875.0	1250.0	2000.0
	2	3750.0	4062.5	1125.0	1593.8
	3	2750.0	3875.0	1250.0	1750.0
	4	3750.0	3685.0	1000.0	2000.0
	5	3875.0	3281.3	875.0	1937.5
	平均	3675.0	3755.8	1100.0	1856.3
去勢群	6	4250.0	4125.0	1250.0	500.0
	7	3437.5	3125.0	875.0	312.5
	8	3500.0	3843.5	937.5	400.0
	9	3938.5	3437.5	1250.0	312.5
	10	3812.5	4250.0	937.5	425.0
	平均	3787.7	3756.2	1050.0	390.0
去勢・ベンツオエイト群	11	3437.5	2656.3	1125.0	2375.0
	12	3687.5	4062.5	718.8	2000.0
	13	4437.5	3937.5	1000.0	2525.0
	14	2500.0	3187.0	875.0	2125.0
	15	4125.0	4062.5	875.0	2337.5
	平均	3637.5	3581.2	918.8	2272.5
去勢・プロピオネート群	16	3937.5	4625.0	1375.0	1812.5
	17	4312.5	4950.0	1625.0	2250.0
	18	3625.0	4250.0	1125.0	1781.2
	19	3375.0	3500.0	1312.5	1937.5
	20	4250.0	5050.0	1531.2	2062.5
	平均	3900.0	4475.0	1393.7	1968.7

第3図 雌正常家兎に Estradiol benzoate 0.2mg/kg 宛隔日注射時の血清 β -glucuronidase 活性の変動 (4例平均)

第4表Ⅰ 雌性正常家兎に Estradiol benzoate 0.2/kg 隔日注射時の血清 β -glucuronidase 活性値の変化 (units/100cc)

経過 (日)	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	173.0	98.9	136.3	263.7	0
2	192.3	104.2	119.4	291.2	4.5
4	153.9	104.2	119.4	285.7	-2.5
6	153.9	119.4	136.3	263.7	2.4
8	192.3	104.2	159.1	263.7	8.3
10	221.1	125.0	170.4	313.2	24.5
12	221.1	119.4	170.4	307.9	22.5

第4表Ⅱ 雌性家兎去勢前及び去勢3週後の血清 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	68.7	131.2	82.9	107.9	
後	68.7	118.7	73.6	102.2	-6.6

第5表 2.2カ月 dds 系雌性マウス臓器 β -glucuronidase 活性値 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎	子宮
無処置 + プロゲステロン	1	2875.0	3281.5	875.0	1687.5
	2	3375.0	2937.5	812.5	2000.0
	3	3312.5	3593.8	1000.0	1812.0
	4	3000.0	2937.5	718.8	1625.0
	5	3156.3	3093.8	937.5	1375.0
	平均	3143.8	3168.8	868.7	1699.0
去勢 + プロゲステロン	6	3125.0	4250.0	1125.0	406.2
	7	2750.0	3000.0	875.0	562.5
	8	3062.5	3593.7	718.7	343.7
	9	2656.2	2875.0	1062.5	456.2
	10	3375.0	3281.2	1000.0	400.0
	平均	2993.7	3399.9	956.2	433.7

射を行ない、最終注射24時間後、屠殺し、臓器 β -glu. 活性を測定した。

正常家兎には progesterone 4mg/kg 注射後、経時的に血清 β -glu. 活性値の変化を追究した。

〔実験成績〕第5表に示した如くマウス臓器では、無処置で progesterone 投与群、去勢し progesterone 投与群共に肝、脾、腎 β -glu. 活性値の低下を示し、無処置で progesterone 投与群では子宮活性値も軽度の低下を示した。

去勢し progesterone 投与群では子宮 β -glu. 活性値は去勢群 (第3表) と大差なく、estradiol 投与群に見られる様な活性上昇は起らない。

第4図 正常雌性家兎に Progesterone 4mg/kg 筋肉内注射後の血清
β-glucuronidase 活性値の変化(増減率) (4例平均)

第4図に示した如く progesterone 注射後正常家兎血清 β-glu. 活性値は, 時間の経過と共に次第に減少して行くのがみられた.

第3節 Androgen と β-glu.

〔実験方法〕臓器 β-glu. の測定には雄性マウス及びラットを使用した.

マウスは4群に分ち, 第1群は対照, 第2群は測定3週前に去勢を行ない, 第3群は第2群と同時に去勢を行ない testosterone propionate 水性懸濁液 (1mg/cc) を 10mg/kg 隔日に2週間, 都合7回, 計70mg/kg 筋肉内注射, 最終注射24時間後に屠殺して直ちに臓器活性値の測定を行なった.

第4群は無処置マウスに第3群と同様に testosterone propionate を投与後測定を行なった.

ラットは2群に分ち, 第1群を対照, 第2群は無処置のものに testosterone propionate 20mg/kg を測定1ヶ月前より, 隔日に15回, 計 300mg/kg 投与して臓器 β-glu. 活性値を測定した. この場合マウスに比して大量投与したのは, 最初マウスと同等同じ投与量を与えたが, 臓器活性に著変をみない故, 増量の必要があつた.

家兎では雄性正常家兎を用い, testosterone propionate 1日 10mg/kg づゝ隔日に7回投与し, 血清中

第6表 I 2.2 カ月 dds 系雄性マウス臓器 β-glucuronidase 活性値 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎	精 囊
対 第 1 照 群	1	3750.0	4500.0	1062.5	2000.0
	2	3937.5	4875.0	1375.0	2000.0
	3	3656.5	3933.5	1500.0	1781.3
	4	3500.0	4125.0	1312.5	1937.5
	5	2593.8	3493.5	1250.0	1593.8
	平均	3487.6	4186.4	1300.0	1862.5
去 第 2 勢 群	6	3812.5	3500.0	875.0	10000.0
	7	2968.8	3281.3	937.5	5937.5
	8	3343.8	4000.0	875.0	12125.0
	9	3062.5	3593.8	1000.0	
	10	3375.0	4312.5	718.8	8187.5
	平均	3312.5	3737.5	881.2	9068.5

去勢 + テストステロン	第3群	11	3437.5	4062.5	3125.0	1500.0
		12	3500.0	3750.0	2656.3	2375.0
		13	4125.0	4812.5	4125.0	1212.5
		14	4062.5	4375.0	2968.8	1875.0
		15	4437.5	3937.5	1656.3	1781.3
	平均		3912.5	4187.5	2906.3	1748.8
無処置 + テストステロン	第4群	16	4437.5	4687.5	3312.5	1250.0
		17	4750.0	5625.0	4187.5	1062.5
		18	2650.0	4250.0	3375.0	1000.0
		19	3843.8	3593.5	2375.0	2093.8
		20	3437.5	3687.5	2437.5	1187.5
	平均		3823.8	4368.7	3137.5	1318.8

及び尿中 β -glu. 活性値を注射24時間後隔日に測定してその変化を追求した。

又雄家兔の去勢を行ない、その前後に於ける血清 β -glu. 活性値の変化を観察した。

〔実験成績〕 マウス臓器活性度の変化は、第6表に見る如く雌性の場合には減少を示さなかったが、雄性の場合去勢により腎 β -glu. 活性は減少し、これと反対に精囊自身は萎縮を示すに拘わらず、酵素活性値は著明に上昇した。又脾、肝に於ては著変をみなかった。

第3群即ち去勢し、testosterone propionate 投与群では、腎 β -glu. 活性値は著明に上昇

し、去勢時の値は勿論、対照値よりも大巾な増加を示している。去勢により上昇した精囊 β -glu. 活性値は testosterone propionate 投与により著しく減少した。肝に於てはごく軽度の活性増加傾向が見られ、脾に於ては有意の変化をみなかった。

第4群、去勢処置をすることなく testosterone propionate を投与した場合も、腎 β -glu. 活性値は著明に増加し、精囊ではやや減少の傾向がみられた。

次にラットに於ける成績は第6表Ⅱに示した如くであるが、ラット各臓器の β -glu. 活性値はマウスに比して非常に高い。

ラット腎はマウスに比し肝より大量の testosterone propionate を投与したにも拘わらず、腎 β -glu. 活性値に投与前後に於て有意の変化をみなかった。

次に家兎では第7、8、9表、第5、6図に示す如く血清及び尿中 β -glu 活性値に投与前後に於て有意の差がみられなかった。

第6表Ⅱ 雄 Wistar 系ラットに Testosterone propionate 300mg/kg 投与時の臓器 β -glucuronidase 活性値 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎
対	1	23687.5	21250.0	3250.0
	2	19875.0	18375.0	2875.0
	3	33905.0	28625.0	3150.0
	4	22125.0	17500.0	3875.0
	5	18687.0	16375.0	2860.0
平均		23655.8	20425.0	3202.0
処	6	20375.0	21812.5	3812.5
	7	23750.0	19000.0	3000.0
	8	26125.0	23625.0	3150.0
	9	21500.0	23000.0	3625.0
	10	18250.0	19500.0	3150.0
平均		22000.0	21387.4	3347.5

第7表Ⅰ 雄性正常家兎に Testosterone propionate 10mg/kg 筋注後の
血清 β -glucuronidase 活性値の変化 (units/100cc)

時 間	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	54.5	136.3	82.9	62.5	
1	54.5	107.2	82.9	73.6	-0.8
2	62.5	136.3	102.2	62.5	+9.4
4	62.5	159.1	82.9	73.6	+12.5
6	54.5	136.3	82.9	73.6	+4.5

第7表Ⅱ 第7表Ⅰと同じ家兎に Testosterone propionate 計70mg/kg
注射前後の血清 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	54.5	136.3	82.9	62.5	
後	62.5	142.0	82.9	62.5	+4.6

第8表 雄性正常家兎に Testosterone propionate 10mg/kg 隔日注射時の
尿中 β -glucuronidase 活性値の経日的変化 (units/100cc)

日	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	39.7	136.3	73.4	62.5	
4	34.0	136.3	73.4	62.5	-3.6
8	34.0	119.3	73.4	62.5	-6.8
10	39.7	136.3	73.4	73.6	+4.8
14	39.7	119.3	82.9	62.5	-0.1

第9表 雄性家兎去勢前及び去勢3週後の血清 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	増減率%
前	106.2	105.2	143.7	81.2	
後	100.0	106.2	137.5	81.3	-2.6

又去勢前後に於ても有意の差をみなかった。

第4節 ACTH, Cortisone と β -glu.

〔実験方法〕雌雄正常家兎及び両側副腎剔除家兎（術後3日経過したもの）に夫々 ACTH 2 units/kg, cortisone 10mg/kg 宛筋肉内注射し、注射前後の血清 β -glu. 活性値の変化を追した。

〔実験成績〕第7図第10表に示す如く正常家兎群では ACTH, cortisone 投与後、何れも血清 β -glu. 活性値の軽度上昇をみとめ、30分後より上昇し、2時間で最高に達し、以後漸減する。

第11表 両側副腎剔除家兎の場合は、表に見る如く、剔除術後家兎血清 β -glu. 活性値は非常な低値を示している。

これらの家兎に ACTH, cortisone 投与を行なうと、第8図、第12、13表に見る如く、ACTH の場合は当然予想される事ながら、 β -glu. 活性値に有意の変化をみない。

第5図 雄正常家兎に Testosterone propionate 10mg/kg 筋注後の
血清 β -glucuronidase 活性値の時間的変動 (4例平均)

第6図 雄正常家兎に Testosterone propionate 10mg/kg 隔日注射時の
尿中 β -glucuronidase 活性値の経日的変動 (4例平均)

第7図 正常家兎に Cortisone 10mg/kg 及び ACTH 2EH/kg 注射後の
血清 β -glucuronidase 活性値の変動率 (何れも4例平均)

第10表Ⅰ 正常家兎に Cortisone 10mg/kg 筋注前後の血清
β-glucuronidase 活性値の変化 (units/100cc)

時 間	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♀	No. 4 ♀	増減率%
前	118.7	175.9	121.9	118.7	
0.5	131.2	219.7	134.1	131.2	+18.9
1	175.0	219.7	146.3	187.5	+37.3
2	187.5	230.7	155.4	225.0	+51.5
4	118.7	219.7	140.2	200.0	+27.1
6	118.7	219.7	161.5	131.2	+16.9

第10表Ⅱ 正常家兎に ACTH2EH/kg 筋注前後の血清
β-glucuronidase活性値の変化 (units/100cc)

時 間	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♀	No. 4 ♀	増減率%
前	81.2	109.7	136.3	102.2	
0.5	81.2	121.9	159.0	107.9	+8.3
1	118.7	128.0	159.0	119.3	+23.9
2	106.2	134.1	170.4	136.3	+29.5
4	106.2	128.0	159.0	107.9	+19.0
6	81.2	128.0	159.0	107.9	+9.6

第11図 正常家兎に両側副腎剔除術施行前後の血清
β-glucuronidase 活性値 (units/100cc)

	No. 1 ♀	No. 2 ♀	No. 3 ♂	No. 4 ♂	減少率%
前	136.3	170.4	82.9	107.9	
後	34.1	34.1	22.7	22.7	-76.6

cortisone の場合は投与後 2～4 時間後に明瞭な酵素活性の上昇を示し、8 時間後にはほぼ前値に近く復する。

第5節 甲状腺製剤と β-glu.

〔実験方法〕 雌雄正常家兎に甲状腺製剤チラジン 100mg/kg 筋肉内注射後、血清 β-glu. 活性の経時的変化、及び 100mg/kg を毎日、計 500mg/kg に達する迄注射を行ない、毎日一定時間に採血して血清 β-glu. 活性値の経日的変化を追究した。

〔実験成績〕 第9図、第14表にみる如く、経時的にも、経日的にも β-glu. 血清活性値に有意の変化をみなかった。

第6節 Epinephrine, Norepinephrine と β-glu.

〔実験方法〕 雌雄正常家兎に epinephrine, norepinephrine を夫々 0.2mg/kg 宛筋肉内注射し、注射前後に於ける血清 β-glu 活性値を血糖値と共に測定した。なお血糖値の測定は Hagedorn-Jensen 氏法に依つた。

〔実験成績〕 第10、11図、第15、16表に示す如く epinephrine 注射の場合、β-glu. 活性値、血糖値共に上昇し、norepinephrine 注射の場合よりも著明な上昇を示した。

第8図 両側副腎剔除家兎に Cortisone 10mg/kg 及び ACTH 2 EH/kg
注射後の血清 β -glucuronidase 活性値の変動率 (何れも 5 例平均)

第12表 両側副腎剔除家兎に Cortisone 10mg/kg 筋注後の血清
 β -glucuronidase 活性値の変化 (units/100cc)

時 間	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♂	No. 4 ♀	No. 5 ♀	増減率%
前	54.5	54.5	34.1	34.1	62.5	
0.5	62.5	54.5	39.7	34.1	73.6	+9.7
2	136.3	82.9	54.5	62.5	107.9	+83.5
4	159.1	136.3	54.5	107.9	181.8	+161.7
6	62.5	82.9	39.7	39.7	107.9	+34.4
8	62.5	82.9	39.7	39.7	73.6	+23.4
12	54.5	82.9	39.7	39.7	73.6	+20.5

第13表 両側副腎剔除家兎に ACTH 2EH/kg 筋注後の血清
β-glucuronidase 活性値の変化 (units/100cc)

時 間	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♂	No. 4 ♀	No. 5 ♀	増減率%
前	22.7	22.7	54.5	34.1	54.5	
2	22.7	22.7	54.5	34.1	54.5	0
4	22.7	22.7	54.5	39.7	62.5	+6.2
6	22.7	22.7	39.7	34.1	54.5	-5.5
8	22.7	22.7	54.5	39.7	54.5	+3.2
12	22.7	22.7	54.5	34.1	54.5	0

第9図 正常家兎にチラジン 100mg/kg 筋注後の血清 β-glucuronidase
活性値の変化率 (4例平均)

第14表 正常家兎に毎日チラジン 100mg/kg 筋注時の血清
β-glucuronidase 活性値の経日的変化 (units/100cc)

日	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♀	No. 4 ♀	増減率%
前	175.0	387.5	143.7	300.0	
2	175.0	356.2	156.2	275.0	-1.8
4	156.2	387.5	156.2	250.0	-4.8
5	156.2	400.0	156.2	275.0	-1.9

norepinephrine 注射の場合、β-glu 活性値、血糖値共に軽度の上昇を示した。

第7節 Insulin と β-glu.

〔実験方法〕 雌雄正常家兎に regular insulin 2 units/kg 筋肉内注射し、その血清 β-glu. 活性の経時的変化を、血糖値と共に測定した。

又一方雄正常マウスに regular insulin 2 units/kg 筋肉内注射し、肝、脾、腎、骨格筋の臓器 β-glu. 活性値の注射50分後の値を、正常対照値と比較した。骨格筋としては前胸部筋肉を用いた。

〔実験成績〕 第12図、第17表は家兎血清に於ける変化を示す。血糖値の低下につれて血清 β-glu. 活性値の低下がみられ、血糖値の上昇につれて酵素活性値も上昇を来たすことをみとめた。

第18表はマウス臓器に於ける変化を示す。対照群と insulin 投与群で、肝、脾、腎に有意の変化をみず、投与群で筋肉に於て軽度の活性上昇をみとめた。

第8節 本章小括考按

estrogen と β-glu. の密接な関係については既に数多くの報告がある。Fishman⁸⁾ は estrogen が去勢子宮

第10図 正常家兎に Epinephrine 0.2mg/kg
注射後の血清 β -glucuronidase 活性値及
血糖値の変動率 (5例平均)

第11図 正常家兎に Norepinephrine 0.2mg/kg 注射後の血清 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の変動 (5例平均)

第15表 正常家兎に Epinephrine 0.2mg/kg 筋注後の血清 β -glucuronidase
活性値及び血糖値の変化 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	131.9	111	104.1	108	81.3	79	112.0	86	135.7	102		
0.5	159.7		131.9		118.8		138.0		165.7		+27.8	
1	194.4	180	138.8	181	143.8	143	138.0	161	200.0	190	+45.5	+76.8
2	194.4		159.7		156.3		138.0		200.0		+52.7	
4	201.3	164	131.9	190	143.8	130	156.3	146	178.5	155	+45.4	+61.9

第16表 正常家兎に Norepinephrine 0.2mg/kg 筋注後の血清 β -glucuronidase
活性値及び血糖値の変化 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	68.8	88	93.8	97	56.3	83	143.8	104	43.8	79		
0.5	81.3		118.8		68.8		175.0		43.8		+17.7	
1	81.3	113	112.5	131	68.8	93	175.0	131	43.8	88	+17.7	+22.5
2	68.8		131.3		68.8		175.0		43.8		+16.7	
4	81.3	119	118.8	143	68.8	93	175.0	136	56.3	88	+23.4	+27.3

第12図 正常家兎に regular Insulin 2 単位/kg 筋注後の血清
 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の増減率 (5 例平均)

第17表 正常家兎に regular Insulin 2 単位/kg 筋肉内注射後の血清
 β -glucuronidase 及び血糖値の変化 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	85.4	97	146.4	101	97.6	88	134.1	104	103.7	81		
1	76.2	61	161.6	70	97.6	63	134.1	66	103.7	63	- 0.1	-31.5
2	97.6	61	161.6	66	70.1	47	121.9	52	122.0	63	+ 0.9	-36.4
4	57.9	52	103.7	60	57.9	41	70.1	48	55.5	45	-39.3	-45.7
8	64.0	61	155.5	74	97.6	72	146.4	90	109.8	77	- 0.8	-20.6
12	85.4	86	161.6	88	70.1	88	134.1	97	109.8	81	- 2.4	- 6.6
24	85.4	86	167.7	95	97.6	84	134.1	95	109.8	81	+ 4.0	- 2.2

β -glu. 活性を増加せしめる事より estrogen の生理作用に β -glu. が根本的役割を演ずるとし, β -glu. が glucuronide 合成に関与すると云う hypothesis を呈出してその活性上昇を説明せんとしている. 私の実験成績からみても子宮 β -glu. 活性は, estrogen の影響を強く受けて著明な変化をしてをり, estrogen と β -glu. が一応密接な関係にある事を示している. この現象にのみ限れば, 合成説で説明され得よう.

estrogen の子宮 β -glu. 活性上昇作用に対して testosterone propionate は estrogen の作用に拮抗する様である.

子宮に作用する progesterone 投与により, 去勢子宮 β -glu 活性は上昇を示さない. progesterone 自身が glucuronidogenic であるとの報告は未だみないが, その代謝物とされている pregnanediol は glucuronidogenic であり²⁾⁸⁾, 合成説に依れば pregnanediol による活性上昇も現われるべきであるが, この場合は全く活性上昇を示さない. 恐らく各種ホルモンの組織代謝に及ぼす影響, 例えば¹³⁾ estrogenは去勢子宮の

第18表 正常雄性 dd 系マウスに Insulin 2Units/kg 筋注後の
臓器 β -glucuronidase 活性値 (units/gm)

	No.	肝	脾	腎	筋 肉
対 照	1	2812.5	3062.5	875.0	187.5
	2	3125.0	3337.5	1125.0	159.7
	3	3000.0	3875.0	1062.0	138.5
	4	3801.3	4312.5	1062.0	93.8
	5	2500.0	3500.0	875.0	70.0
	平均	3047.7	3617.5	999.8	130.9
注 射 群	6	3437.5	3593.8	1000.0	218.8
	7	2937.5	3750.0	1312.0	187.5
	8	2653.8	4312.5	1062.0	262.5
	9	3312.5	3656.3	1250.0	156.3
	10	3437.5	3250.0	1062.0	156.3
	平均	3155.7	3712.5	1137.2	198.2

glycogen 貯溜を増し, progesterone は子宮 glycogen の貯溜を増さないと云う様な作用の違いが, estrogen 及び progesterone を投与して, target organ たるべき子宮 β -glu. 活性上昇, 非上昇の差となつて現われるのではなからうか. しかし glycogen と β -glu. 活性の直接の関連については現在の所不明といつてよい.

非性器たるマウス腎 β -glu. の Androgen に対する反応については, Fishman⁽¹²⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾により詳細に論ぜられてをり, マウス腎は androgen の target organ であると考えられている. しかして種々の androgen の腎 β -glu. 活性上昇力を比較して, 特にその男性化作用力と活性上昇力とは関係なく, 化学構造との関係につき論じている⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾. 私の実験でもマウス腎は testosterone propionate に反応しその β -glu. 活性の上昇を来たした.

去勢による精囊 β -glu. 活性の著明な上昇は, androgen による β -glu. 活性の抑制 (子宮 β -glu. に対する androgen の作用の如き) がとれたと理解することが出来る.

マウス腎 β -glu. の著明な androgen に対する反応に対して, ラット腎 β -glu. はより大量の testosterone propionate 投与に拘わらず何等の反応も示さなかつた. この事実は動物の種属差に基因する事であるが, testosterone の代謝と関連して興味深い事である. ラット腎は androgen の target organ にならないのであるか, 或いはラット腎はマウスに比して高い β -glu. 活性値を有しており, 自身の酵素で何等活性上昇を示すことなく処理して終うのか, testosterone の代謝経路, 或いは体内分布でマウス, ラットに差があるのか, この点は放射性同位元素を用いて追跡すれば興味ある結果が得られると思われる.

次に血清 β -glu. 活性の変化につき考えてみるに, 先づ血清本酵素の由来については, 多元性と考えられてをり, Fishman⁽¹⁷⁾ 私信は何れかの組織で β -glu. 活性値が高まつた場合に血清 β -glu. 活性値が上昇すると考えている. その血中への移行機構については明確でなく, 例えば赤血球内の本酵素活性値は非常に低く, 血漿より非特異的に細胞膜を通して吸収される機序は考え難く, 他方唾液, 胃液, 尿, 脳脊髄液, 気管支分泌液中に本酵素が存在する事より, 腺上皮より分泌され得ると考えられている⁽¹⁸⁾. しかし高酵素活性値を示す臓器より如何なる経路を取つて血清中に現われるかは, 現在の段階では未だ不明であり, その臓器の大小, 或いは血中への移行の難易によつて血清活性値は影響を受けるものと考えられる.

家兎血清本酵素活性値は estrogen に軽度の反応を示し, マウスに於ける実験成績よりみて子宮本酵素活性上昇に由来すると考えられるが, 未だ断言する事は出来ない. なお諸家の⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾⁽²¹⁾人体に於ける研究成績を

参照すれば、家兎血清 β -glu. の estrogen に対する response は人体の場合よりも低い。

progesterone 投与により家兎血清 β -glu. 活性値の低下をみたが、これもマウスの実験よりみて、諸臓器の β -glu 活性減少によるものであろう。

家兎に testosterone propionate を投与して血清 β -glu. 活性値は、投与前後で有意の変化をみなかった。去勢を行なった場合も同様であり、家兎血清 β -glu. は androgen には余り影響されぬものと考えられる。又 testosterone を投与しても家兎尿中 β -glu. 活性の変化をみなかった。Fishman¹⁶⁾ はマウス腎 β -glu. 活性の上昇につれて尿中 β -glu. 活性値の上昇を見出しているが、この場合家兎尿中 β -glu. 活性の上昇しない事は、家兎腎が androgen に対して response を欠き、腎 β -glu. 活性上昇を来たさないためと考えられる。

両側副腎剔除24時間以後に於ては家兎血清 β -glu. 活性値は著明に低下する。この事は血清 β -glu. 活性と下垂体副腎系との密接な関係を予想せしめる。又正常家兎に cortisone を投与した場合の血清 β -glu. 活性値の変動に比して、両側副腎剔除の場合の増加率はより著明であり、ACTH によつては殆んど変化を示さない。これらの事は cortisone の glucuronide 形成に際して β -glu. が関与する事により、その値に増減を示すのではないかと考えられるが、他方後述する理由により cortisone が糖質代謝作用に関連する事も考慮すべきであつて、今直ちに結論を引出す事は早計であると考ええる。

即ち両側副腎剔除時の低血清 β -glu. 値は、同時に起る著明な低血糖²²⁾ と関連するように考えられ、又 cortisone により血糖上昇が起る事を考慮すべきであらう。

thyroxine の glucuronide は既に発見されており³⁾¹⁷⁾、glucuronidogenic であるが正常家兎血清では甲状腺製剤投与に拘わらずその血清 β -glu. 活性値に有意の変化をみなかった。この場合も testosterone propionate を家兎に投与した場合と同様、glucuronide 形成で必ずしも血清 β -glu. 活性値の上昇しない場合である。

epinephrine, norepinephrine が glucuronide を形成する事は既に報告³⁾¹⁷⁾されているが、生体内で各々の glucuronide となる割合は未だ尚不明である。同量を注射して norepinephrine より epinephrine の場合の方が血清 β -glu. 活性値に及ぼす影響の大きいのは、 β -glu. が epinephrine の方により親和性の大きな為か、或いは両者の血糖値に及ぼす影響の差によるのか、理在何れとも断定は下し難い。

Insulin 投与の場合の家兎血清 β -glu. 活性は、血糖値と平行する如き関係にあり、この点よりして、 β -glu. 活性値は糖の代謝過程に関連して変動を来たすのではないかと推測が可能となるのであるが、一方マウス臓器についての実験では、低血糖期に於ても、肝、脾、腎に著明な活性値の変化を見出すことは出来ず、この範囲内よりは血糖調節機転と β -glu. との関連性については断定し難い。典型的低血糖ショック症状（痙攣を伴う）直後では筋肉 β -glu. 活性値の上昇がみられた。

なお insulin は試験管内では血清 β -glu. 活性を抑制しなかった。

各種ホルモンと β -glu. 活性変動との関係をみるに glucuronidogenic substance であつても必ずしも活性上昇を示すとは限らず、不変或いは時に低下するものもあり一定でなく、特に家兎血清 β -glu. 活性は cortisone, epinephrine の如く血糖値により大なる影響を与える物質を投与することにより、より大きい変動をみたことは、後述の glucose 投与の場合と考え合わせて、glucuronide 合成に際して活性増加を来たすと考えられるよりも、glucose 及びそれに関連する糖代謝の変化が β -glu. 活性変動により重要な役割を果すのではないかと推測される。この事は雌雄共に去勢により血清 β -glu. 活性に著変をみず、両側副腎剔除時に著明な活性低下をみると云う現象にも当はまるのではないかと考える。

第5章 自律神経剤と β -glucuronidase

自律神経剤が生体の β -glu. 活性に及ぼす影響については未だ殆んど詳細な報告をみない。

本章では生体内酵素と密接な関係にあるとされる自律神経剤を用い、その β -glu 活性に及ぼす影響を観察した。

第1節 Chlorpromazine と β -glu.

〔実験方法〕 血清 β -glu. の測定には家兎を、臓器 β -glu. の測定にはマウスを用いた。

雌雄正常家兎に chlorpromazine 10mg/kg 筋肉内注射し、経時的に採血、 β -glu. 活性値と血糖値を測定した。

又一方雄マウスに chlorpromazine 25mg/kg 筋肉内注射し、一定時間後(1及び4時間)屠殺し、臓器 β -glu. 活性を測定した。

第13図 正常家兎に Chlorpromazine 10mg/kg 筋注後の血清
 β -glucuronidase 活性及び血糖値の変動 (5例平均)

第19表 正常家兎に Chlorpromazine 10mg/kg 筋注後の血清
 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の変化 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	93.8	102	31.3	79	225.0	101	187.5	106	175.0	92		
0.5	175.0		93.8		287.5		462.5		256.3		+101.3	
1	186.3	155	81.3	141	300.0	148	550.0	188	296.0	170	+111.8	+67.7
2	162.5		93.8		275.0		487.5		289.4		+96.0	
4	156.3		106.3		237.5		337.5		238.8		+85.6	
6	125.0		93.8		225.0		275.0		238.8		+63.1	
12	93.8	113	43.8	106	200.0	108	200.0	119	194.4	127	+9.2	+20.3
24	93.8		31.3		200.0		169.5		181.8		-3.4	

〔実験成績〕 第13図、第19表に示す如く家兎血清に於ては注射後30分には著明な β -glu. 活性値の上昇を認め、1乃至2時間で最高値を示し、漸減して12時間後にはほぼ前値に復したが、血糖はこれとはゞ類似の

第20表 正常 dd 系雄マウスに Chlorpromazine 25mg/kg 注射
前後の臓器 β -glucuronidase 活性 (uits/gm)

	No.	肝	脾	腎	骨 格 筋
対 照	1	2437.5	2437.5	1375.0	93.8
	2	3187.5	3750.0	1312.0	93.8
	3	3062.5	3500.0	1250.0	106.2
	4	2887.5	3437.5	1287.5	125.0
	平均	2893.8	3281.3	1306.1	104.7
注 射 1 時 間 後	5	3187.5	4343.8	2500.0	312.5
	6	3125.0	2656.3	2375.0	156.3
	7	3062.5	3812.5	2250.0	187.5
	8	2875.0	4000.0	1937.5	125.0
	平均	3060.0	3703.1	2265.6	195.3
注 射 4 時 間 後	9	3281.5	4187.5	1531.3	106.2
	10	3437.5	3938.5	1325.0	50.0
	11	3262.5	4275.0	1650.0	87.5
	12	2938.5	3218.8	1175.0	100.0
	平均	3230.0	3904.9	1420.3	85.9

傾向をたどる。

第20表に見る如くマウス臓器 β -glu. 活性は肝に於ては注射前後に有意の変化はなく、脾に於て注射1及び4時間後にごく軽度の活性増加傾向を認めたが、著明ではない。

最も著しい変化は腎に於て見られ、注射1時間後にはその β -glu. 活性値は有意の差を以て上昇するのが認められ、4時間後にはほぼ対照値に復した。

骨格筋に於ても注射1時間後に対照値に比し高値を示し、4時間後では元に復した。

第2節 Acetylcholine と β -glu.

〔実験方法〕 雌雄正常家兎に acetylcholine 2mg/kg 皮下注射後の血清 β -glu. 活性を経時的に採血して測定した。

〔実験成績〕 第14図、第21表に見る如く血清 β -glu 活性値は注射後30分より著明な上昇を示し、1時間後に最高値に達し、以後漸減して12時間後にはほぼ前値に復した。

第3節 Vagostigmin と β -glu.

〔実験方法〕 正常家兎に vagostigmin 0.05mg/kg 皮下注射後の血清 β -glu. 活性変動を経時的に採血して観察した。

〔実験成績〕 第22表に示した如く注射前後に於て血清 β -glu. 活性値に有意の変化を認めなかつた。

第4節 Pilocarpin と β -glu.

〔実験方法〕 正常家兎に塩酸 pilocarpin 1mg/kg 皮下注射し、経時的に採血し、血清 β -glu. 活性に及ぼす影響をみた。

〔実験成績〕 第23表に見る如く注射後ごく軽度の活性増加傾向をみとめたが著明ではない。

第5節 本章小括考按

以上の実験より交感及び副交感神経遮断作用を有する chlorpromazine 投与により、血清及び臓器 β -glu. 活性値の上昇を来し、副交感神経末梢興奮剤の中 acetylcholine では著明な家兎血清 β -glu. 活性値の上

第14図 正常家兎に Acetylcholine 2mg/kg 皮下注射後の血清
 β -glucuronidase 活性値の変動 (5例平均)

第21表 正常家兎に Acetylcholine 2mg/kg 皮下注射前後の血清
 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

時 間	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♂	No. 4 ♀	No. 5 ♀	増 減 率
前	72.4	125.0	68.8	156.3	68.8	
0.25	72.4	111.3	75.0		68.8	-0.5
0.5	125.0	181.0	87.5	175.0	250.0	+83.9
1	355.2	289.4	93.8	356.3	500.0	+262.6
2	421.0	328.9	93.8	300.0	死 亡	+193.1
4	236.8	223.6	93.8	262.5		+102.5
6	125.0	181.0	93.8	250.0		+53.4
8	151.3	196.0	81.3	250.0		+60.8
12	102.0	125.0	77.5	193.8		+19.3
24	85.5	111.3	68.8	143.8		-0.2

昇を認め、同じ分類に含まれる pilocarpin, vagostigmin では血清 β -glu. 活性値に著変を示さない。又前章で述べた如く交感神経末梢興奮副たる epinephrine では血清 β -glu. 活性値を上昇せしめた。この結果よりみれば各種自律神経剤投与により、 β -glu. 活性がその本来の薬理作用別に依じて、譬えば交感神経剤では上昇し、副交感神経剤では低下する様な変動は見られなかつた。

第22表 正常家兎に Vagostigmin 0.05mg/kg 皮下注射前後の血清
 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

No.	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♂	No. 4 ♀	No. 5 ♀	増減率%
時間						
前	43.8	143.8	118.8	68.8	91.2	0
0.5	43.8	143.8	131.3	75.0	87.5	+3
2	43.8	156.3	131.3	81.3	91.2	+7.4
4	43.8	143.8	131.3	75.0	106.3	+7.1
6	43.8	156.3	131.3	75.0	91.2	+5.6

第23表 正常家兎に塩酸 Pilocarpin 1mg/kg 皮下注射前後の血清
 β -glucuronidase 活性値 (units/100cc)

No.	No. 1 ♂	No. 2 ♂	No. 3 ♂	No. 4 ♀	No. 5 ♀	増減率%
時間						
前	62.5	104.1	159.7	38.3	118.0	0
0.5	75.2	104.1	159.7	38.3	118.0	+4.4
2	75.2	118.0	173.6	48.6	131.9	+16.5
4	75.2	104.1	173.6	48.6	131.9	+13.8
6	62.5	118.0	173.6	48.6	131.9	+12.0

個々の薬剤について考えてみるに, chlorpromazine 投与によつて家兎血清, マウス臓器 β -glu. 活性値に著明な上昇を来たした, chlorpromazine の排泄については N.P. Salzman, B.B. Brodie 等²³⁾によればごく少量が変化せず尿中に排泄され, 10~15% がその sulfoxide として排泄され, 他に未知の代謝産物2種を paperchromatography に依り見出しており, sulfoxide がその主な代謝産物であろうと述べている. この様に chlorpromazine の glucuronide は未だその報告をみない. 一方 Benham²⁾(より引用)は家兎に phenothiazine を経口投与後, 尿中にその還元 diol 型のグルクロン酸抱合したものの存在を示唆し, 加水分解により 7-hydroxy-8-isophenothiazene-3-one を得ている.

chlorpromazine は phenothiazine 誘導体であり, 当然 perhydroxylation²⁴⁾等の過程によつて glucuronide を形成する可能性がある訳である.

Salzman 等は chlorpromazine 注射後の臓器内分布について, 脳, 肺, 脾に次いで腎に多くの分布をみているが, この事とマウス腎に於ける著明な β -glu. 活性の上昇とは関連を有する様に思われ, 多分マウスに於ても chlorpromazine は腎に比較的多く分布し, その組織 β -glu. 活性に変化を与えたものと考えられる.

又同氏等は骨格筋に於ても比較的多くの分布をみている.

マウス肝では明瞭な β -glu. 活性の上昇をみなかった. この事は肝には β -glu. 及び他の酵素系が豊富に存在し, 今回の注射量では肝 β -glu. 活性値に影響を与える事なく処理されたのではないかと考えられる. chlorpromazine 投与による家兎血清 β -glu. 活性上昇は, この場合腎, 筋肉等がその源となつたのであろうか.

一方 chlorpromazine と糖代謝の関係については, 十分明らかにされたとは云えないが私の実験では同時に血糖値の上昇を認め, 又同様の報告をみる²⁵⁾²⁶⁾(より引用) chlorpromazine は視床下部下垂体系を抑制する事より, β -glu. 活性も或いは抑制されるのではないかと考えたが結果は逆であつた. chlorpromazine による β -glu. 活性の上昇は, これが glucuronidogenic compound である事と, その高血糖作用とに関連を有するのではないかと考えられる.

次に acetylcholine 投与による家兎血清 β -glu. の上昇をみたが, acetylcholine は体内では容易に acetylcholinesterase により分解され, choline と acetate となると考えられ, choline が glucuronide を形成することは未だ報告をみない. choline は更に分解して trimethylamine となるがこれは glucuronide を形成しないと考えられる. 即ち acetylcholine の glucuronide 形成の可能性は現在の所認められておらず, この場合の β -glu. 活性上昇の説明は非常に困難である. acetylcholine は acetylcholinesterase 活性を抑制するが, この現象は酵素相互間の関係を明らかにすることにより或いは説明されるのではないかと考える. なおマウス臓器は acetylcholine 投与に対して有意の β -glu. 活性変化を示さなかつた.

vagostigmin は cholinesterase を抑制し, 副交感神経末梢を興奮せしめると云われるが, 家兎に投与して有意の血清 β -glu. 活性値の変化をみなかつた. acetylcholine 作用を増強する vagostigmin でこの結果を得たが, その作用機序の細部の違いがこの差となつて現われたものであろう.

塩酸 pilocarpin 投与にても家兎血清 β -glu. 活性に有意の変化をみなかつた. vagostigmin, pilocarpin 共にその glucuronide 形成は報告されておらない. 自律神経剤と β -glu. との関係も, その薬剤の glucuronide 形成の如何, 或いは糖代謝との関連に於て理解すべきであらう.

第6章 糖代謝と β -glucuronidase

現在 β -glu. と糖代謝の関連について主に論ぜられている点は, 何れも glucuronic acid の代謝との関係についてであつて, 即ち glucuronide 合成, 及びその加水分解, glucuronyl transfer 等に β -glu. が関与するとされている.

一方食後に血清 β -glu. 活性の上昇する事が知られており, 又島性糖尿病患者に於て血清 β -glu. 活性値が高値を示したとの報告²⁷⁾があるが, glucuronic acid 代謝以外の糖質代謝と β -glu. の関係を実験的に追究した報告は未だ見出す事が出来ない. かゝる現状にかんがみ, 私は直接血糖値を変化させる glucose 注射, fructose 注射, 或いは催糖尿病物質たる alloxan 注射等を行ない, この際の β -glu. の活性値の変動をみた.

第1節 Glucose と β -glu.

〔実験方法〕 雌雄正常家兎に20% glucose 10cc/kg 静脈内注射後, 経時的にその血清 β -glu. 活性の変化及び血糖値の変動をみた. なお対照として正常家兎に生理食塩水 10cc/kg 宛静注を行ない同様に血清 β -glu. 活性値を測定した.

〔実験成績〕 第24表及び第15図に示す如く, 血清 β -glu. 活性値, 血糖値共に glucose 注射後 30 分乃至 1 時間で最高値を示し, 何れも 2 時間では前値に近くまで低下した.

第24表 正常家兎に20% Glucose 10cc/kg 静注前後の血清 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の時間的推移 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	81.2	100	97.9	94	91.3	97	82.9	101	136.3	113		
0.5	187.5	298	196.0	258	225.0	266	169.1	241	259.2	284	+114.7	+166.7
1	187.5	172	196.0	205	225.0	197	169.1	200	259.2	211	+114.7	+95.0
1.5	91.2	103	138.1	155	150.0	132	107.9	136	159.0	136	+32.8	+31.0
2	91.2	106	103.6	117	118.7	102	107.9	132	147.7	119	+17.3	+14.0
3	118.7	111	103.6	115	118.7	102	102.2	132	147.7	119	+22.6	+14.6

対照群には血清 β -glu. 活性に有意の変化を見出さなかつた.

附 I Fructose と β -glu.

第15図 正常家兎に 20% Glucose 10cc/kg 静注前後の血清 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の時間的変動 (5例平均)

正常家兎に 10% fructose 10cc/kg 静注して、血清 β -glu. 活性値の変動をみたが、glucose 注射の場合と同様に注射後30分乃至1時間で血清 β -glu. 活性値の上昇を示し、注射2時間後にはほぼ前値に復した。

附Ⅱ アミノ酸と β -glu.

正常家兎に総合アミノ酸製剤である 10% ES ポリタミン 10cc/kg 宛静脈内注射し、経時的に β -glu. 活性値の変動を観察した。

第16図に示す如く注射後3時間迄血清 β -glu. 活性値に著明な変化なく、1時間後には軽度であるが減少傾向が見られた。

第2節 Alloxan と β -glu.

〔実験方法〕 正常家兎に alloxan 200mg/kg 11静脈より注射し、その前後に於ける血清 β -glu. 活性値及び血糖値の変化を経時的に追究した。

〔実験成績〕 第17図、第25表に示す如く、血糖値の推移につれて β -glu. 活性値も変動し、高血糖時に高

第16図 正常家兎に 10% ES Politamin 10cc/kg 静注後の血清
 β -glucuronidase 活性値の変動 (4例平均)

第17図 正常家兎に Alloxan 200mg/kg 静注前後の血清
 β -glucuronidase 活性値及び血糖値の変動 (5例平均)

く、低血糖時に低く、血糖曲線と類似した曲線を示して変化した。

第3章 本章小括考按

glucose 注射の場合, alloxan 注射の場合共に血清 β -glu. 活性値の変化は, 血糖値の変化と極めて類似し

第25表 正常家兎に Alloxan 200mg/kg 静注前後の血清 β -glucuronidase
活性値及び血糖値の変動 (units/100cc, mg/dl)

時 間	No. 1 ♂		No. 2 ♂		No. 3 ♂		No. 4 ♀		No. 5 ♀		増減率%	
	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖	β -glu.	血糖
前	122.0	101	89.7	72	165.7	108	157.9	99	96.0	81		
1	161.6	154	144.5	119	178.5	155	268.4	190	157.9	155	+47.0	+68.8
2	246.4	228	220.4	213	257.1	251	348.6	243	268.4	213	+120.5	+152.4
4	80.3	66	62.5	48	78.5	45	96.0	54	54.5	50	-40.0	-42.1
6	75.5	59	62.5	48	78.5	45	96.0	52	72.9	61	-37.0	-41.2
12	107.9	72	62.5	57	死 亡		138.1	68	85.5	70	-16.4	-23.7
24	226.4	272	144.5	251			268.4	254	157.9	209	+70.2	+183.1
48	294.2	316	220.4	298			379.2	304	248.4	255	+146.4	+235.5

た変化を示した。この事より糖代謝と β -glu. 活性値との間に密接な関係があるのではないかと推測される。

非常に類似した血糖、酵素活性両曲線の変化の様相よりすれば、或いは試験管内で glucose が β -glu. の activator として働くのではないかと疑われるが、酵素の dissociation 及び activation はその純度及び稀釈の度合に關係するのであつて¹³⁾、被験物たる血清を1/10に稀釈する今回の測定方法にては起り得ない筈である。本実験の成績は glucose 投与によつて血清 β -glu. 活性が疑いもなく上昇した事を示している。

従来 β -glu. 活性上昇に關係があると云われる細胞有糸分裂、生長等はこの場合勿論直接的な關係を否定しうるし、又 glucose 或いは fructose が glucuronidogenic compound であるか否かの問題については、R.S. Teague⁹⁾によると含水炭素は glucuronidogenic ではないとされ、この場合 glucuronidogenesis に依じての活性増加であるとは考えられない。glucose 注射によつて estrogen や androgen の分泌増加を引きおこすことによる結果とは断定する根拠もない。glucose 注射による β -glu. 活性の上昇は、glucose 注射によつて体内糖代謝の平衡が破れ、グルクロン酸抱合、glucuronide 加水分解の平衡にまで影響が及んで起つたものではないとも考えられる。

Fishman²⁸⁾は glucuronic acid を投与して、血清 β -glu. 活性の低下する事を報告しており、私の家兎に glucuronolactone を注射した実験に於ても血清 β -glu. 活性値は不変か、或いは軽度の低下を示した。この事より glucose 注射により glucose $\rightarrow$ glucuronic acid への代謝経路が促進され、glucuronic acid が体内に増加した為に β -glu. 活性が上昇すると言う事は考えられない事である。

glucose $\rightarrow$ glycogen の過程には phosphorylase の関与が、又 glucose の解糖過程には hexokinase その他種々の酵素系の存在が知られている。 β -glu. が直接これらの解糖過程に関与していないとすれば、glucose 注射によるその活性値の変動は、他の酵素系の活性変動に伴う非特異的な反応として理解すべきであろうか、或い β -glu. はに未知の働きがあり、glucose の代謝に関与するのであろうか、この点に関しては現在の段階では明らかではない。

fructose 注射による血清 β -glu. 活性上昇も glucose 注射の場合と同様の機序によるものであろう。alloxan 注射による血清 β -glu. の変化はよく血糖値の変化に平行する。alloxan は glucuronidogenic compound であると言う報告はない。

この場合の血清 β -glu. 活性の変化は、alloxan が glucuronidogenic であると否とに拘わらず、活性上昇、活性低下が他物質投与の場合の如き1相性の変化でなく、3相性の変化を示し、血糖値と平行して変化する点より、血清 β -glu. 活性値は glucuronide 合成以外の、glucose 注射、insulin 注射の場合と同様、糖代謝の変化に応じて変化するものと思考される。

なおマウスに alloxan を注射して臓器 β -glu. 活性の変化を観察したが、有意の変化を見出し得なかつた。

アミノ酸注射では家兎血清 β -glu. 活性に著変なく、注射 1 時間後にはごく軽度の減少傾向がみられた。種々の sugar acids 或いはある種の有機酸に β -glu. 抑制作用が知られているが、アミノ酸の一部にも或る程度の酵素抑制作用があるのではないかと考えられる。

第 7 章 総 括 考 按

去勢によりマウス子宮 β -glu. 活性は著明に減少し、estrogen 投与によつて子宮 β -glu. 活性は上昇する。これは子宮 β -glu. と estrogen との密接な関係を示すものであり、この点より Fishman⁷⁾⁸⁾ の合成説が現われた訳である。一方 Harris 等²⁸⁾ は去勢子宮は estrogen 投与により alkaline phosphatase 活性増加と esterase 活性減少を来たす事を報告し、Leonard¹³⁾ は estrogen 投与により子宮に於ける phosphorylase 活性上昇を観察しており、estrogen 投与により変化する子宮酵素は単に β -glu. のみではない、alkaline phosphatase, phosphorylase 等の活性変化はその性質より、estrogen 投与の結果起る子宮 glycogen 貯溜と関係ありとされている。一方 progesterone は去勢子宮の大きさを増すに拘わらず、子宮 β -glu. 活性の増加を来たさず、又 glycogen の増加も来たさない¹⁵⁾。progesterone $\rightarrow$ pregnanediol の経路を考え、pregnanediol は glucuronidogenic である事より、pregnanediol による活性上昇がみられるのではないかと考えられるが、その様な事はなく、たゞ単なる合成説のみでは活性上昇の十分な説明は困難の様に思われる。

私の家兎血清に於ける糖代謝と β -glu. 活性の密接な関係より考えて、この場合 estrogen による子宮 glycogen 量の増加、progesterone により子宮 glycogen 量の増さない事等の代謝の違いが、両者を投与した場合の β -glu. 活性の態度の差となつて現われるのではないかと考える。現在の所 glycogen 貯溜と β -glu を直接結びつける関係は明らかではない。

androgen に対してはマウス腎は著明な活性上昇を以て反応する。マウス腎は androgen の nonsex の target organ であると考えられている¹²⁾。

steroid の化学構造、或いは mouse strain による遺伝との関係等については Fishman¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁷⁾ の研究に詳しく述べられている。

これに対し私の実験でラット腎はより大量の testosterone propionate 投与に拘わらず、何等の response を示さなかつた。家兎に於ても testosterone propionate 投与に拘わらず尿中 β -glu. 活性の上昇をみず、この事はマウスに於ける例より考えて¹⁶⁾ 腎 β -glu. 活性が上昇しない為と考えられる。

ラット、家兎共に同じ齧歯類でありながら、腎 β -glu. 活性が上昇せず、androgen に対して腎は target organ にならない様に見える。

androgen の代謝に占める腎の役割、例えば存在すると仮定して glucuronide 合成を行なうか、否か等の役割が、各種動物で異なるのか、単に β -glu. の反応のみが異なるのか明らかではないが、androgen の体内分布が明らかになれば、 β -glu. の in vivo に於ける合成作用の如何に関しても、何等かの手がかりが得られるのではないかと考える。

次に血清 β -glu. につき考えてみるに、既に述べた如く多元性と考えられており、各臓器に由来すると考えられている。その血清活性値に及ぼす影響を考えると、肝、脾等の大きい臓器は少しの活性値の変化でも、血清により大なる影響を与えるであろうし、精囊等の小臓器は血清活性値に及ぼす影響は少ないと考えられる。又各臓器によつて血中に移行する比率も異なるのではないかとと思われる。

各種ホルモン投与の場合、私の実験では progesterone, insulin, ACTH を除き、すべて glucuronidogenic である事が証明された物質であるが、それに対する血清 β -glu. の反応は増加するもの、不変のもの、減少するものと三様の反応を示し、glucuronidogenic compound が必ずしも血清 β -glu. 活性の上昇作用のみを示すと云う事はない。

家兎血清は諸家の人間血清に於ける報告例¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾ に比して estrogen に対する response が低い様に考えられる。

testosterone propionate 投与により家兎血清 β -glu. 活性値に有意の変化なく、又雄家兎去勢前後に於て

も著変をみなかつた。

これに対しマウス腎 β -glu. 上昇作用が testosterone propionate に比し約 1/9 である¹⁵⁾ cortisone を家兎に投与した場合、家兎血清 β -glu. 活性は明らかな上昇を示した。両側副腎剔除家兎血清では著明な活性値の低下を示し、cortisone 投与によく反応して活性値の上昇を示す。これらの事は副腎皮質ホルモンとの密接な関係を示すものであり、或いは cortisone glucuronide 形成の際に β -glu. 活性が上昇するとも考えられる。一方私の実験での血糖値と血清 β -glu. 活性値との平行的変化の様相より考えて、cortisone の血糖上昇作用、両側副腎剔除後にみられる著明な低血糖²²⁾と、この場合の血清 β -glu. 活性値の上昇、低下が平行している所見を呈している。

glucuronidogenic compound を投与して必ずしも家兎血清 β -glu. 活性の上昇しない事より、この場合の血清 β -glu. 活性の変化は、その糖質代謝に及ぼす作用と関連して理解するのがより合理的と考える。

次に共に glucuronidogenic である epinephrine, norepinephrine を同量投与した場合に、epinephrine により強い血清 β -glu. 活性の上昇作用を認めたことは、epinephrine の血糖値に及ぼす影響が、norepinephrine に比して強い事実とよく平行している点が注目される。

甲状腺製剤投与によつて家兎血清 β -glu. 活性には製変がなく、glucuronidogenic compound で活性上昇を示さない場合である。

insulin 注射後血清 β -glu. 活性値の低下をみた。血糖値と共に低下する点が注目される。たゞ注射後初期に、血糖値の低下に比し、 β -glu. 活性低下の著明でないのは、insulin の肝 glycogen 貯溜作用が何等かの影響があるのではないかと考える。

in vitro で insulin は血清 β -glu. を抑制しない事と考え併えるとき、低血糖を来たす機構が、 β -glu. 活性低下に関連性を有することを類推せしめるものと云へる。

以上のホルモン剤投与及び内分泌臓器剔除実験の成績をみると、同じ glucuronidogenic であつても臓器及び血液の糖代謝に及ぼす影響の大きい cortisone, epinephrine 投与、或いは両側副腎剔除で β -glu. 活性値の変化が著明であつた。

以上の実験に関する限りでは glucuronide 合成に際し、 β -glu. が関与して活性上昇を来たすと云う説は広く適用され難いと考ええる。

次に自律神経剤と β -glu. の関係であるが、交感神経興奮剤、副交感神経興奮剤、或いは遮断剤と各々その作用別に β -glu. に一定の影響を与えると云う事はなく、個々の薬剤によつて、その薬理学的分類に関係なく β -glu. 活性に及ぼす影響は異なる。交感神経興奮剤たる epinephrine は前述の如き機序で血清 β -glu. 活性の上昇を来たすと考えられる。副交感神経興奮剤たる acetylcholine も家兎血清 β -glu. 活性を上昇せしめる。これは nonglucuronidogenic と考えられ、現在の所この現象の説明は難しい。

交感、副交感両神経に拮抗作用を有する chlorpromazine 投与では、家兎血清、マウス臓器で β -glu. 活性の上昇が見られた。chlorpromazine は phenothiazine が glucuronidogenic である事より、恐らく glucuronidogenic であると考えられる。その β -glu. 活性上昇はその glucuronide 形成に関してとも、又 chlorpromazine の糖代謝に及ぼす影響に関連すると考えられる。

次に glucose, alloxan 投与の場合 glucose は nonglucuronidogenic であり、又 alloxan が glucuronidogenic であると言ふ報告は見ない。

これらを投与した場合、血清 β -glu. 活性値は血糖値と非常に密接な関係を有して変動している。しかも glucuronidogenic であるホルモン剤投与の場合の変化より、より早く鋭敏に反応する。勿論投与量に大きい差があるが、日常の代謝、或いは治療量を考える時、今回の投与量の比率は不適当とは思われない。

この血糖値と血清 β -glu. 活性値がほぼ並行して変化することは、 β -glu. が本質的に糖代謝に関連して変化しているのではないかと推測を可能とする。ホルモン剤、自律神経剤投与の場合にも、血清 β -glu. 活性の変化は、血糖値により強い影響を与える物質の場合により強い変化が見られた。

現在の所 glucose、或いは glycogen と β -glu. を直接結びつける証拠は何もない。

従来 β -glu. 活性の上昇は Fishman 等の, estrogen, androgen を始めとする glucuronidogenic compounds 投与により β -glu. の合成作用を想定して, 過剰の基質に適応して活性上昇を来たとの説と, Levvy 等の生長, 細胞有糸分裂の場合に伴うとの二説が主に論争せられて来た. 私の見出した家兔血清 β -glu. 値と血糖値との平行的関連性は, その本態については, 解明するに至らぬとは云へ, β -glu. についての新しい知見であつて, 将来この事実を基礎として研究の進められるとき, β -glu. の本質探究に大きな足がかりを与えるものと信ずる.

か様に β -glu. 活性が glucose 近辺の糖代謝の変化に伴ない変動するものならば, estrogen 投与による子宮及び肝²¹⁾の glycogen 量の変化の場合は勿論であるが, その他の glucuronide 合成, 或いは生長, 有糸分裂の場合も当然糖代謝面の変化が予想されるのであり, 又 Levvy³⁹⁾ の nonglucuronidogenic である黄燐や四塩化炭素投与後一定臓器に β -glu. 活性の上昇を認める報告は, 組織障害後, その修復過程に於て糖代謝面の変化は必然的な現象であつた, これらの場合の β -glu. 活性上昇を糖代謝面との関連性にもとづいて説明するときは, その説明はより容易なのではないかと考えられるのである.

次に私の実験成績にもみられる様に, 動物の種類によつて β -glu. 活性が相当の差異を示しており, これは遺伝により決定されると考えられるが, ラットは各臓器共に非常に高い活性値を示している. 各種動物間に於ける活性値の違いの意義は未だ尚不明であつて, β -glu. が関与する各種物質の代謝の様相が異なるのか, 或いは Weinhouse¹⁷⁾(より引用)の説く如く, 組織 homogenate の示す酵素活性はその組織の最大値を表わすものであつて, これは活性の潜在力の反映であり, 実際の代謝面に用いられる活性の反映ではないとの見解に従つて, 実際の代謝面に関しては, 余りその測定値にみられる程の差異が無いのかは明らかでなく, 疑問の存する処である.

こゝで少しく文献的考察を行なうと, Levvy 等のイギリス学派は勿論, Bray²⁾, Teague³⁾ 等も β -glu. は主に加水分解的に働くものと考えている. 特に Teague はムコ多糖類の代謝に β -glu. の占める重要性につき考え, ムコ多糖類の中の hyaluronic acid は hyaluronidase により分解され, D-glucuronic acid と N-acetyl-D-glucosamine の disaccharide となり, これが β -glu. により分解され, glucuronic acid を生じ, β -glu. の主作用はムコ多糖類の catabolism にあるのではないかと述べている.

又, イギリス学派の Dutton²¹⁾ は glucuronide 合成にはすべての場合に glucuronyl donor として, uridine diphosphate glucuronic acid の存在が必要であり, これは α -configuration であると考えられ, それ自身は β -glu. の基質にならぬであろうし, 又 glucuronyl transferase に β -glu. が関与すると考える何等の理由もないと述べている.

ムコ多糖類が glucose より合成されることはすでに報告されているが²²⁾, この場合の β -glu. の関与に関しては明らかにされたと云へない⁶⁾.

一方 Fishman¹²⁾³⁹⁾ は free glucuronic acid は尿中の正常成分でなく, 又大量の β -glu. を静脈注射しても, free glucuronic acid が尿中に現われて来ず, 又 steroid glucuronide の加水分解が, 肝や脾に β -glu. が大量存在するに拘わらず主にホルモン作用の組織に達して行なわれる事より, β -glu. の加水分解作用が優先しているとは信じ難いと述べ, 更にたとえ生きた組織を用いても, in vitro の所見をそのまま in vivo に移して考えるのは危険だと述べ, β -glu. の glucuronide 合成作用を考えると生体内での現象をより容易に説明し得ると述べている,

現在の所, β -glu. の in vivo に於ける作用に関しては, 加水分解説をとなえる者が多い.

私の今回の実験では, これら両説に対して何れとも結論を下し得る様な結果は得なかつたが, glucuronide 合成説のみにては実験成績の十分な説明が困難であつた. 組織の生長, 或いは有糸分裂, 或いは glucuronide 合成, 加水分解とは別に, β -glu. 活性と血糖値との密接な関係より, glucose 近辺の糖代謝の変化は β -glu. 活性を変化せしめる大きい要因の1つであると考え.

β -glu. 活性上昇に対しては, Levvy 等は特別の意味づけを行なわず, 上記の如く有糸分裂等に際して活性上昇を伴うとのみ述べており, 活性上昇の明確なる意義づけは β -glu. の in vivo に於ける作用の決定と

共に今後の研究にゆだねるべき事柄であり、Fishman の β -glu. が合成作用を有し、それに応じて活性上昇を来たすとの説は、本実験に鑑み無条件に受け入れ難い。

結 論

- 1) マウス子宮 β -glu. 活性値は去勢により減少し, estradiol benzoate 投与により活性値は元に復する, progesterone は去勢マウス子宮 β -glu. 活性を上昇せしめない。
- 2) マウス腎は testosterone propionate 投与によく反応して著明な β -glu. 活性上昇を示す。これに対してラット腎はより大量の testosterone propionate 投与に拘わらず, β -glu. 活性上昇を示さず, androgen に対する response を欠くものと思われる。
- 3) 家兎血清 β -glu. 活性は cortisone, epinephrine, norepinephrine 及び estrogen 投与により上昇し, testosterone propionate, チラジン投与では前後に有意の変化なく, progesterone 投与により活性値の低下をみた。これらは progesterone を除き何れも glucuronidogenic hormone であり progesterone の代謝産物たる pregnanediol は glucuronidogenic である。即ち glucuronidogenic hormone を投与して必ずしも, β -glu 活性上昇のみを来たすと云う事はなく, Fishman の過剰の substrate のある時, それに適応して活性上昇を来たすとの合成説はこの場合, 広く適用され難く, 活性上昇は hormone 中でも糖質代謝作用の強いものにみられた。
- 4) chlorpromazine 投与により家兎血清及びマウス臓器 β -glu. 活性の上昇をみた。これは chlorpromazine の糖質代謝に及ぼす影響と関連して考慮すべきであろう。
- 5) glucose, alloxan, insulin 投与により家兎血清 β -glu. 活性値は血糖値の変動とは平行的に変動した。細部の機構は不明であるが glucose 近辺の糖質代謝の変化は β -glu. 活性を変化せしめる大きい要因の1つと考えられる。
- 6) 以上の諸実験の結果よりすれば, 或る種の glucuronidogenic hormone 投与により β -glu 活性値の上昇を来たすのは metabolic conjugation に伴ない, 活性上昇を来たすと考えより, hormone の糖質代謝に及ぼす影響がより大なる役割を占めると考えられ, 現在の段階では β -glu. の主作用は glucuronide 加水分解作用とするのが妥当と考えられ, その糖質代謝との関係及び活性上昇の真の意義付けは将来の研究にまつ所である。

擧筆するに当たり, 終始御指導と御校閲を賜わった吉田教授, 種々御教示, 御指導を賜わった佐藤講師に深甚の感謝を捧げる。

又昭和34年6月来日され, 種々の質問に御解答下され, 又私信を下された W.H. Fishman 教授に尊敬と感謝を捧げる。

文 献

- 1) Masamune, H. : J. Biochem. Japan, 19, 353 (1934).
- 2) Bray, H.G. : Advances in Carbohydrate Chem., 8, 251 (1953).
- 3) Teague, R.S. : Advances in Carbohydrate Chem., 9, 185 (1954).
- 4) Marsh, C.A., Levvy, G.A. : Biochem. J. 68, 610 (1958).
- 5) Fishman, W.H., Green, S. : J. Biol. Chem., 225, 435 (1957).
- 6) Bollet, A.J., Goodwin, J.F., Brown, A.K. : J. Clin. Invest., 38, 451 (1959).
- 7) Fishman, W.H. : J. Biol. Chem., 152, 487 (1944).
- 8) Fishman, W.H. : J. Biol. Chem., 169, 7 (1947).
- 9) Fishman, W.H. : J. Biol. Chem., 136, 229 (1940).
- 10) Levvy, G.A. : Science, 116, 285 (1952).
- 11) Fishman, W.H., Springer, B., Brunetti, R. : J. Biol. Chem., 173, 449 (1948).
- 12) Fishman, W.H. : Advances in Enzymol., 16, 361 (1955).
- 13) Leonard, S.L. : Endocrinol., 63, 853 (1958).
- 14) Fishman, W.H., Farmelant, M.H. : Endocrinol., 52, 536 (1953).
- 15) Fishman, W.H., Artenstein, M., Green, S. : Endocrinol., 57, 646 (1955).
- 16) Riotton, G., Fishman, W.H. : En-

- ocrinol., 52, 692 (1953). 17) Fishman, W.H. : Biochemistry of Glucuronic Acid, Lectures in Japan (1959). 18) Talalay, P., Fishman, W.H., Huggins, C. : J. Biol. Chem., 166, 757 (1946). 19) Cohen, S.L., Huseby, R.A. : Cancer Research, 11, 52 (1951). 20) Odell, L.D., Fishman, W.H. : Am. J. Obs. & Gyn., 59, 414 (1950). 21) Fishman, W.H., Bonner, S.C., Fishman, L.W., Homburger, F. : J. Clin. Endocrinol., 11, 1425 (1951). 22) 王子喜一, 朝田 誠 : 日本臨床, 14, 200 (1956). 23) Salzman, N.P., Brodie, B.B. : J. Pharm. & Exper. Therap., 118, 46 (1956). 24) Fishman, W.H. : Annual Review of Biochem., Vol. 25, 659 (1956). 25) Laborit, H. : Arch. exper. Path. u. Pharmacol., 222, 41 (1954). 26) Lindaur, V. : Arch. exper. Path. u. Pharmacol., 229, 253 (1956). 27) 明石昌幸 : 第4回グルクロン酸研究会報告集, 64, (1958). 28) Fishman, W.H., Smith, M., Thompson, D.B., Bonner, C.D., Kasdon, S.C., Homburger, F. : J. Clin. invest., 30, 685 (1951). 29) Harris, R.S., Cohen, S.L. : Endocrinol., 48, 264 (1951). 30) Kerr, L.M.H., Graham, A.F., Levvy, G.A. : Biochem. J., 42, 462 (1948). 31) Dutton, G.J. : Biochem. J., 64, 693 (1956). 32) Yielding, K.L., Tompkins, G.M., Bunim, J.J. : Science, 125, 1300 (1957). 33) Fishman, W.H. : Science, 116, 286(1952).