simultaneous transplantation of both anterior and posterior lobes, showed remarkable effect on the polyurea and thirst.

Later their condition took a turn for the better as a result of repeating transplantation of calf pituitary.

The third case was 26 years old horse-man and he was beginning to suffer from polyurea and thirst about three weeks after a fall from the horse.

In this case the patient was observed his prognosis without specific treatment, but after six months process, he recovered spontaneously from polyurea and other subjective symptoms.

From these results, we would be proper to consider that this disease take a good prognosis without specific therapy, while the transplantation of calf hypophysis prove the remarkable effect.

Studies on the determination of urinary Aldosterone and other individual Corticosteroids.

Toshihiro SUZUKI

Oshima Clinic of Internal Medicine. Nihon University Medical School.

Metabolism of body fluids and electrolytes which related not only to aldosterone alone but to other corticosteroids, for example, glucocorticoids had mineral action. And the simultaneous administration of aldosterone and corticosterone consistently resulted in a greater potassium diuresis than did the aldosterone alone.

Therefore, body fluids and electrolytes are aumation of many corticosteroids which had biological action, and can't know by the determination of simple corticosteroids.

The author report on the systemic determination of aldosterone, Comp. B, Comp. E, Comp. F, and the newly separated contaminants.

Method :

The 24 hours urine specimen is pooled at 5°C and acidified to pH 1.5 with conc. HCL, then standing 24 hours at 15°C.

Urine was extracted by chloroform and dried. Extract was treated with Florisil column chromatographies and 4 consecutered and different paper chromatographies with Chloroform-Formamide System, Bush-C System, E₂B System, and Bush-B_s System, to separated corticosteroid partitions.

Results :

1. Recoveries of 5 mg/100 ml H₂O standard samples after 5 times continued extraction by 0.1 volume chloroform, for Comp. B, Comp. E, and DOC is 95%, and Comp. F is 83%.

2. Additional chloroform re-extraction, Comp. B, Comp. E, and DOC do not appear in the 7th chloroform extraction, but Comp. F appear in the amount of 60 μ g in 8th chloroform and 9th extraction is nothing, thus this determination necessitate at least 8 consecutered extractions.

3. Comp. B, Comp. E, and Comp. F appear in 25% methanol in chloroform fraction by the use of the Florisil column chromatography is made, and recovery is about 100% in condition of 60 drops/minutes.

4. Separate Comp. III, Comp. V, Comp. VI, and Comp. VII from aldosterone partition in Neher-Wettstein's method.

5. New contaminants were discovered from Comp. E and Comp. F partition after Bush-C System paper chromatography, called Comp. $E_2 \sim E_4$, Comp. F_2 ; and, other contaminants named $M_1 \sim M_3$, $Z_1 \sim Z_3$, $HC_1 \sim HC_3$, AC_1 and AC_2 in Chloroform-Formamide and Bush-C System paper chromatography.
6. Examination of the purities of Comp. B, Comp. E, Comp. F, and aldosterone partitions is made use of the ultra violet absorption spectrum, and necessitates 4 (C-F $\rightarrow$ Bush-C $\rightarrow$ E_2 B $\rightarrow$ Bush- B_5), or 3 (C-F $\rightarrow$ E_2 B $\rightarrow$ Bush- B_5), paper chromatographies to satisfactorily separate these compounds.
7. The H_2SO_4 chromogen spectrum of these partition correspond with the standard compounds.

Aldosterone を中心とした尿中 Corticosteroids

分離定量法に関する研究

日本大学医学部大島内科学教室 (指導 大島研三教授)

鈴 木 敏 弘

緒 言

副腎皮質より抽出せられた Steroids 中, 生物学的に活性を有するものとして, 現在迄に 7 種のものが知られている.

これらは, その生物学的作用から考えて 2 種類に大別されている.

すなわち, 主として糖質代謝に関与するところの Glucocorticoids, および主として鈣質代謝に関与する Mineralocorticoids である.

Mineralocorticoids としては, 従来は Δ^4 -Pregnene-21-ol-3,20-dione (11-Desoxycorticosterone, DOC) がその主体をなすものとされていたが, Simpson および Tait¹⁾²⁾, さらに Neher, Wettstein, Reichstein³⁾⁴⁾ らにより DOC より一層強力な鈣質作用をもつ Corticoid が発見され, これが Δ^4 -Androstene-3,11,17-trione なる物質であることがわかり, Aldosterone という名称で呼ばれ, Na 貯溜効果は DOC の 25 倍, K 排泄効果は 5 倍といわれ, 以来, 水および電解質代謝の面において, この物質が注目をあつめて来た.

本邦においては, 1957 年小田, 石井らにより尿中 Aldosterone の定量法が発表された⁵⁾⁶⁾のを最初として, 以後, 本態性高血圧症の内分泌因子, および体液電解質代謝の因子としての Aldosterone について, 各方面での研究が盛んとなり, 著者らの教室でも, 幾多の論文として発表して来た⁷⁾⁸⁾.

小田-石井法による Aldosterone 定量法は Peter Bent Briham Hospital での方法を基礎として, これに Neher-Wettstein 法の長所をとり入れ, 改良した方法である.

この方法は Chloroform にて抽出した粗抽出物を Florisil column chromatography⁹⁾ の後に, 2 つの paper chromatography を組合せ, 第 1 に Hydrocortisone を分離し, 第 2 に Cortisone を分離し, これにより分けられた Aldosterone 相当の Band を定量に供していた.

しかるに Nowacynski¹⁰⁾ らによつて, この方法で最終的に得られたものの中にも, なおいろいろの contaminants が含まれていることが明かにされ, Aldosterone 以外に Comp. II ~ VII の 6 種の未知の物質の存在が報告された.

他方, Aldosterone, DOC 以外に生物学的活性を有する Corticoids として, 次の 5 種のものが知られている.

- 1) Δ^4 -Pregnene-17 α ,21-diol-3,11,20-trione (Cortisone)
- 2) Δ^4 -Pregnene-11 β ,17 α ,21-triol-3,20-dione (Hydrocortisone)
- 3) Δ^4 -Pregnene-11 β ,21-diol-3,20-dione (Corticosterone)
- 4) Δ^4 -Pregnene-17 α ,21-diol-3,20-dione (17 α -hydroxy-DOC)
- 5) Δ^4 -Pregnene-21-ol-3,11,20-trione (11-Dehydrocorticosterone)

これらの Corticoids は一概に Mineralocorticoids, Glucocorticoids と分けられているが, Glucocorticoids にも鈣質作用があり, また Mineralocorticoids にも糖質に対する作用のあることが知られている¹¹⁾.

したがつて, 鈣質代謝作用を代表するものが Aldosterone であるとはいえ, 単に Aldosterone のみを測定して, 生体内における複雑な水および電解質代謝を言及することは危険である.

生体内における体液諸相の変化に関与するのは, これらの Corticoids の鈣質作用の総合されたものであ

り、単一の Corticoid のみの測定では何うことの出来ないものであると言える。

Hydrocortisone, Cortisone の鉱質作用をみても、同一物質の負荷によつても、その負荷量によつて Na 蓄積性に、あるいは排泄性に、あるいは、ほとんど影響ないようにと、3つの異つた態度を示し¹²⁾、かつ Mineralocorticoid と Glucocorticoid の同時負荷は Mineralocorticoid 単独負荷とは異り、腎における電解質出納の面で大分異なる効果を現すことが知られている。

これらの事から生物学的に活性のある個々の Corticoids を分離定量することは、臨床的に必要なことになつてくるのであるが、系統的にこれらの分離定量についての知見はなく、Aldosterone 定量にのみとどまつている。

著者は Aldosterone 定量法について再検討を行うと同時に、尿中における Corticoids の分離定量法について得た知見を報告する。

なお、本論文中における Corticoids の名称は Kendall に従い、Corticosterone は Comp. B, Cortisone は Comp. E, Hydrocortisone は Comp. F とした。

実 験 対 象

板橋日大病院入院中の正常妊婦、浮腫を有する腎疾患患者、および1例の Conn 症候群患者、本邦健康成年男子の24時間尿を対象とした。

実 験 方 法

方法は抽出、Chromatography、定性および定量の3つの段階に分けられる。

A. 抽出

5°Cの冷暗所に24時間蓄尿を行い、これを conc HCl にて pH1.5 とし、15°Cにて24時間加水分解を行つたのち、0.1容の chloroform にて5回連続抽出を行う。

抽出した chloroform は、その0.1容の $\frac{N}{10}$ NaOH にて2回、次いで同じく0.1容の蒸溜水にて2回洗滌し、芒硝にて脱水後、rotary flash evaporator にて減圧乾固する。

これを約 10ml の chloroform に溶解し、次の chromatography によつて純化してゆく。

B. Chromatography.

1. Florisil column chromatography.

95% ethanol にてよく洗滌した60~100 mesh の Florisil を600°Cにて4時間活性化し、これを湿式にて内径1cm、の column に5cmの高さにつめ、chloroform に溶解した抽出物をながす。

次いで chloroform 5ml, 1% methal in chloroform 25ml, 25% methanol in chloroform 50ml を流し、この25% fraction を採取し、乾固して paper chromatography に供する。

2. Paper chromatography.

i) Chromatography tank.

内径29cm、高さ42cm のガラス製円柱型の tank を使用し、容器内面は濾紙にて3~4枚位を重ねて囲む。固定層を必要とする iii)~v) の system の場合は、濾紙で内面を囲んだ後に、別の濾紙を矩形におつたものを tank 内面の濾紙の内側の対照の位置に2枚固定し、底部は tank の底に達するようにし、tank の底においた100ml容量のガラス・コップ内に入れる。

固定層はこのガラス・コップに入れ、tank の底には移動層を入れておく。

Chromatography に使用した濾紙は Whatman No.1 濾紙である。

ii) Chloroform-Formamide System (C-F System)¹³⁾

formamide 6ml に aceton 14ml を加え混合し、これに Whatman No.1 濾紙を浸し、余分の液を濾紙にて平等に吸いとり、直ちに試料を少量の chloroform に溶解し、start line にのせる。

tank 内面の濾紙に tank 底部の chloroform を充分かけ、直ちにその中に濾紙を吊し、formamide を飽和させた chloroform を移動層として下降法にて、22°C で 3～4 時間展開する。これを充分風乾し、各 band を切りとり methanol にて溶出し、乾固したものを次の system にかける。

iii) Bush-C System¹⁴⁾

溶媒は toluen : methanol : ethyl acetate : water (225 : 125 : 25 : 125) で、これを混和し、放置すると 2 層に分けられる。上層を移動層、下層を固定層とする。

tank 内面の濾紙に移動層を、コップに下げてある矩形の濾紙に固定層をかけ、試料をつけた濾紙を吊し、37°C にて 3～4 時間展開し、濾紙を風乾したのち、各 band をきりとり、次の system に供するように methanol で溶出する。

iv) E₂B System¹⁵⁾

溶媒は iso-octane : tert butanol : water (500 : 250 : 450) で、前者と同じく上層を移動層、下層を固定層とし Bush-C system と同じように tank を処置して、28°C にて 10～14 時間展開する。この後に、さらに次の system を用いる。

v) Bush-B₃ System.

溶媒は benzen : methanol : water (500 : 250 : 250) で、上層を移動層、下層を固定層とし、iii) および iv) と同様にして 25°C で 4～5 時間展開し、これを風乾し、各 band を切りとり、methanol で溶出乾固する。

C. 定性および定量

1. 定性

i) Ultra violet absorption spectrum

試料約 40 μ g を 95% ethanol 3ml に溶解し、210～350m μ の波長で吸収曲線を求めた。

ii) H₂SO₄ chromogen spectrum^{16)~18)}

試料 40～60 μ g を conc H₂SO₄ 5ml に溶解し、室温に 2 時間放置後 210～600m μ の波長で吸収曲線を求めた。

2. 定量

同一試料について、次の 2 種類の方法によつて定量を行つた。

i) 紫外線吸収法 (UV 法)

standard Comp. F を使用し 239m μ における standard curve を作成し、これと試料を比較測定した。

試料は 95% ethanol 3ml に溶解して行つた。

ii) Blue tetrazolium 還元法 (BT 法)

Nowacynski らの blue tetrazolium 反応に従い発色し 510m μ において測定した。

測定には Beckman 型 spectrophotometer (島津製作所製 QB 50 型)、paper における spot の確認には Mineralight V-41 型 (Ultraviolet products U.S.A.) 照射のもとに photocopy を行い、目的の Band を切りとつた。

成績

A. 抽出

抽出過程における回収率は表 I に示すごとく、5 回連続抽出法では Comp. B, Comp. E および DOC は有差の差はみとめられず、93.58～96.5% であり、Comp. F は 82.34, 84.02% であり、Comp. B, Comp. E および DOC は Comp. F よりも回収率がよい。

5 回連続抽出後の残部水層を、さらに 0.1 容の chloroform で抽出すると、Comp. B, Comp. E および DOC では 7 回目以後は、chloroform 中に試料を検出し得ないが、Comp. F では 8 回目に抽出した chloroform 中にも試料の残存がみられる。Aldosterone については、その純末を所有しないので、施行しなかつ

表 I Extraction

Samples	I ~ V		VI	VII	VIII
Comp. B	4.735mg	94.7%	104 γ	0	0
5mg	4.809	// 96.2 //	87 γ	0	0
Comp. E	4.823	// 96.5 //	60 γ	0	0
5mg	4.679	// 93.6 //	94 γ	0	0
Comp. F	4.201	// 84.0 //	634 γ	281 γ	84 γ
5mg	4.117	// 82.3 //	680 γ	329 γ	95 γ
DOC	4.825	// 96.5 //	59 γ	0	0
5mg					

表 II A Column Chromatography 60 drops/min.

Samples	CHCl ₃ fraction	1%M-C fraction	25%M-C fraction
Comp. B 50 γ	0	0	49.3 γ 98.6%
" 200 γ	0.5 γ	0	204.1 γ 102.1%
" 500 γ	0	0	498.0 γ 99.6%
" 3mg	1.3 γ	0	3.007mg 100.2%
Comp. E 50 γ	1.0 γ	0	52.9 γ 105%
" 200 γ	0	0	200.7 γ 100%
" 500 γ	0	0	523.1 γ 104.6%
" 3mg	0.3 γ	0	2.976mg 99.2%
Comp. F 50 γ	1.2 γ	0	52.2 γ 104.7%
" 200 γ	0.7 γ	0	198.2 γ 99.1%
" 500 γ	0.7 γ	0	504.0 γ 100.1%
" 3mg	0.8 γ	0	3.012mg 100.4%

表 II B Column Chromatography 80drops/min.

Samples	CHCl ₃ fraction	1%M-C fraction	25%M-C fraction
Comp. B 125 γ	6.4 γ	13.5 γ	112.1 γ 89.7%
" 500 γ	7.6 γ	10.9 γ	469.0 γ 93.2%
" 1250 γ	13.6 γ	42.0 γ	1107.3 γ 88.6%
Comp. E 125 γ	5.1 γ	15.7 γ	102.2 γ 86.6%
" 500 γ	10.1 γ	17.8 γ	453.4 γ 90.7%
" 1250 γ	15.3 γ	37.9 γ	1132.1 γ 90.6%
Comp. F 125 γ	6.6 γ	14.3 γ	104.9 γ 83.9%
" 500 γ	8.6 γ	13.5 γ	472.0 γ 94.8%
" 1250 γ	10.2 γ	33.1 γ	1153.7 γ 92.3%

methanol in chloroform fraction を C-F system に展開すると図 I に示すごとく, 4つの Band の形成がみられる.

た.

B. Column chromatography

定量的にみると表 II A に示すごとく, 分時60滴の滴下条件では Comp. B, E, F いずれも 25% methanol in chloroform fraction に出現し, その回収率はほぼ100%である.

滴下数を分時80滴とすると表 II B に示すごとく Comp. B, E, F のいずれも chloroform および 1% methanol in chloroform fraction に出現し, 25% methanol in chloroform fraction における回収率は低下する.

定性的には, 分時60滴の滴下条件では, DOC は 1% methanol in chloroform fraction に, Comp. B, E および F は 25% methanol in chloroform fraction に出現をみた.

なお, この際の reagent blank は表 III に示すごとき optical density を示し, 試料を含むものと様にして Chloroform, 1% および 25% methanol in chloroform の順に column を流し, これをとり, 乾燥させ 95% ethanol でこの蒸発皿を洗い, BT 法で測定したものである.

C. Paper chromatography.

1. C-F System

Column chromatography における 25%

表 III Optical density of reagent blank in Column Chromatography.

Chloroform fraction	1%M-C fraction	25%M-C fraction
.010	.085	.183
.019	.075	.172
.016	.045	.133
.017	.070	.140
.015	.080	.166
.020	.039	.157

最も極性の強いものからのべると、第1の band は、Comp. F の standard とほぼ一致した Rf 値を有し Comp. F およびその他の contaminants であろうと想像され、その Rf は 0.280, standard Comp. E を 1 とした migration rate (MR) は 0.420 であり、これを Comp. F fraction と命名した。

第2の band は standard Comp. E および F のほぼ中間にみられ Rf : 0.425, MR : 0.635 を示し、"M" fraction と名付けた。

第3の band は standard Comp. E とほぼ一致した Rf を有するもので Rf : 0.667 で、この中には Comp. E, Aldosterone およびその他の contaminants を含むものと想像され、Comp. E fraction とした。

第4は最も極性の弱いもので Rf : 0.880, MR : 1.29 を示している band で尿色素に移行し、その境界は明かでない。尿色素および人工の色素と思われるものは Mineralight にて黄色の螢光としてみとめられる。この band は solvent front に近く、可成り広い巾で拡がり、精確な Rf を求めることは困難であるが standard Comp. B をこの system にながすと、この Band の一部になるような位置であり、この点より、この band の一部には Comp. B が含まれるのではないかと想像される。

この band を "Z" fraction と名付けた。

2. Bush-C system

C-F system において分離せられた4つの band を夫々 Band-C system に展開すると、図 II に示すような多くの bands の形成がみられる。

i) Comp. F fraction.

C-F system の standard Comp. F 相当の band は Bush-C system によつて standard Comp. F に一致する band 以外に、3種類の未知の物質を分離した。この bands を極性の弱いものより $HC_1 \sim HC_3$ と命名した。すなわち HC_1 は Rf : 0.42, MR : 1.14 を示すもので紫外線照射で水色の螢光帯として見られる。 HC_2 は Rf : 0.185, MR : 0.38, HC_3 は start line 直下にみられる最も極性の強いもので Rf : 0.037, MR : 0.10 である。

ii) "M" fraction

図 II B に示すごとく "M" fraction は5つの bands に分けられ、それぞれの Rf, MR は図に示す値である。真中のものは standard Comp. F に一致した band として出現する。

iii) Comp. E fraction.

C-F system における Comp. E 相当の band は図 II C に示すごとく、standard Comp. F に一致するもの、すなわち現在迄 Aldosterone として定量していたもの、および Comp. E 相当部分以外に極性の強い AC_1 および AC_2 の2つの contaminants を分離した。 AC_2 は出現頻度は AC_1 よりも少ないが、出現するときは量が多い。

iv) "Z" fraction

図 II D に示すごとく "Z" fraction は Bush-C system で7つの分割に分けられ、それぞれの Rf および

図 I C-F System
Florisil Column→

図 2

A. Bush-C System
C-F→

“Comp. F” fraction in C-F.

C. Bush-C System
C-F→

“Comp. E” fraction in C-F.

B. Bush-C System
C-F→

“M” fraction in C-F System

D. Bush-C System
C-F→

“Z” fraction in C-F System

MR は図に示すようである。

真中に出現する band は Comp. E および F の standard の双方にまたがる大きな band であり、2番目に極性の弱い band は Rf 0.79, MR : 1.48 であり standard Comp. B に一致する band である。

3. E_2B system.

Bush-C system によつて分離した Comp. B, E, F, Aldosterone および contaminants を E_2B system に展開したものは図 III に示すような結果となる。

i) Comp. B 相当部分

E_2B system によつても, standard Comp. B と一致して出現し, ほかに band の形成はみとめられなかった。

ii) Comp. E 相当部分

C-F, Bush-C の 2 つの paper chromatography によつて分離された Comp. E 相当部分は E_2B system で現在迄に 4 種の bands に分けられた。

これは図 III B に示すごとく, standard Comp. E 相当部分以外に MR : 0.262, 1.524, 1.770 の 3 つの contaminants を含んでおり, これらを Comp. $E_2 \sim E_4$ と名付けた。

iii) Comp. F 相当部分

Comp. F 相当部分からは E_2B system で standard Comp. F に相当する band 以外に MR : 0.31 に水色の螢光としてみとめられる band を検出し, これを Comp. F_2 と命名した。

Comp. B とあわせて図 III A に示す。

iv) Aldosterone 相当部分

Aldosterone 相当部分は図 III C に示すごとく 3 つの bands に分けられる。Rf : 0.21 に出現する band, すなわち中央のものが Aldosterone 相当部分である。

図 3

C. E_2B System

Bush-C→

Aldosterone fraction.

D. E_2B System

Bush-C→

“M” fraction in C-F.

v) Contaminants.

“M” fraction 中 Bush-C system で $MR: 0.38$ を示したものは E_2B system で3つの bands に分けられ, $MR: 1.16, 0.82, 0.18$ を示す. また同様に Bush-C system で $MR: 0.10$ を示したものは E_2B system で $MR: 1.41, 0.11$ の2つの bands に分けられ, これを図 III D に示す.

“Z” fraction 中 Bush-C system で $R_f: 0.704$, $MR: 1.31$ を示したものは図 III E に示すごとく E_2B system では $MR: 0.76, 0.37$ の2つの bands に分けられ, Bush-C system で $R_f: 0.082, 0.496$ を示す2つの bands は $MR: 0.126$ の位置に同一の band として示される.

AC_1, AC_2 は E_2B でも極性強く, start line に近い位置に見出されるが, さらにいくつかに分れることはない.

4. Bush- B_2 system

Comp. B, E, F は Bush- B_2 system でいずれも単一の band として, 夫々の standard に一致した band として現れる. Comp. B, F は図 4 A. Comp. E および E_2B で分離された contaminant

E. E_2B System

Bush-C→

“Z” fraction in C-F.

図 4

Comp. E₄ は図 4 B のごとく現われ, Comp. E₄ の Rf は 0.71, MR は 1.44 である.

Aldosterone は図 4 C に示すごとく Rf: 0.30, 0.47 の 2 つの bands にわかれ Rf: 0.47 を示すものが Aldosterone 相当部分である.

D. 定性

以上のごとくして得られた各 bands が目的とする Corticoids であるか, 否かを証明するために, これらの H₂SO₄ chromogen spectrum を standard のそれと比較した.

結果は図 4 に示すごとく, いずれも standard と一致した H₂SO₄ chromogen spectrum を得た.

この各種の Corticoids の ultra violet absorption spectrum は図 5 A に示すごとく, 図 5 B の standard Comp. F のそれと一致し, 満足すべき程度に純化されていることを示す.

また C-F→F₂B→Bush-B₅ の paper chromatogr-

C. Bush-B₅
System E₂B→
Aldosterone in F₂ B.

図5の1

図5の2

aphy の組合せで得られた試料もこれと同様の結果を示している。

E₂B および Bush-B₅ system において紫外線照射で contaminant が検出し得なかつた Comp. B の Bush-C system 後の ultra violet absorption spectrum は図 5 B に示すごとく, peak をなす 240m μ 前後の吸光度が乱れ, curve は鋸歯状となり, なお不純であることがわかる。また同様 Bush-C system の後に H₂SO₄ chromogen spectrum を検した Comp. F では図 6 に示す結果となり, curve 全体の感じは似ているが, 222m μ における小さな peak がなく, 395m μ における peak が 475m μ における peak よりも高くなっている。

図 6 H₂SO₄ chromogen spectrum

図 7

AC₂ の H₂SO₄ chromogen および ultra violet absorption spectrum は図 7 に示すように, UV 吸収は 250~290m μ にて無限大となり H₂SO₄ chromogen は 260m μ にて最高の peak を, 302m μ において小さい peak を示している。

考 按

A. 加水分解, 抽出

副腎皮質より分泌せられた Corticosteroids は生体内で代謝をうけて尿中に排泄されるが, free form は少く, glucuronic acid, sulfic acid, とときには amino acid と結合し, いわゆる conjugated form となつてゐる。この様なものは水に溶けやすく, この方法のように chloroform で抽出することが出来ず, 加水分解ということが必要となつてくる。これにより conjugated form より free となつたものを抽出するのであるが, 尿中において生物学的に活性のある Corticoids がどの様な形をとっているかについては, なおいろいろの意見があり, Schneider, Cope¹⁹⁾ らは Comp. E, F は free かまたは glucuronide 以外の形で排泄されるとしているのに対して Venning²⁰⁾ らはこれと反対の立場をとっている。

いずれにせよ, free のものはそのまま, conjugated form は加水分解して抽出しなければならない。

加水分解の方法としては, 次のような方法がとられている。

- a) pH6~7 で直ちに抽出
- b) pH4.5~6.5 で β -glucuronidase で水解して抽出。
- c) pH1.0~1.5 で直ちに抽出。
- d) pH1.0~1.5 で24時間後抽出。

これらの方法のうち Aldosterone に関しては d) の方法によつて比較的大量が得られ, 酸性化しても24時間前後では破壊されることが比較的少いとされている。

Neher ら²¹⁾は Aldosterone 抽出に際し, b) 法で抽出した残尿を d) 法で, さらに抽出することにより, 前よりも多くの Aldosterone を抽出し得ると言い, Venning らも同様に認めている。

しかし、個々の Corticoids を測定するための抽出においては、Aldosterone のみを対象とする場合よりも、考えなければならない。

したがって、 β -glucuronidase による加水分解も考慮に入れなければならない。

そこで、理想的には、先ず d) 法によつて酸加水分解後抽出した残尿を b) 法によつてさらに加水分解し抽出するということが必要となつてくる。酸加水分解では pH が酸性になる程 Aldosterone の収量が增大すると言われているが、pH が 1.0 以下では加水分解過程において Aldosterone の破壊がおり、かつ尿色が極めて濃く、粗抽出物が赤色に近くなる。

これは pH による人工産物と思われる。

Conjugated form の抽出は水に対する溶解度より考えて、当然普通の有機溶媒では不可能であり、水と有機溶媒の中間的性質をもつ butanol が使用されるのであるが、butanol は Venning らによると pH 1.0 でも、その 70% を抽出するだけであり、アルカリ洗滌を行うとアルカリ液の方に移行してしまうという。

Edward らは $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 混合の尿に ether : ethanol (3 : 1) を用いて、抽出後 β -glucuronidase による加水分解を行つている。

抽出の原理は加水分解により水に難溶性となつた free form の Corticoids を chloroform に移すのであるから、free corticoids の chloroform に対する溶解性により抽出率は当然異つてくる。

Comp. B, E, DOC は Comp. F に比べて、同じ回数連続抽出でも、抽出率が高く、5 回連続抽出で Comp. F の 80% に比べて 95% となつている。また Comp. B, E および DOC では 7 回目以後に抽出した chloroform には試料を含有していないが、Comp. F では 8 回目の抽出で Comp. B, E の 6 回目位に相当する量が検出される。このことは 5 回連続抽出では Corticoids 測定に不充分であると言える。

著者は Aldosterone を所有していないので、Aldosterone を使用した抽出率を求めることが出来なかつたが、この実験結果より、個々の Corticoids を分離定量するためには少くとも 0.1 容の chloroform では 8 回の連続抽出を必要とする。rotary flash evaporator を使用しての乾固による loss は技術的な問題であるが、熟練すれば非常に少ないものと考ええる。

B. Chromatography.

1. Column chromatography.

Aldosterone の分離定量は Column chromatography に Florisil 又は Silicagel が用いられる。

Comp. B, E, F を使用しての Florisil column chromatography の回収率はほとんど 100% に近い。

これは滴下を分時 60 滴とした場合であり、80 滴とすると 1% および chloroform 分割にも出現がみられ、回収率は下る。

この成績をみると 60 滴としても chloroform 分割に微量出現がある様に思われるが、これは試料を含む量と関係のないこと、および 1% 分割に全く出ないこと、微量であること、より reagent blank の誤差範囲と考えられる。

Aldosterone については行わないが、これらの成績より考えて、やはり 100% 近い回収率が得られるものと思う。

この方法は、次の paper chromatography の前段階として行うもので、loss が可成り大きければ、粗抽出物の少いときは直接 C-F system に展開してもよいが、この回収率より考えると、contaminants を或る程度制限し、試料をのせる濾紙面が少くてすむという利点より、Neher, Wettsteinのごとく量によつて行うということではなく、すべてに適用してよいと考える。

Silica gel と Florisil との間には定量的には優劣はないとされており、次の C-F system を行うとき、どのような contaminants を多くもちこむかがその差となつてくる。

B. Paper chromatography.

1. Corticosteroids 分離における paper chromatography に関する技術的事項

結論的にこの定量には最低 3 回の paper chromatography を行うので、この間における失敗があれば定

量不可能となる。

失敗はまた、ほとんど paper chromatography においておこり得るので、特に注意を必要とする。著者の経験では、特に C-F system において技術的に困難を来すことが多い。

小田一石井法による尿中 Aldosterone 定量法は最初 C-F system の代りに Zaffaroni による toluene-propylenglycol system を使用していたがその展開時間が非常に長く、ただでさえも複雑をきわめる Aldosterone 定量法であるので、時間短縮の意味で C-F system を採用した。

また Comp. E と F の分離能もすぐれているので、これを使用した。

C-F system で Comp. E と Comp. F を分離するのに、技術的に最も大切なことは tank 内部の chloroform gas の飽和ということである。

これが不充分のときは solvent front が鋸歯状となり、傾いて流れたり、時には front が途中で stop する。このために、paper を set する前に tank の内面の濾紙に chloroform を充分かけて、すばやく set する。

paper を吊すのも tank の壁にどちらか一方が辺よりすぎていると斜に流れることがある。

tank と蓋は、その接触面に硬質のグリスをぬり、内圧で蓋が上つたり、gas がもれたりしない様に固定具をかけておく必要がある。

paper を処理する formamide はその濃度が高いと展開時間は延長するが分離能は高くなる。ただこの両者を考えると、やはり 20% formamide in acetone が適当であろう。

paper の処理が終わったら、直ちに試料をのせるのであるが、これも時間をかけすぎると、分離が悪くなる。

温度は 22°C であるが、理論的には室温 22°C のときなら、室温で展開出来得るわけであるが、実際には 22°C 以下の室温で恒温槽内で行うのが分離がよい。

この理由については、なお不明であるが、あるいは湿度にも関係するかも知れない。

C-F system に比べて Bush-C, E₂B, Bush-B₂ などの system は技術的に困難は少い。

原法に従えば、これらの system は飽和を必要としているが、著者は移動層を tank 内面にかけて、飽和時間を零にして行つたが、展開時間および分離能に関係なく、時間的に短縮する意味では推賞出来る。

2. Contaminants.

Neher & Wettstein 法、あるいはこの変法において Aldosterone と考えていたものの中に、現在迄に 6 種の Aldosterone 以外の Contaminants が発見されており、これについては Nowacynski²³⁾ らによつて詳細に報告されており、Comp. III は 11-Dehydroaldosterone であることも判明した²³⁾。

著者も Bush-C system における Aldosterone 相当の band より contaminants を分離したが、これらの物質の R_f の値より、彼等の Comp. III, V, VI, VII に相当するものと考えられる。

また Bush-C system における Comp. E 相当の部分より、新たに 4 種の contaminants を分離し、これを Comp. E₂~E₄ とした。又 Comp. F 相当部分からも contaminant として Comp. F₂ を分離したが、これらの他に M₁~M₈, Z₁~Z₈, AC₁, AC₂, HC₁~HC₈ の 21 種の contaminants を分離したが、本邦においては稲葉²⁴⁾、岡田²⁵⁾により分離された contaminants がいくつか報告されているが、両者共 C-F system でなく toluene-propylenglycol system を使用しているので、著者の分離した contaminants のどれに相当するかは不明である。欧米においても Hernando²⁶⁾ Brook ら²⁷⁾ の contaminants について報告があるが、これらの報告の各種 paper chromatography における R_f 値より考えると、著者の分離したもののうちの幾つかであると思われる。

Brook らの報告している contaminant は Bush-C system において Comp. F よりも、さらに極性の強いもので Wildegosterone と呼んでいるが、これと Aldosterone が何らかの関係を有するような興味あることを報告している。

すなわち Wildegosterone は妊娠時に増加し、Addison 氏病患者で、Aldosterone, Wildegosterone と

に見られないものに Aldosterone を負荷し、尿中に Aldosterone および Wildegosterone 排泄をみている。また Wildegosterone は KCl 投与で増加することを報告しているが、著者の分離した contaminants のうち、Bush-C, E₂B, Bush-B₅ の system において極性が強く、KCl 投与で著明に増加したのは AC₂ であり、これより考えて、あるいは AC₂ と Wildegosterone が同一の物質であるかも知れない。

Aldosterone を負荷して、これがみとめられるようになったと言うことは、本物質が、Aldosterone の代謝産物ではないかという疑を持たせる。

いずれにせよ問題になるのは著者の分離した多くの contaminants が副腎皮質ホルモン中の何に由来するかということである。

もちろん生物学的に活性の Corticosteroids の代謝産物も含まれるであろうし、非活性のもの、あるいはその代謝物も含まれるであろう。

これらの由来を追求することは生体内における Corticosteroids 分泌を伺う上に極めて重要なこととなつてくる。しかし、いろいろに代謝されているものをすべて合成し、これらの Rf 値、H₂SO₄ chromogen, ultra violet absorption, などを検することは不可能なことではある。

しかし生物学的に活性の 7 種の Corticosteroids の C¹⁴ で label したものが出来れば、これを生体に負荷し、尿中の Corticoids を分離する際、paper chromatography のどんな Rf を示して C¹⁴ を含むものが出現するかを追求すれば解明出来る問題である。

これらの contaminants を容易に分離し得るようにすることが paper chromatography の system を決定する条件となるが、やはり必要なものは standard の Corticoids である。

その意味で Comp. B, E, F などは 18 位の C が methyl 基となつているために、天然に存在する steroids, たとえば desoxychol 酸などから、その化学構造の一部をかえ、いわゆる部分合成によつて作り得るので便利であるが、Aldosterone は methyl 基でなく aldehyd 基であるためこの様な steroid は天然に存在せず、全合成によらねばならないため、入手が極めて困難でこれを standard に用いることがむずかしい。C-F,

Bush-C system のごとく、Aldosterone の Rf 値が standard の Comp. F, E などとほとんど一致するものはよいが、E₂B, Bush-B₅ などの system では全く別の band となるので、この場合どの band が Aldosterone かを見分けるのは Rf 値にたよるを得ない。

ところが paper chromatography における Rf 値は著者の得た値と Nowacynski, Venning らのそれと比べると多少ではあるが異つている。

したがって、この様な system ではその前に極力 contaminants を除去しておかないと、切りとつた band が目的以外のものであるという可能性も出てくる。

たとえば、著者が現在迄に分離した contaminants が 1 つの sample において全部出たとすると、この際 C-F system より Bush-C を通さずに E₂B system にかけたときは図 8 に示すようにいくつもの bands の出現をみる。あるいは新しい contaminants が Aldosterone の付近に検出されたとすると、非常に難しいことになる。このように考

図 8 E₂B System
C-F→

“Comp. F” fraction in C-F.

えると Bush-C system はやはり大切になってくるわけである。

3. Comp. B, Comp. E, Comp. F および Aldosterone の純粋分離

これらの Corticoids を最終的に比色定量するときに、個々のものに特異的な化学反応を利用して行われるならば、いくつもの paper chromatography を組合せて純化する必要はないが、現在ではこれがなく、したがって、純化するということは不可欠の条件となつてくる。

paper chromatography を重ねてゆくときに、対象とするもの以外に contaminant を分離し得る間は純化されたとは言えない。

したがって Bush-C system の後に Aldosterone, Comp. E, F を測定することは誤りであるといえる。Comp. B は E₂B system で Mineralight 照射により contaminant の存在はなかつたが、この方法は UV 吸収法であるから、 α - β 不飽和ケトン基を有するものしか検出されず、これ以外のものは見えないが、存在を否定出来ない。UV absorption spectrum によつて不純なことが判つたのはこの点である。

UV absorption spectrum は standard のそれと比較するとき、その一致の度合は sample の純化の度合を示すものとされている。

この方法により Corticoids が純化されたとするには少くとも3つの paper chromatography の組合せを必要としている。すなわち C-F→Bush-C→E₂B→Bush-B₅、あるいは C-F→E₂B→Bush-B₅ である。

これにより純化されたと思われる物質がはたして目的の Corticoids であるかを検するため H₂SO₄ chromogen spectrum を standard と比較して、これに一致することをみとめたが、この curve は各種の steroids に特有の peak をなすことが知られている。この curve は steroid の化学構造には関係はないが、 Δ^4 -3-Keto 基を有するものは 280~290m μ において強い吸収をみとめる。また free form と C₃, C₅, C₁₁, C₂₀, C₂₁ の mono acetate は全く同一の spectrum を示すとされている。

純化されない物質ではもちろん standard とは変つた型のものが得られる。

これらの成績によつて間違なく純化された Aldosterone, Comp. B, Comp. E, Comp. F が系統的に測定し得るのであるが、DOC はこれらの Corticoids 分離のための paper chromatography では極性が非常に弱く、1% methanol in chloroform に出現するものを全く別の paper system で分離純化して行かなければならない。

Comp. B, E, F および Aldosterone を純化する際に、仮に Comp. B が2回の paper chromatography の組合せで純化し得るとして、個々の Corticoids を別個に独立して測定する際には、Comp. B は2つ、他は3つの paper chromatography を組合せて測定してもよいわけであるが、相対的にその量を論じるためには、すべて全く同じ過程を通さねばならない。生体における電解質代謝に関与するものは、これら生物学的に活性の Corticoids の総合されたものであるばかりでなく、最近 Ross²⁹⁾ の報告によれば Aldosterone 単独負荷と Comp. B との同時負荷とを比べると、Aldosterone+Comp. B の負荷は Aldosterone 単独よりも Na 蓄積性が抑制され、K排泄が促進するという。これは彼も言うごとく、Conn 症候群の病態解明の上から極めて興味深いことである。著者も Conn 症候群患者の尿中より、現在迄に経験したうち最も大量の Comp. B を検出したことと考えあわせ興味ある事実である。

このように電解質出納の面より見ても、単に Aldosterone のみを測定して満足出来るものではなく、Corticoids のすべてを測定し、その相対的値より推測すべきことである。

次に問題となることは、このように純化した free form がはたして生体内においてこの分泌を反影するか否かということである。

特に Aldosterone のごとく分泌機序が不明であるものの分泌規制因子を追求するのには、この点が重大な問題となつてくる。

尿中物質を測定するには free form のほかに metabolite されたものの測定が不可欠であり、この量が free form よりもはるかに多いであろうことは著者の分離した contaminants をみても明白な事実である。これを総合してはじめて生体内におけるその分泌を、さらには生理的、病理的意義を伺うことが出来るので

ある。

分泌調節因子の追求には当然、真に分泌を反映する様な方法をとらねばならず、協研者吉沢³⁰⁾は犬副腎静脈血中の Corticoids 定量法を、横田³¹⁾は各種条件下における変動について発表している。

著者は paper における spot の確認に UV 吸収法を用いたが、なおこれによつてみとめられない contaminants も存在している。

tetrahydrocorticoids がそれで、これは α - β 不飽和ケトン基をもたないため、この方法ではみとめられない。かつこれは可成りの量が存在するとされ、ごく微量の代謝産物は別としても、これは測定の一部に加えなければ、生体での分泌を伺うことが無理である。

このように考えると純粹に分離するということが臨床上 どのような意味をもつかという疑問が生じてくる。その上1回の paper chromatography の実施による loss は10~20%であり、4回の paper chromatography を行えば、その回収率がいかに低下するかがわかる。しかし metabolited form の測定については将来にゆずるとして、現在の段階では、free form の測定法がまず問題となり、このためには純化ということも必要になつてくるのである。

C. 定量

定量法としては現在 UV 吸収法および BT 法の2法が一般に用いられている。

Aldosterone について UV 法、BT 法の2方法で同一試料を測定した結果は Venning らの報告にみられるが Bush-C, E₂B system のあとでは UV 法が高い値を示している。

UV 法は 4⁴-3-Ketone に共通の反応であり、BT 法は20,21- α Ketol あるいは 17-OH 20,21- α Ketol に共通の反応であり、UV 法で高い値を示したことは、BT 陰性の contaminant の存在を暗示するものである。

方法としては、なにぶん微量物質であるから paper blank の低いことが望ましく、この点でも BT 法が用いられ、また BT 陰性物質を除外する意味にもなる。

しかし metabolited form をも測定するということになれば BT 法、UV 法も陰性なものも出現し、満足な方法とはいえない。Porter-Silber 反応にしても Aldosterone は陰性である。この点に関してもなお進歩の余地が多い。

ただ純粹分離を行つた free form に関しては BT 法で満足出来るものと言える。

結 論

著者は尿中の Aldosterone を中心とした Corticosteroids 分離定量法について検討し、つぎの結果を得た。

1) Chloroform による抽出過程における回収率は Comp. F では80%, Comp. B, E, および DOC では95%である。

2) 連続抽出をさらに行うと、Comp. B, E および DOC は7回以後検出されないが、Comp. F では8回目において、Comp. B, E の6回目とほぼ同量のものが検出される。

これより本定量には8回の連続抽出を必要とする。

3) Florisil column chromatography においては、分時60滴の滴下条件では Comp. B, E, F は25% methanol in chloroform に出現し、その回収率は約100%であるが、滴下数を80滴とすると1% methanol in chloroform および chloroform fraction にも出現し、回収率は低下する。

4) paper chromatography において Bush-C system における Aldosterone 相当の band より Comp. III, V, VI, VII を分離した。

5) Bush-C system における Comp. E 相当の band より新たに未知の物質である Comp. E₂~E₄, Comp. F 相当の band より Comp. F₂ を分離した。このほか、未知の Z₁~Z₈, M₁~M₈, AC₁, AC₂, HC₁~HC₈ の21種の contaminants を分離した。

6) Comp. B, E, F および Aldosterone の純化を ultra violet absorption spectrum により検し, これらの純化には C-F→Bush-C→E₂B→Bush-B_s, あるいは C-F→E₂B→Bush-B_s の3 または 4 つの paper chromatography の組合せを必要とする.

7) これにより得られた試料の H₂SO₄ chromogen spectrum は standard のそれに一致し, これらが目的の Corticosteroids であることを同定した.

本稿を撰筆するにあたり御指導, 御校閲を賜った恩師大島研三教授, 御援助を戴いた久代登喜男助教授, 直接研究の御指導を戴いた小田立男講師に深謝するとともに日夜御協力を戴いた石井昭郎博士はじめ大島内科代謝班員各位, ならびに研究室助手の方々に感謝致します.

文 献

- 1) Tait, J.F., et al. : Lancet 262 122 1952.
- 2) Tait, J.F., et al. : Nature 169 795 1952.
- 3) Simpson, S.A., et al. : Experimentia 10 132 1954.
- 4) Simpson, S.A., et al. : Helv. Chim. acta 37, 1163, 1954.
- 5) 小田立男 : 日本医事新報, 1729, 37, 1957.
- 6) 石井昭郎 : 日大医誌, 17, 1710, 1958.
- 7) 村井隆三 : 日大医誌, 19, 513, 1960
- 8) 菅沼 勲 : 日腎誌, 2, 169, 1960.
- 9) Samuels : J. Clin. Endocrinol. 12 519 1955. 19 513 1960.
- 10) Nowacynski, W., et al. : Can. J. Biochem. Physiol. 34 1023 1956.
- 11) 小田立男, 鈴木敏弘他 : ホルモンと臨床, 7, 940, 1959.
- 12) 大島研三, 他 : 日本循環器学会 1960年総会.
- 13) Zaffaroni, A. : Recent Progr. Hormone Res. 8, 51, 1953.
- 14) Bush, I.E. : Biochem. J. 50, 370, 1952.
- 15) Eberlein, W.R., et al. : Arch. Biochem. Biophys. 59, 90, 1955.
- 16) Zaffaroni, A. : Recent Progr. Hormone Res. 8, 51, 1953.
- 17) Gornall, A.G., et al. : Can. J. Biochem. Physiol. 35, 71, 1957.
- 18) Simpson, S.A., et al. : Helv. Chim. Acta 37 1163 1954.
- 19) Nowacynski, W., et al. : J. Lab. & Clin. Med. 45, 818, 1955.
- 20) Schneider, et al. : J. Biol. Chem. 194, 337, 1952.
- 21) Venning, et al. : Recent Progr. Hormone Res. 8, 27, 1953.
- 22) Neher, R., et al. : J. Clin. Invest. 35 800 1956.
- 23) Nowacynski, W.J. et al. : Can. J. Biochem. Physiol. 34, 1023, 1956.
- 24) 稲葉 稔 : 日本内分学会第32回総会
- 25) 岡田弘二 : ホルモンと臨床, 6, 738, 1958.
- 26) Hernando, L. et al. : Metabolism 6, 518, 1957.
- 27) Brook, R.V. et al. : Lancet 3, 925, 1956.
- 28) Zaffaroni, A. et al. : J. Biochem. 193, 749, 1951.
- 29) Ross, E.J. : J. Endocrinol. Metab. 20, 229, 1960.
- 30) 吉沢基一郎 : 日本内分泌学会雑誌. 36, 200, 1960.
- 31) 横田睦雄 : 日本内分泌学会雑誌 36, 199, 1960.