4) In case of infusion of galactose solution blood glucose decreased parallel to the increasing value of the total blood hexose.

There was a similar pattern of insulin-like activity and glucagon-like activity of blood as in the case of glucose infusion.

Thus, galactose seems to promote glucagon secretion, insulin consumption and subsequent insulin secretion. A-V ratio also showed increase on galactose infusion.

5) No particular change of insulin-like activity or glucagon-like activity of blood was observed on levulose infusion. This seems to indicate that insulin is not necessarily required for metabolism of levulose.

Total hexose of blood showed no corresponding increase after levulose infusion. This seems to indicate the relatively quick break down of levulose after infusion. A-V ratio showed no increase on levulose infusion.

6) Electrical stimulation of Vagal Nerve brought about no regular increase or decrease of insulin-like activity of blood drawn from V. pancreaticoduodenalis sup.. In two dogs with relatively high insulin-like activity of blood in preexperimental stadium there occurred decreased insulin value but it was reversed in one dog with low initial blood insulin level.

Thus, attempt has been made to elucidate from this view-point, that stimulation of vagal nerve does not exert a direct accelerating effect on β -cell of islets, it influences blood insulin through complex metabolic and nervous routes.

No apparent difference between the right or the left vagal stimulation was observed. Blood glucagon-like activity and A-V ratio showed no particular change after vagal stimulation.

7) Dogs, which received right as well as left vagal section, showed decreased response of blood insulin level on glucose infusion in comparison to normal dogs.

Glucagon-like activity of blood showed decrease in the same instance. This phenomenon was explained from the plausible consumption of glucagon on glucose infusion.

Experimental Studies on the Correlation Between Male Hormones and Pituitary-thyroid System.

Report I. Influence of castration and male hormone administration
upon the plasma TSH-level and serum PBI.

Noriyuki YONEZAWA

The 2nd Department of Internal Medicine, Kobe Medical College, Kobe, Japan.

(Director : Prof. Dr. Shozo Tsuji)

The correlation between female gonads and pituitary-thyroid system has been discussed very often in the realm of endocrinology and gynecology. As regard to the influence of male gonads upon pituitary-thyroid system there are still many discrepancies of opinion about the result of experimental studies. One of the reasons of such diverse opinions consists in the lack of an appropriate method

for the direct measurement of thyrotropin (hereafter abbrev. as TSH) activity in blood. Ogura et al. of our clinic developed a new method for the direct measurement of plasma TSH activity using I^{131} -release method of calf thyroid slices with Warburg apparatus.

The author therefore tried to study the influence of castration and male hormone administration, i.e., testosterone propionate (abbrev. as T.P.) and Methylandrostendiol (abbrev. as MAD) upon the plasma TSH activity of normal and thyroidectomized dogs with Ogura's method. The serum PBI level was also determined on normal and castrated dogs, further more on castrated dogs treated with T.P. successively using Barker's method.

The results are summarized as follows :

1) The castrated male adult dogs showed a transient elevation of plasma-TSH activity up to the 9th day after castration. A rather sharp decrease of plasma-TSH activity was observed thereafter, reaching its lowest limit in postoperative 30~60 days. The plasma-TSH level then turned to increase but it remained still in subnormal level even 120 days after castration.

2) The plasma-TSH level of thyroidectomized dogs showed marked increase after the operation. If these thyroidectomized dogs are castrated, the elevated plasma-TSH value turns directly to decrease, showing no transient increase, which was observed on nonthyroidectomized dogs. The plasma-TSH value reached the lowest level in between 8~14 days after castration, then it began to increase gradually but even 100 days after castration it remained still in a lower level than preoperative niveau.

3) Injection of T.P. to the male castrated dogs produced elevation of plasma-TSH value. Simultaneous observation of serum PBI showed also an elevated value. The most marked increase of plasma-TSH was observed with single injection of testosterone heptanoate in doses of 5.0mg/kg of body weight, then T.P. 1.0mg/kg/day and 0.5mg/kg/day for three successive days followed the former. Single injection of T.P. in doses of 1.0mg/kg, 5.0mg/kg and 0.1mg/kg brought about also a slight increase of plasma-TSH value in order.

4) The castrated dogs responded with greater percent increase of plasma-TSH upon the injection of T.P. as compared with the castrated-thyroidectomized dogs. A plausible explanation of this phenomenon was sought in the lowered reactivity of elevated plasma-TSH of the thyroidectomized dogs.

5) The decrease of plasma-TSH value on the castrated dogs and the increase of the value upon injection of T.P. are most plausibly explained from the antagonism of TSH-producing activity and gonadotropin-producing activity of anterior pituitary.

6) Injection of MAD showed no apparent influence upon the plasma-TSH level of male castrated dogs and castrated-thyroidectomized dogs. MAD seems to have no effect upon pituitary-thyroid system.

Report II. On the functional response of thyroid upon castration and male hormone administration

Following the report I, the behavior of thyroid gland under castration or male hormone administration was observed. Normal and castrated adult male dogs under thyroid-constant feeding were used in the following experiment to observe the behavior of the thyroid gland. The thyroid gland was totally resected under Isozol-anesthesia and the following examinations were carried out on them.

1) Paper radiochromatography of the iodinated amino acid fractions of the thyroid gland.

The gland was homogenized with NH_4OH-NH_4Cl buffer, then digested with trypsin and urea. The butanol extract of trypsin digest was examined on paper-radiochromatography.

2) Percent uptake of I^{131} after Leblond & Gross and Soliman & Reineke's method.

- 3) PBI^{131} conversion ratio, i.e.

$$\frac{\text{the total organic } I^{131} \text{ serum}}{\text{the total serum } I^{131}} \text{ ratio}$$

- 4) PBI of the serum according to Barker's Method.

- 5) Histological classification of the thyroid with special reference to the functional behavior of thyroid after Irie's classification.

The results of the observation are summarized as follows :

1) Paper radiochromatographic fractionating of I^{131} -labeled amino acid fractions of the thyroid gland digest resected from the castrated dogs (300~360 days after castration) showed no abnormal pattern as compared with that of normal thyroid.

2) Injection of testosterone propionate to the castrated dogs produced decrease of MIT-DIT fraction and increase of T_3 - T_4 fraction on the paper radiochromatography, consequently the ratio T_3+T_4 /MIT+DIT showed increase.

3) Injection of thyrotropin (Pretiron, Schering) to the castrated dogs brought about also decrease of MIT-DIT fraction and increase of T_3 - T_4 fraction with consequent increase of T_3+T_4 /MIT+DIT ratio. Thus the pattern of ionized amino acid fractions of the thyroid gland showed the same response on the injection of testosterone propionate and thyrotropin. This result makes it plausible, that testosterone propionate exerts its effect via stimulation of thyrotropin secretion.

4) Methylandrostendiol showed no apparent influence upon the distribution of I^{131} -labeled amino acid compound of thyroid.

5) Parallel examinations of various functional criteria of the thyroid gland such as percent uptake of I^{131} , serum PBI^{131} /serum total I^{131} ratio, serum PBI and histological classification of the thyroid showed evidence corresponding to the results mentioned in 2) to 4), i.e., the evidences corresponding to the hyperfunction of thyroid gland in the hormone production, where the increase of T_3+T_4 fractions and the decrease of MIT+DIT fractions was observed on paper-radiochromatography.

Studies on Diabetic β_1 -Lipoprotein

Shigeo AKITA

The 1st Department of Internal Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine.

(Director : Prof. Hideo Yoshida)

We prepared β_1 -lipoprotein from human diabetic serum and studied its diabetogenic action. The following results were obtained.

1) Intravenously injected insulin I^{131} was retained in the blood of diabetic patients with and without insulin treatment.

Therefore, it was suggested that diabetics had common unknown extracellular factors in their serum which impeded the distribution of insulin I^{131} to the tissue. At the same time, the blood sugar reduction by insulin was lower in diabetics than in normals.

2) Diabetic β_1 -lipoprotein inhibited the glucose output of rat liver-slices and the glucose uptake of rat diaphragms, but in normal ones it accelerated both.

3) Diabetic β_1 -lipoprotein inhibited the binding of insulin I^{131} to liver, kidney and muscle slices

男性ホルモンと下垂体甲状腺系との 相關に関する実験的研究

神戸医科大学第二内科学教室 (指導 辻 昇三教授)

研究科学生 米 澤 典 之

(昭和35年11月28日受付)

第1編 下垂体甲状腺刺激ホルモンとの相關について

目 次

第1章 実験方法	第3章 男性ホルモン投与の形響について
第1節 実験材料	第1節 Testosterone propionate 投与の 影響
第2節 実験方法	第2節 Methylandrostendiol 投与の影響 (附) 去勢並びに Testosterone propio- nate 投与による血清 PBI 値の変 動
1) 血漿 TSH 値測定法	
2) 血清 PBI 値測定法	
第2章 去勢による血中 TSH 値の変動につ いて	第4章 総括並びに考按
第1節 正常犬における変動	第5章 結 語
第2節 甲状腺剝出犬における変動	

い と ぐ ち

臨床的に甲状腺疾患に罹患する男女の差は圧倒的に女子に多く、例えばバセドウ氏病は女子が男子の4～8倍、粘液水腫では7倍と何れも女子に多いことが認められている。従つて女性ホルモンの甲状腺に及ぼす影響については古くから多くの研究がなされていて、その作用機序についても詳細な発表をみることが出来る。これに比して男性ホルモンの甲状腺への作用についての報告は少なく、未だ定説がない。更にこれが下垂体甲状腺刺激ホルモン (TSH) に及ぼす影響については、その報告はきわめて少なく、特に血中 TSH 値に与える影響についての報告には未だ接しない。これは血中 TSH が微量であるために、その測定が極めて困難であつたことによる。教室の小倉¹⁾はさきに、in vitro における新鮮な牛甲状腺薄片 I¹³¹ Release 法を発案して血中 TSH の定量を可能ならしめた。著者はこの方法を用いて、種々なる条件の下で雄犬に男性ホルモンを投与し、その血中 TSH レベルの変動を観察してその結果を先ず本編に於て報告する。第2編では、これらの実験犬を用いて、男性ホルモン投与時の甲状腺を種々観察し、第一編と併せて男性ホルモンの下垂体甲状腺系に及ぼす作用機序の総括的な考察を行なつた。

第1章 実験方法

第1節 実験材料

実験動物には全て生後1～3年を経た体重10～15kgの健康は成熟雄雑種犬を使用した。実験犬は常に一定の条件で飼育する様に留意し、特に飼料はキャベツ、海藻類等の甲状腺機能に影響をあたえるものをさけた。測定は酷暑厳寒時をさけて行ない、常に同一条件で飼育した対照犬を用いて観察した。

第2節 実験方法

1) 去勢術は Isozol 静脈内麻酔下に、鼠蹊部より入り睪丸、副睪丸を共に剔出した。対照には同様の操作で入り、白膜に切開を加えたのみで手術を終えた偽手術犬を用いた。なお局所消毒剤にはヨードチンキの使用を避けた。

2) 甲状腺剔出術は同様静脈内麻酔下に、上皮小体を残して出来るだけ全剔出を行ない、術後血清 PBI の減少を確認した。

3) 血漿 TSH 当量の測定は、さきに教室の小倉¹⁾が in vitro において新鮮な牛甲状腺薄片が負荷された I^{131} を放出する際に、そのメデウムに含まれる TSH の濃度に一定の相関を以て I^{131} の放出が抑制されることを利用して発案した牛甲状腺薄片 I^{131} Release 法によつた。TSH の測定の Standard には、Schering 社の Pretiron を使用し、常に 10^{-3} 、 10^{-4} JSU の示す I^{131} 放出抑制能で補正した値を用いた。測定に供した血液は全て頸静脈より Heparin 加採血によつた。

4) 血清 PBI の測定は、Barker²⁾のアルカリ灰化法によつて行なつた。

第2章 去勢による血中 TSH 値の変動について

第1節 正常犬における変動

第1図 去勢による血中 TSH 値の経時的変動

男性ホルモンの下垂体甲状腺系に及ぼす影響をみるに先だつて、正常犬においては去勢により血中 TSH レベルが如何に変動するかを観察した。第1図を去勢犬9例(内1例死亡)の血漿 TSH 値の変動を経時的に測定した値を示し、第2図はその平均値を示した。すなわち図の如く術後9日以内においては、その TSH が一時増加する傾向を示した。次で減少の傾向をたどり、30日以降60日の間においては最低値に減少した。しかる後漸増の傾向をたどつて行くが、術後120日に至つてもその値は術前に比して低く、術前値の

第2図 去勢による血中 TSH 値の経時的変動

約40%に止つている。対照の偽手術例は同期間中、術後9日以内に於いて一時増加した以後は術前値に比して有意差のある傾向を示さなかつた。

第2節 甲状腺剔除犬における変動

前節においては正常犬が去勢による血中 TSH 値の減少を来すことを認めた。他方、甲状腺機能に及ぼす TSH の影響については、古くからその主従性について種々論議されている処である。すなわち TSH の刺激によつて甲状腺ホルモン分泌が促進されるとする下垂体主説と、血中甲状腺ホルモンの低下によつて下垂体前葉の TSH 分泌が促進されるとする下垂体従説とがある。一般には、甲状腺の自律性を強調する後者の所謂 feed back 説が有力である。著者はこの feed back の影響の関与を除外する為に、あらかじめ甲状腺を剔除した犬を用いて、去勢による血中 TSH 値の変動を観察した。ここに注意すべきは、甲状腺剔除が TSH 分泌に及ぼす影響である。教室の佐古田によれば、手術侵襲が TSH 分泌に及ぼす影響は術後7~14日を経過すれば消失すると報じ、小倉¹⁾は甲状腺剔除による血中 TSH レベルの上昇は、術後1~3月を経過すればほぼ一定のレベルに固定することを認めている。この為に甲状腺剔除術後3カ月以後において去勢を行なつて観察した。第3図はその経時的変動を示し、第4図は同期間中の平均値を表す。すなわち甲状腺

第3図 甲状腺剔除犬の去勢による血中 TSH 値の変動

第4図 甲状腺剔除犬の去勢による血中 TSH 値の変動

剔除犬の血中 TSH 値は去勢術前において正常犬の10~20倍の高値を示している。去勢を行なうと、正常犬に去勢を行なつた場合と異なり、手術後直ちに血中 TSH 値は減少して8~14日後に最低値を示した。次で漸時上昇の傾向をたどるが、術後100日前後においても尚術前値に比して低値を示しその10%程度に止つた。対照とした非去勢甲状腺剔除犬においては、同期間中有意の変動の傾向を示さなかつた。すなわち甲状腺剔除犬においても、正常犬と同様去勢

により血中 TSH 値の減少を認めた。

第3章 男性ホルモン投与の影響について

第1節 Testosterone propionate 投与の影響

男性ホルモンとしては, Androsterone, Dehydroandrosterone, Testosterone, Methyltestosterone, Methyl-androstendiol 等があるが, Testosterone, Methyltestosterone は男性化作用が強く, Methylandrosterone は蛋白同化作用が著明で男性化作用は弱いとされている。著者は第2章において, 正常犬並びに甲状腺剝出犬が去勢により血中 TSH 値の低下を示すことを認めたが, 本章においては, これらの去勢犬に男性ホルモンを投与して血中 TSH 値の変動を観察した。

先ず男性ホルモンとして Testosterone propionate (以下T.P.と称す)を選び, その結晶水性懸濁液を筋肉内に投与して観察を行なった。対照には, 該実験犬に投与したと同容量の生理食塩水を筋肉内に投与した正常犬及び甲状腺剝出犬 (以下甲剝犬と称す)を用いた。実験中, 単回投与時では絶食せしめ, 連続投与時は常に一定の食餌で飼育した。以下投与前の血中値の平均値を1.0として表し, 投与後の血中 TSH 値の平均を比で示した。

1) T.P. 0.1mg/kg 単回投与

正常犬を去勢した実験群 (以下去勢群と称す)においては表1)に示す如く投与前血中 TSH 値1.0に比して, 6時間後に血中 TSH 値は7.50と増加を示してい

第1表 去勢犬に対する Testosterone Prop. 投与の影響 (T.P. 単回投与)

処 置	T.P.投与量	実験 番号	血漿 TSH 値mJSU/ml	
			投与前	投与後
去勢群	0.1mg/kg	1	0.005	0.004
		2	0.006	0.100
		3	0.008	0.012
		4	0.006	0.063
平 均			0.006	0.045
増 加 率			1.00	7.50
甲剔- 去勢群	0.1mg/kg	5	0.288	0.809
		6	0.832	0.100
		7	2.040	6.520
		8	0.219	0.380
平 均			0.845	1.955
増 加 率			1.00	2.20
正常犬 甲剔犬	対 照	9	0.617	0.511
		10	1.620	1.060

第2表 去勢犬に対する Testosterone Prop. 投与の影響 (T.P. 単回投与)

処 置	T.P.投与量	実験番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml			
			前 値	6 時間後	12時間後	24時間後
去勢群	1.0mg/kg	1	0.002	0.479	0.490	0.003
		2	0.034	0.204	0.288	0.013
平 均			0.018	0.341	0.389	0.008
増 加 率			1.000	19.0	21.6	0.44
甲剔- 去勢群	1.0mg/kg	3	8.320	15.60	20.20	6.790
		4	0.202	4.170	0.204	0.263
		5	0.155	0.912	6.610	0.091
平 均			4.318	10.34	13.50	3.557
増 加 率			1.00	2.40	3.13	0.82
正常犬 甲剔犬	対 照	6	0.036	0.043	0.039	0.025
		7	9.770	5.010	7.820	4.680

る。甲剔犬を去勢した実験群（以下甲剔去勢群と称す）においては前値1.0に対して2.20と増加しているが、その増加率は去勢群に較べて軽度であった。

2) T.P. 1.0mg/kg 単回投与

去勢群においては、第2表に示す如く前値1.0に比し、6時間後は19.0、12時間後は21.6、24時間後は0.44となり、投与後6～12時間において著明なる増加を示し、24時間後にはかえって低くなっている。甲剔去勢群においては、6時間後は2.40、12時間後は3.13、24時間後においては0.82と去勢群同様に6～12時間後において増加を示すが、その増加率は去勢群に比して軽微であり、24時間後ではほぼ前値に復している。

3) T.P. 5.0mg/kg 単回投与

去勢群においては、第3表に示す如く前値1.0に比し、6時間後は9.00、12時間後は7.82、24時間後は2.03であり、同じく6～12時間後において増加を示している。しかしその増加率はT.P. 1.0mg/kg 単回投与に比して少なく、且つ24時間後においても効果の遷延を認めることが出来る。甲剔去勢群においては前値は高く、6時間後9.00、12時間後は3.61、24時間後は1.26とやはり6～12時間後において増加を示しているが、

第3表 去勢犬に対する Testosterone Prop. 投与の影響 (T.P. 単回投与)

処 置	T.P.投与量	実験番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml			
			前 値	6 時間後	12時間後	24時間後
去勢群	5.0mg/kg	1	0.010	0.009	0.263	0.006
		2	0.012	0.085	0.224	0.007
		3	0.096	0.955	0.427	0.224
平 均			0.039	0.350	0.305	0.079
増 加 率			1.00	9.00	7.82	2.03
甲剔- 去勢群	5.0mg/kg	4	0.151	6.760	1.350	0.955
		5	0.186	0.630	0.316	0.135
		6	0.692	1.910	2.040	0.209
平 均			0.343	3.091	1.235	0.433
増 加 率			1.00	9.00	3.61	1.26
正常犬 甲剔犬	対 照	7	0.178	0.164	0.158	0.129
		8	2.140	2.250	3.020	4.680

第4表 去勢犬に対する Testosterone Prop. 投与の影響 (T.P. 0.5mg/kg/day 3日間連続投与)

処 置	実験 番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml		
		前 値	3 日後	投与中止 後 7 日
正常群 + T.P.	1	0.081	1.700	0.083
	2	0.045	0.057	0.089
	3	0.089	0.015	—
	4	0.646	1.820	—
平 均		0.215	0.896	—
増 加 率		1.00	4.17	—

去勢群 + T.P.	5	0.001	0.024	0.023
	6	0.004	0.118	—
	7	0.004	0.012	0.031
	8	0.005	0.380	—
	9	0.123	0.547	0.158
	10	0.013	3.390	—
	11	0.002	3.020	0.003
	12	0.003	1.000	—
	13	0.011	0.229	0.007
平 均		0.023	0.966	0.044
増 加 率		1.00	42.0	1.93

その程度は去勢群とほぼ同様で、24時間後には殆んど前値に復している。

4) T.P. 0.5mg/kg/day 3日間連続投与

最終投与の6時間後に採血を行なつて前値と比較すれば、第4表に示す如く正常群においては、前値1.0に比して3日後で4.17、去勢群も3日後は42.0といずれも増加を示している。この場合、去勢群では正常群に較べて増加は著明で約10倍の効果を示している。なお去勢群の約半数例につき投与中止後7日目に血中 TSH 値を検して、その平均値がほぼ前値に復していることを認めた。

5) T.P. 1.0mg/kg/day 3日間連続投与

前項と同じく最終投与の6時間後において測定して投与前値と比較すれば第5表に示す如く去勢群では前値1.0に対して3日後には85.0と著明な増加を示し、投与中止後7日目はおいては1.5とほぼ前値に近い値に復していた。甲剔去勢群においては、3日後67.0と著明に増加し、投与中止後7日目においては0.58と前値の約半分の値を示している。

6) Testosterone heptanoate 5.0mg/kg 単回投与

Testosterone の誘導体である Testosterone heptanoate (邦品 Enalmon-Depot) は持続性効果を有するこれを去勢犬に投与した場合第6表に示す如く前値1.0に対して、3日後では101と著明に増加を示し、17日後においても8.50となお高値を続けていることを認めた。

第5表 去勢犬に対する Testosterone Prop.
投与の影響 (T.P. 1.0mg/kg/day
3日間連続投与)

処 置	実験 番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml		
		前 値	3 日後	投与中止 後 7 日
去勢群 + T.P.	1	0.004	0.269	0.007
	2	0.004	0.417	0.004
平 均 増 加 率		0.004	0.343	0.006
		1.00	85.1	1.50
甲剔- 去勢群 + T.P.	3	0.044	0.191	0.029
	4	0.042	0.309	0.044
	5	0.654	6.610	0.086
	6	0.891	3.890	0.814
平 均 増 加 率		0.408	2.747	0.235
		1.00	67.5	0.583
正常犬	7 (対照)	0.171	0.174	0.383
甲剔犬	8	0.589	0.400	0.293

第6表 去勢犬に対する Testosterone heptanoate
投与の影響 (Test. hept. 5.0mg/kg 筋
肉内単回投与)

処 置	実験 番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml			
		前 値	3 日後	17 日後	21 日後
去 勢 群 + Test. hept.	1	0.026	0.105	0.038	0.028
	2	0.009	0.398	0.003	0.016
	3	0.021	0.002	0.001	—
	4	0.007	4.230	0.468	—
	5	0.005	2.450	0.001	—
	6	0.005	0.151	—	—
平 均 増 加 率		0.012	1.223	0.102	—
		1.00	101	8.50	—
正 常 犬	7 対照	0.147	0.114	0.178	—

以上、去勢群並びに甲剔去勢群に T.P. を種々の量、方法によつて投与し血中 TSH 値の変動を観察したが、その何れの場合においても血中 TSH 値の増加が

認められた。且つその増加の程度は、一般に去勢群が甲剔去勢群よりも著明であつた。これは甲剔去勢群の血中 TSH レベルが去勢群に比して既に高く、重なる TSH 分泌刺激に應ずる Space が少ない為ではないかと考えられる。又去勢群に於ては血中 TSH 値は低値を示し、従つて T.P. に対する反応として増量を示す場合にも、正常域まで回復した時には増加率としては異常に高い値を示しうることにも去勢群での増加群の高い原因となつている。投与の方法としては Test. hept. 5.0mg/kg 単回投与の3日後における血中 TSH 値の増加率が最も著明で、T.P. 1.0mg/kg/day 3日間連続投与がこれに次ぎ、以下 0.5mg/kg/day 3日間連続投与、1.0mg/kg 単回投与、5.0mg/kg 単回投与、0.1mg/kg 単回投与の順に効果を示している。すなわち、投与方法としては連続投与、投与量としては 1.0mg/kg/day の場合が最も安定した TSH 分泌亢進の効果を

示す様である。対照犬においては、正常犬、甲剔犬を通じて血中 TSH 値の変動は僅少で、且つ一定の傾向を認めなかった。

第2節 Methylandrostendiol 投与の影響

Methylandrostendiol (以下 MAD と称す) は男性ホルモン中蛋白同化作用が著明で、逆に男性化作用は弱いとされている。本節においては MAD の水性懸濁液を筋肉内に投与してその血中 TSH 値に及ぼす影響を観察した。対照犬には同容量の生理食塩水を筋肉内投与して実験した。

1) MAD 1.0mg/kg 単回投与

第7表に示す如く、去勢群においては、前値を1.0として較べると6時間後は0.69、12時間後は0.73、24時間後は1.1と6～12時間後において僅かに減少し、24時間後では前値は復している。甲剔去勢群においては、6時間後は0.25、12時間後は0.10、24時間後は0.70に6～12時間後で減少の傾向を示した。

2) MAD 1.0mg/kg/day 7日間連続投与

第8表に示す如く、去勢群においては前値1.0に比し3日目では0.19、7日目では0.20と減少の傾向を示した。甲剔去勢群では前値1.0に比し3日目では0.94、7日目では0.48と僅かに減少しているが有意の変動

第7表 去勢犬に対する Methylandrostendiol 投与の影響 (MAD 単回投与)

処 置	MAD 投与量	実験番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml			
			前 値	6 時間後	12時間後	24時間後
去勢群	1.0mg/kg	1	0.123	0.058	0.111	0.155
		2	0.058	0.084	0.023	0.064
		3	0.066	0.032	0.045	0.070
平 均			0.082	0.057	0.060	0.096
増 加 率			1.00	0.69	0.73	1.17
甲剔- 去勢群	1.0mg/kg	4	0.912	0.363	0.575	2.400
		5	3.890	0.339	0.011	0.980
		6	1.070	0.501	0.022	1.120
平 均			1.957	0.401	0.203	1.366
増 加 率			1.00	0.25	0.10	0.70
正常犬 甲剔犬	対 照	7	0.217	0.202	0.186	0.284
		8	5.370	7.000	5.750	7.250

第8表 去勢犬に対する Methylandrostendiol 投与の影響 (MAD 1.0mg/kg/day 7日間連続投与)

処 置	実験 番号	血漿 TSH 値 mJSU/ml			甲剔- 去勢群 + MAD	7 8 9	0.933 1.820 1.350	0.692 1.480 2.390	0.386 0.661 1.360
		前 値	3 日 目	7 日 目					
去勢群 + MAD	1	0.123	0.151	0.151	平 均 増 加 率	1.944		1.840	0.904
	2	0.016	0.013	0.015		1.00		0.94	0.48
	3	0.054	0.002	0.006	正常犬 甲剔犬	10 (対照) 11	0.209 2.190	0.234 2.280	— 2.880
	4	0.059	0.001	0.001					
	5	0.661	0.009	0.008					

とは認め難い。以上 MAD を去勢群並びに甲剔去勢群に投与して血中 TSH 値の変動を観察したが、T.P. とは逆に僅かに減少の傾向を示すが如き印象を受けた。対照犬は有意の変動を示さなかつた。

(付) 去勢並びに Testosterone propionate 投与による血清 PBI の変動

術後47日を経過せる去勢犬5例に T.P. 1.0mg/kg を投与し、12時間後に更に T.P. 1.0mg/kg を投与して、12時間後にその血清 PBI を測定した。第9表に示す如く去勢前値の平均を 1.0 として、去勢後の T.P. 投与前値並びに投与後の値の平均と較べるに、去勢後47日目においては0.63と減少を示し、T.P. 投与により1.21と増加を示して去勢前値に復した。

第9表 去勢犬における T.P. 投与による血清 PBI の変動

実験番号	去勢後 経過日数	血清 PBI 値 γ /ml		
		去勢前	去勢後	
			T.P.投与前	T.P.投与後
1	47	5.2	2.3	7.3
2	47	6.0	4.3	6.9
3	47	5.7	3.0	6.2
4	47	5.1	4.2	5.8
5	47	5.4	3.6	7.4
平均	—	5.5	3.5	6.7
比率	—	1.00	0.63	1.21

第4章 総括並びに考按

男性ホルモンが下垂体甲状腺系に及ぼす影響については、いとぐちに触れた如くその報告は少なく、その作用機序についても定説がない。男性ホルモンが下垂体前葉の TSH 分泌に及ぼす影響を知ることは、その下垂体甲状腺系に対する作用機序を解明するに必須のことであろう。しかるに今迄この分野の研究の少なかつた理由は血中 TSH が微量なる為にその刻々の変動を捉えることが出来なかつた為と考えられる。植田⁴⁾、柴田⁵⁾その他の綜説に述べられている如く、TSH の測定法には甲状腺重量を示標とする方法、甲状腺濾胞上皮の細胞高、濾胞上皮細胞に出現する Colloid 小滴数、濾胞上皮細胞の有絲核分裂の数等を示標とする組織学的所見の変化に基づく方法、おたまじやくしの変態を示標とする方法、甲状腺の P^{31} の摂取、或いは I^{131} の摂取又は放出の度を示標とする方法等種々なる測定法が発表されている。しかしこれ等の in vivo における Bioassay は、比較的に大量の TSH を必要とする為に微量なる血中 TSH の測定が出来難く、又検定に使用せる動物の固体差、飼育条件、季節等の問題があり測定条件の均一化が困難である。したがつて、現在迄に発表された正常人の血中 TSH 量も大体の値が記されているにすぎない。Bakke and Lawrence⁶⁾は in vitro における新鮮な牛甲状腺薄片を用いて、 I^{131} の Collecting mechanism を示標とせる方法により比較的微量な TSH の定量法を発表したが、未だ血中 TSH の測定には触れていない。しかし in vitro 法では in vivo における bioassay に較べて、測定せんとする TSH が生体内で稀釈破壊されることなく、これを目標臓器に直接作用せしめることが出来、且つ多数の資料を同一条件で同時に測定出来る利点がある。教室の小倉¹⁷⁾はこれらの利点に着目して、Bakke らの方法を改良発展せしめ、in vitro における新鮮な牛甲状腺薄片の I^{131} Release 法によつて始めて実用性のある血中 TSH 測定法を得た。この方法は血漿を10倍に稀釈する為に、血漿中に存在する他の物質の影響を少なくする利点がある。この方法を実施する際には以下の点に注意する必要がある。すなわち、1) 牛甲状腺は充分に選択し、甲状腺腫を疑はしむるものは絶対に避ける。近年肉用牛に対して肥育の目的で抗甲状腺剤を使用する向もあり、小倉等⁷⁾のいう Thyroid index 0.5 以下のものを使用する。2) 牛の年令は2~3才のものが適当で5才以上のものは使用しない。3) 雌牛は甲状腺機能に変化が多いから必ず去勢雄牛を使用する。4) 薄片を扱う際は常に一定のテクニックで迅速に行ない、薄片に対する高温、乾燥は禁忌である。著者はこの小倉の方法を用いて血中 TSH 値の測定を主題とし、同時に血清 PBI の測定を併せ行なつて、男性ホルモンの下垂体甲状腺系における意義を明らかにせんと試みた。先づ雄犬について去勢による血中 TSH 値の変動を経時的に観察した。すなわち、正常犬を去勢するとその血中 TSH 値は術後9日以内に一時上昇するが、その後漸時減少の傾向を示し、第30~60日後頃に最低値を示し、それ以後は再びレベルを上げて術後120日前後において去勢値の約40%迄回復上昇し固

定している。又あらかじめ甲状腺切除術を行ない、術後 TSH レベルの固定せる雄犬について去勢を行なった。この場合は正常犬の場合と異なり、血中 TSH 値は術後直ちに減少を示し、8～14日後に最低値に達し、その後漸時上昇回復の傾向を示すが、術後 100 日前後に至つてもなお術前値に較べて低値に止つてゐることを認めた。正常犬において去勢術後認められた血中 TSH 値の一時的な上昇は、Crepax⁹⁾が雄 rat を去勢して10日以内に甲状腺が組織学的に機能亢進像を示すことを認め、斉藤⁹⁾は雄家兎を去勢して1週間後に甲状腺重量の増加を認めた如く手術侵襲によるものと考えられ、教室の佐古田⁹⁾の研究結果によく一致している。甲剔犬においてこの様な手術侵襲の影響が見られなかつたことは、甲剔犬が去勢術前においてその TSH レベルは既に高く、為に重なる TSH 分泌刺激機転に応じられなかつたのではないかと考えられる。又去勢後減少した血中 TSH レベルが漸時上昇回復することは、去勢に対して適応する生体反応とも考えられる。この点山口¹⁰⁾も雌を去勢して2週後に甲状腺機能が低下し、後漸時恢復することを認めている。

去勢の甲状腺に及ぼす影響については従来より多くの研究がなされている。Anderson & Kennedy¹¹⁾は成熟 rat で、Hatai¹²⁾は未成熟 rat で、Schulze and Turner¹⁰⁾は鶏で、Morris¹⁴⁾に白色レグホンで夫々去勢による甲状腺機能の低下を認めている。しかし、その機能低下を示す時期は報告により差があり、Anderson & Kennedy¹¹⁾は成熟 rat で3～8週以後、Hatai¹²⁾は未成熟 rat で3～5月以後、Crepax⁹⁾は雄 rat で40～90日以後、Morris¹⁴⁾は白色レグホンで57日以後、Breneman and Mason¹⁵⁾は120日以後、斉藤⁹⁾は雄家兎で4週以後に夫々機能低下を来すと報じている。これは動物の種属差、或いは同種の動物でも成熟の程度や固体差により異なるのではないかと考えられる。又井上¹⁰⁾は雄 rat において去勢による甲状腺機能の低下が42日以後に起るとして、一方山口¹⁰⁾は雌 rat の去勢により同様の現象が14日以後におこることを報じていることよりみると、同種の動物においても性差がありそうである。以上の去勢による甲状腺機能低下を認める説に対して、Choucke¹⁷⁾はモルモットを去勢して甲状腺に組織学的な影響を認めず、Odell¹⁸⁾は白色レグホンで甲状腺機能は不変であるとし、Mercier-Parot¹⁹⁾は幼若 rat を去勢して濾胞上皮細胞高は不変であつたと報じている。又 Aron and Marescaux²⁰⁾はモルモットにおいて去勢により甲状腺の機能亢進像を認めている。しかし他の多くの発表は去勢により甲状腺に於ては組織学的所見から、或いは I¹³¹ をトレーサーとして用いたヨード代謝面から機能低下を認め、Tuckmann-Puplessis and Mercier-Parot²¹⁾も後に成熟 rat において組織学的に機能低下像を認めている。以上述べた如く、時期の相違はあつても、去勢動物は種類性差を問わず早晚甲状腺機能の低下を来すものと考えられる。著者の実験においても去勢犬で PBI の低下を認めてこれらの報告に一致する結果を得ている。以上の如く、去勢動物の甲状腺機能をみた報告は処々にみられるが、去勢が下垂体前葉の TSH 分泌に及ぼす影響について観察した報告はきわめて少なく、僅に Turner and Cupps²²⁾が rat で、Bates²³⁾等が牛で去勢により下垂体の TSH 量の減少を推論しているのみで、この点血中 TSH 値を直接測定した著者の成績は意義深いものといえよう。

下垂体前葉における TSH 産生母体については、従来 α 細胞、 β 細胞、或いは chromophobe 細胞説と種々論議されてきた。近年組織化学的な方法による細胞分析が進歩し、Purves and Griesbach²⁴⁾は PAS 染色や Paraldehyde fuchsin 染色により下垂体前葉の塩基好性細胞を gonadotroph と thyrotroph とに分ち、Gomori 陽性顆粒を有する thyrotroph を TSH の分泌細胞とみなした。この説は同様の方法をもつて β 細胞を産生源とする Halmi²⁵⁾の説とよく一致しており現在この説が有力である。他方 Holweg and Dohrn²⁶⁾、Kushinsky²⁷⁾以来下垂体前葉と性腺の間には feed back の相関々係があり、去勢動物においては下垂体前葉の gonadotropin の分泌亢進をきたすことが認められている。同様な相関は甲状腺と下垂体前葉との間にも認められ、Salter²⁸⁾は thyroxine が視床下部中枢に働いて下垂体前葉の TSH 分泌を抑制し、Hoskins²⁹⁾は血中 thyroxine 濃度が上昇すれば TSH 分泌は抑制されるとしている。又 Severinghaus³⁰⁾によれば、thyroxine 投与が下垂体前葉の塩基好性細胞の退萎を招き、甲状腺切除が腺葉の塩基好性細胞の過形成ないし thyroidectomy cell 化を招くとしている。小倉¹⁾は人の甲状腺切除により血中 TSH レベルの上昇を認め又甲剔犬の血中 TSH の規則的な昇降変化を認めた。著者の犬における甲剔の成績もよくこれに一致している。この様に甲状腺の垂全剔ないし全剔出を行なつて下垂体前葉の TSH 分泌亢進をきたした場合、換言

すれば所謂 thyrotroph の機能亢進をきたした場合に, thyrotroph と相接して存在している gonadotroph がいかなる影響をうけるかについては, Turner and Cupps²²⁾, Stein and Lisle³¹⁾らは rat について, Reinek³²⁾は雄山羊について, 辻田³³⁾は家兎について実験を行ない, それぞれ gonadotropin の分泌低下を認めている. すなわち, thyrotroph の機能亢進は相対的に, gonadotroph の機能低下を招来せしめるものと思われる. 著者は雄犬の去勢により血中 TSH 値の低下を認めたが, これは以上述べた過程の逆の関係を示すものと考えられる. すなわち, Nelson and Hickman³⁴⁾が甲刷による thyroidectomy cell の出現は, 去勢による castration cell の形成により抑制をうけることを報じていることよりみても, 去勢による gonadotroph の機能亢進が相対的に thyrotroph の機能低下を招いたのではないかと推察される. 更に著者は去勢により血清 PBI の減少を認めたこと及び甲状腺剔除を行なつて甲状腺から下垂体前葉への feed back の影響を無くした場合においても, 去勢により血中 TSH 値の減少を認めたことはこの推論を裏づけるものとしてよい. すなわち, 去勢動物において甲状腺機能の低下を来す原因には, 下垂体前葉の TSH 分泌低下が重要な役割を演じているものと考えられる.

著者は又, 去勢犬並びに甲刷去勢犬に男性ホルモンとして Testosterone propionate 並びに Methylandrosterone diol を投与量並びに投与方法を種々変えて与え, その血中 TSH 値に及ぼす影響を観察した. その結果, Test. hept. 5.0mg/kg 単回投与の3日目における血中 TSH 値の上昇が最も著明で, 以下 T.P. 1.0mg/kg/day 3日間連続投与, T.P. 0.5mg/kg/day 3日間連続投与, T.P. 1.0mg/kg 単回投与, 5.0mg/kg 単回投与, 0.1mg/kg 単回投与の順に効果を現し, 去勢犬における T.P. の効果は甲刷去勢犬におけるよりも著明であることを認めた. MAD 投与の去勢犬及び甲刷去勢犬の血中 TSH 値に及ぼす影響はきわめて少なく, 不変であるか, 或いは僅かに低下せしめるかの如き程度に止つた.

男性ホルモンの甲状腺に及ぼす影響についての報告は, 研究者により必ずしも一致していない. Lewis and McCullagh³⁵⁾, Nathanson³⁶⁾は未成熟の rat に T.P. をあたえ, 高折³⁷⁾は成熟 rat に T.P. を長期間投与して何れも組織学的に機能亢進像を認め, Money³⁸⁾等は低ヨード食で飼育した rat に T.P. を投与して甲状腺 I¹³¹ 摂取率の増加を認めている. 又 Burris³⁹⁾等は若い牡牛に T.P. を投与して Thyroxine の分泌促進を推察し, Castellani⁴⁰⁾は成熟モルモットに T.P. を投与し, 0.1mg 15日間投与群に甲状腺の機能亢進像を認めている. これ等の成績に反し, Leatham⁴¹⁾は T.P. により甲状腺重量は不変とし, Crepax⁴²⁾は T.P. を正常又は去勢 rat に投与して組織学的に影響なしとし, Aron and Marescaux²⁰⁾も正常又は去勢モルモットに T.P. を投与して甲状腺機能への影響を認めず, Odell¹⁸⁾は白色レグホンの Thyroxine 分泌速度に T.P. は無関係であつたとしている. 又逆に Gassner⁴³⁾等は rat に T.P. を投与して甲状腺 I¹³¹ 摂取率の低下を認め, 井上¹⁶⁾は去勢 rat に T.P. を投与して甲状腺機能は軽度抑制されるか又は不変であつたと報じている. 以上の如く雄性動物に対する T.P. の影響は各報告者において差異があり, 動物の糖類並びに実験条件により相違を来したものと考えるよう他はない. 山本⁴⁴⁾は男性ホルモンの少量は甲状腺機能を亢進し, 大量又は長期間投与は抑制すると論じている. 著者は雄去勢犬に T.P. を投与して血中 TSH 値の上昇を認めたが, 1.0mg/kg/day の量が最も効果的であつたことから, この量が血中 TSH 値の上昇に有効に作用する量ではないかと考える.

一般に性ホルモンが下垂体を介して甲状腺に作用するのか, 或は直接甲状腺に作用するのかについては論議の多い問題である. Turner and Cupps²²⁾, Brown-Grant⁴⁵⁾, Leblond et al.⁴⁶⁾, Nelson and Hickman³⁴⁾, Gassner et al. 等は下垂体仲介説を支持し, Brauer⁴⁷⁾, Feldman⁴⁸⁾⁴⁹⁾, Money et al.³⁸⁾等は甲状腺への直接作用を認め, 高折³⁷⁾は estrogen は下垂体を介し, androgen は直接甲状腺に作用すると報じている. しかしこれ等諸家の説は直接血中 TSH 値を測定した根拠に基づくものでなく, いわば間接的な実験成績によつたものである. 著者は雄去勢犬並びに雄甲刷去勢犬に T.P. を投与して何れにも血中 TSH の増加を証し, 且つ去勢犬においては同時に血清 PBI の増加を認めた. このことよりみると, T.P. は下垂体を介して甲状腺に作用するものと考えられる. MAD については, 高折³⁷⁾は下垂体剔除 rat にこれを投与して対照の垂刷 rat よりも甲状腺重量が大であり, 組織の萎縮像も軽く且つ核分裂像を認めたことから, 甲状腺への直接作用を

認めている。著者は MAD を雄去勢犬並びに雄甲剔去勢犬に投与して、血中 TSH 値が不変又は軽動の減少をみたことから、MAD は T.P. と異なり下垂体甲状腺系に対してむしろ抑制的に作用するのではないかと考える。

第5章 結 語

1) 雄成犬では去勢により、血中値 TSH は術後9日以内に一時上昇し、次で減少して30~60日後において最低値を示し、後漸時増加恢復するが術後120日前後においても尚前値に較べて低値を示した。

2) 術後一定の経過を経た既に可成り高い血中 TSH 値を示している雄甲状腺剔出犬に去勢を行なうと、正常犬の如き手術侵襲による血中 TSH 値の上昇は認められず、血中 TSH 値は去勢後直ちに減少して8~10日目において最低値を示し、その後漸時増加恢復するも術後100日前後においても尚去勢前値に較べて低値に止つた。

3) T.P. は雄去勢犬の血中 TSH 値を増加せしめ、同時に血清 PBI も増加せしめた。その血中 TSH 値上昇作用は Testosterone heptanoate 5.0mg/kg 単回投与、T.P. 1.0mg/kg/day 或は 0.5mg/kg/day 3日間連続投与の如くに適当量の持続的投与の際に最も強く現われ、T.P. 1.0mg/kg, 5.0mg/kg, 或は 0.1mg/kg 単回投与の順に作用の減弱することを認めた。

4) T.P. に対する反応として一般に、去勢群では甲剔去勢群よりも血中 TSH 値上昇率が大であつた。これは甲剔犬の血中 TSH レベルが既に上界近く迄上昇しており、反応程度の低下を伴うものと考えられる。

5) 以上の去勢及び T.P. 投与による血中 TSH 値の低高は下垂体前葉の性腺刺激ホルモン及び TSH 産生作用の結抗的態度から説明することが出来る。

6) MAD は雄去勢犬並びに雄甲剔去勢犬の血中 TSH 値を軽度減少せしめるか又は殆んど変化を与えない。即ち MAD はこの点において非作用的であつた。

(文献後出)

第2編 甲状腺との関係について

目 次

いとぐち	第1節 Paper radiochromatogram
第1章 実験方法	第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率
第1節 Paper radiochromatography	第3節 血清 PBI 131 転換率
第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率	第4節 血清 PBI
第3節 血清 PBI 131 転換率	第5節 組織学的所見
第4節 血清 PBI	第4章 MAD 投与の甲状腺に及ぼす影響
第5節 組織学的検索	第1節 Paper radiochromatogram
第2章 TSH 投与の甲状腺に及ぼす影響	第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率
第1節 Paper radiochromatogram	第3節 血清 PBI 131 転換率
第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率	第4節 血清 PBI
第3節 血清 PBI 131 転換率	第5節 組織学的所見
第4節 血清 PBI	第5章 総括並びに考按
第5節 組織学的所見	第6章 結 語
第3章 T.P. 投与の甲状腺に及ぼす影響	

い と ぐ ち

Kenedall⁵⁰⁾, Harrington⁵¹⁾の古典的な研究により甲状腺組織内のヨードアミノ酸は Diiodotyrosine (DIT), Thyroxine (T_4) のみとされ, 30 年以上の永きに亘り T_4 が唯一の甲状腺ホルモンとされていた. しかし近年に至り放射性ヨードが tracer として甲状腺ホルモンの化学分野に導入され, 又 Chromatography, 殊に Paperchromatography による微量分析術の進歩, 更に I^{131} と Paperchromatography との組合せ等により甲状腺ホルモンの化学が急速に進歩した. Monoiodotyrosine (MIT)⁵²⁾, Triiodothyronine (T_3)⁵³⁾⁵⁴⁾ 等が正常な甲状腺に存在することが確認されれのもその結果である. 殊に Gross and Pitt-Rivers⁵⁵⁾や Roche⁵⁴⁾ 等が殆んど同時に発見した T_3 は, これ迄唯一の甲状腺ホルモンとされていた T_4 の 3~5 倍の強力な生理学的作用を有するもので特筆すべき進歩といわねばならない. 又 Hydoovitz⁵⁶⁾は正常及び機能亢進時の甲状腺において TSH 投与が血清内の T_3 , T_4 を増加せしめることを Paper chromatography により証明し, 檜垣⁵⁷⁾は単純性嚙漫性甲状腺腫の甲状腺組織内のヨード代謝を Paper radiochromatography により検討してヨード代謝障害の存在することを認め, 小倉等⁷⁾は in vitro において正常甲状腺及び甲状腺腫の腺葉薄片に I^{131} を負荷せしめ Paper radiochromatography によるヨード分析を行なっている. かくの如く Paperchromatography, 殊に I^{131} を用いた Paper radiochromatography は現在甲状腺の化学的研究には甚だ重要な意義を有している. 著者は第 1 編において, 男性ホルモンが下垂体甲状腺系に及ぼす影響について, 血中 TSH 値の変動を主として観察を行なつたが, 本編においては, 男性ホルモンが TSH の目標臓器である甲状腺の組織内ヨードアミノ酸に及ぼす影響を甲状腺 I^{131} 摂取率, 血清 PBI¹³¹ 転換率, 血清 PBI, 組織学的検索と併行して観察し, 男性ホルモンの下垂体甲状腺系に及ぼす作用機序について総括的な考察を行なつた.

第 1 章 実 験 方 法

第 1 節 Paper radiochromatography

実験犬は第 1 編におけると同一の条件のものを用いた. 実験犬の甲状腺は Isozol 静脈内麻酔下に左右同時に剔出した. 右葉のほぼ中央部を矩形に初り出し, その 200mg を PH 8.4 に調製せる NH_4OH-NH_4Cl 緩衝液 5 cc を加えて氷冷下に homogenize したのち, trypsin 10mg, urea 100mg を加えて 38°C で 72 時間 incubate して加水分解した. この加水分解液に n-Butanol 10cc を加えて 5 分間強く振盪し遠沈して上澄をとる. この沈渣に 5 cc の n-Butanol を加えて同様の操作で更に 2 回抽出し各上澄を合せて 45°C 以上の Water bath で減圧乾固する. 乾固物を 0.5cc の n-Butanol で溶解し濾紙の原線上に棒状に塗布する. 濾紙は短冊型の東洋濾紙 No. 50 を用い, その下端より 5 cm の所に原紙をおく. 次で濾紙の下端より 30 cm の所まで n-Butanol-酢酸- H_2O (40 : 10 : 50) 展開する. 展開完了後乾燥して strip counting により各ヨードアミノ酸の分析を行なつた. strip counting に際しては濾紙を原線より展開上界まで 25 等分し, 各切片について Geiger-Müller counter (神戸工業製) を用いて β 線測定を行ない, Paperchromatogram を作製した. 各分割はそれぞれの標準品を用いて同様の操作で展開し, Ninhydrin で発色せしめその Rf より検定を行なつた. なお甲状腺組織内ヨードアミノ酸としては, Monoiodohistidine (MIH), Diiodohistidine (DIH) も挙げられるが, これらについては標準品が得られず, 為に同定を行ない得なかつた. 鈴木⁵⁷⁾によれば, n-Butanol-酢酸- H_2O (10°C) 展開によるヨードアミノ酸の Rf は MIH (0.12), I^- (0.21), DIH (0.40), MIT (0.43), DIT (0.59), T_2 (0.80), T_3 (0.82), T_4 (0.86) としている. 著者は実技上 MIT と DIT, T_3 と T_4 の分離が必ずしも常には充分でなかつた為に, strip の原線より数えて第 7~第 9 初片を I^- , 第 12~第 17 初片を MIT+DIT, 第 20~第 25 初片を T_3+T_4 の分割として, 各分割の Count 数の全数 Count に対する比を百分率で示した.

第 2 節 甲状腺 I^{131} 摂取率

Leblond and Gross⁵⁸⁾, Soliman and Reineke⁵⁹⁾の方法により, 甲状腺の左葉を 2N. NaOH で加熱溶解後その 1.0cc を乾燥して Geiger-Muller Counter で計数し, 全葉の計数値に換算してこれを $Na I^{131}$ 投与量に対

する百分率を以て甲状腺 I^{131} 摂取率とした。

第3節 血清 PBI^{131} 転換率

頸静脈より得た血液の血清 0.5cc に 2N. NaOH 1.0cc を加え加熱溶解し、その 1.0cc の計数値を血清全 I^{131} 計数値とした。別に血清 0.5cc を Somogyi⁶⁰⁾ の変法⁶¹⁾ により除蛋白洗滌後の沈渣を 2N. NaOH で全量を 1.5cc とし、加熱溶解後その 1.0cc の計数値を以て血清有機 I^{131} 計数値とした。

$$\text{血清 } PBI^{131} \text{ 転換率} = \frac{\text{血清有機 } I^{131} \text{ 計数値}}{\text{血清全 } I^{131} \text{ 計数値}} \cdot 100$$

第4節 血清 PBI

この測定は Barker²⁾ のアルカリ灰化法によつて行なつた。

第5節 組織学的検索

剔出甲状腺の右葉の一部を Bouin 氏液で固定し、Hematoxylin-Eosin 染色を施した。組織像による機能判定は入江⁶²⁾ の分類によつた。

第2章 TSH 投与の甲状腺に及ぼす影響

第1節 Paperradiochromatogram (附図 1, I, II)

正常犬並びに去勢犬の各 2 例に TSH (Schering 社 Pretiron) を 10 JSU/kg 投与し、6 時間後に再び TSH 10 JSU/kg 並びに $Na I^{131}$ 100 μ c を筋注射し、12 時間後に Isozol 静脈内麻酔下に左右両葉の甲状腺を同時に剔出して測定に供した。第 10 表は TSH 及び次に述べる T.P. 並びに MAD にの投与例における Paper-radiochromatography, 甲状腺 I^{131} 摂取率, 血清 PBI^{131} 転換率, 並びに血清 PBI の成績の平均値を一括して示したものである。対照には正常犬及び去勢犬の各 2 例を生理食塩水及び $Na I^{131}$ で同様に処置を行なつたものを用いた。

第10表 TSH 並びに T.P., MAD 投与の甲状腺機能に及ぼす影響

実験例	例数	甲状腺組織内ヨード分布率 (%)				甲状腺 I^{131} 摂取率	血清 PBI^{131} 転換率	血清 PBI (γ/ml)	
		I -	MIT+DIT	T_3+T_4	$\frac{T_3+T_4}{MIT+DIT}$			前	後
正 常	2	5.2	67.2	18.9	0.28	2.9	4.4	5.5	5.5
正 常+TSH	2	5.5	62.8	29.4	0.47	3.1	28.1	5.7	6.9
去 勢	2	5.8	66.0	20.1	0.30	2.6	3.0	5.5	5.4
去 勢+TSH	2	4.2	57.9	31.4	0.54	4.0	35.9	5.4	8.2
去 勢+T.P.	2	5.9	60.2	30.1	0.50	3.4	27.7	5.6	6.8
去 勢+MAD	2	5.7	70.6	18.5	0.26	2.0	4.0	5.4	5.0

TSH を投与せる正常犬は、I-の分割の百分率は5.2%, MIT+DIT の分割は62.8%, T_3+T_4 は29.4%, TSH を投与せる去勢犬では、I-が4.2%, MIT+DIT は57.9%, T_3+T_4 は31.4% となつている。すなわち、TSH を投与せる例においては、対照に較べてI-の分割には有意の変化が無く、MIT+DIT は減少し、 T_3+T_4 は増加を示している。従つて T_3+T_4 /MIT+DIT の比は TSH 投与により増大することを認めた。換言すれば TSH は甲状腺組織内において、MIT, DIT, から T_3 , T_4 への移行を促進せしめるが如き作用を有することを認めた。

第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率

TSH 投与例に軽い上昇の傾向を認めた。

第3節 血清 PBI^{131} 転換率

TSH 投与によりそれぞれの対照に比して、正常犬では 6.4 倍去勢犬では12倍と著明に増加することを認

めた。

第4節 血清 PBI

TSH 投与前及び TSH を投与して甲状腺を剔出する直前の値を較べると、対照犬には殆んど変化が認められず、TSH を投与した場合は正常犬で1.2 γ /cc, 去勢犬で3.2 γ /ccと何れも増加の傾向を認めた。

第5節 組織学的所見

第11表は対照例及び TSH, T.P., MAD 投与例の甲状腺の組織学的所見を一括して示したものである。入江⁽²³⁾によれば、I 度及びII度は所謂機能亢進像を表し、III度は正常像、IV度は所謂機能低下像を表す。対照の正常犬は殆んど正常像を示し、去勢犬は一例が正常像で他の一例は殆んど正常像を示す。TSH を投与せる例においては何れも明らかに機能亢進像を認めた。

第2章 T.P.投与の甲状腺に及ぼす影響

第1節 Paper radiochromatogram (附图1, III)

去勢犬2例に T.P. 1.0mg/kg を投与し、6時間後に更に T.P. 1.0mg/kg, 並びに Na I¹³¹ 100 μ c を投与し、12時間後に前節と同様に甲状腺を剔出して測定を行なつた。I-の分割は5.9%で対照に比して有意の差を認めず、MIT+DIT は60.2%と減少し、T₃+T₄は30.1%と明らかに増加している。従つてT₃+

T₄/MIT+DIT の比は T.P. 投与により増大することを認めた。すなわち T.P. は TSH と同様に甲状腺組織内の MIT, DIT がT₃, T₄に移行する過程を促進する作用を有することを認めた。

第2節 甲状腺 I¹³¹ 摂取率

対照と TSH 投与例との間には有意の差を認めなかつた。

第11表 TSH 並びに T.P., MAD 投与の甲状腺機能に及ぼす影響

動物番号	実験例	去勢後日数	甲状腺組織像(入江分類)										判定
			濾大	濾小	濾大	濾小	濾大	濾小	濾大	濾小	濾大	濾小	
30	正	3	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV
32	正	3	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV
31	正	3	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	I II~I
34	正	3	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	II III
10	去	368	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV
14	去	305	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	I II~I
15	去	305	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	II III
17	去	305	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	II III
18	去	260	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV
26	去	260	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV
27	去	240	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	IV III~IV

第3節 血清 PBI^{131} 転換率

T.P. 投与により、対照の6.3倍と明らかに増加を示した。

第4節 血清 PBI

T.P. 投与により、前値に較べて $1.2\gamma/\text{cc}$ の増加を認めた。

第5節 組織学的所見

T.P. 投与例では対照に較べて、濾胞上皮細胞高の増大並びに増殖像を示し、明らかに機能亢進像を認めた。

第4章 MAD 投与の甲状腺に及ぼす影響

第1節 Paper radiochromatogram (附図1, IV)

前章と同様に、去勢犬2例に対して MAD 1.0mg/kg を投与し、6時間後に更に MAD 1.0mg/kg 及び NaI^{131} $100\mu\text{c}$ を投与して、12時間後に甲状腺を剔出して測定に供した。

I⁻の分割は5.7%で対照の5.2%に較べて有意の差は認められなかった。MIT+DIT は70.6%, $\text{T}_3 + \text{T}_4$ は18.5%で何れも対照に較べて明らかな差は無く、従つて $\text{T}_3 + \text{T}_4/\text{MIT} + \text{DIT}$ の比には MAD 投与により有意の傾向は認められなかった。

第2節 甲状腺 I^{131} 摂取率

対照に較べて有意の差は認めなかった。

第3節 血清 PBI^{131} 転換率

対照に較べて明らかな差は認めなかった。

第4節 血清 PBI

MAD 投与前値 $5.4\gamma/\text{cc}$ に較べて、投与後値 $5.0\gamma/\text{cc}$ とやや減少を示した。

第5節 組織学的所見

2例共僅かに機能低下像を示し、対照に較べて MAD 投与による明らかな変化は認めなかった。

第5章 総括並びに考按

さきに第1編に於て、男性ホルモンが下垂体甲状腺系に及ぼす影響を検討しその作用機序を究明した。すなわち、正常犬及び甲剔犬においても、去勢により血中 TSH 値の減少を認め、更にこれらに Testosterone propionate を投与せる場合に血中 TSH 値の増加を認めた。又血清 PBI が、正常犬を去勢した場合に減少し、Testosterone propionate を投与して増加することを認めた。これらのことから、男性ホルモンの下垂体甲状腺系に及ぼす影響に於ては下垂体先行説を推論した。本編においては、これ等の男性ホルモンが、TSH の target organ である甲状腺自体に如何なる影響を及ぼすかを、甲状腺組織内ヨードアミノ酸の分割を中心に、甲状腺 I^{131} 摂取率、血清 PBI^{131} 転換率、血清 PBI 及び組織所見の各観点から検討を行なつた。

まず去勢による甲状腺組織内のヨードアミノ酸分割については、対照の正常犬に比して有意の変化を認めなかった。この去勢犬の2例は何れも去勢後363日、305日と長期間経過して血中 TSH 値の大体恢復したもので、この点更に去勢後短期間の実験を行なう必要があると考えられる。

去勢犬の2例に Testosterone propionate を投与した場合では、対照に比して甲状腺組織内の MIT, DIT の減少並びに T_3 , T_4 の増加、従つてその $\text{T}_3 + \text{T}_4/\text{MIT} + \text{DIT}$ 比の明らかな増加を認め、同時に血清 PBI^{131} 転換率、血清 PBI 値及び組織像の所見も共に甲状腺機能亢進の像を示した。又、去勢犬に TSH を投与した場合の甲状腺組織内ヨードアミノ酸分割をみると、去勢犬に Testosterone propionate を投与した所見にはほぼ等しく、MIT, DIT の減少、 T_3 , T_4 の増加、従つて $\text{T}_3 + \text{T}_4/\text{MIT} + \text{DIT}$ 比の増加、血清 PBI^{131} 転換率、血清 PBI の増加及び組織学的所見共機能亢進像を認めた。すなわち、以上の結果より、T.P. を去勢犬に投与した場合の甲状腺組織内のヨードアミノ酸の分割像は、去勢犬に TSH を投与した場合の態度とよく一致している。

Morton 等⁶³⁾, Perlmutter 等⁶⁴⁾, Stanley and Astwood⁶⁵⁾, Vander Lann and Greer⁶⁶⁾等は、TSH がヨード

の有機化を高めることを報じている。Randall and Albert⁶⁷⁾, Ghosh⁶⁸⁾等は rat の脳下垂体を剔除するとヨードの有機化は正常の12~30%に低下し, Ghosh⁶⁸⁾等は TSH をこれに注射すると正常以上に恢復すると述べ, 更に Chaikoff and Taurog⁶⁹⁾は DIT から T_4 への過程が下腺体剔除によつて阻害され, この際にヨードの有機化は DIT の段階で停止するとし, Morton 等⁷⁰⁾は垂剔の際に DIT/ T_4 の比が正常より増大することを報じている。

さきに, 第1編において去勢犬に T.P. を投与せる場合, 血中 TSH 値の増加は投与後6時間で既に認められたが, 去勢犬に T.P. 投与後は時間を経て剔出せる犬の甲状腺組織内のヨードアミノ酸の分割像の動きは略々 TSH 投与による変動のパターンと同傾向を示すことから, T.P. 投与によつて先ず TSH の分泌が促進され, その結果として甲状腺機能に変動を来したものと考えるのが至当であろう。

更に去勢犬2例に MAD を投与して同様の観察を行なつた。その結果, 甲状腺組織内ヨードアミノ酸分割, 血清 PBI¹⁸⁾ 転換率, 血清 PBI, 組織像共何れも対照の去勢犬に較べて有意の変化を認めなかつた。すなわち, この実験方法によつても MAD の甲状腺に及ぼす影響は直接, 間接を問わず少ないものであると考えられた。

第6章 結 論

男性ホルモンの甲状腺に及ぼす影響を, 甲状腺組織の Paper radiochromatography によるヨードアミノ酸分割像及び種々の甲状腺機能指標を用いて観察し次の如き結論をえた。

- 1) 去勢後300~360日を経過した犬の甲状腺組織内のヨードアミノ酸分割においては, 対照に較べて有意の変化を認めなかつた。
- 2) 去勢犬に Testosterone propionate を投与すると, 対照に較べて MIT, DIT の分割が減少し, T_8 , T_4 の分割に増加が認められ, 従つて $T_8 + T_4 / MIT + DIT$ 比の増加を認めた。
- 3) 去勢犬に TSH を投与して, MIT, DIT の減少と, T_8 , T_4 の増加を認め, 従つて $T_8 + T_4 / MIT + DIT$ 比の増加を認めた。
- 4) 従つて T.P. の甲状腺組織内ヨードアミノ酸分割への影響は, TSH 投与時の所見とよく一致しており, T.P. が TSH の分泌を増加して甲状腺に作用する機構の存在を考えさせる。
- 5) MAD の影響については一定の所見をえず, 甲状腺への作用は少ないものと考えた。
- 6) 以上の Paper radiochromatography 分割と同時に甲状腺 I^{131} 摂取率, 血清転換率, 血清 PBI, 組織学的所見等を同時に観察して, ほぼ前述の実験結果に相等する結果を得た。すなわち, TSH 作用の増大を予想される際には甲状腺機能亢進像に相等する所見を, 又 MAD に就ては無作用又は軽度抑制傾向の存在を認めた。

稿を終るにあたり終始御懇切な御指導を賜つた恩師辻教授に厚く感謝致します。又実験に御協力頂いた教室の小倉一博士, 弘重尚久学士並びに側面より御激励下さつた神戸市立玉津療養所長鴨志田正吾博士に心から感謝致します。

(本論文の要旨は第7回並びに第8回日本内分泌学会西日本地方会の席上に於て発表した)

文 献

- 1) 小倉一: 日本内科学会雑誌, 48: 1045, 1959.
- 2) Barker, S.B. and Humphrey, M.J.: J. Cl. Endocrinol., 10: 1136, 1950.
- 3) 佐古田雅弘: 日本内分泌誌, 36: 609, 1960.
- 4) 植田安雄, 他: ホルモンと臨床, 6: 225, 1958.
- 5) 柴田勝博: ホルモンと臨床, 4: 949, 1956.
- 6) Bakke, J.L. and N. Lawrence: Endocrinol., 58: 531, 1956.
- 7) 小倉一, 他: 総合医学, 17: 579, 1960.
- 8) Crepax, P.: Arch. Sci. Biol., 35: 599, 1951. (Biol. Abst.: 28: 579, 1954).
- 9) 斎藤隆: 日本内分泌誌, 6: 355, 1930.
- 10) 山口彦司: 神戸医大紀要, 9: 954, 1957.
- 11) Andersen, D.H. and

米澤論文 附図 (その1)

(I) 去勢犬+TSH における甲状腺組織の Paper radiochromatogram

(III) 去勢犬+T.P. における甲状腺組織の Paper radiochromatogram

(II) 去勢犬+TSH におまる甲状腺組織の Paper radiochromatogram

(IV) 去勢犬+MAD における甲状腺組織の Paper radiochromatogram

米澤論文附図(その2)

写真1 正常無処置犬
(動物番号30)

写真2 正常犬に TSH 投与
18時間後 (動物番号31)

写真3 去勢犬
(動物番号3)

写真4 去勢犬に TSH 投与
18時間後 (動物番号14)

写真5 去勢犬に T.P. 投与
18時間後 (動物番号17)

写真6 去勢犬に MAD 投与
18時間後 (動物番号26)

- H.S. Kennedy : J. Physiol., 79 : 1, 1933. 12) Hatai, S. : J. Exp. Zool., 18 : 1, 1915 (11より引用).
13) Schulze, A.B. and C.W. Turner : Univ. Missouri Agr. Exper. Sta. Res. Bull., 392, 1945. (44より引用).
14) Morris, D.M. : Endocrinol., 50 : 277, 1951. 15) Breneman, W.R. and R.C. Mason : Endocrinol.,
48 : 752, 1951. 16) 井上康 : 日本内分泌誌, 35 : 670, 1959. 17) Chouke, K.S. : Endocrinol.,
14 : 12, 1930. 18) Odell, T.T. : Endocrinol., 51 : 265, 1952. 19) Mercier-Parot, L. : Bull.
Microscop. Appl., 2 : 117, 1952. (Biol. Abst., 27 : 1818, 1952). 20) Aron, C. and J. Marescaux :
C.r. Soc. Biol., 146 : 1388, 1952. (Excerpta, 7 : 349, 1953). 21) Tuchmann-Duplessis, H. : Ann.
Endocr., 14 : 743, 1953. (Chem. Abst., 48 : 8362, 1954). 22) Turner, C.W. and P.L. Cupps :
Endocrinol., 26 : 1042, 1940. 23) Bates, R. W. et al. : Amer. J. Physiol., 113 : 259, 1935.
24) Purves, H.D. and W.E. Griesbach : Endocrinol., 49 : 224, 1951. 25) Halmi, N.S. : Endocrinol.,
50 : 140, 1952. 26) Holweg, W. and M. Dohrn : Wien. Arch. int. Med., 21 : 337, 1931. 27)
Kuschinsky, G. : Arch. f. Exp. Path. Pharmacol., 162 : 183, 1941. 28) Salter, W.I. : Physiol. Rev.,
20 : 345, 1940. 29) Hoskins, R.G. : J. Clin. Endocrinol., 9 : 1429, 1949. 30) Severinghaus,
A.E. : Allen's Sex and internal secretion. Baltimore, 1939. (46より引用). 31) Stein, K.F. and M.
Lisle : Endocrinol., 30 : 16, 1942. 32) Reineke, E.P. et al. : Endocrinol., 29 : 306, 1941. 33)
辻田純二 : 日本内分泌誌, 36 : 777, 1960. 34) Nelson, W.O. and J. Hickman : Proc. Soc. Exp. Biol.
Med., 36 : 828, 1937. 35) Lewis, L.A. and E.P. McCullagh : J. Clin. Endocrinol., 2 : 502, 1942.
36) Nathanson, I.T. et al. : Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 43 : 737, 1940. 37) 高折忠太 : 日本内分泌
誌, 30 : 543, 1954. 38) Money, W.L. et al. : Endocrinol., 48 : 682, 1951. 39) Burris, M.J.
et al. : Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 84 : 181, 1953. 40) Castellani, L. : Arch. Maragliano Pat.
Clin., 7 : 79, 1952. (Excerpta, 7 : 12, 1953). 41) Leatham, J. H. : Anat. Rec., 109 : 318, 1951.
42) Crepax, P. : Boll. Soc. Ital. Biol. sper., 27 : 1543, 1951. (Ber. 156 : 232, 1953). 43) Gassner,
F.X. et al. : Tr. Amer. A. Study. Goiter, P. 156, 1947. 44) 山本清 : 内分泌機能の協関, P. 59,
1956. 45) Brown-Grant, K. : J. Physiol., 127 : 390, 1955. 46) Leblond, C.P. et al. : Proc.
Soc. Exp. Biol. Med., 51 : 159, 1942. 47) Brauner, F. et al. : Arch. internat. Pharmacodyn., 81 :
369, 1950. 48) Feldman, J.D. : Endocrinol., 58 : 327, 1956. 49) Feldman, J.D. : Endocrinol.,
59 : 289, 1956. 50) Kendall, E.C. : J. Biol. Chem., 39 : 125, 1919. 51) Harington, C.R. and
S.S. Randall : Biochem. J., 23 : 373, 1929. 52) Fink, K. and R.M. Fink : Science, 108 : 358, 1948.
53) Gross, J. and R. Pitt-Rivers : Lancet, 1 : 437, 1953. 54) Roche, J. et al. : Physiol. Review, 35 :
583, 1955. 55) Hydovitz, J.D. and W.L. Arons : Tr. Amer. Goiter. Assoc., P. 1332, 1957. 56)
檜垣修生 : 岡山医学会雑誌, 71 : 1725, 1959. 57) 鈴木光雄 : 内分泌と代謝, 1 : 40, 1958. 58)
Leblond, C.P. and J. Gross : Endocrinol., 43 : 306, 1948. 59) Soliman, F.A. and E.P. Reineke : Am.
J. Physiol., 178 : 89, 1954. 60) Somogyi, M. : J. Biol. Chem., 86 : 655, 1930. 61) 七条小
次郎, 他 : 日新医学, 39 : 307, 1952. 62) 入江一彦 : 東北医誌, 55 : 321, 1957. 63) Morton,
M.E. et al. : Endocrinol., 30 : 495, 1942. 64) Perlmutter, M. et al. : J. Clin. Endocrinol., 12 : 208,
1952. 65) Stanley, M.M. and E.B. Astwood : Endocrinol., 44 : 49, 1949. 66) Vanderlann,
W.P. and M.A. Greer : Endocrinol., 47 : 36, 1950. 67) Randall, R.V. and A. Albert : Endocrinol.,
48 : 327, 1951. 68) Ghosh, B.N. et al. : Endocrinol., 48 : 631, 1951. 69) Chaikoff, J.L. and
A. Taurog : Ann. New York Acad. Sci., 50 : 377, 1949. 70) Morton, M.E. et al. : J. Biol. Chem.,
140 : 602, 1941.