In Reference to Spectrophotometric Estimation of 3-Methoxy-4-Hydroxymandelic Acid in Urine

(I) A critique of Sandler's method

By

H. ABE, T. HOTTA, T. INAGAKI and M. IWASE*

From Department of Surgery and Surgical Endocrinology, Aichi Prefectural Owari Hospital, Ichinomiya

*Department of Surgery, Nagoya University, School of Medicine, Nagoya

In reference to microdetermination of catecholamine, our efforts in the past few years have been concentrated on estimation of free catecholamine in urine or plasma, however the detection has so far met with certain difficulties.

Recently, Armstrong reported that 3-methoxy-4-hydroxymandelic acid was excreted in urine as a major metabolite of epinephrine and norepinephrine. Following this, some methods for estimation of 3-methoxy-4-hydroxymandelic acid in urine have presented.

We have followed Sandler's method without delay and partially modified as well as simplified the entire procedure and we have found it diagnostically significant in clinical application.

In brief, we employed the "omitting of indol reagent"-technique as a blank preparation. We invite your suggestion for our modification.

Fundamental Studies on the Metabolic Response of Epididymal Fat Pad on Various Hormones with Special Reference to Bioassay of Insulin.

Kazuya WAIMATSU

From the Department of Internal Medicine, Division II, Kobe Medical College, Kobe, Japan.

(Director : Prof. Dr. Shozo Tsuji)

The author has attempted to establish basic experimental conditions suitable for metabolic studies, including bioassay of insulin-like activity of blood, of epididymal fat pad excised from Wistar strain rats.

Ca. 100-120gm. weighing rats were used for the experiments. Epididymal adipose tissues were incubated by means of Warburg's apparatus in Krebs-Ringer's bicarbonate solution. Glucose and various hormones were added to the media and tested for their effect upon glucose uptake and QCO_2 .

In the first step, the experiments were made on the comparative studies of different tissue sections of the epididymal fat pad with regard to their influences upon glucose uptake, QCO_2 and QO_2 . A trisection pooled method as described in the figure was found to give most constant results, hence, this method was used throughout the whole experimental series. For the standard metabolic response of epididymal fat pad, glucose uptake and QCO_2 , particularly the glucose uptake, were chosen.

Using this trisection method, insulin, glucagon, ACTH, cortisone acetate, sodium fluoride and malonic acid were tested for their effects on the glucose uptake and QCO_2 of the incubating adipose tissues.

As regards to the insulin effect, detailed studies were carried out to build up a bioassay method of minute insulin dose added to the incubation medium. Δ Glucose uptake and QCO_2 of incubated adipose tissues, particularly of the former, showed variations corresponding to the insulin dosage added to the medium, indicating dose-response relationship. Thus a bioassay method of minute insulin dosage could be deduced by the determination of Δ glucose uptake from the incubation medium.

Using this bioassay method insulin-like activity of normal subjects and diabetic patients were determined in comparison with the results of rat diaphragm method.

The results are summarized as follows :

1) It has been proved that the isolated epididymal fat pad of rat is a suitable model for the study of carbohydrate metabolism of the tissues as in the case of the rat diaphragm. The glucose uptake and QCO_2 of the isolated epididymal fat pad responded quite well to insulin addition. Glucagon acted similarly but gave a mild effect upon glucose uptake and QCO_2 , whereas the pituitary and adrenocortical hormones exhibited no apparent effect. Sodium fluoride and malonic acid apparently inhibited glucose uptake and QCO_2 of fat pad. Insulin effect upon epididymal fat pad could be accelerated by glucagon. But the effect was markedly suppressed with ACTH, cortisone acetate, sodium fluoride and malonic acid, particularly of the latter two.

2) A relation corresponding to linear regression was confirmed between the Δ glucose uptake from the incubation medium and the log dose of insulin added to the medium. This insulin effect was observed with an insulin concentration up to 10^{-5} unit/ml, thus making it possible to determine quantitatively the insulin-like activity of serum in terms of Δ glucose uptake. The mean insulin-like activity of serum in 13 normal subjects was $3.72 \pm 2.97 \times 10^{-4}$ unit/ml. The mean insulin-like activity of serum in 12 diabetics was $2.66 \pm 2.18 \times 10^{-4}$ unit/ml.

3) In the comparative studies, the rat diaphragm showed much more basal glucose uptake than epididymal fat pad, whereas the latter exhibited much more Δ glucose uptake expressed as insulin effect. These results seem to point upon a higher sensitivity of epididymal fat pad in the bioassay of insulin-like activity.

4) Insulin was added to normal or diabetic serum and their insulin effect was examined to see how the effect of exogenous insulin is influenced by human serum. In the case of normal serum, effect of exogenous insulin could be clearly observed by showing an added effect of preexisting insulin when exogenous insulin was given. But with diabetic serum, similar results were not always observed. In certain instances, diabetic sera showed different but diverse results. Sometime an inhibitive effect upon exogenous insulin effect was observed in both experiments on diaphragm and fat pad ; in some instances, however, similar inhibition of exogenous insulin was demonstrated only on diaphragm, or at times, the reverse. This phenomenon requires further detailed studies.

脂肪組織における糖質代謝の研究

特に血中インシュリン相当値の測定について

神戸医科大学第二内科学教室 (指導 辻 昇三教授)

矮 松 一 弥

(昭和36年1月13日受付)

目 次

I 緒 言	果の変動
II 実験方法とその基礎的條件の検討	(c) Iszilin 濃度差による変動
1) 実験動物	(d) Iszilin と Novo 製 semilent insulin
2) 脂肪組織とその剔出法	との比較
3) Medium と Incubation 条件	2) Glucagon
4) ガス代謝測定	3) ACTH
(a) O_2 Consumption	4) 副腎ホルモン
(b) CO_2 output (over all gas output)	(a) Cortisone acetate
5) 糖利用測定	(b) Adrenalin
6) 脂肪組織分割法	(c) Noradrenalin
(a) 1 側単独法	5) 絨毛性 Gonadotropin
(b) 横 2 分法	6) Rastinon
(c) 縦 2 分法	7) 代謝阻害剤
(d) 各葉分割法	(a) 弗化ソーダ
(e) 3 分割プール法	(b) マロン酸
7) 各種条件に於ける糖利用及びガス代謝	8) 小括及び考按
の変動	IV 副腎丸脂肪組織法による血中 Insulin
(a) Medium の glucose 濃度	like activity 測定に関する検討
(b) 白鼠飼料及び絶食の影響	1) 実験方法
(c) 副腎丸脂肪組織重量	2) Insulin 作用濃度直線
(d) 白鼠体重	3) 被検血清稀釈について
(e) Incubation time	4) 血清中に添加した既知 insulin の再発
(f) QO_2 (KOH添加) と QCO_2 (KOH	見成績 (Recovery test)
非添加)	5) 健常人血清 Insulin like activity
8) 小 括	6) 糖尿病患者血清 Insulin like activity
III 各種ホルモン及び薬剤の副腎丸脂肪組織	7) 副腎丸脂肪組織法と横隔膜法の比較
に於ける糖利用, ガス代謝に及ぼす影響	(a) Novo 製 semilent insulin 濃度差
1) Insulin	による糖利用
(a) Iszilin (regular insulin) 添加と	(b) 血清及び Insulin 添加の影響
glucose 非添加の影響	8) 小括及び考按
(b) Iszilin 添加時期による insulin 効	V 結 語

I 緒 言

脂肪組織は単に脂肪を貯蔵するのみで、特別な metabolic activity はないと永らく考えられていた。従って、その生理学的研究も比較的近年になつて行なわれ始めた。1907年に V. Gierke が初めて組織学的に脂肪組織中に glycogen が存在することを認め、Tuerkischer¹⁾ は正常食健康犬或は白鼠の脂肪組織には化学的に glycogen は認め難いが、動物を絶食か低栄養に至らしめて後、高糖質食を与えると脂肪組織に glycogen を一時的に見出したと報告している。Hausberger²⁾ は適量の insulin 注射は白鼠の脂肪組織に glycogen deposition を惹起し、Tuerkischer & Wertheimer³⁾ は in vivo と in vitro の研究を通じ糖質から脂質合成が行なわれる時は常に glycogen deposition が先行して後 fat deposition が起ると述べている。動物に糖質から脂質合成の能力がある事は古くから多くの研究者により検討され、食物による余剰栄養素の大部分は脂肪として体内に沈着するものとされている⁴⁾。従来この合成は専ら肝臓で行なわれると考えられていたが、Shapiro & Wertheimer⁵⁾ は脂肪組織自身にもこの能力のある事を指摘し、最近の C¹⁴ 標識 glucose を用いた研究⁷⁾ でも更にこの事が立証されている。糖質代謝と脂質代謝の関連性が解明されるにつれ、更に

Fig. 1. Both epididymal fat pad and testis.

に進んで糖尿病に於ける脂質代謝障碍が研究されつつある現在、脂肪組織は貯蔵組織として存在するだけでなく特別な metabolic activity を有する事が明白となつた。この興味ある観点から著者は分離脂肪組織として最も好適な白鼠の脂肪組織を利用して in vitro で糖質代謝の研究を試みた。教室からは先にこの方法を用いた insulin 相当値の測定法に就いて概略の検討結果を辻⁷⁾が報告したが、本報告ではこれに関連した基本的実験の詳細及び以後に行なわれた研究結果に就いて報告する。

II 実験方法とその基礎的条件の検討

糖質代謝に関する in vitro の実験方法の一つとして比較的損傷少なく生体から剔出した臓器組織に就いて行なう方法が用いられている。しかしこの方法は各種実験条件が鋭敏に影響して可成り研究成果の変動をみる事が多いので、基礎的条件の検討と実験方法の一定化が必要である。実験にはワールブルグ装置を使用した。

1) 実験動物

当教室で従来より横隔膜及び肝切片に就いて行なつた実験に準じて、同一条件で飼育せる Wistar 雑系雄白鼠の体重 110~120gm のものを実験前24時間絶食せしめ頭部を殴打放血致死させ使用した。

2) 脂肪組織とその剔出法

In vitro の研究対象となる脂肪組織には肩胛間、腎周囲、腸間膜及び副睪丸脂肪組織がある。この各組織の total lipid を Payne's gravimetric method⁷⁾ により測定すると、100mg wet tissue weight につき副睪丸脂肪組織は82.3mg、腎周囲

脂肪組織は74.2mg, 肩胛間脂肪組織は40.1mgとなり, 副睾脂肪組織(以下「副睾脂」と略称す)の total lipid 含有量は多い。又使用する組織を速やかに損傷も少なく剔出する必要上, 副睾脂の解剖学的位置及び構造は最適である。即ち Fig. 1 (写真と略図)に示す様に副睾脂は膜様「ハツ手」型の分葉をなし腹腔内で小腸を蔽い副睾丸に接続する根部は厚く, この部に太い血管がありこれから各分葉に毛細血管が枝状に分岐している。片側の副睾脂は3葉からなると云われるが実際は分葉数に個体差があり, 著明な分葉構造のない切れ込み状のものから5葉状を示すものもある。根部の太い血管に平行にその末梢部を剔出し直ちに21°Cに保った Krebs-Ringer's bicarbonate 液に入れ浮遊させ乍ら分割する。次に濾紙にて組織の損傷と乾燥をさけて水分を切り手早く torsion balance で wet tissue weight を秤量し incubate した。

3) Medium と Incubation 条件

Medium は新調せる Krebs-Ringer's bicarbonate 液(以下「KR液」と略称す)をP.H.7.4に補正し, incubate する迄は液温を21°Cに保った。Medium に添加する各種ホルモン及び薬剤, 血清は KR 液の組成, P.H.に変化を来たさぬ限りの濃度に加えた。Glucose は200mg/dlの濃度(以下「KRG液」と略称す)に, 更に insulin は 10^{-1} u $\sim$ 10^{-5} u/mlの濃度(以下「KRG液」と略称す)に加えた。Warburg-flask に入れる medium は2mlで, 好気性条件の95%O₂と5%CO₂混合ガスを充填し温度37.5°Cで振盪回数110回転/分で120 $\sim$ 180分 incubation とした。

4) ガス代謝測定

(a) O₂ consumption

脂肪組織には O₂ consumption の能力があつて⁹⁾ glucose 更に insulin の存在により促進され¹⁰⁾これらは飼育条件によつても変化する¹¹⁾といわれている。O₂代謝測定のため manometer を用い¹²⁾ flask の center cup に 40%KOH 0.1mlを入れ発生するCO₂を吸収して manometer の動きから O₂ consumption を計算し, QO₂なる記号であらわし単位は μ l/100mg wet tissue weight/incubation time とした。

(b) CO₂ output (over all gas output)

物質代謝の過程に於けるCO₂発生は不可欠のガス代謝で正常脂肪組織のR.Qは約1.0であるが¹³⁾ glycogen を含有する脂肪組織のR.Qは1.0以上で, 特に糖質から脂質への転化のあるときこの傾向を示す⁹⁾といわれる。CO₂の測定は manometer により center cup に KOH を入れずに行なつたが, 実際にはC¹⁴標識 glucose によるC¹⁴追跡法⁸⁾¹⁴⁾¹⁵⁾による測定が確実であるが設備上困難で行ない得なかつた。Manometer によるCO₂発生測定は正確にはO₂消費とCO₂発生の出納をみた over all gas output と考える方が適当であるが, QCO₂なる記号であらわし単位は μ l/100mg wet tissue weight/incubation time とした。

5) 糖利用測定

In vitro でも脂肪組織に糖利用能がある事を Krahl¹⁶⁾が報告して以来, 更に糖利用が insulin により促進される^{11)17)~20)}という研究がある。この摂取された glucose は glycogenesis をへて lipogenesis に利用される²¹⁾²²⁾と考えられている。

本実験では incubation medium である KRG 液の糖量を Hagedorn-Jensen 法で定量し, incubation 前後の medium の糖量の差から糖利用を計算しその単位は glucose mg/gm wet tissue weight/incubation

time とした。KRG 液の糖利用即ち basal uptake は実験日により多少動揺をみせたが少なくとも同時実験群に於ては略々一致する値を得た。副睾脂を剔出して KR 液に浸し分割する液温は21°Cが最適で soaking time も15分とした。最初白鼠横隔膜法にならい氷室内液温に浸したが basal uptake の減少と insulin 効果の低下をみたので, 不必要な handling や chilling は副睾脂の生理的狀態を変化さす⁸⁾様である。

6) 脂肪組織分割法

Table 1. Tissue division methods
(a) Single epididymal fat pad method.

fat tissue	right side	left side
exp. no.	18	18
glucose uptake	4.47 $\pm$ 1.38	4.08 $\pm$ 1.23
QO ₂	47.7 $\pm$ 5.9	41.6 $\pm$ 10.8

(Mean $\pm$ S.D.)

Fig. 2, Table 2. Tissue division methods
(b) Transverse bisection method. Fig. 3, Table 3. Tissue division methods
(c) Longitudinal bisection method.

少なく組織重量は90~110mgであつた。

各葉の糖利用は前述の3方法より優れているが各葉の性状の不同に原因して Table 4 の如く各々の糖利用及びガス代謝は不同であつた。

(e) 3分割プール法

白鼠横隔膜法で4匹を1組とした pooled method の quarter diaphragm technique が用いられている如く、組織の個体差を少なくするため副辜脂にも3分割プール法を検討した。

前述の諸分割法からみて副辜脂の末梢分葉部が根部に接する部より糖利用が良いので、大体分葉に従い Fig. 5 に示す様に末梢部のみを3分割し、各片を3ヶ合わせた組織重量が70~100mgの範囲内で略々等量に

副辜脂の性状は肉眼上根部を除き均等な厚さに見えるが各部位に於ける糖利用とガス代謝の相異をみて実験に供する組織の部位と分割法を検討した。尚個体差をなくするため常に3匹の白鼠を1組とし合計6ヶの副辜脂を用いその平均値をとつた。

(a) 1側単独法

厚みのある根部を除き1側の副辜脂を分割せずを用いる方法で組織の損傷は可成り少なくなる。組織重量250~350mgのものを使用した。性状に可成りの個体差をみた。Table 1 の如く糖利用及びガス代謝をみると右側がやや大であるが左右差は有意の変化を示していない。

(b) 横2分法

Fig. 2 に示す様に根部を除いた副辜脂を横に2等分し右側の上部と左側の下部を合わせ α とし、右側の下部と左側の上部を合わせて β とし組織2片の合計重量は250~350mgとした。Table 2 に示す様に α と β の糖利用及びガス代謝に大差をみなかった。

(c) 縦2分法

Fig. 3 に示す様に根部を除いた副辜脂を縦に2等分し右側の分葉側をa、根部側をb、左側の根部側をc、分葉側をdと4分部に分け組織1片の重量は150mg前後と

した。Table 3 の様に糖利用及びガス代謝とも分葉側が根部側より促進され、左右副辜脂とも同様の傾向であつた。これは組織の性状によるもので分葉側が薄く物理学的に組織とmediumとの間の代謝が良くなるためと考えられる。

(d) 各葉分割法

Fig. 4 に示す様に根部を除いた副辜脂をその分葉に従い3分割し各個の分葉に就いて糖利用及びガス代謝をみた。略々等分に3葉を示すものは

Fig. 4, Table 4. Tissue division methods

(d) Transverse trisection method.

fat tissue	a	b	c	a'	b'	c'
exp. no.	9	9	9	9	9	9
glucose uptake	7.26 ± 1.95	9.00 ± 4.73	7.10 ± 3.14	7.30 ± 1.51	6.33 ± 4.35	5.73 ± 1.33
QO ₂	104.1 ± 40.7	119.1 ± 29.5	180.0 ± 29.8	141.4 ± 25.2	126.2 ± 22.7	131.5 ± 17.3

(Mean $\pm$ S.D)

Fig. 5, Table 5. Tissue division methods

(e) Trisection pooled method.

fat tissue	I	II	III	IV	V	VI
exp. no.	18	18	18	18	18	18
glucose uptake	6.19 ± 1.99	5.98 ± 1.60	5.88 ± 1.16	5.87 ± 1.29	5.91 ± 1.49	5.74 ± 1.53
QO ₂	81.5 ± 39.2	79.6 ± 30.5	88.4 ± 35.2	92.4 ± 27.8	76.7 ± 34.7	75.3 ± 37.3

(Mean $\pm$ S.D)

なる様秤量時に調節した。Table 5 に示す様に本分割法では糖利用は比較的統一的になり且つ糖利用度もよく更に material が多く得られるので以後本法による組織分割法を基準にした。

7) 各種条件に於ける糖利用及びガス代謝の変動

(a) Medium の glucose 濃度

In vitro の実験で糖利用度を決定する大きな因子は insulin の他, medium の glucose 濃度があり白鼠横隔膜法でも検討されている^{28) 67) 70)}。

KR液に glucose を100mg, 200mg, 及び300mg/dlの各濃度に添加した medium につ

Table 6. Effects of glucose concentration in vitro on glucose uptake and QO₂ of rat fat tissue

glucose concentration	100mg/dl	200mg/dl	300mg/dl
exp. no.	12	12	8
glucose uptake	4.21 ± 1.51	7.16 ± 1.91	7.72 ± 1.74
QO ₂	76.3 ± 24.2	102.5 ± 25.6	82.6 ± 28.6

(mean $\pm$ S.D)

きみると, Table 6 に示す様に糖利用は生理濃度に近い100mg/dlより200mg/dlが著明によく更に300mg/dlがよい. ガス代謝は200mg/dlで最も多い.

竹内ら⁷⁰⁾の横隔膜法に於ける検討でも glucose 0.03~1.0%の濃度範囲で濃度の上昇と basal uptake は平行するが insulin 効果は有意差を認めず, 又 Krahl ら⁶⁵⁾も0.1%と0.2%の濃度比較に於て basal uptake と insulin 効果はともに0.2%の方が大であると報告している. 脂肪組織法に於ける medium の glucose 濃度の検討に関する報告はみないが, Beigelman¹⁹⁾, Staub³⁰⁾共に脂肪組織に関して200mg/dlの濃度の medium を使用している. 著者も糖利用及びガス代謝の良好な点から本報告に於て glucose 200mg/dl の medium を使用した.

(b) 白鼠飼料及び絶食の影響

分離組織の物質代謝をみる時その動物の飼育条件中飼料の影響は重要な因子である. 白鼠横隔膜に於ける糖利用でも糖質, 脂質及び蛋白質の3大栄養素が大きな役割をもち²⁴⁾²⁵⁾, 高糖質食では basal uptake は高く, 高脂食及び高蛋白食では basal uptake と insulin 効果の変動がある²⁶⁾と報告している. 一方脂肪組織に関して in vivo で高糖質食と絶食の交互飼育を行なうと食物中の糖質の大部分は脂肪組織内に脂肪として貯蔵されこれは脂肪組織内の glycogen deposition と関係を有し²⁷⁾, in vitro で高脂質食と絶食は脂肪組織の lipogenesis 及び glucose oxidation を抑制するが, 飼料中の脂肪が減少するか或は糖質の増加があると lipogenesis のための糖利用が増す²⁸⁾, と報告している. Itzhaki¹¹⁾は飼料条件と絶食は脂肪組織の糖利用に著明な影響を及ぼさぬが, insulin 効果に高糖質食と絶食が関係してこれを高め, 又絶食は脂肪組織の O_2 consumption を増すという結果を得た. この様に飼料条件が脂肪組織の代謝に対して明らかに影響があるので飼料と実験に供する迄の24時間絶食の影響を糖利用と QCO_2 につき検討し, 更に insulin 効果もみた.

市販されている Oriental 固型飼料で10日飼育した群と, 麦を主とした高糖質飼料で10日飼育した群とに分ち何れも水道水は適当に与えた. 10日間飼育では白鼠体重の増加, 一般状態及び副辜脂の発育状況等は両群間に有意差を認めなかつた. 副辜脂の糖利用と QCO_2 はTable 7 (a), (b)に示す様に, 24時間絶食の KRG 液に於ける糖利用と QCO_2 は両群間に大差を認めないが, 飽食の KRG 液に於ける糖利用と QCO_2 は高糖質群に低下をみた. Insulin 効果は両群間に明らかな差異を認め絶食飽食の有無に拘らず高糖質群に insulin 効果の促進をみた. 次に両群毎に絶食が insulin 効果に及ぼす影響をみると, Oriental 飼料群も高糖質群に

Table 7. (a) (b) Effects of feeding and fasting of rats on glucose uptake and QCO_2 of fat tissue

(a) Oriental stock diet

medium	fasting rat			feeding rat		
	KRG	KRG $I^{10^{-2}}$	KRG $I^{10^{-3}}$	KRG	KRG $I^{10^{-2}}$	KRG $I^{10^{-3}}$
glucose uptake	2.73	9.12	7.75	2.50	8.25	6.75
QCO_2	10.0	113.0	84.2	29.2	64.0	49.3
exp. no.	4	4	4	4	4	4

(b) Carbohydrate-rich diet

medium	fasting rat			feeding rat		
	KRG	KRG $I^{10^{-2}}$	KRG $I^{10^{-3}}$	KRG	KRG $I^{10^{-2}}$	KRG $I^{10^{-3}}$
glucose uptake	2.65	14.10	12.10	1.05	14.05	12.50
QCO_2	15.8	168.5	140.7	6.2	160.8	146.0
exp. no	6	6	6	6	6	6

於ても糖利用に関し絶食が *insulin* 効果にさしたる変化を及ぼさぬが, QCO_2 に関して Oriental 飼料群の絶食が *insulin* 効果を高める結果を得た. 以上を総括すると高糖質食は副睪脂に対する *insulin* 効果を促進し糖利用と QCO_2 を増大せしめたので, 少なくとも実験前の10日間は麦を主とした高糖質食で飼育し, 絶食の影響は著明にみられなかつたが24時間絶食せしめ個体の条件を統一して実験に供した.

(c) 副睪丸脂肪組織重量

3分割プール法による組織重量を60~120mgの範囲で10mg毎の各段階に分け重量差による糖利用と QCO_2 をみた. Fig. 6 に示す様に80~90mgでは糖利用と QCO_2 ともによく, 重量の増加につれ減少の傾向を示した. 重量増加は結局組織の厚みに関係し *in vitro* の本実験法では物理的条件により代謝の低下をみると考える. よつて組織重量は80~90mgのものを使用し, このため組織分割時に副睪脂の性状に応じて3片合計が必要重量になる様に出来るだけ秤量時の切除による重量調節をさけ組織の損傷を防止した.

Fig. 6. Behavior of glucose uptake and QCO_2 , relation to weight of fat tissue.

(d) 白鼠体重

一般に体重の増加と共に体内脂肪組織の発育は良好で副睪脂も同様である. しかし個体差があつて体重の軽重に平衡せぬ発育状態の副睪脂もみられたが, 少なくとも一定期間一定飼料にて教室で飼育すれば体重に相応する副睪脂を得た. 体重差による副睪脂に於ける糖利用と QCO_2 をみると, Fig. 7 に示す様に体重150gm以上では低下をみた. これは組織重量差と同様の傾向で体重増加による組織の厚みの増大によるものである. 体重80~120gmでは糖利用と QCO_2 は良く, しかも大差がないので体重110~120gmの白鼠を使用した.

(e) Incubation time

生体から剔出した組織を Warburg 装置で incubate する時組織の一定標準状態が時間的にどれだけ存続するかを確認し, 且つその範囲内で metabolism の消長を見る事は重要である.

Incubation 直後の flask 内の液温と manometer のガスの動きの安定を待ち15分後から測定を開始した. 180分 incubate した糖利用と QCO_2 を100%とし incubation time 30分, 60分, 120分に於ける変化をみ

Fig. 7. Behaviors of glucose uptake and QCO_2 , relation to body weight of rat. Fig. 8. The rate of glucose uptake and QCO_2 in process of incubation.

ると, Fig. 8 に示す如くである。QCO₂ は30分で既に35.2%を示し以後直線的に時間の経過と共に上昇した。糖利用も30分で27.9%に達し120分迄は可成りの進行状態であるが120分から180分にかけて徐々にその速度は低下する傾向にあつたが、尚長時間の incubation は果して生理的糖摂取によるものか疑問である。肉眼的にも120分以上の incubation は組織の性状に変化を来たしたので、糖利用度からみても120分の incubation が適当と思われる。以後120分 incubation を基準とした。Medium に添加物を加えその効果をみる場合に限り、始め KRG 液又は KRGI 液で60分 incubate し添加物を加えてから更に60分或は120分 incubate した場合もある。

(f) QO₂ (KOH 添加) と QCO₂ (KOH 非添加)

ガス代謝の測定は Manometer 法により、O₂ consumption を QO₂ として flask の center cup に40% KOH 0.1ml を添加して発生 CO₂ を吸収して manometer の動きから QO₂ を算出し、一方 all over gas output を KOH を添加せずに測定して QCO₂ であらわした。QO₂ と QCO₂ の比較、換言すれば KOH 添加の影響を検討し更に insulin 効果に対する変化をもみた。

KOH を0.1ml center cup に添加するにも拘らず incubation 後の medium の pH は7.4より僅かアルカリ側に変化したが、非添加の際には pH の変動を認めない。Table 8 (a), (b) に示す様に basal uptake は KOH 添加5.05mg/gm に対し非添加4.17mg/gm で KOH 添加の影響をみせたがその理由は不明である。糖利用に関する insulin 効果に対しては KOH 添加の影響はみられなかつた。他方ガス代謝には著明な差を認め、KOH 添加により QO₂ を測定するとき insulin 効果は QO₂ の変化の上に殆んど見られない。一方 KOH 非添加の QCO₂ の KRG 液に於ける値は24.8μl/100mg で QO₂ の 72.8μl/100mg に対し小さいが、insulin 効果を見ると 96.9μl/100mg と約3倍の動きを示した。しかし QO₂ と QCO₂ にも共通して糖利用とガス代謝間に平行関係がなく糖利用があるに拘らずガスの動きのない例を少数みたがその理由は不明である。Incubation 後の medium に変化のないこと、insulin 効果が著明に表われる事、操作の簡素化の諸点からガス代謝は all over gas output を QCO₂ として KOH を添加せず測定する事にした。

8) 小 括

以上実験方法とその基礎的条件の検討により次の方法に従い実験を行なうことにした。教室で少なくとも10日間麦を主とした高糖質食で飼育した体重110~120gmの Wistar 雑系雄白鼠を用い、24時間絶食後頭部を殴打放血致死させ速かに副腎脂を剔出し直ちに21°Cに保つた Krebs-Ringer's bicarbonate 液中に浸し、soaking time は15分とした。液中にて副腎脂を分葉に従いその末梢均等性の部分を選んで3分割し、3匹1組の合計6ヶの副腎脂から pooled method により3片1組を使用組織とし、濾紙にて軽く水分を切り手早く秤量して80~90mg wet tissue weight とした。予め用意した glucose 200mg/dl を含む pH 7.4に調節した Krebs-Ringer's bicarbonate 液2mlを incubation medium とした Warburg flask 中に組織を入れ、95% O₂ と 5% CO₂ の混合ガスを充填した好気性条件下で Warburg 装置に連絡し、37.5°Cにて1分間110回転で120~180分 incubate した。Incubation 前後の medium の糖量を Hagedron-Jensen 法で定量しその減少量から副腎脂による糖利用は計算により glucose mg/gm wet tissue weight/incubation time とした。ガス代謝は manometer 法により over all gas output を CO₂ 発生と見做し便宜上 QCO₂ として計算し単位は μl/100mg wet tissue weight/incubation time とした。

Table 8. a) b) Effects of added KOH on glucose uptake, insulin effect and gas metabolisms
a) KOH add (QO₂)

medium	KRG	KRG I ¹⁰ ⁻²
exp. no.	26	15
glucose uptake	5.05±1.67	8.43±2.11
QO ₂	72.8±34.6	73.7±35.4

(Mean±S.D)

b) KOH free (QCO₂)

medium	KRG	KRG I ¹⁰ ⁻²
exp. no.	24	15
glucose uptake	4.17±1.51	8.16±1.93
QCO ₂	24.8±9.3	96.9±25.6

(Mean±S.D)

Ⅲ 各種ホルモン及び薬剤の副睪丸脂肪組織に於ける糖利用, ガス代謝に及ぼす影響

内分泌機能と糖代謝の相関に就いて既に多くの研究がなされ興味ある諸問題がある。睪内分泌ホルモンを筆頭に、下垂体ホルモン、副腎皮質髄質ホルモン及び甲状腺ホルモン等が特に糖代謝と密接な関係にある事は *in vivo* 及び *in vitro* でも認められている²⁹⁾³⁰⁾。又白鼠の横隔膜、肝切片及び脳組織に関し辻、馬場³¹⁾は *in vitro* で各種ホルモン及び薬剤の糖代謝に及ぼす影響に就いて詳細に述べ興味ある知見を得ている。

脂肪組織を対象として Wertheimer & Shapiro⁶⁾ は各種ホルモンの影響を *in vivo* で総論的に述べているが、*in vitro* に関する報告は insulin に就いてみられる以外にない。本報告に於て著者は前述の実験方法により副睪脂を対象に各種ホルモン及び薬剤の糖利用と QCO_2 に対する変化を検討した。

1) Insulin

Krebs-Ringer's bicarbonate 液に glucose を 200mg/dl の濃度に添加した medium (KRG 液) に insulin を加え (KRG I 液) その添加条件による副睪脂の糖代謝に対する影響をみた。

(a) Iszilin (regular insulin) 添加と glucose 非添加の影響

Iszilin (清水製薬) を KRG 液に最終濃度が 10^{-3} u/ml になる様に加え副睪脂を 120 分 incubate すると Fig. 9 に示す様に、糖利用は basal uptake の 2.12mg/gm に対し KRG I 液では 6.78mg/gm と約 3 倍の増加を示し insulin 効果をみた。一方 medium に glucose も insulin も添加せぬ KR 液では incubation 後の medium に還元物質の増加をみたためか糖利用に相当する値は負を示して -0.74 mg/gm となった。 QCO_2 に対する insulin 効果は incubation の時間を追って 15 分後に既に現れ 120 分迄直線的に増加し尚も増加の傾向を示した。KRG 液では $9.58\mu\text{l}/100\text{mg}$ に対し KRG I 液では $75.9\mu\text{l}/100\text{mg}$ と約 8 倍の増加があり insulin 効果の存在を認めた。しかし KR 液では QCO_2 は負の動きをして $-8.56\mu\text{l}/100\text{mg}$ であった。

Fig. 9. Effects of added Iszilin (regular insulin) on glucose uptake and QCO_2 .

(b) Iszilin 添加時期による insulin 効果の変動

Iszilin を 10^{-3} u/ml の濃度に最初から添加して 180 分 incubate した場合 ($KRG I^{10^{-3} \cdot 0'}$) と、最初 KRG 液で 60 分 incubate し予め flask の側室に入れておいた Iszilin を主室に傾注して 10^{-3} u/ml の濃度に添加後更に 120 分 incubate した場合 ($KRG I^{10^{-3} \cdot 60'}$) の insulin 効果の差をみると、Fig. 10 に示す様に糖利用は $KRG I^{10^{-3} \cdot 0'}$ の 6.67 mg/gm に対し $KRG I^{10^{-3} \cdot 60'}$ は 5.41 mg/gm となり当然 insulin 作用時間の長い前者の場合が多い。又 QCO_2 を時間を追ってみると $KRG I^{10^{-3} \cdot 0'}$ の insulin 効果は incubation 直後に現れほぼ直線的に増加して 180 分に至る、他方 $KRG I^{10^{-3} \cdot 60'}$ も insulin 添加後に QCO_2 の増加があり以後 $KRG I^{10^{-3} \cdot 0'}$ とほぼ平行を保ちつつ経過する。即ち 180 分 incubation の範囲内では insulin は添加後直ちに副睪脂に作用し作用時間に比例して糖利用度を高め、 QCO_2 の傾向からみて初め KRG 液で 60 分 incubate した事が insulin 効果の現れ方に著変をもたらさぬ事を示している。

Fig. 10. Difference in Iszilin effect (regular insulin) at different application period.

Fig. 11. Dose response relation between glucose uptake, QO_2 and Iszilin (regular insulin) concentration.

(c) Iszilin 濃度差による変動

副腎脂に於ける insulin 効果の insulin 濃度差による変動をみるため KRG 液に Iszilin を最終濃度 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml になる様添加し各濃度に於ける糖利用及びガス代謝を検討した。先ず insulin 濃度差と糖利用及び QO_2 の関係を Fig.11 にみると、前述した如く insulin 効果は QO_2 に現れ難くしかも両者に何ら相関々係は認めなかつたが、糖利用では insulin 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の濃度範囲で糖利用度と insulin 濃度差は明らかな用量反応を示した。しかも 10^{-5} u/ml の低濃度に於ても insulin 効果を認め得た。

次に insulin 濃度差と糖利用及び QCO_2 の関係を Fig.12 にみると、insulin 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の濃度範囲で糖利用度及び QCO_2 は共に insulin 濃度差と明らかな用量反応を示した。即ち KOH 非添加の状態での糖利用と QCO_2 を測定する方が insulin 濃度差と用量反応の関係をみるに適している。

Fig. 12. Dose response relation between glucose uptake, QCO_2 and Iszilin (regular insulin) concentration.

(d) Iszilin と Novo 製 semilent insulin との比較

Insulin 注射の際に見られる一時的高血糖の原因が insulin 中に混在している glucagon の作用である事が近年解明された。新光ら⁸⁹⁾の測定によれば Iszilin 中の glucagon 濃度は 0.21 $\sim$ 1.20% で、微量濃度の glucagon は insulin に協調的に作用すると報告している⁹¹⁾。Glucagon を含有する Iszilin 10^{-2} u/ml と、

Fig. 13. Comparison between Iszilin (regular insulin) and Novo insulin (semilent insulin) in their effects on glucose uptake and gas-metabolism.

glucagon free といわれる Novo 製 semilent insulin 10^{-2} u/mlを用いて両者の作用を副辜脂に於ける糖利用とガス代謝に就いて比較した。Fig.13に示す様に、Iszilin は Novo に比し糖利用も QO_2 及び QCO_2 共に良好で、これは Iszilin 中の glucagon に原因するものと推定される。

2) Glucagon

膵臓の第2の hormone といわれる glucagon に糖原分解作用並びに血糖上昇作用等のある事は知られている。その作用機序に就いて種々検討が加えられているが、insulin に対する作用は協調的であるとするものと非協調的に働くという2つの報告がある。

そこで medium に glucagon を添加して副辜脂に於ける糖代謝の影響をみた。Table 9 に示す様にKRG液に於ける糖利用は 1.76mg/gm に対し、glucagon を 10 γ /ml の濃度に加えると 2.00mg/gm となり僅か増加する。KRG液では2.72mg/gmであるが glucagon を10 γ /ml添加すると 3.40mg/gm となり insulin 効果に協調的である結果を得た。QCO₂ についても糖利用同様 glucagon 添加により増加を示した。

3) ACTH

ACTH の糖代謝に対する作用は恐らく副腎皮質を介してなされ、ACTH 自身には直接作用がないと考えられる。KRG 液と KRG液に ACTH を 10^{-2} u/ml 及び 10^{-4} u/ml の濃度に添加し各 medium に於ける副辜脂に対する糖代謝の影響をみた。Table 10に示す様に KRG 液への ACTH 添加は糖利用と QCO₂ に有意の変動を与えなかったが、KRG液への添加は insulin 効果に対して抑制的に作用し ACTH 濃度に従って糖利用は減少したが、QCO₂ は変動を示さなかった。

Table 9. Effects of added Glucagon

Medium	KRG		KRG 10^{-3}	
	cont.	glucagon 10 γ /ml	cont.	glucagon 10 γ /ml
glucose uptake	1.76	2.00	2.72	3.40
QCO ₂	8.4	17.9	20.6	27.4
exper. no.	4	4	4	4

Table 10. Effects of added ACTH

Medium	KRG			KRG I ¹⁰ ⁻⁸		
substrate	cont.	ACTH 10 ⁻⁴ u/ml	ACTH 10 ⁻² u/ml	cont.	ACTH 10 ⁻⁴ u/ml	ACTH10 ⁻² u/ml
glucose uptake	3.65	3.72	3.82	9.12	8.61	7.14
QCO ₂	21.8	21.9	18.6	128.5	137.0	129.1
exper. no.	4	4	4	4	4	4

4) 副腎ホルモン

副腎ホルモンの各種物質代謝に対する作用中で糖質代謝との関連性は早くから認められ多くの研究がなされた。副腎皮質、髄質ホルモンを medium に添加して副腎脂に於ける糖代謝の変動をみた。

(a) Cortisone acetate

浮游液の形の cortisone acetate を KRG 液と KRG I 液に 2.5 γ /ml 及び 25 γ /ml の濃度に添加した。Table 11 に示す様に KRG 液では cortisone acetate の添加は糖利用と QCO₂ に著変を与えなかつたが、KRG I 液への添加では insulin 効果に対して抑制的に作用し糖利用と QCO₂ 共に減少を示した。

Table 11. Effects of added Cortisone Acetate

Medium	KRG			KRG I ¹⁰ ⁻⁸		
substrate	cont.	cortisone 2.5 γ /ml	cortisone 25 γ /ml	cont.	cortisone 2.5 γ /ml	cortisone 25 γ /ml
glucose uptake	2.47	2.63	2.43	10.20	8.67	8.45
QCO ₂	21.3	25.6	22.1	157.0	137.5	133.7
exper. no.	4	4	4	4	4	4

(b) Adrenalin

Adrenalin を KRG 液と KRG I 液に 1 γ /ml, 10 γ /ml 及び 40 γ /ml の濃度に添加した。Table 12 に示す様に KRG 液では adrenalin 40 γ /ml の高濃度になって糖利用に僅少の抑制をみせたが、反対に QCO₂ は adrenalin 濃度に従って増加の傾向を示した。KRG I 液では adrenalin 1 γ /ml と 10 γ /ml の濃度で insulin 効果の促進を来し糖利用の増加をみたが QCO₂ は不変であつた。Adrenalin 添加によつて何れも糖利用と QCO₂ の間に平行関係を見出し得なかつた事は特異的な結果であつた。

Table 12. Effects of added Adrenalin

medium	KRG				KRG I ¹⁰ ⁻⁸			
substrate	cont.	adrenalin 1 γ /ml	adrenalin 10 γ /ml	adrenalin 40 γ /ml	cont.	adrenalin 1 γ /ml	adrenalin 10 γ /ml	adrenalin 40 γ /ml
glucose uptake	2.72	2.65	2.54	2.44	4.32	5.71	5.97	4.50
QCO ₂	14.8	18.0	37.9	38.9	69.0	67.3	67.0	45.1
exper. no.	8	4	8	4	8	4	8	4

(c) Noradrenalin

Noradrenalin を KRG 液と KRG I 液に 1 γ /ml 及び 10 γ /ml の濃度に添加した。Table 13 に示す様に KRG 液では noradrenalin 添加により糖利用は僅かに抑制されたが QCO₂ は反対に増加の傾向を示した。KRG I 液への添加では糖利用は 1 γ /ml で insulin 効果の促進をみたが 10 γ /ml では却つて抑制され QCO₂ も減少した。

Table 13. Effects of added Noradrenalin

medium	KRG			KRG $I^{10^{-3}}$		
substrate	cont.	noradrenalin 1 γ /ml	noradrenalin 10 γ /ml	cont.	noradrenalin 1 γ /ml	noradrenalin 10 γ /ml
glucose uptake	2.73	2.27	2.42	7.77	8.90	6.47
QCO ₂	14.9	26.8	31.2	116.0	108.3	88.7
exper. no.	4	4	4	4	4	4

5) 絨毛性 Gonadotropin

向性腺ホルモン及び性ホルモンの糖代謝に対する作用には不明な点があり in vitro の研究でも殆んどが関連性を認めていないが、絨毛性 gonadotropin による副辜脂に於ける糖代謝の変動をみた。本剤を KRG 液と KRG I 液に 0.03 i.u./ml と 0.3 i.u./ml の濃度に添加した。Table 14 に示す様に KRG 液では 0.3 i.u./ml の添加は糖利用に僅かの増加をみ、KRG I 液でも insulin 効果を僅かに促進したが、QCO₂ は各 medium とも不変であった。

Table 14. Effects of added Gonadotropin (chorionic)

medium	KRG			KRG $I^{10^{-3}}$		
substrate	cont.	gonadotropin 0.03 i.u./ml	gonadotropin 0.3 i.u./ml	cont.	gonadotropin 0.03 i.u./ml	gonadotropin 0.3 i.u./ml
glucose uptake	1.77	1.84	2.07	8.56	8.59	8.89
QCO ₂	20.1	15.3	21.9	110.0	105.6	109.6
exper. no.	4	4	4	4	4	4

6) Rastinon (N-[4-methyl-benzene sulfonyl]-N'-butyl-urea)

Sulfonyl 尿素剤の作用機序に就いて諸説があり肝糖原に作用するとするもの、勝ラ氏島細胞刺激に關与するもの等がある。末梢組織では insulin に協調するとも考えられ血糖降下作用による糖尿病治療剤の 1 つで、特に臨床的にみて肥満型糖尿病に有効と認められている。本剤を KRG 液と KRG I 液に 5 γ /ml 及び 50 γ /ml の濃度に添加し副辜脂に於ける糖代謝の変動をみた。Table 15 に示す様に Rastinon は副辜脂に於ける糖利用を期待に反して増進せず、KRG 液で糖利用を僅かに促進し KRG I 液でも 50 γ /ml で insulin 効果に僅かに協調したに過ぎない。QCO₂ は何れの medium にても変動を示さなかつた。

Table 15. Effects of added Rastinon

medium	KRG			KRG $I^{10^{-3}}$		
Substrate	cont.	Rastinon 5 γ /ml	Rastinon 50 γ /ml	cont.	Rastinon 50 γ /ml	Rastinon 50 γ /ml
glucose uptake	1.77	2.09	2.07	5.15	5.28	5.60
QCO ₂	11.8	14.4	8.2	70.7	78.4	76.2
exper. no.	4	4	4	4	4	4

7) 代謝阻害剤

物質代謝の酵素系に特に糖代謝経路に干渉し、又細胞毒として組織の代謝面に影響を与える所謂代謝阻害剤を添加して副辜脂に於ける糖代謝の変動をみた。

(a) 弗化ソーダ

弗化ソーダを KRG 液と KRG I 液に 0.001M と 0.01M の濃度に添加すると、Table 16 に示す様に KRG 液では両濃度とも軽度に糖利用の抑制がみられ特に QCO₂ が gas output として動かず負の方向の manometer

の動きとして現れ特徴的であつた。KRG 液でも明らかに insulin 効果は弗化ソーダにより抑制され、0.01Mでは特に著明であつて QCO_2 も激変を示した。

Table 16. Effects of added NaF

medium	KRG			KRG 10^{-3}		
	cont.	NaF 0.001M	NaF 0.01M	cont.	NaF 0.001M	NaF 0.01M
glucose uptake	1.95	1.68	1.50	7.35	5.86	2.12
QCO_2	4.6	-2.5	-3.2	76.2	59.4	11.9
exper. no.	4	4	4	4	4	4

(b) マロン酸

マロン酸を KRG 液と KRG 液に0.001Mと0.01Mの濃度に添加すると、Table 17に示す様に KRG 液では両濃度とも糖利用は軽度抑制され弗化ソーダ添加の場合同様 QCO_2 は負の動きを示した。KRG 液でも0.01Mの添加で糖利用は著明に減少し insulin 効果の抑制をみ、 QCO_2 も激変を示した。

Table 17. Effects of added $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$

medium	KRG			KRG 10^{-3}		
	cont.	$\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 0.001M	$\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 0.01M	cont.	$\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 0.001M	$\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 0.01M
glucose uptake	1.80	1.73	1.34	6.66	6.60	3.93
QCO_2	7.3	-1.3	-2.1	80.1	71.2	9.9
exper. no.	4	4	4	4	4	4

8) 小括及び考按

Insulin の作用機序に就いて種々論議され現在解明されている点として、(1)糖の細胞膜透過性促進、(2)hexokinase 作用の促進が主であつてその他、(3)酸化的磷酸化促進、(4) Krebs cycle の酸化反応促進等々があげられている。複雑な糖代謝に対する insulin の作用機序を窺うのに in vitro で medium 中の糖利用の動向及びガス代謝をみるのみでは全貌を把握する事は難しいが、insulin の作用効果をその target organ そのものを用いて観察する方法は1つの手段である。これには insulin に sensitive で simple な均質性を有する媒体が必要であり、しかも生体から剔出するとき組織の physical state の損傷を可及的に避けうる事が望ましい。この目的のために Gemmill (1940) の白鼠横隔膜法が良好で血中 insulin の Bioassay にまでも利用し得る様になつた。Krahl¹⁶⁾によつて脂肪組織にも in vitro で糖利用能がある事が発見されて以来、特に副率脂はその構造上 incubate するに都合が良いとして検討された。In vivo では Tuerkischer³⁹⁾, Wertheimer⁶⁾³²⁾, Fawcett³³⁾, Engel³⁴⁾らによつて insulin が脂肪組織内の glycogen 合成に関与すると報告され、更に脂肪合成に作用する事を Teppermann³⁵⁾が報告した。In vitro で Hausberger¹⁰⁾, Rice³⁶⁾, Stadie³⁷⁾, Balm-ain³⁸⁾らの研究によると insulin が glucose, pyruvate 及び lactate 等と共存すると脂肪組織の O_2 consumption や R.Q. の増加の原因になると云う。C¹⁴ 標識 glucose を用いた研究で Winegrad & Renold⁸⁾¹⁴⁾, Cahill¹³⁾, Hausberger & Milstein²⁹⁾らは糖利用とその glucose から脂肪酸への転化に対して促進的作用を有する事を述べた。以上の文献的考察からすれば脂肪組織特に副率脂は筋組織同様 insulin の target organ である事は明白である。著者の結果からみても副率脂は medium に添加せる 200mg/dl の濃度の glucose を摂取する。Insulin を更に medium に 10^{-3} u/ml の濃度に添加する事により 2~3 倍の糖利用の促進をみた。glucose の摂取が組織の断端から非生理的に滲透されることは一応考えられるが、組織の損傷の程度は横隔膜法に比しない利点がある。

本実験では medium 中の糖利用測定を行なつたのみで、利用された glucose の組織内での行方の追求は

なされず glucose が糖原合成か更に脂肪合成に動くか或は他方面の代謝に消費されるかは断定出来ぬが, insulin 添加時期を異にした実験成績からみて少なくとも insulin は副腎脂細胞膜透過性を促進して medium 中からの糖利用を増すという作用機序が考えられる. 次に insulin のガス代謝に関する研究をみると, Gemmill & Hammann^{40)~42)}は筋組織に就いての実験で, insulin は勿論糖利用及び糖原合成に作用するが酸素消費量や R.Q. に影響せずむしろ酸素消費を減少せしめ消費酸素量や発生炭酸ガスと糖利用の間には何ら関連性がないと述べている. しかし副腎脂に関し C¹⁴標識 glucose を用いた研究⁸⁾¹⁴⁾¹⁵⁾では, insulin が C¹⁴標識 glucose の CO₂ への転化に用量反応的関連を有し近時この手段を利用して血中 insulin の Bioassay の研究がみられるに至った. 著者の研究方法ではガス代謝を Warburg 装置の manometer 法により測定し, insulin は糖利用と QCO₂ に就いて明らかな量的関連を示したが, QO₂ とは有意の相関を示さなかつた. 即ち insulin によって糖利用の促進と同時に QCO₂ の増加がみられる点が副腎脂に於ける正常の代謝であるが, QCO₂ に就いては時に成績にばらつきがあり少数例に糖利用の促進がある場合にも QCO₂ の増加を見ないものがありその原因の明白でない場合があつた.

Glucagon の糖原分解作用は早くから知られているに拘らず最近までその作用機序の解明がなされなかつた. Cori⁴³⁾らは glucose-1-phosphate は glycogen 合成の前段階であり又糖原分解による産物でもあると云い, Sutherland ら⁴⁴⁾は肝で glucagon がこの phosphorylase の activity を高める事が糖原分解の一次作用であるとした. しかし筋に於ては glucagon の糖原分解作用を認め得ずむしろ末梢の糖利用を insulin と協調してたかめるとの意見が多く見られる. In vitro で白鼠横隔膜を用いた実験成績から Candela⁴⁵⁾, Linke⁴⁶⁾, 辻・馬場³¹⁾, 阿部ら⁴⁷⁾は glucagon が末梢の糖利用及び糖原合成を促進する事を明らかにした. 又新光ら³⁹⁾の研究による肝切片を用いた glucagon の Bioassay の成績でも低濃度の glucagon は insulin 作用と協調する事を見ている. 副腎脂に於ける実験成績からみて添加 glucagon 10 γ /ml は可成りの濃度であるが糖利用の軽度の促進傾向と insulin 効果には明らかな協調作用を示した.

ACTH 及び Cortisone 等の下垂体副腎系ホルモンの糖代謝に対する影響として Britton & Sillette⁴⁸⁾, Kerppola⁴⁹⁾, Dorfmann ら⁵⁰⁾, 若林⁵¹⁾等は肝糖原合成的に作用すると述べているが, 末梢筋組織の糖利用に対する影響に関し研究者の間に意見の一致を見ない. これらホルモンの脂肪組織に対する作用として Barrett ら⁵²⁾, Stetten & Salcedo⁵³⁾は下垂体抽出物が fat mobilization を促進するとし, Ingle⁵⁴⁾は白鼠の adrenalectomy は fat mobilization を抑制すると報告している. しかし Schiffer & Wertheimer⁵⁵⁾は adrenalectomy は fat deposition に低下を来たし好条件下でも glycogen deposition は抑制され adrenal preparation の摂取によりこれらの障碍が恢復すると述べ, これら実験成績から cortical hormone が直接脂肪組織に作用したり糖質から脂質への転化に関係するだろうと推論している. これらホルモンの他のホルモンに対する干渉作用のうち抗 insulin 作用のある事は多くの in vivo の研究にみられるが Folley⁵⁶⁾は in vitro で lactating mammary gland slice を使用して insulin による QCO₂ の促進が cortisone 添加により低下する事を観察している. In vitro で脂肪組織の糖代謝に及ぼすホルモンの影響に就いての報告は殆んどみられず未知の領域と思われるが, 研究を血中 insulin の Bioassay に進めるに当り insulin 作用に干渉する血中の各種物質の態度をみる上に in vitro のホルモン添加実験は意義がある.

ACTH 10⁻⁴u/ml と 10⁻²u/ml 添加で副腎脂に於ける糖利用は著変を認めず QCO₂ も不変であつた. しかし高濃度の ACTH は insulin 効果には抑制的に作用し特に 10⁻²u/ml で著明である. 辻・馬場³¹⁾, 富田⁵⁷⁾の報告によると横隔膜では相当高濃度の ACTH は糖利用を促進するが生理濃度と推定される 10⁻⁶u~10⁻⁶u/ml では変化なく insulin 効果にも影響しないと述べられている. 副腎脂に於ける insulin 効果に対して高濃度の ACTH は抑制するが 10⁻⁴u/ml になると極く僅かの抑制しかみられず更に ACTH の生理濃度では殆んど insulin 効果に無影響と推定される. Colowick & Cori⁵⁸⁾の結果からみると glucocorticoid は hexokinase 反応を抑制して糖利用を減少さすと云うが, 副腎脂に於ける cortisone acetate の添加実験で 2.5 γ ~25 γ /ml の濃度は糖利用に無影響であつたが insulin 効果には抑制的に作用した. Folley⁵⁶⁾の lactating mammary gland slice の実験結果から考えても cortisone は高濃度で脂肪組織に対する insulin 効果に干

渉するが0.1 γ /ml程度の生理濃度では殆んど無影響と考えられる。

Adrenalin, Noradrenalin が筋及び肝切片に於て示す糖代謝に関する態度はよく知られ、特に前者は *glucagon* 同様 *phosphorylase activity* の促進により糖原分解作用があり Groen ら⁵⁹⁾は抗 *insulin* 因子の1つに両者をあげている。副睾脂に生理的濃度をこえた1 γ , 10 γ , 40 γ /ml添加すると糖利用は濃度に従い僅かの抑制を受けるに拘らず QCO_2 は反対に増加する傾向を示した。これは乳酸産生によるガス代謝の異常に原因すると考えられる。Insulin 効果は横隔膜に関する報告に反し副睾脂では adrenalin 10 γ /ml 及び noradrenalin 1 γ /mlに於てやや促進的であつた。

性腺刺激ホルモンと糖代謝の関連に就いて明白な事実が得られていないが、横隔膜に於て絨毛性 *gonadotropin* 0.03i.u., 0.3i.u., 3i.u./ml 添加によれば³¹⁾濃度に比し糖利用の促進を見ている。副睾脂でも 0.3i.u./ml添加で僅か糖利用の増加をみたが QCO_2 は不変であり、insulin 効果に至つては殆んど無影響と考えられる結果をみた。

Sulfonyl 尿素剤が抗糖尿病剤として用いられ、その作用機序の1つと考えられる末梢糖利用促進の見地から副睾脂に於ける *Rastinon* の添加実験の結果を可成り期待したが、5 γ , 50 γ /ml の添加では50 γ /ml で糖利用を僅かに促進し insulin 効果にもやや協調したが QCO_2 の結果から考え合わせ有意の影響ではなく、筋組織に於ける³¹⁾と同様に脂肪組織でも *Rastinon* が糖代謝や insulin 効果に明白な変動をもたらさなかつた。

次に代謝阻害剤として弗化ソーダとマロン酸を各々0.001M及び0.01Mの濃度に添加した結果、何れも糖利用及び QCO_2 に対する抑制作用があり更に insulin 効果に著明な抑制を与えた。弗化ソーダは糖代謝経路に於ける *oxidative phosphorylation* の *inhibitor* であつて又細胞毒でもあるため脂肪組織の性状を変化させ insulin の細胞膜透過性増強作用を発現せしめず、マロン酸も *Krebs-cycle* に作用して乳酸増生を来たし二次的に insulin 効果を低下さすものと考えられる。又これら阻害剤は比較的低濃度に添加するに拘らず *medium* の性状に変化を来す事は避けがたく、ために糖利用及び insulin 効果に影響する点も考慮に入れねばなるまい。

以上の *in vitro* に於ける各種物質の添加実験から添加物質の副睾脂の糖代謝に対する反応様式をみたが、複雑な糖代謝様相を比較的簡単な *model* として観察し得るという意味からも副睾脂を使用する実験は好都合な実験方法であるという結論に達した。

IV 副睾丸脂肪組織法による血中 *Insulin like activity* 測定に関する検討

血中 insulin 濃度を測定する事は insulin の分泌、代謝、作用機序の解明のみならず内分泌及び新陳代謝に関する未知の問題を探索する上にも重要であり、又糖尿病の病態生理や病型分類等に就いての応用も臨牀的に興味のある分野である。Insulin の物理化学的定量法の確立されていない現在、専らその微量定量には insulin の特異作用を利用した生物学的測定法が行なわれている。Gellhorn ら⁶⁰⁾, Anderson ら⁶¹⁾, Bornstein⁶²⁾, 小坂⁶³⁾による insulin 感性を増大せしめた動物の血糖値により測定する *in vivo* の方法と、Gemmill^{40)~42)}の発見以来 Stadie⁶⁴⁾, Krahl ら⁶⁵⁾, Perlmutter ら⁶⁶⁾, 竹内ら⁶⁷⁾, 辻・馬場³¹⁾, 島津⁷⁰⁾等の研究による白鼠剔出横隔膜に於ける糖利用を測定する *in vitro* の方法である。この横隔膜法は insulin の *target organ* を筋組織に求めたものであるが、最近脂肪組織を対象とした血中 insulin 相当値の測定が始められた。Martin ら¹⁷⁾¹⁸⁾, Beigelman¹⁹⁾, Staub³⁰⁾ は *in vitro* で脂肪組織の糖利用が insulin により促進される事から、Martin ら⁶⁸⁾, Peiffer⁶⁹⁾は C^{14} 標識 *glucose* の C^{14}O_2 への *oxidation* が insulin により促進される事を指標に血中 insulin 相当値の測定を試みた。これら *in vitro* の *Bioassay* は実験方法の条件に敏感に影響され、諸家の研究成績も不一致となつているが著者は基礎的条件の種々な検討から副睾脂は insulin の *Bioassay* に利用出来る諸条件を備えている事を確めたので、血中 *insulin like activity* の測定に関する検討をこころみた。

1) 実験方法

前述の基礎実験方法に従い白鼠は3匹を1組とし副睾脂は3分割プール法にて使用組織は6組を以て1実

験単位とした。

3組の組織を各々 KRG 液を incubation medium とした 3 ケの flask に入れ、他の 3 組の組織は溶血をさけ採血した被検血清を添加した KRG 液を incubation medium とした 3 ケの flask に各々入れ、各 medium に於ける糖利用を測定した。被検血清の糖量は予め定量し KRG 液に添加しその最終糖量が 200mg/dl になる様 KRG 液の糖量を調整した。KRG 液の糖利用を basal uptake とし、血清添加 KRG 液の糖利用から basal uptake を差引いた値を以て被検液の Δ glucose uptake とした。これらの値は glucose mg/gm wet tissue weight とし何れも同種 3 ケの flask に於ける値の平均値をとった。尚末梢の筋組織と脂肪組織に於ける糖利用の異同をみるため一部白鼠横隔膜法を併用して比較検討した。横隔膜法は辻・馬場²¹⁾、島津⁷⁾の方法に従い 4 匹を 1 組とした quarter diaphragm 法によるプール法の手技により 2 組の組織を各々 KRG 液を入れた 2 ケの flask に入れ basal uptake を測定し、他の 2 組は被検血清を添加した KRG 液を入れた 2 ケの flask に各々入れ糖利用をみた。糖利用は同種 2 ケの flask の平均値をとった。

2) Insulin 作用濃度直線

Novo 製結晶 insulin 溶液を KRG 液で順次稀釈しその最終 insulin 濃度が 10^{-4} u $\sim$ 10^{-5} u/ml になる様に稀釈系列を作り、この各濃度の medium に於ける副率脂の糖利用を測定した。4 実験群平均 basal uptake 1.99 ± 0.18 mg/gm で、 Δ glucose uptake をみると Fig. 14 に示す様に insulin 濃度 10^{-5} u では 1.13 ± 0.186 ,

Fig. 14. Effects of Novo-crystalline insulin in various concentrations upon Δ glucose uptake of rat fat tissue.

10^{-4} u では 3.27 ± 0.179 , 10^{-3} u では 5.15 ± 0.297 , 10^{-2} u では 7.56 ± 0.433 mg/gm (mean $\pm$ S.E) と略々直線関係を以て増加するが、 10^{-1} u では 6.73 ± 0.423 mg/gm と低下した。この様に insulin 濃度 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の範囲は於いて insulin 濃度 (log-dose) と Δ glucose uptake との間には直線関係が成立する。この時の直線的回帰の要因分析は、表 18 に示す如くであつて、回帰直線の slope $b = 2.12$, 許容限界 $= \pm 1.40$, Precision index (λ) $= 0.405$ である。これから次の如き実験式が求められた。

Table 18. Analysis of Variance.

Nature of variation	Degree of freedom	Sum of squares	Mean square
Regression	1	89.5	
Deviation from regression	3	0.3	0.1
Between doses	4	42.3	
Within doses	11	5.09	0.46
Total	15	94.88	

Fiducial limit of $b = 2.12 \pm 1.40$

$$y = 11.68 + 2.12x$$

x : insulin log-dose

y : Δ glucose uptake

(mg/gm wet tissue weight)

この実験式から計算した血清 insulin like activity を血清の insulin 相当値と見做し, 単位は unit/ml であらわした.

3) 被検血清希釈について

Fig. 15. a) b) Effects of added normal serum in various dilutions upon glucose uptake and QCO_2 of rat fat tissue.

血清中には各種ホルモンや有機、無機物質が混在し血清添加により KRG 液の性状が変化する。これら化学的、物理的性状の変化が副腎脂の糖利用に影響し又血清中の endogenous insulin 作用に干渉する事は当然考えられる。血清をどの程度の濃度に添加すればこれら障害を最小にし、且つ血清自身の insulin like activity を失わずに測定し得るかをみるため、KRG 液にて血清を 2 倍から 30 倍迄倍数稀釈して何れの medium に於ける糖量も 200mg/dl になる様調整した。採血は早朝空腹時に溶血を避けて行ない直ちに血清を分離して実験に供した。健常例男子 2 名に就いての結果は Fig. 15(a), (b) に示す様に、糖利用は 5 倍から 30 倍に至る迄血清濃度と共に増加し 5 倍にて最高になるが 2 倍ではかえつて低下をみた。QCO₂ を incubation の時間経過を追って測定すると時間と共に増加し 120 分 incubation では 5 倍血清が糖利用の場合同様に最高であつた。他の健常例男子 3 名及び女子 2 名の早朝空腹時血清添加の結果も同様の傾向を得た。血清の insulin like activity に対する種々の阻害因子を考慮に入れ、稀釈という最も簡単な方法によつて阻害因子の除去を行ない、且つ material が比較的多量に使用出来るという利点からも血清は KRG 液で 10 倍稀釈して実験に供した。

4) 血清中に添加した既知 insulin の再発見成績 (Recovery Test)

血清中に insulin が存在する事はすべての研究者の認める所であり、事実 KRG 液に血清を添加することにより副腎脂の糖利用及 QCO₂ びは促進した。しかしこの事実は本実験法で妥当な insulin 作用によるものか或は

Table 19. Estimation of Novo-crystalline insulin added to serum of healthy subjects. (recovery test)

Case sex age	serum insulin like activity (u/ml)	added insulin dose (u/ml)	serum insulin like activity + added insulin activity (u/ml)	per cent recovery
S.T M 35	2.87×10^{-4}	5.00×10^{-4}	6.32×10^{-4}	80
M.O M 30	8.27×10^{-4}	5.00×10^{-4}	1.37×10^{-3}	97
K.S M 34	3.41×10^{-4}	5.00×10^{-4}	7.20×10^{-4}	85
K.W M 30	1.89×10^{-4}	5.00×10^{-4}	7.24×10^{-4}	105

所謂抗 insulin 因子の存在も考慮に入れるべきか血中 insulin 相当値の Bioassay に当り recovery test は重要な前提となる。健常男子 4 名の血清に既知量の Novo 製結晶 insulin 溶液 5.00×10^{-4} u/ml を添加して測定すると Table 19 に示す様に、添加 insulin の 80~105% の再発見率を得て副腎脂法で略々満足の回収をみた。

5) 健常人血清 Insulin like activity

健常人の対象として当教室医師(男子) 10 名と看護婦 3 名の合計 13 名につき早朝空腹時の血清をとりその血清糖量、 Δ glucose uptake 及び insulin like activity を insulin 相当値に計算して示すと Table 20 の如くである。Insulin 相当値の平均は $3.72 \pm 2.97 \times 10^{-4}$ u/ml (mean $\pm$ S.D) であつた。

Table 20. Fasting serum glucose and serum insulin like activity in healthy subjects.

Case sex age	fasting serum glucose (mg/dl)	Δ glucose uptake (mg/gm)	serum insulin like activity (u/ml)
1 T.G M 29	87	3.17	9.68×10^{-4}
2 K.I M 27	84	2.97	7.79×10^{-4}
3 Y.I F 20	77	2.37	4.06×10^{-4}
4 T.S M 35	86	2.82	6.62×10^{-4}
5 T.H F 23	90	1.54	1.65×10^{-4}
6 K.W M 30	91	1.07	9.89×10^{-5}
7 A.S M 28	88	2.01	2.75×10^{-4}
8 K.I M 33	79	2.76	6.20×10^{-4}
9 M.H M 29	80	2.46	4.24×10^{-4}
10 K.N M 29	82	0.98	8.97×10^{-5}
11 S.S F 25	63	1.16	1.09×10^{-4}
12 K.N M 29	95	1.28	1.24×10^{-4}
13 K.M M 29	78	1.22	1.16×10^{-4}
average (mean $\pm$ S.D)	83.0	1.99 ± 0.81	$3.72 \pm 2.97 \times 10^{-4}$

6) 糖尿病患者血清 Insulin like activity

当教室入院中の 12 名の糖尿病患者の早朝空腹時の血清糖量、 Δ glucose uptake 及び insulin like activity を

insulin 相当値に計算して示すと Table 21 の如くである。原則として検査日とその前日は insulin 治療と他の薬剤治療を中止しその影響のない様にした。糖尿病患者の insulin 相当値の平均は $2.66 \pm 2.18 \times 10^{-4}$ u/ml (mean $\pm$ S.D) で、健常人に比しやや低値をみたが血清糖量と insulin 相当値の間に何ら相関関係を見出し得なかつた。Case 1 の値は勿論 insulin 治療中止時のもので相当多量の insu-

Table 21. Fasting serum glucose and serum insulin like activity in diabetics

Case	fasting serum glucose (mg/dl)	Δ glucose uptake (mg/gm)	serum insulin like activity (u/ml)	treatment
sex age				
1 J.M F 24	222	1.49	1.54×10^{-4}	insulin inj.
2 H.S M 68	108	1.75	2.07×10^{-4}	// //
3 S.N F 63	90	1.88	2.39×10^{-4}	diet cure
4 K.N F 56	223	1.72	2.00×10^{-4}	insulin inj.
5 S.M M 59	184	0.09	3.41×10^{-5}	// //
6 H.M M 47	110	1.40	1.39×10^{-4}	// //
7 K.N F 65	215	0.21	3.89×10^{-5}	// //
8 A.M F 16	141	2.52	4.78×10^{-4}	// //
9 Y.N M 59	99	1.63	1.82×10^{-4}	diet cure
10 T.M M 55	186	2.37	4.06×10^{-4}	insulin inj.
11 Y.U M 54	140	2.12	3.09×10^{-4}	diet cure
12 H.K F 20	290	2.79	8.06×10^{-4}	insulin inj
average (mean $\pm$ S.D)	167.3	1.16 ± 0.83	$2.66 \pm 2.18 \times 10^{-4}$	

lin 治療を要する本患者の治療時の insulin 相当値は 9.79×10^{-5} u/ml で相当高値を示すに拘らず血清糖値は 202mg/dl であつた。Case 12 も多量の insulin 治療を要する例で本症も健常人値より高い insulin 相当値を示したが血清糖値は 290mg/dl であつた。

7) 副睾脂法と横隔膜法の比較

(a) Novo 製 semilent insulin 濃度差による糖利用

脂肪組織と筋組織に於ける糖利用及び insulin 効果の異同を比較するため副睾脂法と横隔膜法を併用した。Novo 製 semilent insulin を KRG 液に添加し順次稀釈し各 medium に於ける最終 insulin 濃度が 10^{-5} u $\sim$ 10^{-1} u/ml になる様調整し、その各々の medium につき糖利用をみた。Table 22 に示す様に、basal uptake は横隔膜法の 5.27mg/gm に対し副睾脂法の 1.89mg/gm で前者が大であり、各濃度の insulin による糖利用値も横隔膜法が多い。他方 insulin 効果を Δ glucose uptake でみると insulin 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の範囲では副睾脂法が大である。この結果からみれば insulin sensibility の点では副睾脂が横隔膜より優れている事になる。しかし insulin 10^{-1} u/ml では横隔膜法で最高の糖利用があり、副睾脂法では 10^{-2} u/ml に於けるより低下を示し前述の結晶 insulin 溶液の濃度差による糖利用の場合と同様な傾向を示した。

Table 22. Comparison between rat diaphragm method and rat epididymal fat tissue method about glucose uptake and Δ glucose uptake in various concentrations of Nove-semilent insulin

method	medium (mg/gm)	KRG	KRG·Insulin u/ml				
			10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}
diaphragm	glucose uptake	5.27	5.42	6.50	7.24	7.53	9.08
	Δ glucose uptake		0.15	1.23	1.97	2.26	3.81
epididymal fat tissue	glucose uptake	1.89	2.42	4.70	5.25	6.12	3.24
	Δ glucose uptake		0.53	2.81	3.36	4.23	1.35

Fig. 16. Comparison between sensibility of rat diaphragm method and rat epididymal fat tissue method as regard to Δ glucose uptake caused by added serum.

と添加 exogenous insulin との間には協調作用を認めた。一般に3種 medium とも Δ glucose uptake は副率脂法が横隔膜法より大で、従つて insulin 効果も同様の傾向にあつた。

糖尿病患者5名の血清を使用した場合は、Fig. 18に示す様に、比較的軽症で insulin 療法を必要としない Case 3 では健常人血清の場合と同様に両法とも血清添加, insulin 添加, 血清と insulin 添加の順に Δ glucose uptake の増加がみられ、血清と添加 exogenous insulin の協調作用を認めた。しかし Case 2 では両法ともに血清と insulin の協調作用は認められず insulin 添加の場合より血清と insulin 添加の場合の Δ glucose uptake の低下をみ、Case 1 及び Case 5 では副率脂法のみ血清と insulin の協調作用がみられず、尚 Case 5 では横隔膜法にみられなかつた insulin like activity を副率脂法に於て僅かに認めた。

8) 小括及び考按

脂肪組織法により結晶 insulin 溶液の糖利用を測定せる場合、糖利用の発現をみる insulin の最低濃度は Martin & Renold によれば 10^{-5} u/ml, Staub²⁰⁾は 10^{-4} u/ml, Beigelman¹⁹⁾は 10^{-6} u/ml, 著者は 10^{-5} u/ml であつた。この様に各研究者による値に100倍の開きがある原因は竹内⁷⁰⁾が横隔膜法にて検索した如く研究者の実験方法の不同に帰因するが、何れにせよ脂肪組織法でも 10^{-5} u/ml の低濃度の insulin に反応する事は確実である。Insulin 作用濃度曲線に関し、Staub²⁰⁾は 10^{-4} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の、Beigelman¹⁹⁾は 10^{-6} u $\sim$ 10^{-8} u/ml の濃度範囲で insulin 効果と insulin 濃度の間に軽度の逆拋物線状の曲線を示し、Beigelman は 10^{-3} u/ml でかえつて insulin 効果の低下を認め S 字状の作用曲線を報じている。著者の成績は 10^{-5} u $\sim$ 10^{-2} u/ml の濃度範囲で直線的であり Δ glucose uptake と insulin 対数濃度との間に直線回帰を認めたが、 10^{-1} u/ml では 10^{-2} u/ml より insulin 効果の低下をみた。動物の膀胱から化学的処置を経て抽出した結晶 insulin 溶液による作用濃度直線が血中 endogenous insulin の Bioassay の尺度に利用し得るか、血清による Δ glucose uptake は insulin のみの作用によるか、血清の複雑な成分が Δ glucose uptake の発現に如何ように影響しているか多くの疑問が残る。この問題の根本的解決には血中 insulin の化学的定量法の確定以外にないとしても、既に血漿或は血清の Δ glucose uptake の増減に干渉する諸因子の探求は多くなされ、特に抗 insulin

(b) 血清及び Insulin 添加の影響

血清による insulin like activity と、更に血清に Novo 製 semilient insulin を添加して exogenous insulin 作用に対する血清の影響を副率脂法と横隔膜法の比較に於て検討した。Medium は(1) KRG 液に serum が10倍稀釈になる様添加したもの、(2) KRG 10^{-8} u 液、(3) (1)の medium に 10^{-3} u/ml になる様 insulin を添加したものの3種を作り各 medium に於ける糖利用をみた。同一血清に就き副率脂法と横隔膜法を同時に用い、その Δ glucose uptake をみると Fig. 16に示す様に健常人8名及び糖尿病患者8名とも副率脂法が大であり、糖尿病例中横隔膜法で血清 insulin like activity を見ぬ2例に於ても副率脂法でその発現をみた。

次に上記3種の medium につき副率脂法と横隔膜法を比較すると、Fig. 17に示す様に健常人4名の血清を使用した場合、両法とも血清添加, insulin 添加, 血清と insulin 添加の順に Δ glucose uptake の増加があり血清

Fig. 17. Influence of added healthy serum upon the exogenous insulin effect in comparison between rat diaphragm method and rat epididymal fat tissue method.

因子として内分泌物質及び電解質は勿論のこと Randle⁷¹⁾の報告による cystein や glutathion, Bornstein⁷²⁾による血漿蛋白分劃中の β -lipoprotein は知られている。これら抗 insulin 物質の除去には血清の稀釈という最も単純な方法があり、竹内⁷⁰⁾による横隔膜法では insulin の作用濃度直線と血漿の稀釈系列の Δ glucose uptake の示す回帰線の性状の比較で低濃度で両回帰線の平行性が認められている。

副睪脂法に於て血清稀釈と血清の糖利用の関係をみた著者の実験成績では、正常人血清を2倍から30倍迄稀釈して各濃度に於ける糖利用は5倍で最高を示し10倍がそれに次ぎ2倍では可成り低下をみた。Beigelman¹⁹⁾は副睪脂法で血清10倍稀釈を用い、Staub²⁰⁾も4~8倍稀釈で検討を行なっている。この様に血清を稀釈する事により抗 insulin 因子の作用が少なくなるのか、medium の物理的性状の変化に帰因するのか検討の余地があるが、何れにしても血清稀釈によりその insulin like activity が出現し易くなることは事実である。更に著者は正常人稀釈血清中に既知量の結晶 insulin を添加して副睪脂法による recovery test を行なつた結果80~105%の再発見率を得たので exogenous insulin に対して10倍稀釈健常血清中には著明な抗 insulin 因子は存在しないと云う結果を得ている。何れも副睪脂法による血中 insulin の Bioassay の可能性を示す実験結果である。

この様にして測定した Δ glucose uptake を血清 insulin 相当値に換算した値は insulin 濃度そのものでなく insulin like activity と考えるべきであるが、便宜上健常人平均 $3.72 \pm 2.97 \times 10^{-4}$ /ml と、糖尿病患者平均 $2.66 \pm 2.18 \times 10^{-4}$ u/ml を得た。健常人がやや高値を示している。これらの値は何れも食事や治療の影響をさけた血清に就いてであるが健常人及び糖尿病患者を通じて個体差としてその値に10倍位の開きが認めら

Fig. 18. Influence of added diabetic serum upon the exogenous insulin effect in comparison between rat diaphragm method and rat epididymal fat tissue method.

れる。Beigelman¹⁰⁾が副腎脂法で insulin like activity を糖利用値で示した結果も可成りの個体差を示したが、diabetic coma の血清に明らかにその insulin like activity の低下或は消失を認め、治療によつて正常値以上に回復すると報告している。著者の例で insulin 相当値の低い2例では多量の insulin 治療を要し血中 insulin の絶対量の不足によく相当していた。この例では血糖値も可成り高かつた。しかし他の2例に於て正常或はそれ以上の insulin 相当値を示すに拘らず血糖値も高く多量の insulin 治療を要しており、これらは末梢に於ける insulin 利用機能の低下を想像せしめる例であつた。

体内に於ける糖代謝の場は末梢では絶対量としては筋組織が重要な位置を占めるが脂肪組織も可成りの役割を果していると考えられる。そこで副腎脂法と横隔膜法を比較し、各々の糖利用及び insulin 効果、更に血清による insulin like activity をみた。従来の横隔膜法に於てさえ測定値は報告者により実験操作の違いから相当の開きをみ、加うるに性状の異なつた脂肪組織を対象にした値を比較する事は困難なので、むしろ両組織に於ける糖代謝の態度の異同を窺わんとしたものである。Basal uptake は横隔膜法に大であるが、insulin 効果を Δ glucose uptake にてみると副腎脂法が大であり一見脂肪組織の insulin sensibility が大であると見做されるが、Kerly & Ottaway²⁶⁾、竹内⁷⁰⁾⁷⁴⁾の検討した如く basal uptake が多い程 insulin 効果

が現れ難い事に帰因すると考えられ更に検討する余地もある。しかし insulin の Bioassay に insulin 効果を利用する場合には sensibility の大きい対象を測定の尺度とする方が有利である。著者の成績に於ても糖尿病患者血清中で横隔膜法では insulin like activity の発現のない2例でも副睾脂法で発現をみており、健康人血清及び糖尿病患者血清を通じ副睾脂法の Δ glucose uptake が横隔膜法より大である結果を得た。Stub²⁰⁾の両法比較実験成績でも横隔膜法に basal uptake が、副睾脂法に血漿による Δ glucose uptake が各々大なる事を報告しているのと符合する成績である。次に血清に外来の insulin を添加せよときの作用を横隔膜法と副睾脂法に就いて比較すると、健康人血清はすべて insulin 添加によりその insulin 作用に協調を示し、両法とも反応態度に相違を認めなかつたが、糖尿病血清中には添加 insulin 作用を抑制する例があり両法とも抑制されるもの、横隔膜或は副睾脂法の方のみ抑制を受けるもの等々その反応態度が筋組織と脂肪組織とによつて異なり糖尿病の病態生理上興味ある所見を呈した。

V 結 語

分離した白鼠副睾丸脂肪組織を Warburg 装置を用いて Krebs-Ringer's bicarbonate 液中で incubate する実験方法が、in vitro の糖質代謝検索のモデル標本として使用価値があるや否やを決定するために、基本的実験条件に関する詳しい検討を加えた。その結果先づ左右の副睾脂を夫々3分して使用する3分割プール法が最も安定した実験成績をあげ得る事を証明した。次いでこの基本的方法を応用して、Insulin, Glucagon, ACTH, Cortisone acetate, 弗化ソーダ及びマロン酸等が副睾丸脂肪組織の糖利用及び炭酸ガス発生を目標とした糖代謝に如何なる影響を与えるかを検した。更にこの結果に於て insulin 添加によつて招来される糖利用及び炭酸ガス発生量の量的変動 (夫々 Δ glucose uptake 及び QCO_2 と略記する)、殊に Δ glucose uptake が、Warburg 装置の medium 中に添加された微量 insulin と濃度反応の關係を示す点を利用して、副睾丸脂肪組織法を用いて血清中の微量 insulin 作用を定量的に測定し得る可能性を詳しく検討した結果、白鼠副睾丸脂肪組織を利用する血中 insulin 様作用測定法を考案した。続いてこの方法を利用して正常人及び糖尿病患者の血中 insulin 様作用を追跡した。又白鼠横隔膜法と平行して血中 insulin 様作用を測定し、両者の利用価値、特性を比較した。観察した主な結果を要約すると：

1) 副睾丸脂肪組織は横隔膜組織と同様に in vitro に於ける糖質代謝をみるのに都合の良い代謝モデルである。その糖利用並びに QCO_2 は insulin によく反応して著明に促進される。糖利用及び QCO_2 からみると glucagon も同様の傾向にあつたが、下垂体副腎系ホルモンの影響は少なく、一方弗化ソーダ及びマロン酸は糖利用及び QCO_2 に対して抑制的に作用した。副睾丸脂肪組織に対する insulin の作用に Glucagon は協調し、ACTH, Cortisone acetate はこれを抑制し、弗化ソーダ及びマロン酸も著明に抑制した。

2) 副睾丸脂肪組織に於て浮游 medium からの Δ glucose uptake と medium 中の結晶 insulin の対数濃度との間には直線回帰的關係が成立する。この insulin 作用は 10^{-5} u/ml 濃度の insulin にもよく現われる。従つて血清中の insulin 作用は血清のあらゆる Δ glucose uptake から insulin 相当値として定量的に算出する事が可能である。この値は健康人13例平均 $3.72 \pm 2.97 \times 10^{-4}$ u/ml, 糖尿病患者12例平均 $2.66 \pm 1.18 \times 10^{-4}$ u/ml (mean $\pm$ S.D) であつた。

3) 副睾丸脂肪組織法と横隔膜法とを比較すると、basal uptake は後者に大であるが、insulin による Δ glucose uptake は前者が大である。尚糖尿病患者血清に insulin を添加するとその insulin 作用を抑制するものがあり、横隔膜組織と脂肪組織とではその現れ方を異にする例があつた。

本論文研究にあたり、終始御懇篤な御指導御教示を賜つた恩師辻昇三教授に深謝の意を表わすと共に、常に有益なる御助言御協力を惜しまれなかつた馬場茂明助教授、新光毅講師並びに教室員一同に感謝します。

(本論文の要旨は第2回日本糖尿病学会シンポジウムの辻報告、第45回日本消化機病学会秋季大会、第7回日本内分泌学会西日本地方会、第34回日本内分泌総会にて発表した)。

文 献

- 1) Tuerkischer, E. and Wertheimer, E. : J. Physiol., 100 : 385, 1942.
- 2) Hausberger, F.X. and Gujot, O. : Arch. Exptl. Path. Pharmacol., 187 : 655, 1937.
- 3) Tuerkischer, E. and Wertheimer, E. : J. Physiol., 103 : 359, 1945.
- 4) Schoenheimer, R. and Rittenberg, D. : J. Biol. Chem., 114 : 381, 1938.
- 5) Shapiro, B. and Wertheimer, E. : J. Biol. Chem., 173 : 725, 1948.
- 6) Wertheimer, E. and Shapiro, B. : Physiol. Rev., 28 : 451, 1948.
- 7) Chernick, S.S., Masoro, E.J. and Chaikoff, I.L. : Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., 73 : 348, 1950.
- 8) Winegrad, A.I. and Renold, A.E. : J. Biol. Chem., 233 : 267, 1958.
- 9) Mirski, A. : Biochem. J., 36 : 232, 1942.
- 10) Hausberger, N. and Marsch, J.B. : J. Biol. Chem., 194 : 33, 1952.
- 11) Itzhaki, S. and Wertheimer, E. : Endocrinology, 61 : 72, 1957.
- 12) Dixon, M. : Manometric method 3rd ed. New York. Macmillan, 1951.
- 13) Scoz, G. : Arch. Sci. Biol., 17 : 262, 1932.
- 14) Winegrad, A.I. and Renold, A.E. : J. Biol. Chem., 233 : 273, 1958.
- 15) Cahill, G.F., Leoboef, B. and Renold, A.E. : J. Biol. Chem., 234 : 2541, 1959.
- 16) Krah, M.E. : Ann. N.Y. Acad. Sci., 54 : 649, 1951.
- 17) Martin, D.E., Renold, A.E. and Dagenais, Y.M. : Abstract of papers at the eighteenth Annual meeting of the American Diabetes Association on June, 21, 1958.
- 18) Martin, D.B., Renold, A.E. and Dagenais, Y.M. : Third Congress of the international Diabetes Federation, Düsseldorf, Germany, July, 22, 1958.
- 19) Beigelman, P.M. : Diabetes, 8 : 29, 1959.
- 20) Staub, M. : Schweiz. Med. Wschr., 88 : 831, 1958.
- 21) Chernick, S.S., Masoro, E.J. and Chaikoff, I.L. : Proc. Exper. Biol. & Med., 73 : 348, 1950.
- 22) Hausberger, F.X., Milstein, S.W. and Rutmann, R.J. : J. Biol. Chem., 208 : 431, 1954.
- 23) Hechter, D., Levine, R. and Soskin, S. : Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., 46 : 390, 1941.
- 24) Hansen, R.G. : J. Biol. Chem., 192 : 243, 1951.
- 25) Gilmore, R.C. and Samuels, L.T. : J. Biol. Chem., 181 : 812, 1949.
- 26) Kerly, M. and Ottaway, J.H. : J. Physiol., 123 : 534, 1954.
- 27) Mackay, E.M. and Drury, D.R. : Amer. J. Physiol., 123 : 534, 1954.
- 28) Hausberger, F.X. and Milstein, S.W. : J. Biol. Chem., 214 : 483, 1955.
- 29) Soskin, S. and Levine, R. : Carbohydrate Metabolism, 2nd Edition, The University of Chicago Press, Chicago, 1952.
- 30) Cantarow, A. and Trumper, M. : Clinical Biochemistry, Saunders Co., London, 1955.
- 31) 辻昇三, 馬場茂明 : 日内分泌誌, 34 : 31, 1958.
- 32) Wertheimer, E. : J. Physiol., 103 : 359, 1945.
- 33) Fawcett, D.W. : Endocrinology, 42 : 454, 1948.
- 34) Engel, F.L. and Scott, J.L. : Endocrinology, 46 : 574, 1950.
- 35) Teppermann, J., Brobeck, J. and Long, C.N.H. : Yale J. Biol. & Med., 15 : 855, 1943.
- 36) Rice, E. and Evans, E.A. : Science, 97 : 450, 1945.
- 37) Stadie, W.C., Haugard, N. and Perlmutter, M. : J. Biol. Chem., 172 : 567, 1948.
- 38) Balmann, J.H., French, T.H. and Folley, S.J. : Nature, 165 : 807, 1950.
- 39) 馬場茂明, 新光毅, 森下敬司, 最新医学, 15 : 317, 1960.
- 40) Gemmill, C.L. : Bull. Johns Hopkins Hosp., 66 : 50, 1941.
- 41) Gemill, C.L. : Bull. Johns Hopkins Hosp., 68 : 50, 1941.
- 42) Gemill, C.L. and Hammann, L. : Bull. Johns Hopkins Hosp., 68 : 329, 1941.
- 43) Cori, C.F., Colowick, S.P. and Cori, G.T. : J. Biol. Chem., 121 : 465, 1937.
- 44) Sutherland, E.W. and Cori, C.F. : J. Biol. Chem., 188 : 531, 1951.
- 45) Candela, J.L.R. : Ciba Foundation Colloquia on Endocrinology, 6 : 233, 1953.
- 46) Linke, A. : Third Congress of International Diabetes Federation, Düsseldorf, Germany, July, 22, 1958.
- 47) 阿部正和 : 日内分泌誌, 3 : 299, 1956.
- 48) Britton and Silvette : Am. J. Physiol., 100 : 701, 693, 1932.
- 49) Kerppola : Endocrinology, 51 : 192, 1952.
- 50) Dorfmann, Ross and Shipley : Endocrinology, 38 : 178, 1946.
- 51) 若林健三 : 日内分泌誌, 32 : 379, 1956.
- 52) Barrett, H.M., Best, C.H. and Ridout, J.H. : J. Physiol., 93 : 367, 1938.
- 53) Stetten, D. and Salcedo, J. : J. Biol. Chem., 156 : 27, 1945.
- 54) Ingle, D.J. : J. Clin. Endocrinology, 3 : 603, 1943.
- 55) Schiffer, F. and Wertheimer,

- E. : J. Endocrinology, 5 : 147, 1947. 56) Folley, S.J. : Ciba Foundation Colloquia on Endocrinology, 6 : 1949. 57) 富田明夫 : 日内分泌誌, 35 : 1147, 1960. 58) Colowick, S.P., Cori, G.T. and Stein, M.W. : J. Biol. Chem., 167 : 583, 1947. 59) Groen, J., Geld, H.V.D., Bolinger, R.E. and Willebrands, A.F. : Diabetes, 7 : 272, 1958. 60) Gellhorn, E., Feldman, J., Allen, A. : Endocrinology, 29 : 137, 1941. 61) Anderson, E., Linder, E. and Sutton, V. : Am. J. Physiol., 149 : 350, 1947. 62) Bornstein, J. : Austr. J. Exp. Biol. & Med. Sci., 28 : 87, 1950. 63) 小坂樹徳 : 日内分泌誌, 33 : 571, 1957. 64) Stadie, W.C., Zapp, J.A. : J. Biol. Chem., 170 : 55, 1947. 65) Krah, M.E., Cori, C.F. : J. Biol. Chem., 170 : 607, 1947. 66) Perlmutter, M., Greep, R.O. : Federation Proc., 7 : 92, 1948. 67) 竹内節弥, 大橋茂, 小林芳人 : 日薬理誌, 53 : 740, 1957. 68) Martin, D.B., Renold, A.E. and Dagenais, Y.M. : Lancet, 2 : 76, 1958. 69) Pfeiffer, E.F. : Klinische Wschr., 37 : 23, 1959. 70) 竹内節弥 : 日内分泌誌, 34 : 13, 1958. 71) Randle, P.J. : Brit. Med. J., 1 : 1237, 1954. 72) Bornstein, J., Park, C.R. : J. Biol. Chem., 205 : 503, 1953. 73) Bornstein, J. : J. Biol. Chem., 205 : 513, 1953. 74) 竹内節弥 : 糖尿病, 2 : 1, 1959, 南江堂. 75) 辻昇三 : 糖尿病, 2 : 15, 1959, 南江堂. 76) 島津幸作 : 日本消化機病学会雑誌, 57 : 827, 1960. 77) Payne, P.W. : Endocrinology, 45 : 305, 1949.