5) Formation and liberation of NEFA in and from the epididymal adipose tissues of alloxan diabetic rats showed an increase in proportion to the decreased glucose uptake. These metabolic disturbances of epididymal adipose tissues could be restored more or less by addition of glucose alone or glucose plus insulin to the incubation medium or through pretreatment of diabetic rats with insulin or D860. Addition of ACTH or hydrocortisone to the incubation medium invited further inhibition of glucose uptake and more liberation of NEFA possibly through the disturbance of fat synthesis. Metabolic behavior similar to this tendency was observed also in vivo experiments. Comparison of metabolic effects of insulin and D860 showed almost no difference in the above experiments.

6) The above mentioned studies seem to have disclosed a plausible co-operation of disturbed carbohydrate metabolism of adipose tissues in the patho-physiology of diabetes. This metabolic disturbance showed a favorable response to insulin and D860, whereas they responded to ACTH and cortisone etc. in quite a different manner. The author is of the opinion, that the metabolic disturbance in adipose tissues is an important clue in the study of type and physiology of diabetes.

Studies on the Separation and the Extraction of Anterior Pituitary Hormone by Paper-electrophoresis.

by

Matsuto MOCHIZUKI

Department of Obstetrics and Gynecology, Kobe Medical College (Director: Prof. Yasuo Ueda)

Separation and purification of pig's thyroid stimulating hormone and its molecular weight. (4th report)

Aceton dry powder of pig's anterior hypophysis were extracted with 2% saline water, and were centrifuged. The supernatant fluid was fractionated by continuous paper-electrophoresis (Condition: 26mA/35cm. 500v/40cm, ionic strength 0.05, Phosphoric buffer pH 8.5).

Each fraction was biologically assayed; TSH activity by Greenspan's method, Gonadotropic activity by Florsheim's method, STH activity by Tibia-Test, and ACTH activity by Sayers-Munson's method. The fraction in the middle, TSH activity was clearly detected with slight gonadotropic activity. Other activities were not accounted. Contents of the fraction, in which TSH activity was revealed, were ultracentrifuged. The sedimentation curve was monophasic and the sedimentation constants was 2.28. Thus the molecular weight was calculated as about 20000.

Separation and purification of pig's pituitary gonadotropin and transmission of gonadotropic substances in vivo. (5th report)

In phosphate buffer solution, pH 4.5, the extracted substances of aceton dry powder of pig's anterior hypophysis were separated by continuous paper-electrophoresis into six fractions. In this case, as it was anticipated on account of acid solution thyrotropic activity would be diminished and only gonadotropic activity would be remained, the gonadotropic activity was measured by weighing the ovaries, uterus, prostate and seminal vesicle of hypophysectomized immature rats and the ovaries were examined histologically. On the second and the third fraction, which are numbered from anod, gonadotropic activity was found. The LH action was recognized in the second fraction and the FSH action in the third fraction.

NIH-FSH and NIH-LH which were introduced by Dr. Wilhelmi were also separated by paper-electrophoresis, then NIH-FSH is separated into two fractions, but NIH-LH separated into only one fraction, so the purity of NIH-LH was confirmed.

Anteron was injected into hypophysectomized rat intravenously, ten minutes later blood was taken. The serum separated by continuous paper-electrophoresis were examined for gonadotropic activity of each fraction by the method of weighing mouse uterus.

On gamma-globulin in the serum of rat, gonadotropic activity was recognized.

Separation and purification of urinary gonadotropin by
continuous paper-electrophoresis. (6th report)

Crude gonadotropic substances of pregnant woman's urine and postmenopausal urine obtained by kaolin absorption method, were separated into some fractions by continuous paper-electrophoresis (Condition: 26mA/35cm, 450v/40cm, ionic strength 0.05, phosphate buffer solution, pH 4.5).

Crude substance of postmenopausal woman's urine was separated into 3 fractions. Only in the first fraction, gonadotropic activity was revealed; its FSH-action was very strong, but its LH-action was very weak.

Crude substance of the pregnant woman's urine in the former half term was separated into four fractions. Gonadotropic activity was recognized in the first and the second fraction; The LH-action of it in the second fraction was stronger than that of the first fraction and FSH-action in the first fraction was stronger than that of the second.

Crude substance of the pregnant woman's urine in the later half term was separated into three fractions. In the first and second fraction of it gonadotropic activities were found, but FSH-action was a little weak comparing with that of the gonadotropic activity of the urine in the former half term.

Even in the case of human chorionic gonadotropin and postmenopausal gonadotropin, LH-action and FSH-action were not separated perfectly.

Comparison with TSH substances to gonadotropic substances. (7th report)

1) Differences by paper-electrophoretic condition.

TSH activity exists only in the middle fraction fractionated in basic solvent, but in acid solvent thyrotropic activity is apt to be lost. On the other hand, gonadotropic activity was not lost even in acetic solvent and in basic solvent. Therefore, for separation, extraction and purification of TSH, any procedure under acetic solvent are not desirable.

2) Thyrotropic substances and gonadotropic substances in serum.

Both TSH activity and gonadotropic activity were recognized on gamma-globulin. It shows the similarity between these two proteohormones.

3) Physical chemical characteristics.

Sedimentation-coefficient of pig's purified TSH is 2.3S and molecular weight is 20000. On the other hand, gonadotropic substances (Steelman), molecular weight of sheep FSH is 25000-30000, and that of sheep LH is 30000. So, gonadotropin consists of larger molecules than TSH.

4) Contamination of biological activity between TSH and Gonadotropin.

From our result of separation and purification of these two tropic substances by paper-electrophoresis, in basic solvent small amount of gonadotropic activity always contaminates of TSH activities. Bates' thyrotropin and in FSH and LH of NIH have approved the contamination with TSH and gonadotropin. Therefore, separating the two tropic hormones is very difficult, although the contamination is to be ascribed to the chemical similarity, the secondary biological actions of each other are to be considered.

脳下垂体前葉ホルモンの濾紙電気泳動学的研究 及び分離抽出に関する研究

第4報 豚甲状腺刺激ホルモンの分離精製と分子量について

神戸医科大学産婦人科教室

大学院学生 望 月 真人

(昭和36年9月19日受付)

緒 言

前報¹⁾では市販製品中に含まれる甲状腺刺激ホルモン（以下 TSH と略記）活性物質の分離精製法について報告した。本報では既報の基礎的研究をもととして連続濾紙電気泳動法により豚脳下垂体前葉から、本物質を分離精製し、混在が予想される他の tropic Hormone²⁾即ち性腺刺激ホルモン（以下 G と略記）、副腎皮質刺激ホルモン（以下 ACTH と略記）及び成長ホルモン（以下 STH と略記）の検定を行ない、又分離精製した豚 TSH 活性物質の分子量についても結果が得られたので報告する。

実験材料並びに実験方法

1) 実験材料

実験材料としては豚下垂体前葉アセトン粉末、実験動物には下垂体剔除幼若ラット及び初生雛を使用した。

2) 実験方法

装置は既報の連続濾紙電気泳動装置を使用し、泳動条件は 26mA/35cm, 500V/40cm, Sørensen 緩衝液 $\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{KH}_2\text{PO}_4$, イオン強度0.05, pH8.5で施行した。

透析にはビスキン膜、分子量測定には超遠心分離法を用い、精製豚 TSH 活性の検討は初生雛甲状腺^{P³²}摂取率法³⁾によつた。

実 験 成 績

1) 分離精製法は前報と同様連続濾紙電気泳動法により Sørensen 緩衝液pH8.5, 東洋濾紙No52を使用する。

豚下垂体前葉 アセトン粉末 1g を 2% の食塩水 3 cc, 4℃で冷浸抽出、遠心分離後上澄液を垂直角濾紙の中心部に絶えず少量宛毛細管現象を利用して流下、泳動中は冷水を還流、装置内温度を10度以下に保つ。

第1図は上記の結果を示し、それぞれ陽極側、陰極側に移動する7分劃を得る。

染色は Amidoblack 10B, 脱色は 5%酢酸水を用い、10分間毎3回処理の後、5%酢酸溶液中に12時間放置する。

得られた各分劃を水槽中で、夫々強力に攪拌しつつ99.5%エチルアルコール（5℃以下）を添加、飽和度85%として15時間以上冷

第1図 連続式濾紙電気泳動法による豚脳下垂体抽出液の分離像

第1表 分離した各分劃から検体を調製する方法

蔵庫中に静置, 1分間はほぼ3000~4000回転で10分間遠心沈澱, 沈渣を得る. この沈渣中の塩類などを除去するために, 沈渣を再生蒸溜水10ccに溶解し, ビスキン膜で72時間流水透析した後再び上記の要領でエチールアルコールにより再沈, 遠心沈澱後々々10ccのエチールアルコールで数回洗滌, 更にエチールエーテルで洗滌後, 減圧真空乾燥を行ない7分劃より夫々白色の粉末を得た.

第1表はこの要領を示す.

上記の7分劃より得た白色粉末を夫々2mgずつ蒸溜水3ccに溶解し, 各分劃毎のTSH活性をGreenespan法³⁾で, 又同時にFlorsheim法⁴⁾でG活性を測定した.

第2表 各分劃毎の TSH 活性及びG活性の測定値

Count/min	分劃	1	2	3	4	5	6	7	対照群
甲状腺P ³² 摂取率 (TSH 活性)		81	74	74	125	80	97	70	79
		61	60	94	138	92	90	98	57
		54	91	85	120	93	77	73	66
		51	107	88	99	96	107	96	69
		62	82	101	131	86	83	72	82
睾丸P ³² 摂取率 (G 活性)		208	241	355	485	762	357	170	170
		149	386	244	474	702	402	182	109
		170	352	308	481	583	429	109	250
		182	303	321	450	639	410	229	219
		185	290	298	441	629	452	112	106

第2表はこの結果を示す.

第2表によれば 雌甲状腺内 P³² 摂取率の平均は対照群の70 (Counts/min.) に対し, 第4分劃投与群は124 (Counts/min.) と約2倍で, 有意の差を認め, 第4分劃に TSH 活性のあることを示している. 又同時に測定した雌睾丸内 P³² 摂取率の結果からみてG活性は下欄のように第5分劃に相当量と第4分劃に微量認められた. 併しその他の分劃には TSH 活性も G 活性も認められない.

第2図はこの結果を示す.

次いで脳下垂体剔出ラッテ⁵⁾を使用して上記7分劃につき各分劃毎のSTH活性とACTH活性を検討した. 即ち前者にはTibia test⁶⁾, 後者にはSayers-Mounson 変法静注法⁷⁾を採用した. その結果は第2表, 第4表に示す.

STH 活性 (Tibia test) は第3表のように第1分劃と第2分劃に, いずれも微量認められる.

第2図 各分劃毎の TSH と G 活性検討

第3表 各分割毎の STH 活性検討値

fraction.	sample weight.	No of rats.	wide of Tibia (u)	potency ratio ($\bar{u}/\text{mg}$)
1	223.3	7	214.6 $\pm$ 10.0	0.0002
2	277.7	7	221.2 $\pm$ 7.5	0.002
3	173.7	4	196.7 $\pm$ 8.5	none
4	140.9	6	189.1 $\pm$ 3.2	//
5	353.9	6	190.2 $\pm$ 5.7	//
6	379.2	9	194.1 $\pm$ 6.6	//
Control	—	8	196.3 $\pm$ 7.9	—
*standard				
0.3mg (0.42 $\bar{u}$)	—	8	303.7 $\pm$ 14.9	—
0.03mg (0.042 $\bar{u}$)	—	8	231.2 $\pm$ 17.6	—

Growth Hormone (Bovine) Armour Lab. Lot No. S92710
method : Tibia test 使用ラット数100匹

第4表 各分割毎の ACTH 活性検討値

fraction.	sample weight.	potency ratio (u/mg)*
1	138.3	0.0002
2	152.6	0.0002
3	194.8	0.0040
4	375.5	0.0002
5	341.2	0.0002
6	164.5	0.0003
7	212.5	0.0001

*USP Corticotropin Reference Standard (intravenous method)

method : Sayers-Mounson
変法静注法 使用ラット数160匹

第4表は脳下垂体抽出ラット 160 匹を使用し Sayers-Mounson 変法静注法で ACTH 活性を検討した結果であるが、第3分割に微量の活性が認められた。

2) 甲状腺刺激ホルモン活性物質の分子量に関する検討

上記の方法で分離精製した豚 TSH 活性物質は平面式濾紙電気泳動法によっても単一の泳動像となる事が確認できたが 0.1 M NaCl 水で蛋白濃度 0.8% となる様に溶解し、15 分間隔で 80 分間、1 分間 60000 回転で超遠心分離⁹⁾した処第3図に示す様に、その沈降図形は単一の波形であつた。第5表はこの実験結果をあらわすもので 20°C に換算した沈降率 S は 2.28 で、この沈降図形から拡散係数を求めると D は 1.23×10^{-6} となる。従つてこれらの数値から私の得た TSH 活性物質の分子量は 19634 で大体 20000 前後と推察される。

考 按

Loeb¹⁰⁾等により 1929 年下垂体前葉内に TSH の存在が発見されて以来、Junkmann & Scheller (1932)¹¹⁾, Collip (1935)¹²⁾, Frankel-Conrat (1940)¹³⁾, Ciereszko (1945)¹⁴⁾, Bates (1959)¹⁵⁾, Bakke (1960)¹⁶⁾等により各種動物の下垂体及び体液から TSH の抽出並びに精製法が研究されているが TSH は G と同様な Glycoprotein Hormone でありながら、他の前葉ホルモン、特に G に比較して純粋に下垂体から取り出す事は今日尚困難である。

私は前報¹⁷⁾に於いて市販されている TSH 製剤が電気泳動的に 3 ケ乃至 4 ケの分割に分離され、しかも酸性溶液で泳動すると活性が減殺され、pH 8.0 附近では TSH の活性以外に微量の G 作用が介入する事も確認した。又市販 TSH 製剤を使用して TSH の生物学的作用を検討するときは混在する他の tropic Hormone がその標的臓器を介して甲状腺に作用する可能性があり、又反対に TSH による 2 次的反応の混在も当然予想出来る。下垂体に含有される TSH は動物の種類によつて異なり、これ等を全く同一物質として取扱うことも危険である。従つて原料の明示されない市販製品による実験結果をそのまま承認することは適当でない。故に単一原料から TSH 物質を抽出精製してその性状を検討すべきであると考え、豚脳下垂体前葉アセトン粉末を材料として実験を行なつた。

第3図 超遠心分離法による 精製 TSH の沈降図形

ultracentrifugation of purified pig TSH. protein concentration 0.8% ; buffer : 0.1M NaCl-water pH7.0 6000r.p.m., pictures taken after 35 & 65 minutes in a synthetic boundary cell S=2.3s. D= 1.23×10^{-6} molecular weight 19634 $\approx$ 20000

第5表 第4分割の超遠心分離測定値

No.	種算回数計	D.S.	Temp.	Time	α	A*	B	$\frac{B}{M^*}$	$\frac{\Delta x}{x_2 - x_1}$	$\frac{x_1}{5.65 + \frac{B}{M^*}}$	$\frac{x_1 + x_2}{2}$	R.P.S.	ω^2	$\omega^2 st$	st
1	904869	82	24.2	8	240	4.38	150	0.035	0.041	6.005	6.0255	981.9	3.80×10^7	2.736×10^{10}	2.487×10^{-13}
2	905576	80	24.4	20	"	4.52	108	0.076	0.047	6.045	6.0935	975.6	3.75×10^7	3.375×10^{10}	2.285×10^{-13}
3	906454	75	"	35	"	4.56	174	0.123	0.054	6.093	6.120	975.6	"	"	2.614×10^{-13}
4	907332	72	24.2	50	"	4.59	250	0.177	0.047	6.147	6.171	"	"	"	2.257×10^{-13}
5	908210	72	24.3	65	"	4.65	316	0.224	0.048	6.194	6.218	"	"	"	2.287×10^{-13}
6	909088	72	24.6	80	"	4.65	384	0.272		6.242					

$$S = 2.39 \times 10^{-13} \times 0.92 \times 1.05 \approx 2.28$$

$$An \quad 2.386 \times 10^{-13} \approx 2.39 \times 10^{-13}$$

$$*M = 0.32$$

$$*M = 14.12$$

最近 Heidemann¹⁸⁾, P.G. Condliffe & R.W. Bates¹⁹⁾等は牛脳下垂体前葉を原料とし、精製 TSH を採取し、その物理化学的性状を検討する目的で IRC-50, Carboxylmethyl cellulose を用いた Column chromatography を採用して比較的純度の高い TSH を得、更にアルカリ性溶媒で使用する Diethylaminoethyl-cellulose の Column chromatography で純度、活性の高い TSH を得た。

私は前報の連続式濾紙電気泳動法にもとずき豚下垂体前葉より TSH の分離精製を試みた、即ち第1図は上記の条件下下垂体前葉抽出液を泳動させたものであるが抽出液は明瞭に7ヶに分割されている。ここに得られた7分割に含まれる TSH 活性とG活性は Greenspan 法と Florsheim 法で同時に検したが、TSH 活性は第4分割に、G活性は第5分割に主として認められ、他に微量のG作用を第4分割に認めた。又この第4分割の TSH 活性は1 mg 当り15~20 J.S.U. であつた。この値は Bates 等の精製した TSH 活性能よりも 少々劣るが Bioassay の相違によるものと考えられる。

豚脳下垂体前葉アセトン粉末中には TSH 及びGの外に ACTH, STH, などの tropic Hormone の混入が一応予想されるので Tibia test で STH を, Sayers-Mounson 変法静注法で ACTH の検討を行なつたが TSH 活性を認めた第4分割にはいずれの存在も認め得なかつた。第3表及び第4表はこれを示している。

以上の結果から連続式濾紙電気泳動法によつても相当純度の高い豚 TSH を得る事が出来、その精製分離に充分に利用出来る事が判明した。

扱て TSH の物理化学的性状に関して Whitte (1944)²⁰⁾, Fels et al. (1955)²¹⁾, は牛 TSH の沈降率, 1.0S 分子量10000, Pierce & Carstan²²⁾は Membrane 法で分子量既知の蛋白と TSH の拡散率を比較して分子量は26000~30000と推論している。Condliffe & Bates²³⁾は彼等が牛脳下垂体より精製した TSH についてその沈降率は2.6S, 分子量約25000であり、組成アミノ酸、糖についても報告している。

私の得た豚 TSH の分子量は日立超遠心分離器により検討したが、その結果は第3図に図示されるように明瞭な単一波形を示し、第5表から沈降率約2.3S, 拡散系数は 1.23×10^{-6} となり、算定²⁴⁾出来る分子量は約20000となる。TSH の沈降率、分子量は報告者によつて上記の如く若干異なるが、少なくとも私の得た数値から豚 TSH は沈降率2.3S, 分子量約20000の蛋白体であると結論出来る。

結 論

- 1) 連続式濾紙電気泳動法により、豚下垂体前葉から精製 TSH を抽出分離し得た。
- 2) 混入が予想される G, STH, ACTH, 活性物質の検討を行なつたが私の精製した豚 TSH には極めて微量のG作用を認める以外には STH, ACTH 活性物質の存在は検出出来得なかつた。
- 3) 精製豚 TSH の沈降率は2.3Sで、分子量は約20000であつた。

文 献

- 1) 望月真人：日本内分泌学会雑誌，Vol. 36, No. 4, 668, 1960.
- 2) Fels, I.G. and Simpson et al. : Biol. Chem., 213 : 311 (1955).
- 3) Greenspan, F.S., Kriss, J.P., Moses, L.E. and W. Lew : Endocrinology, 58 : 767 (1956).
- 4) Florsheim, W.H. : Acta. Endo., 30 : 175 (1959).
- 5) 田中明：ラッテ脳下垂体剔除法（小山氏外聴道変法），塩野義研究所年報，No. 5, S. 35.
- 6) Evans, H. M., M. E. Simpson, W. Marx and E. A. Kibrick : Endocrinol., 32 : 13, 1943.
- 7) Greenspan, F. S., C. H. Li, M. E. Simpson and H.M. Evans : Endocrinol., 45 : 455 (1949).
- 8) Munson, P.L., A.C. Barry and F.C. Koch : J. Clin. Endo., 8 : 586, 1948.
- 9) Bates, R. W. and P.G. Condliffe : Recent progress in Hormone research., XVI, 308, 1960.
- 9') Williams, J.W. et al. : J.A.C.S., 74 : 1542, 1952.
- 10) Loeb, L. and R.B. Bassett : Proc. Soc. Exper. Biol. and Med., 26 : 860, 1929.
- 11) Junkmann, K. and W. Scheller : Klin. W. Schr., 11, 28, 1176, 1932.
- 12) Collip, J.B. et al. : J.A.M.A., 104 : 965, 1935.
- 13) Frankel-Conrat, H.J. et al. : J. Biol. Chem., 135 : 199, 1940.
- 14) Ciereszko, L.S. : J. Biol. Chem., 160 : 585, 1945.
- 15) Bates, R.W., M.M. Garrison and T.B. Howard : Endo., 65 : 7, 1959.
- 16) Bakke, J.L. : Am. Fed. for Clin. Res., 28 : 106, 1960.
- 17) 望月真人：日本内分泌学会雑誌，Vol. 36, 4, 675, 1960.
- 18) Heideman, M.I. : Endocrinol., 53 : 640, 1953.
- 19) Condliffe, P.G. and R.W. Bates : J. Biochem., 23 : 843, 1956.
- 20) White, A. 1944. In "The Chemistry and Physiology of Hormones" (F.R. Moulton, ed.), P. 1. Association for the Advancement of Science, Washington, D.C.
- 21) Fels, I.G., M.E. Simpson and H.M. Evans : J. Biol. Chem., 213 : 311, 1955.
- 22) Pierce, J.G. and M.E. Carsten : J. A. C. S. 78 : 751, 1956.
- 23) Bates, R.W. and P.C. Condliffe : Recent progress in Hormone research., XVI, 345, 1960.
- 24) 赤堀四郎，水島三一郎：蛋白化学，2, 398, 参照.

脳下垂体前葉ホルモンの濾紙電気泳動学的研究 及び分離抽出に関する研究

第5報 豚脳下垂体性々腺刺戟ホルモンの分離精製並びに 下垂体性々腺刺戟ホルモンの生体内移行に就て

神戸医科大学産婦人科教室

大学院学生 望 月 真 人

緒 言

前報¹⁾に於いて、連続式濾紙電気泳動法による甲状腺刺戟ホルモンの分離精製を報じ、且つその分子量に就いて発表を行なつたが、甲状腺刺戟ホルモンと近い関係にある性腺刺戟ホルモン（以下Gと略記）についても電気泳動学的研究を行なうこととした。

GはTSHと同様糖蛋白²⁾であると云われているが、その化学的性質は勿論その検定法や抽出法についてもなお論議が多い。従つて私は連続式濾紙電気泳動法を利用し、豚脳下垂体前葉から性腺刺戟ホルモンの分離精製を行なつた。

即ち下垂体性Gの分離精製には使用する緩衝液はpH4.5の磷酸緩衝液とした。これは既報のTSHは塩基性溶媒中でのみ安定であり、Gは酸性並びに塩基性溶媒中に於いてもその生物学的活性は安定であると云う私の得た実験結果を利用したもので精製G特にLH分割中にTSHの混入を防ぐ意義を有している。

次に私は米国 National Institut of health (NIH) を介して頒布されたGと私が連続式電気泳動法によつて分離した豚下垂体性Gを電気泳動学的に比較検討を試みた。更に下垂体性Gの電気泳動学的知見に基づいてG活性物質の生体内移動の様相をも併せ追求した。

実験材料並びに方法

1) 実験材料

実験材料としては豚下垂体前葉アセトン粉末と Schering 社の Anteron を用いた。

G活性検定には下垂体剔出幼若ラッテと幼若マウス³⁾を使用した。

2) 実験方法

装置は既報のもので、緩衝液は Sörensen $\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{-KH}_2\text{PO}_4$, イオン強度 0.05, pH4.5で濾紙は No. 52 東洋濾紙、泳動条件は26mA/35cm, 500V/40cmで施行し、染色法には Amidoblack 10B を用い、透析にはビスキン膜を使用、流水透析を行なう。

G活性検定には下垂体剔出幼若ラッテの子宮、卵巣、前立腺、精囊、重量増加法⁴⁾⁵⁾⁷⁾と検定動物の卵巣組織像⁷⁾を併せ検討した。

実験成績

1) 豚脳下垂体前葉アセトン粉末からGの分離精製について

豚下垂体前葉アセトン粉末を2%の食塩水で抽出した後、遠心分離し、得られた上澄液を装置内に垂直に張つた濾紙の陽極側1/3の所に、濾紙の毛細管現象を利用して少量宛たえず流し込む。この様にして電気泳動を行なうと第1図に示すように抽出液は6分割に分離される。

それぞれの各分割は前報に記載したように水槽中に入れ、夫々強力に攪拌しつつ冷却99.5%エチールアル

第1図 連続式濾紙電気泳動法による豚下垂体抽出液の分離

第2図 採取した下垂体性G

コールを85%となるまで添加し、更に15時間冷蔵庫に静置保存する。以後遠心沈澱し得られた沈澱を再び再生蒸溜水10ccに溶かした上、ビスキン膜を使用して72時間流水透析を行ない、再度この溶液を前記の要領で遠沈させ沈澱を10ccのエチールアルコール及びエチールエーテルで数回洗滌、減圧真空乾燥してそれぞれの6分劃より白色結晶状物質⁹⁾を得る。第2図は得られた性腺刺激ホルモン活性物質を示す。

このようにして豚下垂体前葉より得られた6分劃物質を生後21日目から25日目の幼若ラッテ（雄、雌）で下垂体剔出した後、皮下に投与して検定動物の卵巢、子宮、前立腺、精囊、重量を測定して、その性腺刺激作用を判定した。第1表はこの検定法の要領を示し、第2、3表はこの方法によつて判定した結果を示す。

第1表 検定方法

実験動物：生後21～25日目の幼若♂，♀，ラッテ

実験方法：1) 下垂体剔出；1日

2) 注射；第8日目から第9日目から開始1日1回，
3日間皮下注

検定方法：第11日目に剖検

卵巢重量(R+L)→組織検査

子宮重量

精囊重量

前立腺重量

第2表 各分劃毎のG活性検定用量

分劃	Amount (mg)	Gonadotropin Assay	
		♀	♂
1	43.4	5 × 3*	5 × 3*
2	2.3	1 × 1	1 × 1
3	7.9	3 × 1	3 × 1
4	2.2	1 × 1	1 × 1
5	36.2	5 × 3	5 × 3
6	54.0	5 × 3	5 × 3

* total dose × No. of rats (mg)

第3表 検定各臓器重量

Fraction	B.W. (g)	Ovary wt. (mg)	Uterus wt. (mg)	B.W. (g)	S. Vesicle (mg)	V. prostata (mg)
1	27	9.4	14.0	39	2.5	4.8
				46	4.9	3.3
	35.5	6.8	16.0	37	3.7	4.1
2	45	22.3	64.0	51.5	8.5	7.5
3	40	24.3	70.5	48	5.3	5.6
4	36	7.5	16.0	死	死	死

これによると下垂体剔出幼若雄雌ラッテに全量1mg～5mgを注射した場合、連続式濾紙電気泳動により分離された各分劃のうち第2分劃投与群と第3分劃投与群のみが対照群に比して卵巢、子宮、前立腺、精囊の重量が増加していることが認められ、第2分劃投与群では卵巢及び子宮重量が増加しているが同時に精囊、前立腺共にその重量が2倍以上に増加しており、第3分劃投与群では卵巢及び子宮重量は第2分劃投与群よ

5	48	6.0	15.5	46	4.7	2.9
	43	7.3	15.1	46	5.4	2.8
	41	5.5	15.6	44	5.5	4.2
6	45.5	6.6	15.0	42	4.4	5.0
	32	6.0	14.35	40	4.1	3.1
対照群	48	6.4	15.8	43	4.1	2.8
	45	8.1	14.0	52	5.0	2.6
	38	10.8	21.0	31	3.6	2.1
	40	5.7	16.4	48	4.0	4.5

り著明に増加しているが、前立腺、精囊の重量は余り増加していない。即ち第2分劃には LH 作用が強く、第3分劃は FSH 作用が強い。

第3図はこれを示す。

同時に検定に使用したラットの卵巣の組織所見は対照群 (第i図) に比して第2分劃投与群は第ii図のように間質の増殖が顕著であり、第3分劃投与群は第iii図のように卵胞の

第3図 各分劃毎のG活性検討
(脳下垂体前葉抽出液)

第i図 対照群

第ii図 第2分劃投与群

第iii図 第3分劃投与群

発育が著明である。従つて卵巣組織所見からも第2分劃には LH 作用が、第3分劃には FSH 作用が著明であることが判明した。

2) NIH より頒布されたGの電気泳動学的研究

本品は米国 Emory 大学 A.E. Wilhelmi 教授がイオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーを用い、羊脳下垂体前葉から分離精製したGでその内 FSH (NIH-FSH と略記) は250γで対照群の卵巣重量2倍値を示し、LH (NIH-LH と略記) は 0.4ugs で充分な卵巣充血がみられると記載している。

扱てこの両者を上述同様な手技で濾紙電気泳動により分離した所第4図の様に酸性溶媒に於ける場合 NIH-FSH は陽極に2分劃に分離するが塩基性の場合には陽極に向う1分劃と陰極に向う1分劃とに分離される。NIH-LH は FSH と異なり、塩基性、酸性いずれの溶媒でも常に陰極に向つて泳動し、ただ1つの

第4図 NIH-FSH, NIH-LH の
水平式濾紙電気流動像

分割のみを確認した。

3) G活性物質の生体内移動に関する検討

第3報に於いて TSH の生体内移動について報じたが、之に準じてG活性物質の生体内移動の検討を行なつた。即ち下垂体剔出幼若ラッテを使用し、術後第8日目に下腿静脈から50単位 of Anteron を注射、20分後にラッテをエーテル麻酔し、開胸してその心房内より全血を採取する。1分間3000回転で遠心沈澱を行ない血清を分離し前述のような方法で連続式濾紙電気泳動 (17mA/30cm, 420V/45cm, pH8.5, Sörensen $\text{KH}_2\text{PO}_4\text{-Na}_2\text{HPO}_4$, イオン強度0.05) を行なつて多量の血清分割を得た。得られた血清分割を透析した後、アルコール濃度85%にして遠心沈澱を行ない、得た沈澱をエチルアルコールで数回洗滌、減圧真空乾燥を行なつて乾燥血清分割を採取、その内に含まれるG活性を8g前後の雌マウスを使用し子宮重量法で検討した。第4表はこの結果を示す。又第5図はこの成績を示したもので、上欄はラッテ血清の ionogram である。又下欄はその対応分割のG活性を図示している。即ち第4表及び第5図で明らかな如くγ-グロブリン分割を注射した群は対照群に比して2倍近くの

第4表 血清分割毎のG活性測定値

分割	γ	β	α	Al	対照群
子宮重量 (mg)					
10.5	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0
11.5	9.5	7.5	7.5	7.5	6.0
10.5	8.0	6.0	8.0	8.0	5.5
9.5	8.0	9.0	8.0	8.0	7.0
11.0	9.0	9.5	7.8		

子宮重量増加を認め、他の分割投与群ではその重量増加を認めない。

この事からG活性物質は生体内ではγ-グロブリンと共に移動すると考えられる。

考 按

Zondek, B. (1927, 1928)^{9,10}, Smith, P. E. は未熟ラッテに下垂体前葉組織を移植し卵巣の卵胞が成熟することや黄体化が惹起することを認め、下垂体中に性腺刺激作用の物質が存在することを知つた。又 Zondek はこの性腺刺激物質をその生物学的作用の点より prolan A, prolan B の2つの因子に分類した。Fevold (1939)¹¹, Li (1940, 1949)¹², Greep (1940, 1941)¹³等はこの2つの因子を分離して卵胞刺激ホルモン (FSH) と黄体形成ホルモン (LH) とに区別した。これらの業績は主として動物実験によりその生物学的作用から下垂体性Gの性状やその特性などを研究したものである。

近年蛋白質化学の進歩により、G自体の物理化学的性状が次第に明らかとなり、其の抽出法¹⁴⁻¹⁹並びに精製法の研究²⁰⁻²⁴が行なわれ、脳下垂体前葉から抽出されたG、殊に FSH, LH の化学的組成は動物によつて著しい差異のあることなどが明らかとなつた。又化学的に FSH と LH の両者を分離する試みは Crooke

第5図 各血清分割毎のG活性検討比較

& Butt (1953, 1954)^{25, 26)}によつて行なわれ Column chromatography の利用がなされた。又 Brown (1955)²⁷⁾は脳下垂体Gと胎盤性Gとの分離に Tricalcium phosphate の流体クロマトグラフィーを試みている。

私は既に下垂体前葉から proteo hormone の1つである TSH の分離精製に連続式濾紙電気泳動法を試み TSH の結晶を得て物理化学的性状を明らかにした。そこで本法を応用して下垂体前葉中のGを連続式濾紙電気泳動で分離精製を行ない FSH と LH の垂直濾紙上の移動差を検し、更に下垂体剔出幼若雄雌ラッテを用い各分割毎の生物学的作用の分析をも行なつた。第1図は下垂体前葉抽出液の分離像である。この6分割毎のG活性検定は第1表に示すような方法を行なつた。元来生物学の定量法はどのような方法によつても使用動物による制約を受け随時に用い得ない難点があるが化学的定量法の不可能な現在では、これにたよる他はない。従つてGの生物学の検定法はその生物学的作用に基づき性腺に起る変化を利用するが、使用動物の種類、性別、並びに性器又は副性器の利用法によつて極めて多種類の方法が発表されているが夫々一長一短がある。又 FSH と LH を個々に測定する場合、又 total G として検定する場合によつても何れの検定法に拠るべきかは今日尚論議されている。従つて私は数多い検定法のうち第1表に示すような脳下垂体剔出幼若雄雌ラッテを使用し、子宮、卵巣、精囊、前立腺重量増加による方法を採用し判定の正確を期した。第3表はこの結果であり第2分割に LH 作用第3分割に FSH 作用を示し、検定動物の卵巣組織像でもこれと一致した結果を示している。又両者が略々2分割に分離される事も判明した。なお水平式濾紙電気泳動法でも FSH, LH は分離され FSH は LH よりも陰極に向つて良く泳動するか塩基性の場合 FSH は LH とは異なり陽極に向つて泳動する分割が出現する。

NIH-FSH と NIH-LH とを水平式濾紙電気泳動を行なつて検討した結果を上述したが、これによつても NIH-FSH は NIH-LH よりも、よく泳動している。所が泳動距離は緩衝液によつて差があり、この FSH は緩衝液の pH によつて左右されるが、LH はたえず一定の方向に移動し緩衝液の pH には影響されない。

扨てこのGが生体内で血液中のどの様な分割に編入されて移行するかは常に密接な関係にある TSH 活性物質の血中移動と比較して興味がある。Winzler (1958)²⁸⁾は人血清中の Muco 蛋白は α -グロブリン分割中の構成成分であり、電気泳動的には α_1 と α_2 グロブリンとの中間に移動するが、Muco 蛋白だと云うGを平面式濾紙電気泳動で血清と平行して泳動すると α -グロブリンに一致すると報じ、同様な方法を行なつた古谷 (1960)²⁹⁾も α -グロブリンの位置にGは移動すると報じた。一方藤井 (1960)³⁰⁾は濾紙電気泳動で尿抽出Gを血清と平行に泳動させて β -グロブリンに相当する位置にGの Spot を得たと報告している。最近 Nagy et al. (1961)³¹⁾は Durram (1950) の山形懸垂法を改良した方法で、妊娠中血清 HCG は β -グロブリン分割と移動するが過剰に HCG を血清中に与えた場合は γ -グロブリン分割にもGの活性を認めると報告している。

この様に実験方法及び使用装置の差異によつて実験結果が異なることは問題を提起するが、①同じG剤でも動物の種属が違えば濾紙上の泳動像も異なること、②同じG作用を有しても FSH と LH との比率が異なるときは常に同じ泳動像を示すとは限らない事、の2点から電気泳動条件の異なる血清を同一濾紙上でGと平行的に泳動させても実験の確実性は期せないと考えられる。そこで私は外来的に Anteron を下垂体剔出ラッテに静注し、その血清を連続法によつて多量に分離して γ -グロブリンの位置に明瞭なG活性作用の存在することを認めたが、 α 、 β -グロブリン分割にはG活性を認める事は出来なかつた。

結 論

- 1) 豚脳下垂体前葉より連続式濾紙電気泳動法により略々 FSH と LH を分離出来た。
- 2) NIH-LH は濾紙電気泳動学的にみて、その純度が非常に高い。
- 3) 生体中での下垂体性Gは常に γ -グロブリンと共に移行している事を確認した。

文 献

- 1) 望月真人：本誌上第4報。 2) Li, C.H., M.E. Evans and P.H. Wonder : J. Gen. Physiol., 27 : 737, 1940.
- 3) Lyon, R.A., M.E. Simpson and H.M. Evans : Endo., 53 : 674, 1953. 4) Loraine, J.A.

- : J. Endocr., 319, 1950. 5) Emmens, C.W. : L.N. Bull. Health Organiz., 8 : 862, 1939. 6) Jensen, H., M.E. Simpson, S. Tolksdorf and H.M. Evans : J. Physiol., 79 : 180, 1933. 7) Evans, H.M. and M.E. Simpson : The Hormones (Ed. by G. Pincus and K.V. Thimann) Academic Press, New York. Vol. 2 : 351, 1950. 8) 大塚秀雄他 : J. Biol. Chem., Vol. 141, No. 5, 547, 1954. 9) Aschheim, S. and B. Zondek : Klin. Wochenschr., 6 : 1322, 1927. 10) Aschheim, S. and B. Zondek : Klin. Wochenschr., 7 : 1404, 1928. 11) Fevold, H.L. : J. Biol. Chem., 128 : 83, 1939. Endo., 24 : 435, 1939. 12) Li, C.H., M.E. Simpson and H.M. Evans : Science., 91 : 530, 1940. 13) Greep, R.O. et al. : J. Biol. Chem., 133 : 289, 1940. 14) Bradbury, J.T., E.S. Brown and W.E. Brown : Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 71 : 228, 1949. 15) Bron, J.B. and J.A. Lorain : J. Endo., 13 : ii (1956). 16) Gordman, A. : Endocrinol., 37 : 177 (1945). 17) Jugck, E.C., W.D. Maddock and C.C. Heller : J. Clin. Endo., 7 : 1 (1947). 18) Katzman, P.C. and E.A. Doisy : J. Biol. Chem., 98 : 739 (1934). 19) Levin, L. and H.H. Tyndale : Pro. Soc. Exper. Biol. and Med., 34 : 516 (1936). 20) Johnsen, S.G. : Acta. Endo., 20 : 106 (1955). 21) Albert, A., S. Kelly, L. Silver and J. Kobi : J. Clin. Endo. and Meta., 18 : 600 (1958). 22) Ringas, D.A., C.A. Panlsen and C.G. Heller : Endocrinol., 62 : 738 (1958). 23) Segaloff, A., S.L. Steelman, C. Evesett and A. Flores : Endocrinol., 62 : 827, 1957. 24) Butt, W.R., A.C. Crooke and F.J. Cunningham : Acta. Endo., 32 : 509, 1959. 24') Woods, M.C. and M.E. Simpson : Endocrinol., 66, 4 : 575 (1960). 25) Crooke, A.C. and W.R. Butt : Proc. Soc. Study Fertility, 5 : 87, 1953. 26) Crooke, A.C., W.R. Butt and J.D. Ingram : Lancet., 1 : 379, 1954. 27) Brown, P.S. : J. Endocrinol., 13 : 59, 1955. 28) Winzler, R.J. : Chem. and Biol. of Mucopolysaccharide (1958). 29) 古谷博他 : 日本不妊学会雑誌, 5, No. 7, 78, 1960. 30) 藤井久四郎他 : 産婦の世界, 9, 1451 (1957). 31) Nagy, D., I. Gafi and G. Keller : Acta. Endo., 36 : 3, 438, 1961.

脳下垂体前葉ホルモンの濾紙電気泳動学的研究 及び分離抽出に関する研究

第6報 人尿性々腺刺激ホルモンの連続式濾紙電気泳動法 による分離精製について

神戸医科大学産婦人科教室

大学院学生 望 月 真 人

緒 言

尿中に排泄されるGには2種類ある。その1つは下垂体前葉より分泌され、尿中にこれが排泄されたものであつて、尿中の含有量はきわめて微量である。併しながら閉経期以後の婦人の尿中にはやや多く含まれている。以下これをPMGと仮称する。その2は妊娠婦人尿中に含まれるGで胎盤の絨毛より産生されるものであつて、その濃度はかなり高い。以下これをHCGと略記する。

以上の2種類のGはそれぞれその産生臓器である脳下垂体又胎盤から直接に抽出して得られるGとその生物学的性状、その他が多少相異すると云われている。又動物の種属や産生臓器の別によつてもその諸性状が若干異なると云われている。第5報に於いては豚下垂体前葉より連続式濾紙電気泳動法で、下垂体性Gの分離精製を試み、その性状について検討したが、今回はPMG及び絨毛性G（以下HCGと略記）の分離精製を行ない、FSHとLHの夫々の単離を検討し、更に独逸Köln大学のHeinrichs講師の分離精製したPMG（以下Köln-Gと略記）を濾紙電気泳動学的に検討を加え、更に連続式による方法でKöln-Gの精製を試みた。

実験材料並びに方法

1) 実験材料

実験材料としては妊娠前半期妊婦尿と後半期妊婦尿並びに閉経期婦人尿を採取し腐敗によるGの変性を防ぐために採取した尿は出来るだけ速かに実験に供した。止むを得ず保存する場合にはトルエンを上層に加え、氷室に保存した。これは変性の速度は温度の上昇と共に増加するからである。

2) 実験方法

(1) 尿中よりGの抽出

尿中よりGの抽出はBradbury¹⁾のカオリン吸着法(1949)とLorain²⁾, Albert³⁾の改良法(1956)を比較検討し改良した松島の方法⁴⁾によつた。即ち10%カオリン吸着、N-NH₄OHで抽出した後、エタノール沈澱を行ない、エタノール、エーテルで洗滌後、減圧真空乾燥を行なう。

以上の抽出法を表記すると第1表のようになる。

(2) 連続式濾紙電気泳動法

第1表 尿中Gの抽出法

装置, 濾紙, 緩衝液, 泳動条件は第5報と同様, 透析にはビスキン膜使用.

(3) 検定動物

脳下垂体剔出幼若雄雌ラッテを使用し, 卵巢, 子宮, 前立腺, 精囊重量増加測定のみならず, 卵巢組織所見をも検討した.

3) 実験成績

1. PMG の分離精製

前報で豚下垂体前葉アセトン粉末から下垂体性Gを分離精製した様に, 粗 PMG を所要の生理的食塩水に溶解, 試料を垂直に張った濾紙の大体中央となる様に, 濾紙の毛細管現象を利用してたえず少量宛流下, 試料がなくなるまで泳動を行なう. 第1図は閉経期婦人尿より抽出した粗Gの泳動像で, 明らかに陰極側に移動する3分割を認める.

これらの各分割から純白の精製 PMG を採取するのは前報と同じである. 第2図は精製Gを示す.

各分割毎のG活性検定は生後21日目から25日目の下垂体剔出幼若ラッテを使用し, 検体を皮下に投与して被検動物の卵巢, 子宮, 前立腺, 精囊重量の増加を測定して判定した. 第2表及び第3表はこの結果を示す.

第3表によると被検動物に全量 5 mg を注射した場合, 第1分割投与群のみが対照群に比して卵巢, 子宮, 前立腺, 精囊に重量増加が認められるが第2分割投与群と第3分割投与群は重量増加は認められなかった. 従つてG活性は有しない. 重量増加が認められる第1分割投与群では卵巢, 子宮重量は対照群に比し著明な

第1図 連続式濾紙電気泳動法による
PMG の分離

第2図 採取した PMG

第2表 各分割毎のG活性検定用量

Fraction	Amount (mg)	Gonadotropin Assay	
		♀	♂
1	24.3	5 × 2	5 × 2 *
2	18.3	5 × 2	5 × 1
3	28.4	5 × 2	5 × 2

* total dose × No. of rats (mg)

増加を示さないが, 前立腺重量は著明に増加している. 処が検定動物の卵巢所見は第1分割投与群では対照群に比して著明な卵胞の発育がみられ, 間質

第3表 各分割毎のG活性測定値 (PMG)

Fraction	B.W. (g)	Ovary wt. (mg)	Uterus wt. (mg)	B.W. (g)	S. Vesicle (mg)	V. prostate (mg)
1	46	7.3	15.3	48	5.7	13.6
	42	10.5	18.0	/	/	/
2	40	6.9	13.1	38	4.5	3.2
	35	5.8	14.1			
3	47	6.1	16.4	35	4.2	2.7
	42	7.4	13.3	45	5.3	6.9
対照群	48	6.4	15.8	43	4.1	2.8
	45	8.1	14.0	31	5.0	2.6
	40	5.7	16.4	48	4.0	4.5

第3図 対照群の卵巣組織像

第4図 第1分割投与群の卵巣組織像

第4表 各分割投与群の卵巣組織像の比較

分割	卵胞肥大	間質増殖 (黄体形成)
対照群	—	—
1	+++	+
2	—	—
3	—	—

第5図 各分割毎のG活性検討 (PMG)

の増殖は著明でない。

第3図 (対照群卵巣所見) と第4図はこれを示す。

第4表は各分割の被検動物の卵巣組織所見を示したものであり、第5図は第3表の結果を図示したものである。

2. HCG (妊娠前半期) の分離精製

妊娠前半期妊婦尿から抽出した粗 HCG を上記と同様な方法で分離精製すると第6図のように4分割に分離される。

この各分割から精製Gを採取するのは上記の通りで、第7図は得られた純白の精製Gを示す。

この分割毎のG活性検定は既述と同様検定方法で、被検動物の卵巣組織所見を併せ検討するのも同様であ

第6図 連続式濾紙電気泳動法による HCG (前半期) の分離

第7図 採取したHCG (前半期)

第5表 各分割毎のG活性検定用量

Fraction	Amount (mg)	Gonadotropin Assay	
		♀	♂
1	71.8	5 × 3	5 × 3 *
2	10.9	5 × 1	5 × 1
3	14.1	5 × 1	5 × 1
4	43.9	5 × 3	5 × 3

* total dose × No. of rats (mg)

る。

その結果は第5表と第6表に示す。即ち第6表によれば各分割毎に下垂体剔出幼若ラッテを使用し、皮下に全量 5 mg を投与した場合、妊娠前半期 HCG の4分割のうち第1分割投与群と第2分割投与群のみが対照群に比較して卵巣子宮、精囊、前立腺の重量の増加を認める。併し第1分割投与群は精囊、前立腺重量の増加より卵巣重量の増加が著明であり、一方これに反して第2分割投与群は前立腺、精囊重量増加が著明である。

第8図はこの結果を図示するものである。

被検動物に使用した下垂体剔出幼若ラッテの卵巣組織所見は第3図の対照群に比して第1分割投与群第9図は卵胞の発育が強く、第2分割投与群第10図は間質の肥大がみられる。

3. HCG (妊娠後半期妊婦尿) の分離精製

妊娠前半期の場合と全く同様な方法で分離すると第11図のように妊娠前半期粗 HCG と異なり3分割に分離される。

第6表 各分割毎のG活性測定値 (HCG前半期)

Fraction	B.W. (g)	Ovary wt. (mg)	Uterus wt. (mg)	B.W. (g)	S. Vesicle (mg)	V. prostata (mg)
1	35	20.0	11.5	31	4.4	4.0
	41	12.3	13.7	38	6.2	5.7
	38	11.5	16.8	/	/	/
2	42	8.9	17.9	35	6.9	10.2
3	/	/	/	40	4.7	3.1
4	40	4.9	15.5	46	4.3	4.1
	36	8.8	13.0	46	3.7	3.3
	38	4.2	15.1	/	/	/
対照群	48	6.4	15.8	43	4.1	2.8
	45	8.1	14.0	31	5.0	2.6
	40	5.7	16.4	48	4.0	4.5

第8図 各分割毎のG活性検討 (HCG前半期)

第9図 第1分割投与群の卵巣組織像

第10図 第2分割投与群の卵巣組織像

第11図 連続式濾紙電気泳動法による
HCG (後半期) の分離

第12図 採取したHCG (後半期)

これらの各分割から得た精製Gは第12図のように純白の結晶状を示すが妊娠前半期 HCG と比較すれば妊娠後半期 HCG の方が微細な結晶状を示している。この精製分割毎のGの活性検討の結果は第7表と第8表に示される。

即ち第8表によれば第1分割と第2

第8表 各分割毎のG活性測定値 (HCG後半期)

Fraction	B.W. (g)	Ovary wt. (mg)	Uterus wt. (mg)	B.W. (g)	S. Vesicle (mg)	V. prostate (mg)
1	46	20.8	24.5	46	9.1	23.7
	26	22.0	48.9	48	6.5	8.8
	/	/	/	48	5.9	13.9
2	39	9.6	15.5	42	7.5	10.1
	44	8.4	15.9	40	8.5	12.0
	39	12.3	17.0	/	/	/
3	39	8.3	15.4	54	5.3	6.1
	37	5.0	12.4	46	5.9	4.2
	47	7.9	14.9	39	3.8	3.1
対照群	48	6.4	15.8	43	4.1	2.8
	45	8.1	14.0	31	5.0	2.6
	40	5.7	16.4	48	4.0	4.5

第7表 各分割毎のG活性検定用量

Fraction	Amount (mg)	Gonadotropin Assay	
		♀	♂
1	75.2	5 × 3	5 × 3 *
2	39.4	5 × 3	5 × 3
3	34.6	5 × 3	5 × 3

* total dose × No. of rats (mg)

第13図 各分割毎のG活性検討
(HCG後半期)

第14図 第1分割投与群の卵巣組織像
(HCG後半期)

分割にG活性を認める。第1分割投与群は卵巣、子宮は対照群の2倍以上の重量増加があり、精囊、前立腺もいずれもその重量が増加している。第2分割投与群は対照群に比較して卵巣、子宮共に余り重量の増加を認めないが、精囊、前立腺共に著明な重量の増加を認める。

第13図はこの結果を図示したものである。

又卵巣組織所見は第1分割投与群（第14図）では卵胞、間質ともに肥大しているが、特に卵胞の発育が著しい。第2分割投与群（第15図）では間質の増殖が著明である。

第15図 第2分割投与群の卵巣組織像
(HCG後半期)

第9表 各分割毎投与群の
卵巣組織像の比較

分割	卵胞肥大	間質増殖 (黄体形成)
1	+++	+
2	+	++
3	—	—
4	—	—
1	++	+
2	÷	++
3	—	—

以上両者の結果をまとめると第9表のようになり第1分割投与群ではいずれも FSH 効果が強く、第2分割投与群では LH 効果が強い事を認める。

4. Köln-G の濾紙電気泳動学的検討

本品は Köln 大学産婦人科教室 Heinrichs 講師が閉経期婦人尿よりカオリン吸着法で抽出、アセトン法によつて精製したものである。その力価を吾々の教室の安水、玉岡が検定した所 1 mg 1 単位以下であつた。

この Köln-G を酸性及び塩基性溶媒で水平式濾紙電気泳動（条件；6 mA/10cm, 400~280 V/40cm, 8~9 時間）したものは第16図に示される様に酸性溶媒では陰極側に2~3分割、又塩基性溶媒で下図の様に陽極側に2分割に分れて泳動している。

次でこの Köln-G を連続式濾紙電気泳動を行なうと第17図pH4.5で分離精製した様に水平式の場合より更に多くの5分割に分離されている。

第16図 水平式濾紙電気泳動法による
Köln-G の泳動像

第18図は同じく pH 8.5 で Köln-G を連続式濾紙電気泳動を行なつたものであるが第17図酸性の場合

第17図 酸性溶媒に於ける Köln-G の
連続式濾紙電気泳動像

第18図 塩基性溶媒に於ける Köln-G の連続式濾紙電気泳動像

第19図 各分劃毎のG活性検討

と同様水平式よりも2分劃多い4分劃に分離されている。

扱てこの各分劃毎の生物学的活性をマウス卵巣子宮重量法で検討した。

第19図はこの検討結果であつて、酸性では第4分劃投与群に子宮重量増加と第5分劃投与群に卵巣重量増加を認めるが、塩基性では第3分劃投与群に卵巣重量増加と若干の子宮重量増加を、第4分劃投与群に著明な子宮重量増加と若干の卵巣重量の増加があり、塩基性、酸性、溶媒いずれに於いても2つの分劃にG活性を認めるがFSH作用とLH作用は完全には分離されていない。

考 按

カオリン吸着法によつて得たGは他の方法に比して純度が高いとされているが純粋なGではなく相当量の不純物を含んでいる。

しかしながら脳下垂体からのGについてはFSHとLHとに夫々別個の独立した物質として分離され、又その物理化学的性状も近年明らかにされているが、既述の人尿性GではHCGは勿論の事PMGに於いてもFSHとLH両作用が認められているにも拘らず今日ではまだ両者を完全に分離することに成功していない。従つて尿中のFSHとLHは動物の下垂体から抽出されたFSHとLHと同様に独立しているものか、或は一物質の2作用と考えるべきであるかは全く不明である。

最近Johnsen (1955)⁹⁾, Albert (1958)¹⁰⁾, Ringas (1958)¹¹⁾, Segaloff (1959)¹²⁾は種々の方法を採用して、この問題を研究している。特にSegaloffは電気泳動、超遠心分離、その他の分析方法によつて純粋と思われるGの分離に成功した。しかしこの純粋と云われるGは強いFSH作用を示したが同時にLHの作用も有し、しかもこの他にLH分劃を得、これは化学的に純粋ではなかつたがFSH作用を有していなかつたと報告している。又他の学者も夫々相当に高い純度のGを分離しているがFSHとLHとの分離には成功していない。

Crooke (1959)¹³⁾は最近イオン交換樹脂を用いる分離法を試みているがFSHとLHとの分離は完全でない。

私は前報で詳述したように連続式濾紙電気泳動法を利用し、カオリン吸着法によつて抽出した粗Gの分離精製を試みた(1959)。即ち閉経期婦人尿Gは第1図の様に明瞭な3分劃に分離され、その精製Gの活性は第1分劃のみに陽性である。しかし強いFSH作用を示すと同時に若干のLH作用も有している。

又第6図、第11図は妊娠尿粗Gの泳動像であるが妊娠前半期尿Gでは4分劃に、妊娠後半期尿Gは3分劃に分離されているが両者とも第1分劃と第2分劃にその生物学的活性を有している。即ち第1分劃に主としてFSH、第2分劃に主としてLH作用のある事を実証したがFSH活性を認めた第1分劃に若干のLH活性を検出した。又卵巣組織所見からみるとFSH作用は妊娠前半期尿Gの方が強く、LH作用は後半期尿Gの方が優位である。

此の様に妊娠初期尿GにFSH作用が強いのは此時期では下垂体性Gの混在していることを思わせるものであり、更に妊娠初期には粗Gが4分劃に分離されて泳動することはHCGの他にFSH作用のある物質を含んでいると考えられる。この事は赤須(1958)¹⁰⁾, Lyon (1953)¹¹⁾も報告している。

次に Köln-大学産婦人科教室 Heinrichs 講師が閉経期婦人尿中より精製した Köln-G を濾紙電気泳動学的に検討したが濾紙電気泳動学的にみて純度が低かった。この Köln-G を連続式濾紙電気泳動で分離した所いくつかの分割に分れたが、そのうち中央に近い2分割に生物学的活性を認めたが、両者には FSH 作用と LH 作用が混在していた。

以上更年期婦人尿、妊娠前半期並びに後半期妊婦尿及び Köln-G について行なつた実験や文献からみて尿中に排泄される G が単一であるか否かは結論づけられないが FSH と LH の分離は極めて困難な事を示している。

次に Segaloff (1955)¹²⁾は PMG は1つの蛋白質に低分子の FSH, LH 作用部分が結合して1分子を形成するものとすれば両者の分離は不可能であり、両者の結合の比率が変り得るものとすればその結合の比率が異なることにより作用が異なるものと推定している。Brown (1959)¹³⁾も此の考え方に同意し、両者の比率の差によつて作用が異なるものであると述べているが、一方これに対して Lorain (1958)¹⁴⁾は FSH と LH は別個のものであるとしている。

いずれにしても PMG, HCG は PG に比して FSH と LH の分離は困難であり、化学的な面でも今後更に検討すべき多くの問題を含む。

結 論

連続式濾紙電気泳動法により尿中 G の分離精製を試みた。

- 1) 閉経期婦人尿 G は3分割に分れ、第1分割にのみ G 活性を有するが強い FSH 作用の他に若干の LH 作用を含む。
- 2) 妊娠前半期妊婦尿 G は4分割に分れ、第1分割と第2分割に生物学的活性を有する。即ち第1分割には FSH 作用が強く、第2分割は LH 作用が強い。
- 3) 妊娠後半期妊婦尿 G は3分割に分れ、第1分割と第2分割に G 活性を有する。即ち第1分割は FSH 作用が強く、第2分割は LH 作用が強い。
- 4) 妊娠前半期妊婦尿 G の方が後半期尿 G に比して FSH 作用が強い。
- 5) Köln-G を連続式濾紙電気泳動法で精製したが FSH と LH を完全に分離する事は出来なかつた。

文 献

- 1) Bradbury, J.T., E.S. Brown and E.W. Brown : Proc. Soc. Exper. Biol. and Med., 71 : 228, 1947.
- 2) Lorain, J.A. and J.B. Brown : J. Clin. Endo., 16 : 1180, 1956.
- 3) Albert, A. : Recent progress in Hormone Research., 12 : 227 (1956).
- 4) 松島早苗 : 皮膚と泌尿, 20 : 225, 1958.
- 5), 6), 7), 8), 9) : 本誌, 第5報, 文献参照.
- 10) 赤須文男 : 胎盤の内分泌, 南江堂, 1958.
- 11) Lyon, R.A., M.E. Simpson and H.M. Evans : Endocrinol., 53 : 674, 1953.
- 12) Segaloff, A. : Year Book of Endocrinol., 266, 1954~1955.
- 13) Brown, P.S. : J. Endocrinol., 18 : 46, 1959.
- 14) Loraine, J.A., J.S. Brown and A. Klopfer : J. Endocrinol., 17 : 401, 1958.

脳下垂体前葉ホルモンの濾紙電気泳動学的研究 及び分離抽出に関する研究

第7報 総括; TSH 活性物質とG活性物質の関連について

神戸医科大学産婦人科教室

大学院学生 望 月 真 人

性機能, 特に女性々機能と甲状腺機能とが密接な関係にあることは, 実験的にも臨床的にも明らかな事実である. 従つて夫々を支配する性腺刺激ホルモン (以下Gと略記) と甲状腺刺激ホルモン (以下 TSH と略記) との間にも関連する点が多いことが容易に予想される.

両者の関連性を論ずるに当つては, 先ず夫々の特徴を正確に把握する必要がある. そのうちGについての研究は近年頓に活潑となり, その生物学的特徴のみならず, 化学的性状についても解明された処が少なくない. 併しながら TSH はGと同じく下垂体性 proteohormone であり, その産生機構にも類似点が多く, ともに糖蛋白であると云われながらも, 尚今日その化学的性状はもとより分離抽出法に関しても知る処が少なく, 多くの検討すべき余地がある.

そこで私はまず TSH 活性物質について連続式濾紙電気泳動法により豚下垂体から有効成分の分離精製を試み, その化学的性状の一部を明らかにし, ついでGについて同様の操作を行なつて若干の新知見を得, その詳細を前報に記述したが, 茲に更めて両者の関連性について総括する.

1) 濾紙電気泳動条件による相異

TSH 活性は塩基性溶媒の許で分割された中央の分割にのみ存在し, 酸性溶媒で分離した分割では, TSH 活性は著しく減殺されてしまう (第2報, 第3報). 他方G活性は塩基性, 酸性何れの溶媒で分離した場合でも活性を認めた (第6報). このことからG活性物質は何れの溶媒でも安定であるに反し, TSH 活性物質は塩基性溶媒では安定しているが, 酸性溶媒中では不安定で生物学的活性が失われる恐れがあると云い得る. 従つて体液中から TSH を分離抽出する場合や精製を行なう場合G活性物質の分離抽出に常用されている様な酸性溶媒下の操作は不適當であると推論することが出来る.

2) 生体内での移動

ラットに TSH 並びにG製剤を高濃度に投与した後, その血清を連続式濾紙電気泳動法で分離, 各分割毎の生物学的活性を検討した処, TSH 活性物質もG活性物質も共に γ -グロブリン分割にあることを見出した (第3報, 第5報). 即ち TSH 及びG活性物質は血中に於いてともに γ -グロブリンと結合して移行していると考えられる. このことは此の2種の proteohormone の化学的近似性を示唆するものであろう.

3) 物理化学的性状の比較

第4報で既述した如く, 私は豚下垂体前葉アセトン粉末より濾紙電気泳動法によつて精製し, 他の tropic hormone を殆んど含まない TSH 活性物質を分離し, これを超遠心分離法でその分子量を測定した処, 沈降率2.3S, その分子量は約20000と算定出来た. Bates が牛の TSH の分子量を約25000と報告しているが, 動物の種属によつて多少差異のあるものと思われる. 既述した如く一つの製薬会社の TSH 製剤でも製品番号を異にする場合泳動像に多少の相異のあることと何等かの関連があるものと思われる (第2報).

次にGについては Steelman, S.L. & A. Segaloff²⁾は羊 FSH は25000~30000, 羊 LH は30000, 人Gは30000と述べている. 此点からみてGは TSH に比して大きな分子より構成されているものと思われる.

処で私の分離精製した TSH 並びにG活性物質について, その糖成分並びにアミノ酸組成を分析した協同研究者荒木の研究によると, TSH も G (Köln-G, NIH-FSH, NIH-LH, 市販製剤, PMG, HCG) いずれ

も生物学的活性のある分割には常に同じ糖を確認しており、TSH 及びG活性物質に共通するこの糖がこれらホルモンの生物学的作用と何等かの関係を有しているものと推察され、アミノ酸組成では Steelman & Segaloff がGのそれについて報告している処と略々等しい。此点を併せ考えると TSH とGとは化学的に極めて近似している糖蛋白で、唯その分子量に差があるものと云いうる。

4) 両者の Contamination.

私が行なつた濾紙電気泳動法による両物質の分離精製の結果からみると溶媒を酸性とした場合 TSH 活性が減弱するから、TSH の Contamination を除外しうるが、併し TSH 活性を減弱しない塩基性溶媒に於いては若干のG活性が混入する(第4報, 第3表)。他方 Bates より寄贈された Column chromatography によつて分離精製した牛 TSH 活性物質のG活性をマウス子宮重量法で検討した私の成績では第1表の様に弱い乍ら、若干のG作用を認めた。

第1表 Bates's TSH のG作用検討
(マウス子宮重量法)

No. of rat	Bates's TSH (mg)	Control (mg)
1	9.7	6.5
2	9.0	6.0
3	11.2	6.3
4	10.5	7.0
5	11.8	6.5

又米国 National Institute of Health (NIH) を通じて頒布をうけた Emory 大学 Wilhelmi 教授の精製した羊下垂体性Gのうち LH は濾紙電気泳動的に極めて純度の高いことは第5報で確認したが、此純度の高いLH 活性物質にも 1 mg 当り 0.015 USP の TSH 作用を含有していることが附記されている。此様に現在の段階に於いては両物質の分離は極めて困難である。

此分離の困難なことは両物質の化学的性状の近似している点から容易に想像しうるが、両者の混在が果して精製上の Contamination であるのか、或は更に間接的な生物学的作用によるものであるかは今後の研究に俟ちたい。

本論文の要旨は第33回, 第34回日本内分泌学会総会及び第7回, 第8回日本産婦人科学会総会に於いて発表した。

稿を終るに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲を賜つた恩師植田安雄教授並びに神戸薬大森五彦博士、終始有益なる助言を賜つた本教室赤堀助教授、林講師、井上講師に謝意を表します。

又研究上の便宜を与えて下さつた塩野義製薬三宅有博士、阪大蛋白質研究所垣内博士に深甚な謝意を表します。

更に貴重な資料を供与された米国 NIH, Bates, R.W. と P.G. Condoliffe 及び Emory 大学 A.E. Wilhelmi 教授, Köln 大学 Heinrichs 講師, 帝国臓器製薬の各位に感謝致します。

本研究は昭和35年度文部省科学研究費の補助の下に行なわれた。

文 献

- 1) 植田安雄他：日本産科婦人科学会雑誌, 13, 1, 77 (1961).
- 2) Steelman, S.L. and A. Segaloff : Recent progress in Hormone research., XV, 1959.

第1図 Pretiron, Bates's TSH 及び私の TSH の水平式濾紙電気泳動像の比較