Effect of Electrical Stimulation of the Limbic System on Pituitary-Thyroidal Function

Fukashi MATSUZAKI

Third Department of Internal Medicine, University of Tokyo, Faculty of Medicine
(Director : Professor Shigeo Okinaka)

The regulation of pituitary-thyroidal function through the central nervous system has been the subject of many studies, most of them dealing with the hypothalamus. The limbic system has been known to play an important role in autonomic nervous regulation, and recent studies at several laboratories have revealed that this part of the brain has an intimate relation to corticotropic and gonadotropic secretion.

The effect of electrical stimulation of the posterior orbital surface on pituitary-adrenocortical function has been reported from our laboratory.

With respect to the secretion of TSH, however, a definite relationship has not been established. Yamada and Greer reported that bilateral destruction of amygdaloid nuclear complex had little effect on PTU induced goitrogenic action. In this paper the effect of electrical stimulation of the limbic system on the pituitary-thyroidal function in dogs is reported.

Stimulation of the amygdaloid nuclear complex, the posterior orbital surface and the hippocamp formation was induced in morphine anesthetized dogs which had been previously labelled with I^{131} .

In each of four cases in which the posterior orbital surface and the amygdaloid nuclear complex were stimulated, there was no significant increase in the concentration of PBI¹³¹ and inorganic I^{131} in the thyroid venous blood.

In 10 cases in which the hippocampal formation was stimulated, a definite increase in both of organic and inorganic I^{131} in the thyroid venous blood was observed with no significant change in the thyroid venous blood flow. Significant increase in the TSH content of the jugular vein blood, assayed in 4 animals by McKenzie's method, occurred in all cases within 30 minutes. Hypophysectomy prevented the response of the thyroid to hippocampal stimulation.

The Metabolic Effects of Thyroxine Analogues : Especially the Effects on the Fatty Metabolism

By

Yasuyuki SATO

The 1st Department of Internal Medicine, Niigata University School of Medicine
(Director : Professor Dr. Mitsuo Nishikawa)

Part 1. The metabolic effects of thyroxine analogues in the hypothyroid subjects ;
A dissociation of various effects of analogues.

L-thyroxine, L-triiodothyronine, D-triiodothyronine and four compounds of triiodothyroformic acid group were administrated in increasing doses to hypothyroid patients, and one gouty patient was administrated D-triiodothyronine or triiodothyropropionic acid.

1. The administration of L-thyroxine and L-triiodothyronine to myxedematous patients did not result in a marked dissociation in the decrease in serum cholesterol level and the increase basal metabolic rate.

2. In elevating the basal metabolic rate, D-triiodothyronine is approximately from 17 to 33 percent as active as L-thyroxine, acetyl triiodothyroformic acid is only from 0.1 to 0.4 percent as active as L-thyroxine, and each effect of triiodothyroformic acid, amide of triiodothyroformic acid and its methyl ester are less than from 0.1 to 0.2 percent, from 0.5 to 1.0 percent and from 0.1 to 0.2 percent of L-thyroxine.

3. It seemed that D-triiodothyronine and triiodothyroformic acid group were more effective in reducing the serum cholesterol than in increasing the basal metabolic rate. It is interesting to note that this dissociation was marked in triiodothyroformic acid group.

4. The administration of acetyl triiodothyroformic acid on hypothyroid subjects resulted in a decrease of serum uric acid and in an increase of urinary excretion of uric acid, and produced a negative phosphorus balance. In one gouty patient, a decrease of serum uric acid and an increase of urinary excretion of uric acid were observed over three months by the administration of D-triiodothyronine or triiodothyropropionic acid.

5. The rate of disappearance of triiodothyroformic acid group from the blood of hypothyroid patients was observed as half time of protein bound iodine after the cessation of chronic administration. The half time of protein bound iodine were 2.9 days for triiodothyroformic acid, 2.0 and 2.4 days for acetyl triiodothyroformic acid, 8.8 days for its amide and 4.5 days for methyl ester.

Part 2. The hypocholesterolemic effect of D-thyroxine and acetyl triiodothyroformic acid on euthyroid hypercholesterolemic patients.

D-thyroxine or acetyl triiodothyroformic acid were administered to the ten euthyroid hypercholesterolemic patients respectively.

1. The administration of 4 mg. daily of D-thyroxine to ten euthyroid subjects produced a little elevation of basal metabolic rate. It seemed that the administration of less than 4 mg. daily of D-thyroxine failed to sustain the decreased serum cholesterol level in one or two weeks.

2. In administering 4 mg. daily of D-thyroxine, the elevation of protein bound iodine level was slight but thyroidal radioiodine uptake was markedly inhibited.

3. The administration ranging from 25 to 60 mg. daily of acetyl triiodothyroformic acid in ten euthyroid hypercholesterolemic patients produced rapid reduction of serum lipids without significant elevation of basal metabolic rate. In spite of the increase of doses, it seemed to return gradually to its pre-treatment value.

4. The administration of relatively large doses, as much as 60 mg. daily of acetyl triiodothyroformic acid from the beginning was able to produce the reduction in serum cholesterol level without significant elevation of basal metabolic rate continuously for more than three months. At present, therefore, it seems that acetyl triiodothyroformic acid is the most potent hypocholesterolemic agents among thyroxine analogues.

5. A high protein bound iodine and marked inhibition of thyroidal radioiodine uptake were observed by the administration of acetyl triiodothyroformic acid.

Thyroxine analogues の代謝効果

特に脂質代謝に対する効果

新潟大学西川内科教室 (指導 西川光夫教授)

佐 藤 康 行

(昭和37年 6 月 4 日受付)

目 次

はじめに

第1編 Thyroxine analogues の甲状腺機能低下症に於ける代謝効果
特に諸作用の解離についての考察

I. 緒 言

II. 対照並びに測定方法

III. 臨床結果

1. L-thyroxine (L-T₄) の効果

2. 3:5:3'-L-triiodothyronine (L-T₃) の効果

3. 3:5:3'-D-triiodothyronine (D-T₃) の効果

4. 3:5:3'-triiodothyroformic acid group (T₃-formic acid group) の効果

a. T₃-formic acid

b. acetyl T₃-formic acid

c. T₃-formic acid, methyl ester

d. T₃-formic acid, amide

e. T₃-formic acid group の血中消失速度

IV. 考按並びに総括

1. L-thyroxine 及び L-triiodothyronine の作用の解離について

2. thyroxine analogues の BMR 上昇作用

3. thyroxine analogues の BMR 上昇作用と血清 cholesterol 低下作用との解離

4. thyroxine analogues の磷及び尿酸代謝に及ぼす影響

5. thyroxine analogues の血中消失速度

V. 結 論

第2編 甲状腺機能正常者に於ける D-thyroxine 及び acetyl T₃-formic acid の血清脂質低下作用

I. 緒 言

II. 対照並びに測定方法

III. D-thyroxine の血清脂質低下作用

IV. acetyl T₃-formic acid の血清脂質低下作用

V. 考按並びに総括

1. 血清脂質低下作用

1). D-thyroxine

2). acetyl T₃-formic acid

2. 心臓に対する作用

3. PBI の変化

4. 甲状腺 I¹³¹ 摂取率抑制効果

VI. 結 論

は じ め に

1915年, Kendall⁽¹⁾ による 3:5:3':5'-L-tetraiodothyronine 即ち L-thyroxine (L-T₄) の発見後, 長い間 thyroid hormone の研究は暗中模索の状態であつたが, 1950年 Gross and Pitt-Rivers⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ によつて 3:5:3'-L-triiodothyronine (L-T₃) が分離されたことによつて, 甲状腺 hormone の系統的研究の道が開かれた。

上記の天然に存在する hormone に対し, 1952年 Hattington and Pitt-Rivers⁽⁵⁾ によつて, 3:5:3':5'-tetraiodothyroacetic acid (tetrac) が, 次いで1953年 Pitt-Rivers⁽⁶⁾ により 3:5:3'-triiodothyroacetic acid (triac) が合成されて以来, thyroxine analogues の研究が大きく注目されるようになった。

一方1800年代の末期に、偶然甲状腺摘出動物に動脈硬化症の発生することが見出され、Hurxthal⁸⁹⁾及びAdlersberg⁹⁾等も家兎で甲状腺を摘出すると、血清 cholesterol が著しく上昇することを認めている。又犬では cholesterol 飼育のみでは atherosclerosis を起すことは困難といわれているが Thiouracil⁷⁴⁾や I^{131} で甲状腺機能を低下させると atherosclerosis を容易に発生させることが知られている。

人に於ても、甲状腺機能低下症患者で血中 cholesterol 及び phospholipids の高値をみることは周知の事実であり²⁸⁾²⁹⁾³¹⁾⁵⁹⁾、動脈硬化症の患者では、それのない者よりも甲状腺機能が低下の傾向にあることも指摘されており¹⁸⁾、更に甲状腺機能亢進症では血清脂質の低下傾向が認められている⁵¹⁾⁵⁹⁾⁶⁰⁾。

以上のことから、甲状腺が動脈硬化ならびに脂質代謝に大きな役割を有していることが推察される。

動脈硬化症は元来、老化の一現象として避けがたいものと考えられてきた。しかし現在、動脈硬化症の中少なくとも atherosclerosis は、多分その多くを脂質代謝異常にもとづくものであらうとの意見が支配的で、これを是正しようとする試みが実際的な問題となつてきつつある。この場合、大動脈壁中の脂質は血管壁の代謝異常にその原因を求める意見もあるが、atherosclerosis の大動脈の内膜には、正常の260倍にも達する cholesterol ester が含まれており⁶⁸⁾、局所の代謝異常のみからは説明されないといわれている。従つて現在では、やはり atherosclerosis は全身的脂質代謝異常に基づき、過剰な脂質が浸透して内膜に、又は栄養血管を通じて中膜に蓄積されて起るといふ濾過説⁶⁹⁾が支配的である。そして phospholipids に対して cholesterol の相対的な上昇(C/P比の上昇)は、cholesterol の不安定化をきたし、内膜への沈着を促進する²⁾という。最近 Field ら²³⁾は C^{14} を用いて、人の動脈壁に存在する cholesterol の多くは血中より移行したものであることを証明している。

従つて、近年この脂質代謝異常に対して治療的意味がもたれるようになった。もちろん動脈硬化症の発生は単一の原因に由来するものではなく、種々の機転が複雑に働いているであろうことは想像にかたくない。

以上述べてきた関係より、第1編に於て、主として thyroxine analogues の脂質代謝に及ぼす効果について比較検討を試み、第2編に於ては臨床的应用について記載する。

尚この成績は第8回及び第9回日本内分泌学会東部々会総会、並びに第3回日本老年医学会総会に於て発表したものである。

使用した analogues は L-triiodothyronine 及び T_3 -formic acid group を武田薬品より、D-thyroxine を Travenol Laboratories、D-triiodothyronine を Smith-Kline & French Laboratories 及び T_3 -propionic acid を Warner-Lambert Research Institute—小野薬品より供与をうけた。

第1編 Thyroxine analogues の甲状腺機能低下症に於ける代謝効果

特に諸作用の解離についての考察

I. 緒 言

一般に thyroxine analogues はいくつかの作用を有し、それぞれの生物学的力価の検定には次のような方法が用いられている⁴³⁾。

1. オタマジャクシの変体促進⁵³⁾
2. Thiouracil 投与によつて生ずる甲状腺腫を予防する作用⁷³⁾
3. 小動物の酸素消費を促進させる作用⁷³⁾
4. ラットの甲状腺 I^{131} 摂取率を抑制する効果⁵⁴⁾
5. 移植可能なマウス下垂体腫瘍発育抑制効果⁴⁵⁾

以上の他に臨床的な力価検定として次の如きものがある。

6. 粘液水腫の BMR を上昇させる作用
7. 血清脂質を低下せしめる作用⁴⁸⁾⁵⁰⁾⁵⁶⁾

そして thyroxine analogue のこれらの力価は必ずしも平行するものでなく⁴²⁾⁵⁶⁾⁶²⁾⁷⁰⁾、動物実験及び臨床

的にも BMR を上昇させる作用と血清脂質を下げる作用とは平行しないことが知られている¹¹⁾¹²⁾⁸⁸⁾⁴⁸⁾⁶⁶⁾⁷¹⁾.

Peters⁶⁰⁾は既に1950年に、甲状腺機能低下症患者が乾燥甲状腺で治療された際に、他の指標よりも血清 cholesterol が速かに反応し、BMR に先立って正常に戻るであろうと述べている。Boyd and Oliver¹¹⁾ は一定条件下の実験で12種の analogues について、antigoitrogenic 酸素消費量の増加、心搏数及び心重量の増加並びに血清及び肝の cholesterol の低下を観察し、これらの方法のいずれに於ても、それぞれの analogues の dose-response curve が平行しないことを記載している。

このような thyroxine analogues の“作用の解離”が、本来の甲状腺 hormone である L-thyroxine 及び L-triiodothyronine についてもみることができるか否かを検討した報告は少ない。従つて本研究に於てはその点を明らかにし、更に数種の analogues について、解離の程度の比較検討を試みた。

II. 対照並びに測定方法

新潟大学西川内科に入院し、諸種機能検査により確かめられた甲状腺機能低下症患者が選ばれた。

測定方法としては、BMR は Roth 法、PBI は Barker のアルカリ灰化法⁴⁾、甲状腺 I^{131} 摂取率は科研製 scintillation-counter で24時間値が求められ、cholesterol は Schoenheimer-Sperry⁶⁹⁾法、phospholipids 及び 磷は Fiske-Subbarow 法²⁴⁾、lipoprotein は濾紙電気泳動法⁸¹⁾により、尿酸は Folin 法²⁵⁾によつて測定された。

III. 臨床結果

甲状腺機能低下症患者に L-thyroxine, L-triiodothyronine, D-triiodothyronine 及び T_3 -formic acid group の4種を、漸増法によつて微量より投与し、機能低下に対する治療効果及び血清脂質低下作用とを観察し、両作用の分離について検討し、更に一部の症例で尿酸及び磷代謝に及ぼす影響について検索した。

I. L-thyroxine (L- T_4) の効果

症例 N. Y. (Fig. 1) では、L-thyroxine を微量より漸増的に経口投与された。治療前値の平均は、血清 cholesterol 310mg/100ml, phospholipids 250mg/100ml, BMR-34%, PBI は1.4mcg/100ml 及び甲状腺 I^{131} 摂取率 0% であつた。

L-thyroxine 1日25mcg の投与で血清 cholesterol はわずかな変化をみたが、100 mcg以下の投与では有意な低下はみられなかつた。しかし1日200mcg の投与で、血清 cholesterol は233mg/100ml と治療前値に比べて25%の減少をきたした。血清 phospholipids も大体 cholesterol に一致した態度を示した。BMR に対しては、L-thyroxine 100mcg 以下でもわずかな漸増傾向が認められ、200mcg の投与で-19%を示し、400mcg では-9~-1%と上昇した。BMR の上昇に従つて一般症状の改善も認められた。

血清 cholesterol と BMR との関係をみると、投与量の増加に一致して、両者はほぼ同程度の態度を示しているように思われ、両作用の間には有意な解離傾向は認められなかつた。

PBI は投与中止時6.0mcg/100mlと BMR

Fig. 1. Effects of L-Thyroxine (L- T_4)
Idiopathic Myxedema N.Y. 44 F

の正常になるに一致して正常値に復した。

2. 3 : 5 : 3'-L-triiodothyronine (L-T₃) の効果

症例 M. S. (Fig. 2) は幼時より甲状腺機能低下症状を示し, cretinism として治療を受けていたが, 服薬の不規則により症状の増悪をみたので一時投薬を中止して, L-triiodothyronine を微量より投与した。服薬中止後33日で BMR は-26%乃至-30%, PBI は1.2mcg/100ml 及び I¹³¹摂取率は2.6%を示し, 血清 cholesterol は285mg/100ml であった。この症例で血清 cholesterol 低下作用は, 1 日約 10mcg の L-triiodothyronine の投与で現われ, 15mcg 投与終了時には214mg/100ml と25%の減少をみた。BMR は 10mcg の投与で軽度の変化をみたにすぎず, 15mcgの投与でも-15%を越えることなく, BMR の変化に対して cholesterol の低下作用が若干強いようであるが, はつきりしたものではない。これについては, 症例 Y. K. (Fig. 3) でも確かめられた。この症例では L-thyroxine に引き続いて L-triiodothyronine が投与された。やはり1日100mcg 以下の L-thyroxine では, 血清 cholesterol に有意な変化がみられず, BMR は-45%より-25%と軽度上昇した。ここで BMR を上昇させない程度の L-triiodothyronine 1日12.5mcg 投与に切り換えた所 BMR は-20%以下に維持できたにもかかわらず, 血清 cholesterol は急速に低下をきたした。

従つて前症例及び本症例より10乃至12.5 mcg 程度の L-triiodothyronine で, BMR 上昇作用と cholesterol 低下作用との間に軽度の解離傾向が認められたが, 血清 cholesterol の低下は両症例とも, この程度の投与量では持続できなかつた。25mcg で BMR は著明に上昇した。

前記2症例で L-triiodothyronine 投与によつて PBI の上昇はみられなかつた。

3. 3 : 5 : 3'-D-triiodothyronine (D-T₃) の効果

症例 S. I. (Fig. 4) では D-triiodothyronine を1日0.2mgより0.6mgまで投与された。血清 cholesterol は0.2mgの投与で既に262mg/100mlより211mg/100mlまで低下し, 0.4mgで176mg/100ml, 0.6mg

Fig. 2. Effects of L-Triiodo-thyronine (L-T₃)
Cretinism M.S. 27 F

Fig. 3. Effects of L-T₄ & L-T₃
Idiopathic Myxedema Y.K. 17 F

投与終了時には164mg/100ml と 37.4%の減少をきたした. phospholipids も cholesterol にほぼ平行して 207mg/100ml より 122mg/100mlに低下した.

それに反して BMR では, この投与量で殆んど変化はみられなかつた. PBI は D-triiodothyronine 投与開始の17日前まで T_3 -formic acid が投与されていたために, 治療開始時 23mcg/100ml であったが, 投薬中減少を示し, 投与中止時 8.2mcg/100ml であった. 従つて少なくともこの程度の D-triiodothyronine の投与では, 著明な PBI の上昇はないものと思われる.

4. 3 : 5 : 3'-triiodothyroformic acid group (T_3 -formic acid group) の効果

Fig. 5 に示される T_3 -formic acid ; acetyl T_3 -formic acid ; T_3 -formic acid, methyl ester 及び T_3 -formic acid, amide の4種が使用された.

a. Triiodothyroformic acid (T_3 -formic acid)

Fig. 4. Effects of D- T_3

Idiopathic Myxedema S.I. 33 F

Fig. 5 T_3 -Formic Acid Group

T_3 -Formic acid

Acetyl T_3 -Formic acid

T_3 -Formic acid, amide

T_3 -Formic acid, methyl ester

症例 S. I. (Fig. 6) に T_3 -formic acid を1日 4 mg, 50mg 及び 100mg と12日間投与された. 血清 cholesterol の低下作用は, 既に 4 mg の投与で認められた. 治療前272mg/100ml の血清 cholesterol は50 mg の投与で200mg/100ml と 26.7%の低下を示し, 100mg の投与で155mg/100ml と 26.7%の低下をきたした. それに対して BMR は100mg の投与でも -29%から -21%に上昇したにすぎなかつた. PBI は投与量の増加につれて著明に上昇し100mg の投与では160mcg/100ml と異常な高値を示した.

b. Acetyl triiodothyroformic acid (acetyl T_3 -formic acid)

症例 H. O. (Fig. 7) は acetyl T_3 -formic acid を1日10mg より100mg まで漸増的に38日間投与された. 血清 cholesterol は投薬前279mg/100ml あつたが, 10mg の投与で204mg/100ml と 26.9%の減少を

きたし、増量に従つて血清 cholesterol の低下も著明となり、30mg 投与で154mg/100ml と55.2%の低下を示した。

それに対して BMR の変化はごく軽度で、治療前-21%であつたものが30mg 以下の投与では、-15%を越えることがなく、50mgの投与で-10.8%，100mgでは-6.5乃至+6.3%を示し、BMR の上昇に一致して臨床所見の改善が認められた。PBI は投与量の増加に一致して高値を示し、100mg投与終了時では146mcg/100ml と著明に上昇した。

症例 I. S. (Fig. 8) にも acetyl T₃-formic acid が投与された。この症例では最初500mg の acetyl T₃-formic acid を3回に分けて1日のみ投与され、その後臨床効果の消失を待つて、1回投与の18日後より連続投与が行なわれた。

投与前の各検査成績は、血清 cholesterol 321.3mg/100ml, phospholipids 262.0mg/100ml, lipoprotein 比 (β/α) 4.23, 血清尿酸値3.76mg/100ml, 尿中尿酸排泄量は7日の平均で181.9mg/day, 燐の balance test ではやはり7日の平均で +127.4mg/day, PBI 2.2mcg/100ml, BMR-18.5% 及び I¹³¹摂取率は1%であつた。

500mg 1回投与後の血清脂質は著明に低下し、phospholipids は3日目に最低を示し211mg/100ml と19.5%の低下、血清 cholesterol はそれに遅れて8日目に196mg/100ml と最高39.0%の減少をみた、lipoprotein 比も8日目に最低値を示した。血中尿酸値も投与2日後に減少をきたし、2.66mg/100ml となり、尿中尿酸排泄量も8日間の平均で238.8mg/day と増加が認められた。又 BMR もこの投与量では翌日より影響が現われ、2日後には-9%に上昇し、PBI は投与翌日より最高値を示した。

連続投与に於ては、所見はほぼ症例 H. O. でみられたと同様で、血清 cholesterol は1日20mgの投与で229mg/100ml と28.7%の低下をきたし、80mg では167mg/100ml と48.6%の減少がみられた。phospho-

Fig. 6. Idiopathic Myxedema S.I. 33 F

Fig. 7. Post-I¹³¹ Myxedema H.O. 31 F

lipids はやはり80mgで183mg/100mlと最低値を示し、C/P比も1.23より0.91と低下した。更に血中尿酸も投与中に3.00乃至3.20mg/100mlと低下傾向を示し、燐のbalance testでも投与後22日間の平均で-3.6mg/dayと軽度の排泄増加傾向もみられた。一方BMRでは1日40mg以下の投与では目立つ上昇は認められず、80mgの投与で-10乃至+5%と正常化がみられた。PBIはやはり投与量の増加につれて著明な高値を示し、80mgの投与で169mcg/100mlに上昇した。

症例 T. I. (Fig. 9) では、やはり acetyl T_3 -formic acid が投与された。acetyl T_3 -formic acid 400mg を1日3回に分けて投与すると、phospholipids はやはり cholesterol の低下に先き立つて最低を示し、255.8mg/100mlより218mg/100mlと低下した。血清 cholesterol も治療前の平均は298.8mg/100mlであつたが、投与4日目に262mg/100mlと12.3%の減少をきたした。この症例に於ては400mgの1回投与でBMRには影響がみられず、PBIは投与翌日397mcg/100mlと著明に上昇した。又燐のbalance testで投与前5日の平均は+184mg/dayであつたが、投与後11日の平均で-32.3mg/dayと負のbalanceを示すようになり、特に投与翌日の総燐排泄量は2283mg/dayと著明な増加がみられた。殊に尿中への排泄が著明であつた。

c. Triiodothyroformic acid, methyl ester (T_3 -formic acid, methyl ester)

症例 H. T. (Fig. 10) では T_3 -formic acid, methyl ester が投与された。最初200mgを3回に分けて1日のみ投与され、その7日後より連続投与が行なわれた。治療前の検査成績は、血清 cholesterol 292.5mg/100ml, phospholipids 240.5mg/100ml, lipoprotein 比5.79, 血中尿酸値4.40mg/100ml, 8日間平均の尿中尿酸排泄量は666.5mg/day, 燐のbalance testで前値の平均は+254.0mg/day, BMRは-23.1%, PBIが2.2mcg/100mlで、甲状腺 I^{131} 摂取率は0%であつた。

1回投与で血清脂質は投与当日すでに低下傾向が認められた。(Fig. 10に於て1回投与後の第1点は、当日の午後4時の採血による値である。) 血清 phospholipids は、このものでも cholesterol に先き立つて投与翌日199mg/100mlと最低となり、lipoprotein 比も翌日に最低を示した。血清 cholesterol は投与3日後に224mg/100mlと25%の減少がみられた。この症例で200mgの1回投与では血中尿酸、尿中尿酸排泄及び燐のbalance testに著明な変動は認められなかつた。BMRでは投与後わずかな動揺があつたが、特に上昇傾向は認められず、又PBIは投与当日既に37mcg/100mlと最高値を示した。

連続投与では血清 cholesterol は漸次低下傾向を示し、50mg投与で222mg/100mlと26%の減少をきたし、100mg投与時216mg/100mlとなつた。一方BMRに対しては100mg投与で1回-6.3%を示した以外は、

Fig. 8. Idiopathic Myxedema I.S. 59 F

Fig. 9. Post- I^{131} Myxedema T.I. 16 F

-18%を越えることなく、この投与量以下では殆んど BMR に影響ないものと考えられた。又血中尿酸値及び尿中尿酸排泄には特に著変はみられなかつたが、磷の balance test では連続投与の29日間の平均で -53.9mg/day と磷排泄の増加傾向が認められた。PBI は投与量の増加に従つて著明に上昇し、投与中止時 119mcg/100ml であつた。

d. Triiodothyroformic acid, amide (T_3 -formic acid, amide)

症例 T. M. (Fig. 11) には T_3 -formic acid の amide の形のを20mg まで投与された。血清 cholesterol は1日5mg の投与で273mg/100mlより233mg/100mlに低下し、10mgの投与では208mg/100ml, 20mgで196mg/100mlと28%の減少がみられた。phospholipids も cholesterol に平行して低下傾向を示し、20mg投与では210mg/100mlより157mg/100mlに低下した。これに対して BMR は1日20mg以下の投与では-22%を越えることがなかつた。PBI は投与終了時36mcg/100ml に上昇した。

e. T_3 -formic acid groupの血中消失速度

T_3 -formic acid group の各々について、血中よりの消失速度を、投薬中止後の PBI の減衰より半減期として求めると、Fig. 12にみられる如く、投薬中止後の日数に対して、PBI の変動を対数グラフ上にとれば、ほぼ直線的な減衰を示し、その半減期は、 T_3 -formic acid で2.9日、acetyl T_3 -formic acid では2.0乃至2.4日、 T_3 -formic acid, methyl ester は4.5日であつたが、amide の形のものでは少し長くて8.8日であつた。

IV. 考按並びに総括

以前より、甲状腺と脂質代謝との関係は、臨床的及び実験的に確かめられ²⁸⁾³⁹⁾⁵²⁾⁵³⁾⁵⁹⁾⁶⁰⁾、又甲状腺機能低下症患者を甲状腺末或は L-thyroxine や L-triiodothyronine 等で治療することにより、BMR 及び臨床症状の改善に従つて血清脂質も改善されることは、文献的にも³⁾²⁷⁾、臨床事実からも明らかである。更に tet-

Fig.10. Post- I^{131} Myxedema H.T. 36 M

Fig.11. Idiopathic Myxedema T.M. 40 F

rac, triac の合成以来, これらの thyroxine analogues の血清脂質に対する作用が注目され, これら analogues の或るものは calorigenic activity に対して比較的強い血清脂質低下作用のあることが報告されている。

1. L-thyroxine 及び L-triiodothyronine の作用の解離について

しかし本来の hormone である L-thyroxine 及び L-triiodothyronine に於て, この calorigenic な作用と血清脂質に対する作用とが, はたして平行的なものであるか否かを検討した報告は少なく, 最近 Lerman⁴⁸⁾ は乾燥甲状腺末を粘液水腫に投与し, その血清脂質低下作用及び BMR 上昇作用は投与量に比例して変化し, 直線関係を示すのに反し, triac では直線関係が成り立たないことを報告しているにすぎない。

ここで L-thyroxine, L-triiodothyronine 及び acetyl T₃-formic acid について, 粘液水腫患者の血清 cholesterol を治療前の25%低下させることのできる誘導体の量を対比させてとり “BMR の上昇率 (たとえば-30%の BMR が-15%になった場合を50%の上昇率とみなす)” と比較すると, Fig.13の如く, 本来の甲状腺 hormone である L-thyroxine 及び L-triiodothyronine では, 血清 cholesterol を25%低下させるような薬量範囲で直線関係が得られ, この範囲内で BMR は50%の上昇率がみられた。この点より L-thyroxine 及び L-triiodothyronine では BMR 又は cholesterol に対する作用の間に著明な解離傾向は認められなかった。但し L-triiodothyronine も 10mcg 以下では BMR に影響を与えずに cholesterol の低下傾

向を認めた報告⁴⁰⁾もあり、本観察でも 10 mcg でその傾向がうかがわれた。

粘液水腫患者に L-thyroxine を投与した場合、血清 cholesterol は正常にまで低下しうが、その時には BMR 及び臨床症状も又正常となる³⁶⁾という。L-thyroxine 及び L-triiodothyronine の作用は BMR や cholesterol のみならず、窒素代謝、磷代謝等に対しても効果を有し、しかも効果発現の速さ及び効果の大きさに於て異なるのみで、質的差異はないといわれ^{37,63)}、いずれにしてもこの両者で BMR は上昇作用と血清 cholesterol 低下作用との間に著明な解離傾向は認められない⁶⁷⁾。

これに対して acetyl T₃-formic acid は大量ではほぼ直線関係が得られるが、投与量の増加に比して BMR の変化が少なく血清 cholesterol を 25% 低下させる程度の投与量以下即ち 20mg 以下では、直線関係は得られず、BMR には殆んど影響ないが、ごくわずかであつた。即ち acetyl T₃-formic acid では比較的少量の投与で、BMR に変化を与えずに血清 cholesterol の低下作用が認められた。

このことから、各種 analogues について BMR の 50% 上昇率をきたす薬量、及び血清 cholesterol を治療前の値より 25% 低下させるに要する薬量とをみると Table 1 の如くである。

2. Thyroxine analogues の BMR 上昇作用

L-thyroxine では BMR の 50% 上昇率をきたすのに 1 日約 100 乃至 200mcg を必要とし、これを 100% とし

て各々の比較的活性度をみると、Table 1 でみられるように、D-thyroxine は BMR に対して L-thyroxine の 3 乃至 10% の力価を有する。これは粘液水腫患者に於ける他の報告の 2~10%^{37,10)}に一致する。

L-triiodothyronine は粘液水腫患者の BMR に対しては L-thyroxine の 400~800%^{37,38)}といわれているが、本研究に於ては 400~1300% である。

D-triiodothyronine, tetrac 及び triac については、それぞれ 17~33% より大、2.5~6.7% 及び 3.3~10%

Fig. 12. PBI-T1/2 of Thyroxine Analogue

Fig. 13. Percentage Change of BMR in Myxedematous Patients Receiving Graded Dosage of Analogues

cholesterol を 25% 低下させるに要する薬量を
----線内に対比させて示してある

Table 1. Approximate Minimal Daily Dose of Thyroactive Compounds Required to Reduce Serum Cholesterol & Raise BMR in Hypothyroid Patients

Thyroactive Compound	50% Increase in BMR		25% Depression in Serum Cholesterol		BMR/Chol.
	Dose	Relative Potency	Dose	Relative Potency	Ratio
L-T ₄	100-200 mcg	100	200-400 mcg	100	0.25-1
D-T ₄	2-3 mg ^a	3-10	under 1-2 mg ^a	> 10-40	> 1-3
L-T ₃	15-25 mcg	<400-1300	10-25 mcg	800-4000	0.6-2.5
D-T ₃	over 600 mcg	<17-33	400 mcg	50-100	> 1.5
Tetrac	3-4 mg ^a	2.5-6.7	2-4 mg ^a	5.0-20	0.75-2
Triac	2-3 mg ^a	3.3-10	1-2 mg ^a	10-40	1-3
(T ₃ -Formic)	over 100 mg	≪ 0.1-0.2	50 mg	0.4-0.8	? ≧ 2
50-75 mg	0.1-0.4	10-20 mg	1-4	2.5-7.5
over 20 mg (no change)	≪ 0.5-1	20 mg	1-2	? ≧ 1
over 100 mg	≪ 0.1-0.2	50 mg	0.4-0.8	? ≧ 2
(T ₃ -Prop.)	under 2 mg ^a		under 2 mg ^a		

a : 田村⁸²⁾によると他の報告⁸³⁾⁸⁰⁾にほぼ一致する。

現在までの所, T₃-formic acid group の粘液水腫患者に対する効果についての報告は見受けられない。T₃-formic acid は rat で BMR 上昇作用はない⁸⁰⁾といわれていたが, 粘液水腫患者に対しては BMR 上昇作用が認められた。しかしその作用は極めて弱く, BMR の50%上昇率をきたすには, acetyl T₃-formic

acid で1日50~75mgを必要とし、L-thyroxine の0.1~0.4%の作用しか有しない。T₃-formic acid 及び T₃-formic acid, methyl ester では、それぞれ100mgまで使用されたが、BMR は50%の上昇率をきたさなかつた。しかし T₃-formic acid 100mg の投与で BMR は-29%より-21.3%とわずかな上昇を示し、T₃-formic acid, methyl ester でも-23%より-18%とわずかな上昇傾向が認められた。T₃-formic acid, amide は20mgまで投与されたが BMR には変動がみられなかつた。従つて T₃-formic acid ; T₃-formic acid, amide 及び methyl ester は BMR に対して、L-thyroxine のそれぞれ0.1~0.2%, 0.5~1%及び0.1~0.2%より更に小さな効果を有するに過ぎないと思われる。

一般に thyroxine analogues の作用はいかなる assay に於ても、一つの compound group についてみると、3:5:3'-triiodo-analogues, 3:5:3':5'-tetraiodo-analogues 及び 3:5-diiodo-analogues の順に活性度が弱くなり¹¹⁾²⁰⁾²²⁾⁷²⁾、D-isomer は L-isomer よりも弱い¹¹⁾¹⁸⁾とされ、又 amino acid side chain を propionic acid, acetic acid 及び formic acid におきかえると、やはりこの順に活性度が低下する¹⁸⁾といわれる。以上の傾向は Table 1 で粘液水腫に於ける BMR 並びに cholesterol に対する作用についても認められる。Formic acid group は rat の酸素消費量を増加させる作用は L-thyroxine の3%以下⁷³⁾で3:5:3':5'-tetraiodothyroformic acid (T₄-formic acid) は粘液水腫患者の BMR 上昇作用は L-thyroxine の0.12%⁸⁾であるという。

3. Thyroxine analogues の BMR 上昇作用と血清 cholesterol 低下作用との解離

L-thyroxine 及び L-triiodothyronine に関しては先に述べたが、Fig. 13にみられた如く acetyl T₃-formic acid では BMR 上昇作用と血清 cholesterol 低下作用との間に解離のあることは明らかである。この解離の程度は analogues により差があり、Table 1 に於て BMR の50%上昇率をきたす量と、cholesterol を25%低下させるに必要な投与量との比をみると、L-thyroxine では0.25~1、及び L-triiodothyronine では0.6~2.5であるのに対し、D-thyroxine は1~3より大きく、D-triiodothyronine では1.5より大で、acetyl T₃-formic acid は2.5~7.5並びに T₃-formic acid, T₃-formic acid, amide 及び methyl ester はそれぞれ2、1及び2より更に大きな値を示している。この値の大きいことは解離の程度の大きいことを示していることになる。D-thyroxine 及び T₃-formic acid group は cholesterol 低下作用の比較強い物質と考えられる。粘液水腫患者に BMR を上昇させない程度の投与量で、血清脂質又は Cholesterol を低下させることは triac³⁸⁾⁴⁰⁾⁴⁸⁾⁴⁹⁾⁸⁶⁾、Tetrac³⁸⁾⁴⁹⁾、T₃-propionipionic acid⁶⁾³⁸⁾⁶²⁾、D-thyroxine⁸⁾¹⁾⁷¹⁾⁸²⁾ 及び D-triiodothyronine¹²⁾¹⁷⁾についてはいくつかの報告がある。しかし tetrac 又は triac もやはり BMR に対して影響が現われやすく⁶⁶⁾、Table 1 に於ても D-thyroxine や T₃-formic acid group よりも、BMR に対していくらか大きな影響のあることが知られる。

T₄-formic acid については粘液水腫患者及び高 cholesterol 血症患者に投与された報告もあり、20mg まででは、BMR 及び cholesterol の両者に影響がない⁴⁸⁾といわれていたが、Boyd and Oliver¹²⁾¹²⁾ は、T₄-formic acid は粘液水腫患者では1日100mg、甲状腺機能正常者では200乃至300mg で血清 cholesterol の低下がみられ、この程度の投与量で BMR に変化がみられなかつたことを記載し、一方 Best and Duncan⁸⁾によれば、粘液水腫患者の BMR を正常とするのに1日220mg を必要とするといわれている。

T₃-formic acid group では、粘液水腫に於ける解離傾向についても報告はみられず、本研究で他の analogues に比して血清 cholesterol に対する作用が一層強いことは注目値する。

この thyroxine analogues による両作用の解離は動物に於ても認められている。D-thyroxine⁷⁾¹¹⁾¹⁸⁾¹⁸⁾、D-triiodothyronine¹¹⁾¹⁸⁾、D-diiodothyronine¹¹⁾¹⁸⁾、T₄-formic acid⁷⁾¹¹⁾¹⁸⁾¹⁸⁾²⁰⁾、T₃-formic acid⁷⁾¹⁸⁾²⁰⁾ 及び 3:5-diiodo-thyroacetic acid (diac)⁶⁵⁾⁶⁶⁾等は他の analogues に比べて、BMR 又は心臓に対する作用よりも血清及び肝 cholesterol に対する作用が強いといわれている。

このような analogues による作用の解離が、いかなる機序によるものかは、現在の所明らかではない。最近 I¹³¹標示の thyroxine analogues を使用し、生体内の分布を調べた実験から L-thyroxine 及び L-triiodothyronine は、血中、骨格筋及び脳に比較的高濃度に分配され、propionic acid group 及び acetic acid

group はそれらに比べて血中及び心筋に多く集まり、又血中よりの消失がおそい³⁷⁾。D-thyroxine は L-thyroxine に比べて肝や腎に多く集まり³⁸⁾、D-triiodothyronine も肝に多く集まる²¹⁾といわれ、従つて肝 cholesterol に強く作用するのかも知れないと想像されている。又血中 cholesterol は肝機能により調節される²⁹⁾といわれており、cholesterol 代謝には、組織への分布の相異が関与していると考えられる。又、かかる作用の分離は BMR と cholesterol に対する作用の間にもみられる現象ではない、rat の thiouracil 投与による甲状腺腫を同程度に抑制する量で比べると T₄-formic acid 及び T₃-formic acid は L-thyroxine よりも血中又は肝 cholesterol を低下させる作用の強いことが知られており³⁹⁾、甲状腺腫予防効果も酸素消費に対する効果と平行せず⁷⁹⁾、甲状腺 I¹³¹ 摂取率の抑制効果⁷⁰⁾も甲状腺腫予防やオタマジクションの変態に及ぼす効果とは一致する傾向なく、更に移植可能な下垂体腫瘍発生の抑制効果⁶²⁾も他の効果に平行しないといわれている。

4. Thyroxine analogues の磷及び尿酸代謝に及ぼす影響

乾燥甲状腺又は D・L-thyroxine の投与で、粘液水腫患者の尿中窒素排泄量の増加することは古くより知られており、ことに ammonia N, uric acid N 及び creatin N の排泄が増加する¹⁴⁾⁸⁰⁾。窒素代謝のみならず磷代謝に対しても L-thyroxine 及び L-triiodothyronine⁸¹⁾、tetrac 及び triac⁴⁰⁾⁸⁰⁾並びに T₃-propionic acid⁶⁾が効果を有すると考えられている。

一方痛風患者の約30%に甲状腺の機能低下が認められ⁴⁶⁾、又粘液水腫患者の或るものでは血清尿酸値高く、尿中尿酸の排泄が低下しているといわれ⁴⁷⁾、尿酸代謝と甲状腺機能との間に或る程度の関係がうかがわれる。粘液水腫患者の高尿酸血症は適当の乾燥甲状腺⁶³⁾、L-triiodothyronine⁴⁷⁾及び T₃-Propionic acid⁶⁾⁴⁷⁾の投与で低下が認められている。Fig. 8の症例 I. S. 及びFig.10の症例 H. T. では血清尿酸値は高値をとつておらず、T₃-formic acid, amide 投与例では血中尿酸値又は尿中尿酸排泄量に変動が認められなかつたが、acetyl T₃-formic acid 投与例では血中尿酸値は1回の大量投与及び連続投与でも低下傾向を示し、尿中尿酸排泄量も1回投与でわずかながら増加傾向を示した。

この尿酸代謝に対する効果は、Fig.14に示された痛風の1例 J. T. でも確かめられた。治療前の血清尿酸値は 10.4mg/100 mlと高値をとり、D-triiodothyronine を1日0.2乃至1.0mgを9日、その後は T₃-propionic acid を4mg 投与された。D-triiodothyronine の投与で尿中尿酸排泄増加と血中尿酸値の低下をきたし、T₃-propionic acid 投与でもその傾向が明らかで Benesid 投与に先立つて血中尿酸値は4.85mg/100ml と正常値を示し、3ヶ月以上にわたり低値を維持できた。

この尿中尿酸排泄増加及び血中尿酸値の低下は、analogues の投与により腎血流量が増し⁴⁷⁾、尿酸の clearance が増加するため⁶⁾といわれる。

磷の代謝については、Rawson⁶³⁾は磷の総排泄量の増加と共に血中磷値の上昇も認められたことから腎機能のみより説明されないとし、粘液水腫のいわゆる貯蔵蛋白は大

Fig.14. Effects of D-T₃ & T₃-Prop.
Gout J.T. 56 M

量の磷を含有しているか、或は phospholipids から遊離した磷が考えられると述べている。

一般に甲状腺機能低下で腎機能はいずれも低下を示し、thyroid hormone の投与で GFR 又は RPF よりも TmPAH の上昇が著明で、従つて thyroid hormone が腎に直接作用するものと考えられている²⁶⁾。

5. Thyroxine analogues の血中消失速度

Thyroxine analogues の血中よりの消失速度は、蛋白との結合能力⁶⁴⁾⁸⁴⁾及び脱ヨード化によつて支配されると考えられる。PBI 半減期は Benua, Leeper, Kumaoka and Rawson⁶⁾によれば、L-thyroxine では6.5日であり、L-triiodothyronine, triac 及び T₃-propionic acid は2乃至3日で、I¹³¹標示の L-thyroxine の半減期6乃至12日、L-triiodothyronine の2.5日⁶⁵⁾、及び Sterling⁷⁵⁾⁷⁶⁾の結果にほぼ一致するという。

T₃-formic acid 及び acetyl T₃-formic acid は凡そ L-triiodothyronine と同程度に速かに血中より消失し、T₃-formic acid, methyl ester はややおそく、amide の形のものでは L-thyroxine とほぼ同様の消失速度であつた。

V. 結 論

甲状腺機能低下症患者に L-thyroxine, L-triiodothyronine, D-triiodothyronine 及び T₃-formic acid group の4種を投与し、更に1例の痛風患者に D-triiodothyronine 及び T₃-propionic acid が投与された。

1. L-thyroxine 及び L-triiodothyronine では BMR 上昇作用と血清 cholesterol 低下作用との間に著明な解離傾向は認められなかつた。

2. D-triiodothyronine は L-thyroxine の17~33%の BMR 上昇作用を有している。

Acetyl T₃-formic acid は BMR に対しては、L-thyroxine の0.1~0.4%の効果しかなく、T₃-formic acid ; T₃-formic acid, amide ; 及び methyl ester は、それぞれ0.1~0.2%, 0.5~1%及び0.1~0.2%より更に小さな効果を有するに過ぎない。

3. D-triiodothyronine 及び T₃-formic acid group では BMR に対するよりも血清 cholesterol に対する効果が強力と思われる。中でも T₃-formic acid group でこの解離は著明であつた。

4. Acetyl T₃-formic acid で血中尿酸低下、尿中尿酸排泄増加及び磷の総排泄増加傾向が認められ、T₃-formic acid, amide でも磷の総排泄増加傾向が確かめられた。

更に1例の痛風患者で D-triiodothyronine 及び T₃-propionic acid の投与で血中尿酸低下と尿中尿酸排泄増加傾向が3ヶ月にわたり観察された。

5. PBI 半減期による血中よりの消失速度は、T₃-formic acid は2.9日、acetyl T₃-formic acid は2.0~2.4日、T₃-formic acid, amide では8.8日で、methyl ester は4.5日であつた。

第2編 甲状腺機能正常者に於ける D-thyroxine 及び acetyl

T₃-formic acid の血清脂質低下作用

I. 緒 言

Atherosclerosis の傾向にある人が、しばしば血中 cholesterol の上昇のあること¹⁹⁾が認められて以来、血中又は組織の cholesterol を下げるような物質を見出すことが重要視されてきた。

乾燥甲状腺や thyroxine 投与で甲状腺機能低下症又は機能正常者の上昇せる血中 cholesterol を下げることはできるが、全体の代謝に及ぼす影響のために、atherosclerosis の治療剤として臨床的に使用することはできない。

それで BMR, 発育等に影響を与えることなく、cholesterol を低下させうような thyroxine analogues を見出す努力がなされてきている。

臨床的に thyroxine analogues を高 cholesterol 患者に使用するには、次のような作用のないことが望

ましい。

- 1) Calorigenic effectの少ないこと
- 2) 発育に対しての作用がなく、又体重減少をきたさないこと。
- 3) 心臓に影響のないこと、もしくは狭心症を増悪させるような作用のないこと。
- 4) 効果に escape のないこと。

等である。

第1編の粘液性腫患者に於ける観察で、BMR 上昇作用に比べて、血清 cholesterol 低下作用の比較的強いと思われた D-thyroxine 及び acetyl T₃-formic acid を甲状腺機能正常の hypercholesterolemia の血清脂質を低下させる目的で使用した。本編においてはその結果をのべる。

II. 対照並びに測定方法

各々10例の甲状腺機能正常者に D-thyroxine 又は acetyl T₃-formic acid が投与された。D-thyroxine 投与例は全例入院患者であり、acetyl T₃-formic acid 投与例は2例を除き、入院で1乃至2ヶ月間観察され、その後外来で経過が追われた。測定方法は第1編に於けると同様である。

III. D-thyroxine の血清脂質低下作用

10例の甲状腺機能正常者に D-thyroxine を最初1日2mg、次いで4mgを3乃至6週間にわたり投与した。

Fig.15に示された症例 T. S. は、治療前の血清 cholesterol は248mg/100mlであつた。D-thyroxine 1日2mgの投与で cholesterol は6日目に229mg/100ml とわずかに低下したが、その後はかえつて上昇をきたし、14日目には283mg/100ml となつた。それで1日4mgに増量した所、血清 cholesterol は最低167mg/100mlと33%の減少をみたが、その後投与継続中に escape がみられ、治療前値にもどつた。血清 phospholipids も cholesterol とほぼ同様な態度を示した。BMR は治療前+10%で、2mgの投与で殆んど変化はなかつたが、4mgの投与で+30%と軽度上昇した。血清 PBI 値は3.4mcg/100mlより投与中止時には10.0mcg/100mlと軽度の上昇をきたし、甲状腺 I¹³¹ 摂取率は4.2%と著明に抑制された。この症例は冠不全の患者で時々胸痛を訴えていたが、投与後にも自覚的増悪はみられず、ECG で T_v5.6が一時増高を示したが投与継続中に又平低となつた。

Fig.16 I 及び II にみられるように D-thyroxine の投与された10例の甲状腺機能正常者では1日2mgを1乃至3週間投与された場合、血清 cholesterol は1例を除いて低下をみたが、その中5例に escape がみられた。次いで4mgを1乃至3週間投与すると、2mgで低下を示さなかつた症例及び escape をみた症例も、共に低下をきたしたが、中には殆んど変化のみられ

Fig.15 Coronary Failure T.S. 66 M

Fig. 16.

なかつたもの、或は 2 mg の投与で低下していたものが 4 mg でかえつて escape のみられた症例もあつた。4 mg で低下を示した 5 例の中 3 例にやはり 2 週前後で escape がみられた。

BMR 及び 血清 PBI 値については Fig. 17 I 及び II にみられるように、2 mg の投与では一過性に +40% を示した症例を除いては、BMR は軽度の上昇傾向を有するが目立つた変化はみられなかつた。4 mg では BMR の上昇傾向がみられ、一過性又は最終的に治療前より 20% 以上の上昇をきたした者が 3 例あつた。

Fig. 17.

PBI は漸次上昇傾向を示したが 2 mg では殆んど正常値を越えることなく、4 mg の投与では、3 週後にも尚正常範囲を示した 1 例を除いて、全例正常値以上となつたが、15mcg/100ml を越えなかつた。

Table 2. Metabolic & Cholesterol Reducing Effects of D-T₄ on Euthyroid Patients

Patient (Sex)	Control Cholesterol Level (mg/100ml)	Max. Change			Final Observation		
		Dose (mg)	Chol. Level (mg/100ml)	Chol. Change (%)	Chol. Change (%)	PBI (mcg/100ml)	BMR (%)
S. S. (M)	209	2	178	-14.6	-13.2	10.6	+20
M. M. (M)	343	4	200	-41.8	-10.8	7.6	+29
Y. I. (M)	250	4	163	-34.9	-7.6	13.1	+14
T. H. (M)	270	2	233	-13.8	+5.4	13.0	+19
M. T. (F)	226	2	127	-43.9	0	8.2	+32
T. S. (M)	248	4	167	-32.5	0	10.0	+31
M. I. (F)	199	4	144	-27.6	-27.6	8.4	+14
N. N. (F)	182	2	116	-36.2	+3.4	11.0	+15
K. H. (M)	189	4	163	-13.8	-13.6	7.5	-8
I. M. (F)	264	4	184	-30.2	-22.3	10.2	+20
Mean Change				-28.9	-8.6		

これを表示すると Table 2 の如く、全経過で血清 cholesterol が最高の変化を示した時の平均低下率は 28.9 % であるのに比べて、投薬終了時では 20% 以上の低下を示しているものは 2 例に過ぎず、平均低下率は 8.6 % で、このことから escape の存在がうかがわれた。8 例で測定された甲状腺 I¹³¹ 摂取率は D-thyroxine 2 乃至 4 mg の投与で著明に抑制され、Table 3 に示されたように、1 例を除いて 10% 以下となつた。

Table 3. Effects of D-T₄ on Thyroidal I¹³¹- Uptake of Euthyroid Patients

Patient (Sex)	Premedication	Post-medication	Days
S. S. (M)	17.5%	4.7%	27
M. S. (M)	16.0	1.9	27
Y. I. (M)	11.0	4.3	28
T. H. (M)	12.5	1.8	32
M. T. (F)	22.6	2.6	30
T. S. (M)	18.0	4.2	36
M. I. (F)	6.5	3.4	69
N. N. (F)	45.7	14.2	22
Average	18.7	4.6	

IV. Acetyl T₃-formic acid の血清脂質低下作用

5 例の甲状腺機能正常者に 28 乃至 90 日間、acetyl T₃-formic acid を漸増法により 1 日 25mg より 55 乃至 90 mg まで及び 5 例に初回より 1 日 60mg を 3 ケ月以上にわたり投与した。

Fig. 18 の症例 Y. O. には acetyl T₃-formic acid が漸増法により 1 日 25mg より 70mg まで 84 日間投与された。治療前の成績の平均値は、血清 cholesterol は 268.5mg/100ml, phospholipids 236mg/100ml, lipoprotein 比 3.95, BMR -11.0%, PBI 5.8mcg/100ml 及び甲状腺 I¹³¹ 摂取率は 18.0% であつた。

Fig. 18

最初1日25mgの投与で血清脂質は急速に低下を示し、投与4日目に cholesterol 204mg/100ml, phospholipid は183mg/100ml と著明な低下をみたが、両者はこの投与量の持続で上昇傾向がみられた。しかし増量することにより更に低下傾向を示し、cholesterol はほぼ200mg/100ml前後の値を維持できた。最高の低下は55mg投与時179mg/100mlと33.3%の低下を示した。最後の4週間の値を平均した最終観察時では27.5%の低下であった。Phospholipids は最終的には低下がそれ程著明ではなかったが、C/P比は1.14より1.00と低下がみられた。Lipoprotein 比も漸次低下をきたし、投与終了時1.97と正常値を示した。

BMR に対しては投与初期にわずかな変動がみられ、全体的に軽度上昇傾向が認められたが、最終観察時+3.5%であった。血清 PBI は投与量の増加に従って著明な上昇をきたし、投与終了時 160mcg/100ml にまで上昇し、甲状腺 I¹³¹摂取率は投与21日で2.0%と著明に抑制された。ECG では投与前後で特に変化はみられなかった。

Fig. 19の症例 Y.F. ではやはり漸増法により1日10mgより90mgまで投与された。血清 cholesterol は10mgの投与で249.0mg/100mlより226mg/100mlに、phospholipids は236mg/100mlより200mg/100mlに低下をきたしたが、その後20mgに増量しても上昇傾向がみられ、60mgの投与で更に治療前値以上の値を示し、90mgの投与でも低下をみなかった。Lipoprotein 比は治療前も正常範囲にあり、投与後も特に変化はみられなかった。BMR はわずかに上昇傾向が認められたが、+10%を越えず、ただ90mgの投与で一過性に+18%を示した。PBI は投与終了時131mcg/100ml と著明に上昇した。I¹³¹摂取率は21日で0%に抑制された。

Fig. 20の症例 T.K. は大動脈弁不全及び高度の左室肥大を有する動脈硬化性心疾患の患者である。Acetyl T₃-formic acid は25mgより60mg まで漸増的に77日間投与された。血清 cholesterol は1日25mgの投与により240mg/100mlより198mg/100 mlと急速な低下をきたした。35mg 投与中も殆んど200mg/100ml前後の値を維持していたが、35日以後に至り、43mgの投与にかかわらず、escape をきたし、治療前の値以上となった。60mgに増量した所、再度低下をきたし、投与終了時201mg/100mlであった。Phospholipids も cholesterol に一致した経過を示した。比較的 BMR 上昇作用の少ない acetyl T₃-formic acid でも、高度の心疾患を有する本症例では、やはり多少 calorigenic に働き、BMR は25mg の投与で一過性に+23.8%と上昇し、自覚的にも軽度的心悸亢進及び発汗を訴えた。しかし BMR は投与持続により間もなく治療前値にもどり、自覚的症状も消失した。更に60mgを投与した所、再度心悸亢進、発汗を訴え、BMR も+28.5

Fig.19.

%と増加し、2週後には+2%にもどつたが、投薬は万一の危険を考慮して中止された。PBI はやはり 202mcg/100ml と異常な高値を示した。ECG では投与前後でみるべき変化はみられなかつた。

以上漸増法により acetyl T_3 -formic acid を甲状腺機能正常者の血清脂質を低下させる目的で使用されたが、血清脂質は少量の投与で既に急速且つ著明な低下をきたすが、その持続を保ち得ず、投与量を増加しても escape をきたしやすいように思われた。一方 Strisower 等⁷⁷⁾⁷⁸⁾は、この escape は外因性の thyroid

hormone の投与で、下垂体よりの thyrotropin の分泌が低下し、徐々に内因性の thyroid hormone の分泌減少が起る。それで外因性 thyroid hormone の投与量が少ない場合は、循環血中の thyroid hormone 量が治療前に及ばず escape をみると仮定し、外因性の hormone を充分量に増すならば、甲状腺の hormone 分泌が完全に杜絶した場合でさえも、循環血中の thyroid hormone 量は治療前の1日生産量を上廻り、escape をみないであろうと考えた。それで195mgの乾燥甲状腺で escape がみられたが、1日260mg及び325mg以上では30週にわたり escape をみなかつたことを報告している。

この見解にもとづいて、1日60mgと比較的大量の acetyl T_3 -formic acid を初回より使用した。

Fig.20.

Fig. 21に示した症例 F.K. では初回より1日60mgの acetyl T₃-formic acid が投与され、160日以上にわたり観察された。治療前の検査成績の平均は、血清 cholesterol 251.5mg/100ml, phospholipids 223mg/100ml, C/P 比 1.15, lipoprotein 比 4.84, BMR -8.3%, PBI 4.8mcg/100ml であった。

Fig. 21.

Acetyl T₃-formic acid 1日60mg が投与されると血清脂質は速かに著明な低下をきたし、phospholipids は16日目に163mg/100ml, cholesterol は22日目に155mg/100mlと最低を示し、それぞれ27.9%及び38.4%の低下をみた。その後はいくらか上昇傾向がみられたが、160日の投与期間を通じて、cholesterol はよく200mg/100ml前後の値を維持し、最終観察では平均21.9%の低下がみられた。又C/P比も1.03に、lipoprotein 比も2.05に低下した。BMR は一過性に軽度の上昇が認められたが、+10%を越えることはなかった。PBI は投与後急速に上昇し、9日目に169mcg/100ml に達したが、その後同一量投与にもかかわらず漸次低下をきたした。しかし最終観察時47.3mcg/100ml であった。投与前後で ECG に変化はみられなかった。

症例 R. S. (Fig. 22) でもやはり初回より1日60mgの acetyl T₃-formic acid が、126日間にわたり投与された。治療前の検査成績では血清 cholesterol は平均282.5mg/100ml, phospholipids 244mg/100ml, C/P 比 1.16, lipoprotein 比 3.76, BMR -9.8%, PBI は 5.2mcg/100ml であった。

血清脂質の最大の低下は、やはり投与早期にみられ、2週間後で cholesterol は172mg/100mlと39.1%の減少、phospholipids は150mg/100mlと38.5%の低下をきたした。最終観察時の平均では、cholesterol は25.1%の低下をみており、phospholipids は7.0%の減少にすぎないが、C/P 比は0.96と低下し、lipoprotein 比も2.20となつた。BMR は前例と同様、投与初期に軽度の上昇がみられたが、その後治療前値にもどり、最終観察時では平均+1.6%であった。PBI は最高152mcg/100ml にまで上昇したが、最終観察では116mcg/100mlであった。投与前後の ECG では変化がみられず、Scheie IV 度の眼底所見も投与により改善はみられなかった。

10例の甲状腺機能正常者に acetyl T₃-formic acid を投与した結果を表示する。

Table 4 に於て、A表は漸増法で微量より投与され、B表では最初より1日60mgが投与された。

漸増法で投与された5例では、血清 cholesterol は最高の低下をきたした時で平均18.9%であるが、最終観察時の平均では+1.6%と殆んど治療前の値にまでもどり、症例 Y. O. のみが最終的にも27.5%の低下

Fig. 22.

Table 4. Metabolic & Cholesterol Reducing Effects of Acetyl T₃-Formic Acid on Euthyroid Patients

Patient (Sex)	Control Cholesterol Level (mg/100ml)	Max. Change			Final Observation			Dose $\left(\frac{\text{mg}}{\text{day}}\right)$	Dura- tion (days)
		Dose (mg)	Chol. Level (mg/100ml)	Chol. Change (%)	Chol. Change (%)	PBI (mcg/100ml)	BMR (%)		
A) Increased Doses									
T.M. (F)	235.0	25	216	- 8.1	- 2.2	71	+ 5.8	25-55	. 28
T.H. (M)	203.0	25	170	-16.3	+ 5.4	78	- 7.3	25-60	. 32
Y.F. (F)	249.0	60	201	-19.3	+33.0	131	+ 5.9	10-90	. 66
T.K. (M)	240.0	25	198	-17.5	- 0.7	202	+10.8	25-60	. 72
Y.O. (M)	268.5	55	179	-33.3	-27.5	160	- 3.5	25-70	. 90
				-18.9	+1.6				
B) Relatively Large Doses									
F.K. (F)	251.5	60	150	-38.4	-21.9	47	- 6.0	60	.156
R.S. (M)	282.5	60	172	-39.1	-25.1	116	+ 1.6	60	.125
J.T. (M)	305.0	60	188	-38.4	-22.3	118	- 6.7	60	. 91
K.I. (M)	275.0	60	175	-36.5	-23.8	66		60	. 99
M.K. (F)	273.5	100	188	-32.5	-13.1	252	+10.2	60-100	.105
				-37.0	-21.2				

を維持しているにすぎなかつた。

初回より1日60mgを投与されたB表では、cholesterolの最大の低下は平均37%と著明であり、最終観察時でも21.2%の低下を示している。このことから初回より比較的大量を投与した方がescapeを起しにく

いと思われる。

A表、B表共に最終的に PBI の上昇は著明であつた。BMR は全例正常値を越えなかつた。Table 5 は 7 例で測定された甲状腺 I^{131} 摂取率の抑制効果を示したものである。Acetyl T_3 -formic acid 投与14乃至28 日で I^{131} 摂取率は平均1.12%と著明な抑制がみられた。

Table 5. Effects of Acetyl T_3 -Formic Acid on Thyroidal I^{131} - Uptake of Euthyroid Patients

Patient (Sex)	Premedication	Post-medication	Days
T.M. (F)	34.5%	1.65%	18
T.H. (M)	13.8	2.08	25
Y.F. (F)	20.9	0	19
T.K. (M)	12.3	0.80	28
Y.O. (M)	18.0	2.02	21
M.K. (F)	10.9	1.04	13
S.N. (F)	21.5	0.20	14
Average	19.6	1.12	

V. 考按並びに総括

Thyroid hormone の充分量が甲状腺機能正常者に投与された場合でも、粘液水腫患者にみられたと同様に、やはり血清脂質の低下がみられることは広く知られている。

乾燥甲状腺⁷⁷⁾⁷⁸⁾, L-thyroxine⁸⁾¹⁰⁾⁸⁰⁾, L-triiodothyronine¹⁰⁾⁶⁷⁾の投与で、甲状腺機能正常者でも、total lipids, phospholipids, cholesterol 及び β -lipoprotein 又は Sf0-12, Sf12-20, lipoprotein の低下がみられている。しかしこれらの効果も比較的小量では長期の投与で escape をきたしやすく、又その低下を維持できる程度に増量すれば BMR の上昇、心搏数の増加、体重減少等の代謝亢進の症状をきたし、又冠不全の患者では、狭心症の頻発がみられるといわれ、脂質降下剤としては不適である。

Triac⁵⁷⁾⁸⁴⁾ 又は T_3 -propionic acid⁵⁾⁶²⁾⁸²⁾ を甲状腺機能正常者に投与しても、ほぼ同様であるが、このものでは BMR の上昇の程度は、L-thyroxine や L-triiodothyronine の場合よりも軽度のような。

1. 血清脂質低下作用

1) D-thyroxine

既に第1編で述べた如く、D-thyroxine は粘液水腫患者⁷¹⁾⁸¹⁾及び動物⁷⁾¹⁸⁾¹⁸⁾で BMR を上昇させない程度の投与量で、血清又は肝 cholesterol を低下させることが知られている。更に最近、甲状腺機能正常者で、BMR 又は ECG に変化を与えることなく、長期にわたり血清 cholesterol を低下させたとという報告は多い⁸⁾¹²⁾³¹⁾⁴¹⁾⁷²⁾。しかしこれらの報告では多くは1日4mg乃至16mgの投与であり、5mg以下では escape をきたしやすい⁸¹⁾といわれている。本編に於ける D-thyroxine 投与例では、4mgですでに BMR は上昇傾向を示し、又2mg及び4mgで escape の傾向が認められた。4mg投与でみられた BMR の上昇は上記報告者の結果と異なるが、これは恐らく日本人と外国人との体格的相異に帰せられるものと考えられる。

2) Acetyl T_3 -formic acid

Thyroxine 及び triiodothyronine の formic acid analogues は動物で酸素消費量又は心臓に対する作用よりも、血中及び肝の cholesterol に大きな効果を有するといわれ⁷⁾¹¹⁾¹⁸⁾²⁰⁾⁶⁶⁾, T_4 -formic acid は粘液水腫患者に投与された場合、BMR を上昇させない投与量で血中 cholesterol を低下させることが知られている⁸⁾¹²⁾¹³⁾。更に最近、甲状腺機能正常の高 cholesterol 患者に投与された場合でも、ほぼ満足すべき結果が報告されている⁸⁾¹²⁾¹⁶⁾。しかし未だ T_3 -formic acid group を甲状腺機能正常者に使用した報告はみうけら

れない。

Table 4 でみられた如く、漸増的に acetyl T₃-formic acid を投与した場合、比較的少量の投与で cholesterol の低下がみられたが、escape をきたしやすく、最終観察では治療前の値に戻る傾向がみられた。先に述べたように Strisower 等の見解にもとづき、初回より 60mg と比較的大量の投与を試みた所、投与初期に血中 cholesterol の最大の低下がみられたが、3 ヶ月以上の観察でも、よくその低下が維持された。そして血中 cholesterol は正常値を越えて低下することはなく、L-thyroxine で指摘された⁷⁹⁾如く、このものでも治療前の値の高い程低下は著明なようである。更に cholesterol の低下は、L-thyroxine、L-triiodothyronine 及び乾燥甲状腺投与でみられたと同様、phospholipids、 β -lipoprotein の低下を伴い、C/P 比も低下の傾向がみられた。従つて血中脂質全体に低下傾向を示すもののようである。よつて現在の段階では血中脂質降下剤として最も有用な thyroxine analogue と考えられる。

2. 心臓に対する作用

粘液水腫患者又は狭心症の既往のある患者に thyroid hormone を投与すると狭心症発作の増悪する場合のあることが知られている。

Oliver and Boyd⁸⁷⁾及び Ibbertson, Fraser and Alldis⁴⁰⁾は微量の triac を冠不全の患者に投与し BMR の上昇なしに血中 cholesterol の低下をみたが、しかし中には、BMR の変化なしに狭心症をきたす症例もあり、triac では心筋は骨骼筋、腎及び肝等より酸素消費量が增大する¹⁰⁾といわれている。又他の analogues についても BMR の上昇なしに狭心症をきたす可能性があると考えられている¹²⁾。

動物での実験でも tetrac 及び T₄-propionic acid は L-thyroxine より血中及び心筋に多く集まり⁸⁷⁾、又 D-thyroxine は心筋への集まりは少なく、心筋の酸素消費量の増加は L-thyroxine の方が多い⁸⁸⁾といわれる。そして rat で D-thyroxine、D-triiodothyronine、T₄-formic acid、T₃-formic acid 等は、心臓に対する作用が他のものに比べて少ない¹¹⁾¹⁸⁾とされている。人の粘液水腫患者でも L-thyroxine、乾燥甲状腺で治療中は狭心症が頻発していた症例で、D-thyroxine 投与により甲状腺機能正常となり、狭心症発作がみられなくなつたという報告⁷²⁾がある。臨床的にも D-thyroxine は他の analogues に比して狭心症をきたす作用は弱く¹²⁾、動脈硬化性心疾患の患者でも、1 日 4 mg 以下なら安全といわれている³¹⁾⁷²⁾。

Formic acid group については、最近 Best and Dancan⁸⁾は心疾患の患者に T₄-formic acid を 1 日 200 mg、又は dimethyl T₂-formic acid 100mg を投与し、狭心症又は心不全の悪化をみながつた。しかし Boyd and Oliver¹²⁾はやはり狭心症の既往のある者に、T₄-formic acid を投与し、1 日 200mg の投与では増悪はみられなかつたが、200~300mg を投与された 6 例の中 2 例に BMR の上昇と狭心症の悪化をみている。

Acetyl T₃-formic acid 投与の症例 T. K. については狭心症の発来はみられなかつたが、一過性の BMR 上昇と心愁訴があり、やはり心不全の症例では 60mg 以下の投与が安全と思われる。

しかし最近では更に積極的に、狭心症発作の頻発する症例に対して I¹³¹により人工的に甲状腺機能低下をきたさしめるとよいといわれ⁹⁾¹⁶⁾、後療法として、このような BMR 上昇作用の弱い analogue を投与することが、更に好結果をもたらすであろうと考えられる。

3. PBI の変化

Thyroxine analogues 投与による PBI の変化は、必ずしも反応の程度を示すものではなく、triac 投与により BMR がかなり上昇しているにもかかわらず、PBI の上昇はごくわずかな症例がある一方、他の症例で BMR は殆んど不変であるのに、PBI はかえつて上昇を示すことがあり、PBI と BMR は必ずしも平行しないといわれている⁵⁰⁾。このことは analogue の種類についても知られており、triac は tetrac よりも、及び D-thyroxine は L-thyroxine よりも PBI を上昇せしめる作用は弱い⁴⁴⁾。

甲状腺機能正常者に D-thyroxine 4mg を投与した場合 Table 2 にみられるように、PBI の上昇は軽度であつた。Acetyl T₃-formic acid を投与した場合はその増量に従つて PBI は著明な上昇をきたした。最初より 60mg を投与された症例では、PBI は急速又は比較的速かに著明な上昇をきたし、ほぼ 150mcg/100ml 以上の値を示したが、その後漸次下降し、投与 3 ヶ月以上で同一量の持続にもかかわらず 50乃至 100mcg/100ml

程度の値を維持した。この原因についての説明も現在の所不明である。正常者の場合 cholesterol 値の escape 現象と同様な意味を有するものかも知れない。

4. 甲状腺 I^{131} 摂取率抑制効果

D-thyroxine 及び acetyl T_3 -formic acid 投与後の甲状腺 I^{131} 摂取率は全例著明に抑制された。Analogues 投与による甲状腺 I^{131} 摂取率の抑制は、単なるヨードのためではなく、Greer²²⁾によれば、正常者に1日65mgの微量の乾燥甲状腺を3週間投与すると I^{131} 摂取率の著明な抑制がみられるが、それに含まれると同量のヨードを投与しても、その抑制は殆んどみられないが、ごくわずかなことが知られている。又、同じ triiodothyronine でも、3:5:3' の位置にヨードを有するものと3:5:5'に持つものでは、人に於ける抑制効果は、後者では前者の1/100より小さいといわれている⁷⁰⁾。従つて大量の thyroxine analogues による甲状腺機能の抑制は、その一部はヨードによる直接作用も否定できないが、下垂体を介して抑制されることが大きいものと考えられる⁶¹⁾。

D-thyroxine 及び T_3 -formic acid の rat に於ける I^{131} 摂取率抑制効果は、それぞれ L-thyroxine の50%及び15%であるという⁶⁴⁾。

VI. 結 論

甲状腺機能正常者各々10例に、D-thyroxine 又は acetyl T_3 -formic acid が投与された。

1) D-thyroxine 4mg の投与で、甲状腺機能正常者でも軽度の BMR 上昇傾向がみられた。血清 cholesterol に対しては4mg以下の投与で escape をきたしやすいと思われた。

2) D-thyroxine 4mg の投与では PBI の上昇は比較的軽度であつたが、甲状腺 I^{131} 摂取率は著明に抑制された。

3) Acetyl T_3 -formic acid を甲状腺機能正常者に投与した場合、1日25~60mgの投与で BMR の上昇はごくわずかであり、血清脂質全体に著明な低下をきたすが、漸増法で投与した場合は escape が起りやすいように思われる。

4) Acetyl T_3 -formic acid を最初より1日60mg 程度の比較的大量を投与した場合、BMR の上昇はごくわずかであり、血清 cholesterol は200mg/100ml 前後の値を3ヶ月以上にわたり持続しえた。従つて血中脂質降下剤として有用と思われた。

5) Acetyl T_3 -formic acid で、PBI は投与量の増加に従つて著明に上昇した。しかし同一量を長期にわたり継続した場合低下傾向を示したが、この理由は不明である。甲状腺 I^{131} 摂取率は著明に抑制された。

6) 1例の高度の心不全患者に1日60mgの acetyl T_3 -formic acid が投与され、BMR の軽度上昇と心愁訴が認められた。心疾患を有する症例では、60mg以下の投与が望ましいと思われる。

終るに当たり、終始御懇篤なる御指導及び御校閲をいただいた恩師西川光夫教授並びに熊岡爽一講師に深く感謝いたします。又御協力をいただいた研究室の諸先生に謝意を表します。

文 献

- 1) ADLERSBERG, D.: Am. J. Med., 23: 769~789, (1957).
- 2) AHRENS, E.H., JR. and H. G. KUNKEI: J. Exp. Med., 90: 409~424, (1949).
- 3) ASPER, S.P. JR., H.A. SELENKOW and C.A. PLAMONDON: Bull. Johns Hopkins Hosp., 93: 164~198, (1953).
- 4) BARKER, S.B., M. J. HUMPHREY and M.H. SOLEY: J. Clin. Invest., 30: 55~62, (1951).
- 5) BAUER, H.G., T.H. McGAVACK and L. SWELL: J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 19: 490~493, (1959).
- 6) BENUA, R.S., R.D. LEEPER, S. KUMAOKA and R.W. RAWSON: Ann. N.Y. Acad. Sci., 86: 563~581, (1960).
- 7) BEST, M.M. and C.H. DUNCAN: Am. J. Physiol., 199: 1000~1002, (1960).
- 8) BEST, M.M. and C.H. DUNCAN: Circulation. 24: 58~67, (1961).
- 9)

- BLUMGART, H.L., A.S. FLEEDBERG and G.S. KURLAND : J.A.M.A., 157 : 1~4, (1955).
- 10) BOYD, G.S. and M.F. OLIVER : Bull. Schweiz. Akad. Med. Wiss., 13 : 384~395, (1957).
- 11) BOYD, G.S. and M.F. OLIVER : J. Endocrinology, 21 : 25~32, (1960). 12) BOYD, G.S. and M.F. OLIVER : J. Endocrinology, 21 : 33~43, (1960). 13) BOYD, G.S. and M.F. OLIVER : Brit. Med. Bull., 16 : 138~142, (1960). 14) BROWN, E.F. and F.A. MORGAN : J. Nutrition, 35 : 439~452, (1948). 15) BRUGER, M. and J.A. ROSENKRANZ : J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 2 : 176~180, (1942). 16) CORDAY, E., D.W. IRVING and H. JAFFE : Circulation, 22 : 677, (1960). 17) CROSLLEY, A.P., JR., F. ALEXANDER and W.H. STRICKLAND : Symposium on Derivatives and Isomers of Thyroid Hormones, (1960), 55~60, Philadelphia.
- 18) CUTHBERTSON, W.F.J., P.V. ELCOATE, D.M. IRELAND, O.C.B. MILLS and P. SHEARLEY : J. Endocrinology, 21 : 45~68, (1960). 19) DAVIS, D., B. STERN and G. LESNICK : Ann. Int. Med., 11 : 354~369, (1937). 20) DUNCAN, C.H. and M.M. BEST : Endocrinology, 63 : 169~176, (1958). 21) DUNCAN, C.H. and M.M. BEST : Circulation, 22 : 660, (1960).
- 22) DYSON, A. and M.W.W. WOOD : Lancet, 2 : 757~759, (1956). 23) FIELD, H., JR., L. SWELL, P.E. SCHOOLS, JR., and C.R. TREADWELL : Circulation, 22 : 547~558, (1960).
- 24) FISKE, C.F. and Y. SUBBAROW : J. Biol. Chem., 66 : 375~400, (1925). 25) FOLIN, O. : J. Biol. Chem., 101 : 111~125, (1933). 26) FORD, R.V., J.C. OWENS, G.W. CURD, JR., J. H. MOYER and C.L. SPURR : J. Endocrinol. and Meta., 21 : 548~554, (1961). 27) FRAWLEY, T. E., J.C. McCLINTOCK, R.T. BEEBE and G.L. MARTHY : J.A.M.A., 160 : 646~652, (1956).
- 28) GILDEA, E.F., E.B. MAN and J.P. PETERS : J. Clin. Invest., 18 : 739~755, (1939). 29) GOULD, R.G. and R.P. COOK : Chap. 7 in : Cholesterol, edited by R.P. Cook. New York : Acad. Press, (1958). 30) GREEN, R. and H.E.A. FARRAN : Brit. Med. J., 11 : 1057~1060, (1958).
- 31) GREEN, R., J.F. PEARCE and D.F. RIDEOUT : Brit. Med. J., 1 : 1572~1575, (1961). 32) GREER, M.A. : New Engl. J. Med., 244 : 385~390, (1951). 33) GROSS, J. : Science, 111 : 105~108, (1950). 34) GROSS, J. and R. PITT-RIVERS : Lancet, 1 : 439~441, (1952).
- 35) HARRINGTON, C.R. and R. PITT-RIVERS : Biochem. J., 50 : 438~439, (1952). 36) HART, F.D. and N.F. MACLAGAN : Brit. Med. J., 1 : 512~518, (1950). 37) HATFIELD, W.B., F.F. DAVIDOFF, J.E. ROSS and D.F. TAPLEY : Endocrinology, 66 : 676~693, (1960).
- 38) HILL, S.R., JR., S.B. BARKER, J.H. McNEIL, J.O. TINGLEY and L.L. HIBBETT : J. Clin. Invest., 39 : 523~533, (1960). 39) HURXTHAL, L.M. : Arch. Int. Med., 53 : 762~781, (1934).
- 40) IBBERTSON, K., R. FRASER and D. ALLDIS : Brit. Med. J., 11 : 52~58, (1959). 41) JONES, R.J. : Symposium on Sodium D-Thyroxine, (1959), 71~74, Chicago. 42) KENDALL, E.C. : J. Biol. Chem., 20 : 501~509, (1915). 43) 熊岡爽一 : ホルモンと臨床, 8 : 291~296 (1960).
- 44) 熊岡爽一 : 内科, 5 : 421~430 (1960). 45) KUMAOKA, S., W.L. MONEY and R.W. RAWSON : Endocrinology, 66 : 32~38, (1960). 46) KUZELL, W.C., R.W. SCHAFFARZICK, W.E. NAUGLER, P. KOETS, E. A. MAKLE, B. BROWN and B. CHAMPLIN : J. Chronic Disease, 2 : 645~669, (1955). 47) LEEPER, R.D., R.S. BENUA, J.L. BRENER and R. W. RAWSON : J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 20 : 1457~1466, (1960). 48) LERMAN, J. : J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 21 : 1044~1053, (1961). 49) LERMAN, J. and R. PITT-RIVERS : J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 15 : 653~655, (1955). 50) LERMAN, J. and R. PITT-RIVERS : J. Clin. Endocrinol. and Metabol., 16 : 1470~1479, (1956). 51) MALMOROS, H. and B. SWAHN : Acta Med. Scand., 145 : 361~369, (1953). 52) MAN, E.B., E.F. GILDEA and J.P. PETERS : J. Clin. Invest., 19 : 43~59, (1940). 53) McGEE, L. G. : Am. Int. Med.,

- 9 : 728~738, (1935). 54) MONEY, W.L., R.I. MELTZER, D. FELDMAN and R.W. RAWSON : *Endocrinology*, 64 : 123~125, (1959). 55) MONEY, W.L., R.I. MELTZER, J. YOUNG and R.W. RAWSON : *Endocrinology*, 63 : 20~28, (1958). 56) MONEY, W.L., S. KUMAOKA, R.W. RAWSON and R.L. KROC : *Ann. N. Y. Acad. Science*, 86 : 521~544, (1960). 57) OLIVER, M.F. and G.S. BOYD : *Lancet*, I : 124~126, (1957). 58) PAGE, I.H. : *Circulation*, 10 : 1~27, (1954). 59) PETERS, J.P. and E.B. MAN : *J. Clin. Invest*, 22 : 715~720, (1943). 60) PETERS, J.P. and E.B. MAN : *J. Clin. Invest*, 29 : 1~11, (1950). 61) PITT-RIVERS, R. : *Lancet*, II : 234~235, (1953). 62) RAWSON, R.W., W.L. MONEY, R.L. KROC, S. KUMAOKA, R.S. BENUA and R.D. LEEPER : *Am. J. Med. Sci.*, 238 : 261~273, (1959). 63) RAWSON, R.W., J.E. RALL, O.H. PEARSON, J. ROBBINS, H.F. POPPELL and C.D. WEST : *Am. J. Med. Sci.*, 226 : 405~411, (1953). 64) ROBBINS, J. and J.E. RALL : *J. Clin. Invest*, 34 : 1331~1336, (1955). 65) RUEGAMER, W.R. and F.R. SILVERMAN : *Endocrinology*, 68 : 564~573, (1961). 66) RUEGAMER, W.R., M.F. ALPERT and F.R. SILVERMAN : *Endocrinology*, 66 : 160~166, (1960). 67) SACHS, B.A., E. DANIELSON, M.C. ISAACS and R.E. WESTON : *J. Clin. Endocrinol. and Metabol.*, 18 : 506~515, (1956). 68) SCHÖNHEIMER, R. : *Ztscht. Physiol. Chem.*, 160 : 61~76, (1926). 69) SCHOENHEIMER, R. and W.M. SPERRY : *J. Biol. Chem.*, 106 : 745~760, (1934). 70) SLATER, S., M. PERLMUTTER, J. PAZ-CARRANZA and M. NUMEROFF : *J. Clin. Endocrinol. and Metabol.*, 20 : 401~408, (1960). 71) STARR, P. : *J. Clin. Endocrinol. and Metabol.*, 20 : 116~119, (1960). 72) STARR, P., P. REON, J.E. FREIBRUM and L.A. SCHLEISSNER : *Arch. Int. Med.*, 105 : 830~842, (1960). 73) STASILLI, N.R., R.L. KROC and R.I. MELTZER : *Endocrinology*, 64 : 62~82, (1959). 74) STEINER, A. and F.E. KENDALL : *Arch. Pathol.*, 42 : 433~444, (1946). 75) STERLING, K., J.C. LASHOF and E.B. MAN : *J. Clin. Invest*, 33 : 1031~1035, (1954). 76) STERLING, K. and R.B. CHODOS : *J. Clin. Invest.*, 35 : 806~813 (1956). 77) STRISOWER, B., J.W. GOFMAN, E.F. GALIONI, A.A. ALMADA and A. SIMON : *Metabolism*, 3 : 218~227, (1954). 78) STRISOWER, B., J.W. GOFMAN, E.F. GALIONI, J.H. RUBINGER, J. POUTEAU and P. GUZVICH : *Lancet*, I : 120~123, (1957). 79) STRISOWER, B., P. ELMLINGER, J.W. GOFMAN and O. DELALLA : *J. Clin. Endocrinol. and Metabol.*, 19 : 117~126, (1959). 80) SURE, B., Z.W. FORD, JR., R.M. THEIS. and M. GOLDFISCHER : *Endocrinology*, 28 : 806~815, (1941). 81) SWAHN, B : *Scand. J. Clin. and Lab. Invest*, 4 : 98~103, (1952). 82) 田村孝 : 新潟医学会誌, 74 : 597~607, (1960). 83) TAPLEY, D.F., F.F. DAVIDOFF, W.B. HATFIELD and J.E. ROSS : *Am. J. Physiol.* 197 : 1021~1026, (1959). 84) TATA, J.R. and C.J. SHELLABARGER : *Biochem. J.*, 72 : 608~613 (1959). 85) TOMITA, K. and H.A. LARDY : *J. Biol. Chem.*, 219 : 595~604, (1956). 86) TROTTER, W.R : *Lancet*, I : 885~889, (1956).