脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲狀腺ト副腎皮質並ニ 副腎皮質トインスリントノ相互作用ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室
大學院學生 醫學士 大村 節次 郎 述

目次

第一章 緒論	第六節 インスリン葡萄糖並ニ副腎皮質粉末少量投與
第二章 實驗方法	第七節 インスリン葡萄糖並ニ副腎皮質粉末大量投與
第三章 實驗成績	第四章 總括考按
第一節 對照並ニ甲狀腺粉末試食	第五章 結論
第二節 副腎皮質粉末試食	附 主要文獻
第三節 甲狀腺粉末並ニ副腎皮質粉末少量試食	
第四節 甲狀腺粉末並ニ副腎皮質粉末大量試食	
第五節 インスリン並ニ葡萄糖注射	

第一章 緒論

甲狀腺ト副腎皮質トガ機能的ニ拮抗作用ヲ有スルコトハ、實驗的ニモ亦臨床的ニモ證明セラレタル所ニシテ、今茲

ニ文献ヲ擧ゲテ之ヲ指示スル迄モナシ。只バセドウ氏病ニ際シ各種新陳代謝ノ亢進ハ、著シク脂肪ノ燃燒ヲ盛ニスルモノナルコトハ、バセドウ氏病ニ於テ一般ニ酸素消費量ノ増加、呼吸系数ノ下降ニヨリテ見ルモ容易ニ推定シ得ラルル所ナルト共ニ實驗的ニハ甲狀腺物質ヲ試食セシメタル白鼠ノ體脂肪ガ、健常白鼠ノソレニ比シテ著シク減少スルコトハ已ニ余ノ報告セル所ナリ。

一方バセドウ氏病患者ニ副腎粉末ヲ投與スル時上昇セル基礎新陳代謝ハ下降シ、下降セル呼吸系数ノ上昇スルコトハ、當教室龜井⁽²⁾、原ノ實驗スル所ナリ。而テ此ノ際此ノ成績ニ參與スル物質ハ髓質ニ非ズシテ皮質ナルコトハ辻教授ノ檢索ニヨリテ疑フノ餘地ナキノミナラズ、副腎皮質ニ因ル發育ノ増進、體重ノ増加ヲ實驗的ニ證明セル Fala. W.⁽⁴⁾ McKinley, Earl and N. F. Fischer, Herwerden. M. A. van. Castaldi, Luigi,⁽⁵⁾ ノ成績ニ就テ考察スルモ、副腎皮質ガ體內脂肪消費ヲ抑制シ之ヲ沈着セシムル作用アルコトハ認メラル可シ。又當教室新田⁽⁸⁾ハアヴィタミノゼ白鼠ニ於テ甲狀腺粉末ノ投與ハ、益々體重及ビ臟器脂肪量ノ減少ヲ來スモ、全副腎粉末ノ試食ハ却テ體重及ビ臟器脂肪量ノ減少ヲ抑制スルコトヲ知レリ。

果シテ之等ノ成績ガ事實ナリトセバ副腎皮質ノ治療的意義ニ一層ノ重大性ヲ生ズルモノニシテ、之ヲ闡明セムトスルコトハ即チ本實驗ノ生命ナリ。

而テ更ニ腎臟ガ甲狀腺ト拮抗的ニ在ルコトヨリインスリンノ肥肝療法益々實用セラレムトスル今日、之ガ實驗的證明ハ余ノ曩ニ發表セル所ニシテ、インスリンハ確實ニ甲狀腺物質投與ニヨル體內脂肪量ノ減少ヲ抑制シ得ルコトヲ識レリ。又脾臟内分泌ト副腎皮質トガ協同作用ヲナスコトハ近時種々ノ方面ヨリ闡明セラレツ、アル所ニシテ、當教室

(10) 河野ハ皮質エキス中ニハインスリント同様ニ血液リポイド及ビ副腎リポイドヲ減少セシムル作用アルコトヲ報告シ、
(11) 織田ハ皮質ノ食鹽水又ハアルコホルエキスニハインスリンノ血糖下降作用ヲ增強セシムルコトヲ告ゲタリ。更ニ辻
教授ハ糖尿病インスリン療法ヲ施スニ當リ、ソノ耐糖力ノ高マリ難ク體重ノ増加シ難キ患者ニインスリント共ニ副腎
粉末ヲ併用シテ好結果ヲ得ラル。

是ニ於テ肥胖療法ヲ施スニ當リ、インスリント共ニ副腎皮質ヲ與フルコトハ其ノ目的効果ヲヨリ一層有利ニ導クモ
ノニ非ルカナ考ヘ、之ニ就キ實驗シタルニ聊カ獲ル所アリ。茲ニ之ヲ併セテ發表セムトス。

第二章 實驗方法

實驗動物ハ專ラ白鼠ヲ用ヒ、脂肪測定ハソツクスレー、エーテル浸出法ニヨル。脂肪測定ニハ心臟、肝臟、腎臟、骨骼筋ノ四臟器
ニ就テ行フ。

甲狀腺及副腎皮質ハ牛ノ新鮮ナルモノヲ屠牛場ヨリ求メ、之ヲ自ラ乾燥粉末トシタルモノヲ用ヒ、インスリンハトロント製劑ヲ使
用セリ。

其ノ他實驗上ニ關スル詳細ナル事項ニ就テハ、余ノ再三發表セル所ニ等シケレバ茲ニハ之ヲ省略ス。

第三章 實驗成績

第一節 對照竝ニ甲狀腺粉末試食

對照群及甲狀腺粉末試食群成績ニ就テハ既ニ甲狀腺トインスリントノ相互作用ヲ檢シタル際記載セル所ニシテ、本實驗モ之ト相前後シテ行ヒタル關係上之ヲ引用スルコトノムシロ至當ナルヲ思ヒ、之ヲ再録スルコト、シ（第一、第二表）茲ニハ甲狀腺試食ハ對照ニ比シ體重ニ於テモ、臟器脂肪量ニ於テモ著明ノ減少アルヲ記スニ止メン。

第一表 對 照

臟器	番 號	性 別	試驗開始時 體重(瓦)	試驗終了時 體重(瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂 肪 量	脂 肪 量 百 分 率 (%)
心 臟	1	♀	140	142	0.70	0.1480	0.0122	8.24
	2	♂	105	100	0.37	0.1353	0.0100	7.39
	3	♀	125	135	0.67	0.1237	0.0095	7.69
	4	♀	105	110	0.50	0.1348	0.0130	9.64
	5	♀	125	143	0.62	0.1570	0.0114	7.26
	6	♂	143	152	0.70	0.1433	0.0145	10.12
	平均		124	130				8.39
肝 臟	1				5.70	1.8383	0.1754	9.54
	2				4.30	1.2352	0.1073	8.68
	3				5.10	1.4400	0.1598	11.04
	4				4.10	1.2188	0.0991	8.13
	5				5.50	1.6453	0.2644	16.67
	6				5.50	1.6592	0.1590	9.52
	平均							10.60
腎 臟	1				1.00	0.2337	0.0226	9.24
	2				1.70	0.2216	0.0259	11.68
	3				1.10	0.2768	0.0230	8.31
	4				0.80	0.2216	0.0208	9.38
	5				1.00	0.2684	0.0272	10.13
	6				1.00	0.2386	0.0218	9.13
	平均							9.65
骨 骼 筋	1				1.70	0.4370	0.0460	10.53
	2				1.30	0.2876	0.0346	12.03
	3				1.70	0.4583	0.0424	9.25
	4				1.50	0.4182	0.0507	12.12
	5				2.00	0.5502	0.0819	14.78
	6				2.10	0.3327	0.0336	10.09
	平均							11.47

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲狀腺ト副腎皮質……(大村)

副腎粉末試食カ體重ノ増加ヲ來スト共ニ基礎新陳代謝ノ下降並ニ呼吸係數ノ上昇ヲ招來スルコトハ、諸家ノ實驗ニ

第二節 副腎皮質粉末試食

第二表 甲状腺粉末試食

臓器	番 號	性 別	試驗 開始 時體 重 (瓦)	試驗 終了 時體 重 (瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂 肪 量	脂 肪 量 百 分 率 (%)
心 臟	1	♂	95	90	0.62	0.0806	0.0045	5.58
	2	♂	148	140	0.70	0.1627	0.0142	8.73
	3	♀	140	140	0.70	0.1418	0.0094	6.62
	4	♀	135	130	0.70	0.1266	0.0106	8.37
	5	♀	105	95	0.60	0.1198	0.0078	6.51
	6	♀	145	135	0.70	0.1592	0.0136	8.54
	平均		128	122				7.39
肝 臟	1				4.50	1.1474	0.0771	6.72
	2				6.10	1.6976	0.1550	9.13
	3				5.30	1.1105	0.1150	10.35
	4				6.00	1.5182	0.1190	7.83
	5				4.30	1.2094	0.1126	9.31
	6				6.80	1.8550	0.1332	7.18
	平均							8.42
腎 臟	1				1.00	0.1616	0.0132	8.17
	2				1.30	0.3660	0.0324	8.85
	3				1.20	0.2626	0.0232	8.45
	4				1.20	0.2208	0.0200	9.00
	5				1.10	0.1980	0.0160	8.08
	6				1.20	0.3332	0.0272	8.16
	平均							8.45
骨 格 筋	1				1.23	0.3053	0.0094	3.08
	2				2.60	0.6826	0.0540	7.91
	3				1.80	0.4084	0.0331	8.10
	4				2.20	0.4610	0.0438	9.50
	5				1.70	0.3533	0.0264	7.47
	6				2.00	0.4930	0.0240	4.88
	平均							6.82

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲状腺ト副腎皮質……(大村)

ヨリテ知ラレタルハ緒論ニ述べタルガ如シ。之等ノ實驗中ニハ全副腎粉末ヲ使用シタルアリ、又皮質ノミヲ供シタルモノアルモ、要スルニ其ノ現ス所ノ作用ハ髓質ニ非ズシテ皮質ニアルコトハ辻教授ノ説カレタル所ナリ。

第三表 副腎皮質粉末試食

臓器	番 號	性 別	試験開始時 體重(瓦)	試験終了時 體重(瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂 肪 量	脂 肪 量 百 分 率 (%)
心 臟	1	♂	140	145	0.50	0.1336	0.0142	10.63
	2	♂	122	127	0.60	0.1390	0.0144	10.36
	3	♂	150	158	0.60	0.1455	0.0170	11.69
	4	♀	137	145	0.70	0.1506	0.0164	10.89
	5	♀	117	126	0.40	0.1095	0.0134	15.86
	6	♂	116	125	0.40	0.1050	0.0118	11.24
	平均		130	137				11.78
肝 臟	1				4.70	1.3704	0.1364	9.95
	2				5.70	1.6064	0.1742	10.84
	3				7.30	2.2485	0.2672	11.88
	4				5.50	1.5277	0.1600	10.46
	5				4.00	1.2493	0.1204	9.64
	6				4.30	1.2522	0.1182	9.44
	平均							10.37
腎 臟	1				0.90	0.2353	0.0260	11.05
	2				0.90	0.2290	0.0256	11.18
	3				1.00	0.2633	0.0308	11.69
	4				1.00	0.2670	0.0284	10.64
	5				0.70	0.1592	0.0248	15.58
	6				0.70	0.1860	0.0213	11.45
	平均							11.93
骨 格 筋	1				2.10	0.5980	0.0906	15.15
	2				1.90	0.4652	0.0274	5.89
	3				2.00	0.5066	0.0528	10.42
	4				1.80	0.5068	0.0845	16.67
	5				1.50	0.3942	0.0554	14.31
	6				1.50	0.3938	0.0372	9.45
	平均							11.98

今自家製牛副腎皮質乾燥粉末ヲ白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ對シ、〇・〇二瓦ノ割合ヲ以テ連日一〇日間投與シタル後、

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲状腺ト副腎皮質……(大村)

其ノ體重竝ニ臟器脂肪量ヲ檢スルニ、體重ハ全六例凡ベテ増加シ試驗開始時平均一三〇瓦ナリシモノ終了時二八一三六瓦トナリ平均六六瓦ノ增量ヲ示セルハ諸家ノ說ト一致スル所ナリ。

更ニ臟器脂肪量ニ就テ見ルニ、骨骼筋ニ於テ一ニ差格ノ著シキモノアルモ、其ノ平均百分率ハ心臟一一・七八%、肝臟一〇・三七%、腎臟一一・九三%、骨骼筋一一・九八%トナリ、之ヲ對照群ニ比較スルニ各臟器共ニ增量シ、之ヲ甲狀腺粉末投與群ニ照合スルニ格段ノ増加ヲ認ム可シ(第三表)。

第三節 甲狀腺粉末竝ニ副腎皮質粉末少量試食

甲狀腺粉末投與ガ體重、臟器脂肪量ノ減少ヲ、副腎皮質試食ガ其等ノ增量ヲ來スコトハ前節ニヨリテ明ニセラレタル所ナリ。然バ副腎皮質ガ甲狀腺ニヨル體重竝ニ脂肪量ノ減少ヲ抑制シ得ルモノナリヤ如何ヲ知ラムガタメ、今甲狀腺皮質共ニ白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ對シ〇・〇二瓦宛併セ投與スルコト一〇日間ニ及ビタルモノヲ檢スルニ、第四表ノ如クニシテ五例中體重ノ減少ヲ見タルモノ一例ノ外ハ凡ベテ増加ヲ示シ、平均試驗開始時九〇瓦終了時九四瓦トナリ四瓦ヲ増セリ。

臟器脂肪量ハ平均百分率心臟一〇・一七%、肝臟九・〇八%、腎臟一一・七二%、骨骼筋九・八八%トナリ、甲狀腺粉末投與群ニ比シテハ何レモ增量セルモ皮質單獨投與群ニ較ベテハ各臟器共ニ減量ス。又對照群ニ對シテハ肝臟、骨骼筋ニ於テ減セルモ心臟、腎臟ニ於テハ増加セリ(第四表)。

第四表 甲状腺粉末並ニ副腎皮質粉末少量試食

臓器	番 號	性 別	試験開始時 體重(瓦)	試験終了時 體重(瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂 肪 量	脂 肪 量 百 分 率 (%)
心 臓	1	♀	90	117	0.70	0.1715	0.0142	8.28
	2	♂	100	82	0.70	0.1428	0.0120	8.40
	3	♂	87	90	0.50	0.1223	0.0132	10.79
	4	♂	80	85	0.50	0.1086	0.0130	11.97
	5	♂	92	95	0.60	0.1418	0.0162	11.41
	平均		90	94				10.17
肝 臓	1				5.30	1.5568	0.1624	10.43
	2				4.10	1.0102	0.0790	7.82
	3				3.20	0.9455	0.0802	8.48
	4				3.30	0.9322	0.0848	9.09
	5				3.70	0.9984	0.0956	9.56
	平均							9.08
腎 臓	1				1.10	0.2720	0.0304	11.17
	2				1.00	0.2418	0.0280	11.57
	3				0.75	0.1944	0.0244	12.55
	4				0.80	0.1864	0.0230	12.34
	5				1.00	0.2264	0.0248	10.95
	平均							11.72
骨 格 筋	1				1.53	0.3985	0.0502	12.59
	2				1.10	0.2680	0.0226	8.43
	3				1.34	0.3786	0.0418	11.04
	4				1.30	0.3670	0.0378	10.29
	5				1.25	0.3220	0.0227	7.05
	平均							9.88

第四節 甲状腺粉末並ニ副腎皮質粉末大量試食

前節ニ於テ副腎皮質ガ如何ニ作用スルカハ凡ソ知り得タルモノト思惟スルガ故ニ、本節ニ於テハ更ニ其ノ投與量ガ
脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲状腺ト副腎皮質……(大村)

影響スルコトナキヤヲ知ラムトシテ、甲狀腺投與量ハ其ノ儘トシ皮質投與量ヲ倍加シテ、即チ白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ對シ〇・〇四瓦宛ヲ同ジク一〇日間連投シタルニ、體重ハ試驗開始時平均一〇四瓦ニシテ四瓦ノ増加トナリ、其ノ増加率前節ト等シキモ、之ヲ臟器脂肪量ニ就テ見ル時ハ、其ノ平均百分率心臟九・二一%、肝臟八・八八

第五表 甲狀腺粉末並ニ副腎皮質粉末大量試食

臟器	番號	性別	試驗開始時體重(瓦)	試驗終了時體重(瓦)	切除時重量	乾燥粉末重量	乾燥粉末脂肪量	脂肪量百分率(%)
心臟	1	♂	134	140	0.70	0.1706	0.0155	9.09
	2	♂	115	123	0.70	0.1690	0.0140	8.29
	3	♀	90	92	0.55	0.1168	0.0086	7.36
	4	♀	110	117	0.60	0.1328	0.0122	9.19
	5	♂	100	100	0.60	0.1495	0.0174	11.64
	平均		110	114				9.11
肝臟	1				5.75	1.6158	0.0752	4.65
	2				4.80	1.3288	0.1028	7.73
	3				3.82	1.0378	0.0754	7.27
	4				4.90	1.4426	0.1770	12.27
	5				4.70	1.2792	0.1600	12.50
	平均							8.88
腎臟	1				1.30	0.3140	0.0342	10.89
	2				1.15	0.2878	0.0254	8.83
	3				0.80	0.1974	0.0196	9.93
	4				0.85	0.2070	0.0242	11.69
	5				1.00	0.2364	0.0338	14.29
	平均							11.13
骨骼筋	1				2.20	0.5200	0.0354	6.62
	2				1.30	0.3146	0.0372	11.82
	3				1.35	0.3177	0.0236	7.43
	4				1.60	0.3973	0.0468	13.32
	5				1.20	0.2924	0.0528	14.63
	平均							10.76

%、腎臓一・二三%、骨骼筋一〇、七六%トナリ、前節群ニ比較シ骨骼筋ニ於テ僅カニ増加セル外、他ハ凡ベテ減少セリ。尙個々ニ就テ仔細ニ觀察スル時ハ減少ノ傾向一層顯著ナルモノアリ。肝臓ニ於テハ甲狀腺單獨投與群ニ於ケルモノヨリモ尙減量セルモノヲ見ルハ何ニ因ルカ（第五表）。

第六表 インスリン並ニ葡萄糖注射

臓器	番 號	性 別	試験開始時體重 (瓦)	試験終了時體重 (瓦)	切除時 重量	乾燥粉末 重量	乾燥粉末脂肪量	脂肪量百分率 (%)
心臓	1	♀	135	135	0.50	0.1274	0.0110	8.63
	2	♂	120	123	0.52	0.1062	0.0093	8.76
	3	♀	127	132	0.60	0.1109	0.0120	10.82
	4	♂	110	115	0.50	0.1838	0.0183	9.96
	平均		123	126				9.54
肝臓	1				5.50	1.5724	0.1274	8.12
	2				4.50	1.2962	0.1135	8.76
	3				3.50	1.0590	0.1188	11.22
	4				4.35	1.4386	0.1562	10.86
	平均							9.74
腎臓	1				0.85	0.2111	0.0240	11.37
	2				0.80	0.1770	0.0190	10.73
	3				0.70	0.1920	0.0226	11.77
	4				1.00	0.2758	0.0312	11.31
	平均							11.29
骨骼筋	1				1.80	0.4968	0.0538	10.83
	2				1.70	0.4492	0.0420	9.35
	3				2.00	0.5196	0.0564	10.85
	4				1.70	0.4480	0.0452	10.08
	平均							10.22

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲狀腺ト副腎皮質……（大村）

第五節 いんすりん竝ニ葡萄糖注射

インスリン注射ガ體脂肪ノ増加ヲ來シ之ニ葡萄糖ヲ添加スルコトニヨリ、更ニ一層ノ増量ヲ來スコトハ、余等ノ曩ニ家兎竝ニマウスニ於テ實驗證明セル所ナリ。今インスリント副腎皮質トノ交互作用ヲ見ルニ當リ、先ヅ之ヲ白鼠ニ試ミルコトハ、一ハ對照ヲ造ル上ニ於テ、一ハ追試ノ意味ニ於テ必要ナルコトナリ。即チ白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ對シインスリン〇・〇〇八珎、二五%葡萄糖溶液〇・三珎宛連日一〇日間皮下注射スルニ、四例共體重ハ凡ベテ増加ヲ示シ平均試驗開始時一二三瓦ナリシモノ終了時ニハ一二六瓦トナリ平均三瓦ノ増加ヲ來ス。

一方臟器脂肪量ハ平均百分率心臟九・五四%、肝臟九・七四%、腎臟一一・二九%、骨骼筋一〇・二二%トナリ、對照ニ比シ肝臟、骨骼筋ニ於テ稍々減少セルモ、心臟、腎臟ニ於テハ明カニ増加シ一般ニ増量ノ傾向アルコトハ明カニシテ、即チ曩ニ家兎ニ於テ試ミタル成績ノ愈々確實ナルコトヲ裏書キスルモノナリ(第六表)。

第六節 いんすりん葡萄糖竝ニ副腎皮質粉末少量投與

インスリント副腎皮質トガ協同作用ヲ有スルコトハ、近時漸ク認メラレムトスル所ニシテ、之ガ實驗的報告ニ就テハ緒論ニ述べタルガ如シ。

余ハ斯、ル諸說ニ對シ別途脂肪代謝ノ方面ヨリ、果シテ之等兩内分泌腺ノ間ニ協同作用ノ存スルモノナリヤ否ヤヲ檢索センタメ、即チインスリンニヨリテ増加セル體脂肪ガ皮質添加ニヨリテ、果シテ一層ノ増加ヲ來シ得ルモノナリ

ヤチ知ラムト欲シテ、本實驗ヲ試ミタルニ次ノ如キ結果ヲ得タリ。

第七表 インスリン葡萄糖並ニ副腎皮質少量投與

臓器	番 號	性 別	試験開始時 體重(瓦)	試験終了時 體重(瓦)	切除時 重量	乾燥粉末 重量	乾燥粉末 脂肪量	脂肪量 百分率(%)
心臓	1	♂	147	155	0.60	0.1377	0.0140	10.17
	2	♂	95	102	0.50	0.0926	0.0094	10.15
	3	♀	124	136	0.55	0.1090	0.0138	12.66
	4	♀	97	114	0.50	0.0954	0.0130	13.63
	5	♂	118	128	0.60	0.1514	0.0180	11.89
	平均		116	127				11.70
肝臓	1				6.80	1.8964	0.2972	15.67
	2				4.20	1.0710	0.1507	14.07
	3				4.25	1.2020	0.1460	12.15
	4				6.00	1.4292	0.2778	12.44
	5				4.00	1.0700	0.1231	11.50
	平均							13.37
腎臓	1				0.85	0.2019	0.0228	11.34
	2				0.80	0.1820	0.0204	11.21
	3				0.80	0.1768	0.0222	12.56
	4				1.00	0.1890	0.0266	14.07
	5				0.75	0.1690	0.0326	19.29
	平均							13.69
骨格筋	1				2.50	0.6200	0.0730	11.77
	2				1.20	0.2686	0.0334	12.43
	3				2.35	0.6000	0.0942	15.70
	4				2.00	0.4272	0.0775	18.14
	5				2.10	0.5270	0.0624	11.84
	平均							13.98

即チ白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ付キインスリンハ〇・〇〇三耗、二五%葡萄糖溶液、〇・二耗、皮質粉末〇・〇一瓦ノ割合ヲ以テ、一〇日間連續注射或ハ試食セシメタルニ、體重ハ全五例共ニ増量ヲ示シ、平均試験開始時一二六瓦、終了

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲状腺ト副腎皮質……(大村)

時一二七瓦ニシテ實ニ一一瓦ノ増加ヲ來ス。之ヲ臟器脂肪量ニ就テ見ルモ平均百分率心臟一一・七〇%、肝臟一三・三七%、腎臟一三・六九%、骨骼筋一三・九八%トナリ、對照ニ比シ各臟器共格段ノ増加ヲナセルノミナラズ、之ヲ單獨インスリン葡萄糖注射、單獨皮質粉末試食群ニ較ベテモ著明ノ増加ヲ示セルコトハ誠ニ興味深キコト、言ハザル可カラズ。

第七節 いんすりん葡萄糖並ニ副腎皮質粉末大量投與

インスリン副腎皮質ノ併用投與ガ其等兩者單獨投與ニ比シ、體重及脂肪量ノ増加ヲ招來スルコトノヨリ大ナルハ前節ノ實驗ニヨリ明白ナルガ、更ニ之レガ量的關係ノ參與スルコトアルハ、第三、第四節ノ甲狀腺對皮質ノ實驗ニ徴スルモ推察セラル、所ナル可シ。

依ツテ今白鼠體重一〇〇・〇瓦ニ付キインスリン〇・〇〇八蚝、二五%葡萄糖溶液〇・三三蚝及ビ皮質粉末〇・〇二瓦ヲ前同様一〇日間連投シタル九例ニ就テ檢スルニ、體重ハ凡ベテ増量ノ傾向アリ、試驗開始時平均一二一瓦、終了時平均一二五瓦ニシテ平均四瓦ノ増加ヲ示スモ、之ヲ前節少量投與群ノ平均一一瓦増加ニ比較スル時ハ其ノ率著シク低下ス。

又臟器脂肪量ヲ視ルニ其ノ平均値ニ於テ、對照ニ較ベテハ心臟、腎臟ニ於テ増シ、肝臟、骨骼筋ニ於テ減少ス。皮質インスリン各單獨投與群ト比較シテハ、其ノ前者ノ何レノ臟器ニ於ケルヨリモ減少シ、後者ノモノトハ殆ド大差ナキ狀態ニ在リ。之ヲ少量投與群ト對比スル時ハ大ナル差異ヲ認ム。即チ大量投與ハ少量投與ニ比シ其ノ増加率僅微ナ

ルノミナラズ、寧ロ對照ニ比シ肝臟、骨格筋ニ於テハ減少ヲ來セル有様ナルコトハ注目ニ値ス可ク、其ノ量的關係ノ忽ニス可カラザルヲ語ルモノニ非ズシテ何ゾヤ。

第八表 インスリン葡萄糖竝ニ副腎皮質大量投與

臟器	番 號	性 別	試驗開始時體重 (瓦)	試驗終了時體重 (瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂肪量	脂肪量 百分率 (%)
心 臟	1	♀	113	118	0.50	0.1284	0.0109	8.48
	2	♀	115	122	0.50	0.1276	0.0110	8.60
	3	♀	120	120	0.60	0.1432	0.0144	10.05
	4	♀	115	120	0.62	0.1362	0.0133	9.76
	5	♂	137	140	0.75	0.1582	0.0152	9.61
	6	♂	115	126	0.60	0.1344	0.0117	8.71
	7	♂	120	125	0.55	0.1266	0.0128	10.11
	8	♂	130	135	0.65	0.1086	0.0108	9.94
	9	♂	125	127	0.70	0.1220	0.0110	9.01
	平均		121	125				9.36
肝 臟	1				4.30	1.2802	0.1200	9.39
	2				4.60	1.3462	0.1220	9.06
	3				5.70	1.6226	0.2064	12.72
	4				4.52	1.3280	0.1240	9.33
	5				5.15	1.4994	0.1523	10.16
	6				4.10	1.1944	0.1454	12.17
	7				3.80	1.1460	0.1273	11.11
	8				4.90	1.4609	0.1438	9.84
	9				4.23	1.2940	0.1210	9.36
	平均							10.35
腎 臟	1				0.70	0.1800	0.0202	11.22
	2				0.80	0.1864	0.0234	12.55
	3				0.86	0.2170	0.0266	12.26
	4				0.75	0.1912	0.0218	11.40
	5				1.15	0.2354	0.0270	11.47
	6				0.70	0.1928	0.0214	11.10
	7				0.65	0.1972	0.0230	11.11
	8				0.72	0.2138	0.0220	10.43
	9				0.60	0.2134	0.0254	11.90
	平均							11.49

第四章 總括考按

斯クノ如クニシテ獲タル實驗成績ヲ顧ルニ、牛副腎皮質中ニハ體重竝ニ臟器脂肪量ノ増加ヲ招來スル物質ノ存スルコトハ確實ナルト共ニ、更ニ甲状腺物質投與ニヨリテ來ル體重、脂肪量ノ減弱ヲ抑制スル作用ヲ有スル事モ認メ得ラル、所ナル可シ。

而テ之ガ作用上ニハソノ量目ニ關係アルコトハ同量ノ甲状腺粉末ニ大量少量ニ様ノ皮質量ヲ添加シタル際、其ノ脂肪量ニ増減アルコトニヨリテ知ラル、所ニシテ、大量投與ハ却テ減少ヲ見ルガ如シ。此ノ事實ハインスリンニ副腎皮質ヲ併用シテ其ノ增強作用ヲ檢シタル際ニ於テモ認メラル、所ニシテ、即チインスリン、葡萄糖竝ニ皮質ノ各大量投與ハ其等ノ少量投與ニ反對ニ減少ヲ來スモノ、如シ。コハ恐ク中毒作用ノ結果ニヨルモノ

ナル可ク、治療上最モ注意ヲ要スル點ナリ。

次ニインスリンニ皮質ヲ添加スルコトニヨリテ、其ノ肥胖療法的價值ヲ高メ得ルモノナリヤ否ヤヲ檢シタル結果ハ豫期以上ノ好結果ヲ得、其ノ各單獨投與ニ對比シテ對重、脂肪量共ニ著明ノ増量ヲ來セリ。只茲ニ注意ス可キハソノ

臟器	番 號	性 別	試驗開始時體重 (瓦)	試驗終了時體重 (瓦)	切 除 時 重 量	乾 燥 粉 末 重 量	乾 燥 粉 末 脂 肪 量	脂 肪 量 百 分 率 (%)
骨 格 筋	1				1.75	0.4459	0.0400	8.97
	2				1.50	0.3798	0.0551	14.53
	3				1.70	0.4567	0.0506	11.08
	4				1.85	0.4612	0.0530	11.49
	5				1.70	0.4208	0.0309	7.34
	6				1.50	0.3638	0.0390	10.72
	7				1.62	0.4256	0.0428	10.06
	8				1.70	0.4770	0.0523	10.76
	9				1.85	0.5002	0.0698	13.95
	平均							10.99

量的關係ニシテ、少量投與ニ於テハ好結果ヲ得タルモ、大量投與ハ却テ有害ニ作用セルモノ、如キハ上述ノ原因ニヨルモノナランカ。

最後ニ注意ス可キハ斯、ル副腎皮質ノ作用物質ガ果シテ何物ナリヤトイフコトナリ。

Viale⁽¹⁴⁾ ハ副腎皮質ホルモンハヒヨリンナリト考ヘ、堀江亦副腎皮質エキスハインスリンノ血糖降下作用ヲ增強セシムルコトヲ認メ、之ヲ皮質中ニ含マル、ヒヨリンニ歸セムトスルガ如キモ、河野ハコレステリン代謝ニ關シ、久保園⁽¹⁵⁾ハ別出子宮筋運動ニ就キヒヨリン以外ニ何等カカ、ル作用物質ノ存在ヲ主張セリ。近時織田ハヒヨリンハ普通副腎皮質中ニ含マル、ガ如キ微量ニテハ血糖、アドレナリン過血糖及インスリン寡血糖作用ニ對シ何等ノ影響ヲ與ヘズ。約其ノ二〇〇倍量ニテ始メテ作用スルコトヲ證シ、而テ副腎皮質エキス中ニハヒヨリント同様ニ血糖下降、アドレナリン過血糖抑制作用及インスリン寡血糖增強作用ヲ有スル物質ヲ含有シ、然モ此等ノ作用ハヒヨリンノ同作用ト異リアトロピンニヨリテ全ク消除セラレズトイヒ此ノ間ノ消息ヲ一層明瞭ニセリ。

由是觀之、余ノ皮質物質投與ニヨリテ得タル作用モ、河野、久保園、織田等ノ認メントスルヒヨリン以外ノ他物質ニヨルモノナルコトヲ推定セムトス。

第五章 結 論

本實驗ハ白鼠ヲ用ヒ臟器脂肪量、體重ノ消長ヨリ、甲狀腺ト副腎皮質竝ニ副腎皮質トインスリントノ相互關係ヲ觀察セルモノニシテ、其ノ結果次ノ如シ。

脂肪新陳代謝ヨリ觀タル甲狀腺ト副腎皮質……(大村)

- 一、副腎皮質粉末ノ適當量試食ハ臟器(心臟、肝臟、腎臟、骨骼筋)脂肪量竝ニ體重ノ増加ヲ來ス。
- 二、副腎皮質粉末試食ハ甲狀腺物質投與ニヨル臟器脂肪量及體重ノ減少ヲ抑制ス。
- 三、適當量ノインスリン、葡萄糖溶液ノ注射竝ニ副腎皮質粉末ノ併用試食ハ、之等單獨投與ニ比シ、其ノ臟器脂肪量及體重ノ著明ナル増加ヲ來ス。

稿ヲ終ルニ臨ミ終始懇篤ナル御教示ヲ賜リシ恩師辻教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

(昭和三年九月二十九日脱稿)

出 張 文 献

- 1) 大村; 日本内分泌學會雜誌, 未發表
内分泌學會雜誌, 第4卷, 第3號, 401頁.
- 2) 龜井; 日本内分泌學會雜誌, 第3卷, 第2號, 211頁.
- 3) 原; 日本内分泌學會雜誌, 第4卷, 第3號, 401頁.
- 4) Falta. W.; Wien. Klin. Wochenschr. Jg. 38, S. 1203, 1925.
- 5) McKinley, Earl and N. F. Fischer; Americ. Journ. of physiol. Bd. 76, S. 268, 1926.
- 6) Herwerden; Arch. neerl. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 9, S. 381, 1924; Bericht. üb. d. gesam. physiol. Bd. 36, S. 667, 1926.
- 7) Castaldi, Luigi; Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. 22, S. 297, 1925; Bericht. üb. d. gesam. physiol. Bd. 35, S. 123, 1926.
- 8) 新田; 日本内分泌學會雜誌, 第3卷, 第6號, 1478頁.
- 9) 新田; 日本内分泌學會雜誌, 第4卷, 第9號, 1623頁.
- 10) 河野; 日本内分泌學會雜誌, 第3卷, 第1號, 46頁.
- 11) 織田; 日本内分泌學會雜誌, 第4卷, 第6號, 1068頁.
- 12) 辻; 日本内分泌學會雜誌, 第4卷, 第3號, 381頁.
- 13) 大村, 新田; 日本内分泌學會雜誌, 第2卷, 第6號, 1003頁.
- 14) Vialé; Cpt. rend. d. seanc. d. l. soc. d. biol. 1928, T. 108, P. 177.
- 15) 堀江; 滿洲醫學會雜誌, 第3卷, 第5號, 53頁.
- 16) 久保園; 日本内分泌學會雜誌, 第3卷, 第5號, 1231頁.

Spritzt man Chinin ein, so vermehrt sich im Vergleich zu den Kontrolltieren der Fettgehalt der einzelnen Organe (Herz, Leber, Niere und Muskel). Diese Zunahme ist jedoch geringer nach kombinierter Einspritzung von Chinin und Schilddrüsenextrakt als nach einfacher Chinininjektion, dagegen grösser nach der Injektion von Schilddrüsenextrakt allein.

DER EINFLUSS VON SCHILDDRÜSE UND CORPUS LUTEUM AUF DEN FETTSTOFFWECHSEL.

Von

Dr. S. Omura.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Die Körpergewichts- und Organfettzunahme an weiblichen Ratten, welche bei der Fütterung mit Corpus luteum deutlich sind, werden gering bei der mit Schilddrüse und Corpus luteum. Daraus schliesst der Verfasser, dass die Schilddrüsensubstanz und der Luteinkörper antagonistisch zueinander wirken.

DER EINFLUSS VON SCHILDDRÜSE UND NEBENNIERENRINDE ODER VON NEBENNIERENRINDE UND INSULIN AUF DEN FETTSTOFFWECHSEL.

Von

Dr. S. Omura.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Verf. untersuchte an weissen Ratten die Wirkung von Schilddrüse und Nebennierenrinde oder von Nebennierenrinde und Insulin auf den Fettgehalt verschiedener Organe (Herz, Leber, Niere und Muskel).

Die Resultate lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:—

1) Die Fütterung mit einer geeigneten Menge Nebennierenrinde führt zur Zunahme des Fettgehalts der verschiedenen Organe und des Körpergewichts.

2) Nebennierenrindenfütterung verhindert die Abnahme des Fettgehalts der verschiedenen Organe und des Körpergewichts, die bei der Schilddrüsenfütterung auftreten.

3) Bei der kombinierten Einspritzung von Insulin, Traubenzuckerlösung und Nebennierenrinde ist die Fettzunahme der verschiedenen Organe und die Körpergewichtsvermehrung stärker als bei der Injektion der einzelnen Stoffe.

DER EINFLUSS VON INSULIN BEI DEN B-AVITAMINOLESEN AUF DEN FETTSTOFFWECHSEL.

Von

Dr. S. Omura.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verf. stellte diese Experimente an männlichen weissen Ratten an, um festzustellen, wie bei B-Avitaminosen Insulin den Fettgehalt verschiedener Organe (Herz, Leber, Niere und Muskel) beeinflusst.

Die Resultate waren die folgenden:

1) Wenn man Ratten B-vitaminfrei ernährt und gleichzeitig Insulin injiziert (täglich pro 100 g K. G. 0.003 ccm) sieht man anfangs einen günstigen Erfolg, später dagegen nicht mehr, d. h. der Fettgehalt der einzelnen Organe nimmt den Kontrollen gegenüber ab.