鹽化ヒヨリンノ室素新陳代謝並ニ食鹽排泄ニ 及ボス影響ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 青 木 主 計 述

目 次

緒 言	第三章 總括及考按
第一章 實驗動物及ビ方法	結 論
第二章 實驗成績	文 献

緒 言

ヒヨリン⁽¹⁾ Lohmann Gautrelet Schwarz u. Lederer, Fûrh u. Schwarz. Kinoshita⁽²⁾ 等ニヨリテ證明セラレタルガ如ク副腎、脾臓、脾臓、甲狀腺、肝臓、肺臓小腸及ビ筋肉等、動物組織内ニ常存スル物質ニシテ、其作用ニ就キテハ⁽¹⁾ Lohmann⁽¹⁾ヲ初メ諸多ノ學者ニヨリテ研究セラレタル所ニシテ其成績未ダ盡ク一致セリト云フヲ得ザレドモ大體ニ於テアドレナリント反對ニ副交感神經及ビ其ノ神經節ニ對シ一定ノ緊張作用ヲ有スルモノナルコトハ多數學者ノ認ムル所ナリ。然レドモ其多クノ業績ハ主トシテ植物性神經即チ腸運動、血管系殊ニ血壓、唾液腺淚腺等ニ對スル作用ノ

鹽化ヒヨリンノ室素新陳代謝並ニ食鹽排泄ニ及ボス影響ニ就テ……(青木)

研究ニシテ偶々新陳代謝ニ及ボス關係ニ指テ染ムルモノナキニ非ズモ之レ亦主ニ血糖ノ上ニ限ラレ、生體ノ窒素新陳代謝ニ如何ニ作用スルヤニ就キテハ研索ノ歩武ヲ進メタルモノアルヲ聞カズ。余ノ淺學ナル僅カニ Riesen Abderhalden, u. Buadze ガヒヨリン注射ノクレアチニン排泄ニ及ボス影響ニ就テ報ズルモノアルヲ知ルノミ。

依ツテ余ハ此未開ノ領域ニ開拓ノ手ヲ下サント欲シ恩師辻教授指導ノ許ニ本實驗ヲ企テ、同時ニ尿中食鹽ノ消長ニ關スル文献乏シク僅カニ財津ノ家兎ニ就キテノ報告存スルニ過ギザルヲ以テ此點ニ就キテモ併セ觀察ヲ遂ゲ一定ノ成績ヲ得タルヲ以テ茲ニ發表セントスルモノナリ。

第一章 實驗動物及ひ方法

實驗動物ハスベテ成熟ヲ遂ゲ經産セル牝犬ヲ用ヒ余ガ嘗テ類似ノ實驗ヲ行ヒタル際ノ同様方式ノ許ニ飼育シ、毎廿四時間尿ニ就キ尿分析ヲ行ヒ(拙著、内分泌學雜誌第一卷、第六號、第三卷第二號參照)尿總窒素、尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素尿中アセトン及アセト醋酸、並ニ尿中食鹽(Volhard-Salkowski 氏法)ヲ定量シ、日々ノ量略一定スルヲ待チ、カールバウム會社製鹽化ヒヨリンヲ二%ノ割ニ淨水ニ溶解シタルモノ(第一例)四%ノ割ニ溶解シタルモノ(第二例、第三例)各五匹ヲ毎日一回皮下注射シ尿中諸成分ノ消長ヲ觀察セリ。元來鹽化ヒヨリンハ極メテ不安定ナル物質ニシテ之ガ水溶液ハ其有効期間甚ダ短時日ナルガ故ニ余ハ各例ニ就キ別々ニ注射第一日ニ調製シ注射日數五日ヲ超エザルコト、セリ。而シテ注射ハ食餌ヲ與フルニ先チテ之ヲ行ヒタリ尿ハ之ヲ檢セザリキ。

第二章 實驗成績

一、尿總窒素。第一例ニテハ試驗期第一日ニ於テハ其排泄増加シ試驗期ニ於ケル最大ヲ示シ其他ノ日ニハ前期ニ比

第 一 例

月 日	體重 (距)	尿量 (距)	比重 (15°C)	攝取窒 素(瓦)	尿總窒 素(瓦)	尿 素 窒 素		アミノ 窒 素		クレチニ 窒 素		クレアチン 窒 素		尿中アセ トゲン及ア セト酸 (距)
						瓦	%	瓦	%	瓦	%	瓦	%	
前 期	V1 29	10.35	315	1018	4.597	3.472	2.701	77.79	0.197	5.67	0.130	3.74	0.006	1.934
	30	10.25	365	1016	"	3.304	2.572	77.78	0.183	5.63	0.136	4.11	0.003	0.967
	V11 1	10.30	385	1014	"	3.276	2.514	76.74	0.188	5.74	0.166	5.07	0.004	1.451
平 均	2	10.50	300	1022	"	3.388	2.629	77.59	0.185	5.46	0.143	4.22	0.005	1.269
	平均	10.35	341	1018	"	3.360	2.604	77.72	0.189	5.62	0.144	4.28	0.005	1.390
	試 驗 期	3	10.50	420	1014	"	3.962	3.181	80.29	0.207	5.22	0.138	4.75	0.026
4		10.35	370	1016	"	3.164	2.395	75.69	0.188	5.94	0.143	4.52	0.003	1.934
5		10.45	500	1011	"	3.514	2.842	80.88	0.193	5.58	0.143	4.07	0.020	0.57
6		10.45	400	1018	"	3.528	2.819	79.90	0.219	6.21	0.179	5.07	0.024	0.68
7		10.50	260	1020	"	3.262	2.599	79.68	0.203	6.22	0.152	4.66	0.017	0.52
平均		10.45	390	1016	"	3.486	2.767	79.29	0.205	5.83	0.161	4.61	0.018	0.498
2.332*														
後 期	8	10.50	410	1012	"	3.374	2.556	75.76	0.202	5.99	0.147	4.36	0.011	0.33
	9	10.50	460	1015	"	3.738	2.929	78.36	0.221	5.91	0.128	3.42	0.012	0.32
	10	10.45	370	1018	"	3.430	2.668	77.78	0.216	6.29	0.138	4.02	0.011	0.32
平 均	11	10.50	400	1013	"	3.276	2.598	79.30	0.188	5.74	0.143	4.37	0.003	0.09
	12	10.45	385	1014	"	3.262	2.542	77.93	0.188	5.76	0.150	4.59	0.004	0.12
	1.934													
平均	10.48	405	1014	"	3.416	2.659	77.83	0.203	5.94	0.141	4.15	0.003	0.24	
1.837														

備考 試験期ニハ日々 Kohbaum 製糖化ヒヨリン2%ノ割ニ淨水ニ溶解シ5cc.ヲ皮下注射ス

糖化ヒヨリンノ窒素新陳代謝並ニ食糖排泄ニ及ボス影響ニ就テ……(青木)

食餌		瓦	瓦		總 窒 素
白米	190.0	蛋白質	28.73	4.597	
牛肉	75.0	脂 肪	4.80		
醬 油	10.0	含水炭素	137.02	總カロリー 724.315	

體重一坵ニ就テ窒素山納表 (平均)			
	攝取窒素	尿總窒素	窒素山納
前 期	0.444	0.325	十 0.119 — α
試驗期	0.440	0.334	十 0.106 — α
後 期	0.439	0.326	十 0.113 — α

表中 α ハ尿中ノ窒素ヲ示ス

シ變化ナキカ寧ロ少シク増加シ其平均値ハ三・四八六瓦トナリ前期平均三・三六〇瓦ニ比シ殆ンド差ナキモ何レカトイヘバ僅カニ増加ノ傾向ヲ示セリ。第二例ニアリテハ試驗期第一日ヨリ増加シ平均値三・六四六瓦トナリ、前期ノ平均値三・二二五瓦ナルニ比シテ増加セリ。第三例ニアリテモ試驗期第一日ヨリ排泄増加シ平均四・六九四瓦トナリ前期平均三・九八五瓦ニ比シ明カニ増加ヲ來セリ。更ニ之ヲ體重一坵ニ付キテノ窒素出納ニ見ルモ、表示セルガ如ク第一例ニ於テハ殆ンド變化ナキモ、第二例及第三例ニアリテハ試驗期平均各々 $(+0.0112$ 瓦及 $+0.0007$ 瓦ニシテ各々前期平均 $+0.0148$ 瓦及 $+0.0073$ 瓦ト較ブルニ體內窒素殘留ノ試驗期ニ於テ減少セルヲ知ル。

二、尿素窒素、第一例ニアリテハ試驗期平均二・七六七瓦ニシテ前期平均二・六〇四瓦ニ比シ殆ンド差ナク僅カニ増加ノ傾向ヲ有スルニ止ルモ、第二例ニ於テハ前期平均二・五二九瓦ナリシモノ試驗期ニハ平均二・七八九瓦ニ増加シ第三例ニテハ試驗期平均三・八三九瓦ニシテ前期平均三・二九三瓦ニ較ベ明カニ増加セリ、次ニ總窒素ニ對スル百分率ニ就テ見ルニ第一例ハ前期平均七七・七二%試驗期平均七九・二九%、第二例ハ前期平均七八・四三%、試驗期平均七六・四五%、第三例ハ前期平均八二・六三%、試驗期平均八一・八三%ニシテ第二例ニ於テハ増加ノ兆ヲ、第二例及第三例

第 二 例

	月 日	體重 (斤)	尿量 (匁)	比重 (15°C)	攝取窒 素(瓦)	尿總窒 素(瓦)	尿 素 窒 素		アミノニア 窒 素		クレアチニ 窒 素		クレアチン 窒 素		尿中アセ トニ及ビ アセト酸 量 (匁)
							瓦	%	瓦	%	瓦	%	瓦	%	
前 期	VIII	811.500	550	1018	4.983	3.343	2.587	77.39	0.252	7.54	0.176	5.26	0.010	0.20	1.741
		911.500	500	1021	"	3.309	2.597	78.48	0.234	7.07	0.180	5.44	0.014	0.42	2.031
		1011.450	385	1030	"	3.091	2.472	79.97	0.233	7.54	0.151	5.89	0.013	0.42	1.741
		1111.500	370	1031	"	3.158	2.460	77.89	0.245	7.76	0.165	5.22	0.011	0.35	2.031
	平 均	11.490	451	1025	"	3.225	2.529	78.43	0.241	7.48	0.168	5.20	0.012	0.37	1.836
試 驗 期		1211.450	300.	1032	"	3.662	2.869	76.71	0.265	7.24	0.188	5.13	0.019	0.52	2.031
		1311.450	600	1015	"	4.032	3.067	76.07	0.343	8.51	0.180	4.46	0.025	0.62	2.321
		1411.500	400	1030	"	3.411	2.621	76.84	0.269	7.89	0.164	4.81	0.016	0.47	2.321
		1511.450	460	1031	"	3.480	2.651	76.18	0.272	7.82	0.180	5.17	0.022	0.63	2.031
	平 均	11.460	440	1027	"	3.646	2.789	76.45	0.287	7.87	0.178	4.89	0.021	0.56	2.176
後 期		1611.450	450	1030	"	3.326	2.534	76.19	0.255	7.67	0.159	4.78	0.014	0.42	2.321
		1711.500	350	1031	"	3.269	2.510	78.22	0.228	7.11	0.159	4.95	0.008	0.24	2.031
		1811.450	420	1030	"	3.410	2.646	77.59	0.252	7.39	0.165	4.84	0.017	0.49	2.031
		1911.450	380	1029	"	3.293	2.580	78.35	0.259	7.86	0.164	4.98	0.009	0.27	1.741
	平 均	11.450	400	1027	"	3.242	2.523	77.82	0.249	7.68	0.161	4.97	0.012	0.37	1.451
	平 均	11.460	400	1029	"	3.293	2.559	77.64	0.249	7.55	0.162	4.91	0.012	0.36	1.915

備考 試験期ニハ日々鹽化ヒヨリニテ4%ノ割合ニ淨水ニ溶解シタルモノヲ5c.c 皮下ニ注射ス

鹽化ヒヨリンノ窒素新陳代謝並ニ食糧排泄ニ及ボス影響ニ就テ……(青木)

食餌表	瓦			瓦			瓦	
	白米	190.0	蛋白質	30.83	脂肪	5.33	總窒素	4.933
	牛肉	85.0	含水炭素	137.02			總カロリー	737.738
	醬油	10.0	食糞	2.011				

體重一坩ニ付キテノ窒素出納表 (平均)			
	攝取窒素	尿總窒素	窒素出納
前期	0.429	0.281	+ 0.148 - α
試驗期	0.430	0.318	+ 0.112 - α
後期	0.430	0.288	+ 0.142 - α

表中 α ハ尿中ノ窒素ヲ示ス

	月 日	尿總窒素	攝取食糞	尿中食糞	食糞増減 (比)	食糞出納
前期	VIII 8	3.343	2.011	1.800	0.54	+ 0.211 - β
	9	3.309	〃	1.800	0.54	+ 0.211 - β
	10	3.091	〃	1.752	0.57	+ 0.259 - β
	11	3.158	〃	1.922	0.61	+ 0.089 - β
	平均	3.225	〃	1.819	0.56	+ 0.192 - β
試驗期	12	3.662	〃	2.184	0.59	- 0.107 - β
	13	4.032	〃	2.220	0.55	- 0.209 - β
	14	3.411	〃	2.040	0.59	- 0.029 - β
	15	3.480	〃	2.010	0.58	+ 0.001 - β
	平均	3.646	〃	2.114	0.58	- 0.103 - β
後期	16	3.326	〃	1.704	0.51	+ 0.307 - β
	17	3.209	〃	1.752	0.55	+ 0.259 - β
	18	3.410	〃	1.944	0.57	+ 0.067 - β
	19	3.293	〃	1.896	0.58	+ 0.115 - β
	20	3.242	〃	1.848	0.57	+ 0.163 - β
	平均	3.296	〃	1.829	0.56	+ 0.182 - β

表中 β ハ尿中ノ食糞ヲ示ス

ニ於テハ寧口減少ノ兆ヲ示シ一定セザルモ増減ノ度極メテ僅カニシテ恐クハ百分率ニハ大ナル變化ナシト見做スヲ得ン。

三、あむもにあ窒素。第一例ハ前期平均○・一八九瓦ニ比シ試驗期ニハ平均○・二〇五瓦トナリ、第二例ニアリテハ

第 三 例

月 日	體重 (起)	尿量 (g)	比重 (15°C)	攝取窒 素(g)	尿總窒 素(g)	尿 素		アミノア 窒 素		クレアチニ ン窒 素		クレアチン 窒 素		尿中アセト ン及アセト 酸液 (起)
						g	%	g	%	g	%	g	%	
前 期	VIII 15	10.70	170	1053	4.705	3.326	82.49	0.286	7.09	0.140	3.47	0.004	0.09	0.967
	16	10.70	140	1045	"	3.878	82.17	0.283	7.29	0.167	4.31	0.003	0.08	0.967
	17	10.65	150	1039	"	4.046	83.35	0.291	7.19	0.158	3.66	0.008	0.19	1.451
試 驗 期	平 均	10.68	153	1046	"	3.935	82.93	0.287	7.19	0.155	3.81	0.005	0.12	1.128
	18	10.50	210	1037	"	4.704	80.48	0.358	7.61	0.188	3.99	0.012	0.26	1.934
	19	10.55	175	1055	"	4.613	81.88	0.353	7.65	0.156	3.38	0.011	0.24	1.692
後 期	20	10.50	150	1046	"	4.515	83.79	0.347	7.68	0.161	3.54	0.022	0.49	1.934
	21	10.40	180	1049	"	4.942	81.16	0.378	7.65	0.183	3.70	0.042	0.84	1.692
	平 均	10.49	179	1047	"	4.694	81.83	0.359	7.65	0.172	3.66	0.022	0.46	1.813
後 期	22	10.45	170	1041	"	4.172	82.79	0.358	8.58	0.140	3.36	0.013	0.31	1.934
	23	10.50	145	1049	"	3.906	83.10	0.246	6.29	0.144	3.66	0.006	0.15	1.692
	24	10.50	150	1044	"	4.410	82.48	0.342	7.76	0.167	3.79	0.005	0.11	1.934
	25	10.50	180	1042	"	3.948	84.29	0.249	6.31	0.155	3.93	0.008	0.21	0.967
	26	10.55	170	1042	"	3.808	83.01	0.255	6.69	0.155	4.07	0.012	0.32	1.451
	平 均	10.50	163	1044	"	4.049	83.51	0.290	7.13	0.152	3.76	0.009	0.22	1.596

備考 試験期ニハ日々塩化ヒヨリンヲ4%ノ割合ニ淨水ニ溶解シタルモノ15 c.c.ヲ皮下ニ注射ス

鹽化ヒヨリンノ窒素新陳代謝並ニ食糧排泄ニ及ボス影響ニ就テ……(青木)

食餌表	瓦	蛋白質	29.78	總 窒 素	瓦
	白米 190.0 牛肉 80.0 醬油 10.0	脂肪 5.06 含水炭素 137.02 食 糞 2.005		總カロリー	730.897

體重一匹ニ付テノ窒素出納表(平均)				
	攝取窒素	尿總窒素	窒 素 出 納	
前 期	0.446	0.373	+	0.073 - α
試 驗 期	0.454	0.447	+	0.007 - α
後 期	0.454	0.386	+	0.068 - α

表中αハ尿中ノ窒素ヲ示ス

	月 日	尿總窒素	攝取食糞	尿中食糞	食糞歩率(%)	食 糞 出 納	
前 期	VIII 15	4.032	2.005	1.860	0.46	+	0.145 - β
	16	3.878	〃	1.820	0.47	+	0.185 - β
	17	4.046	〃	1.900	0.47	+	0.105 - β
	平 均	3.985	〃	1.860	0.47	+	0.145 - β
試 驗 期	18	4.704	〃	2.140	0.46	-	0.135 - β
	19	4.613	〃	2.100	0.46	-	0.095 - β
	20	4.515	〃	2.060	0.45	-	0.055 - β
	21	4.942	〃	2.180	0.44	-	0.175 - β
	平 均	4.694	〃	2.120	0.45	-	0.115 - β
後 期	22	4.172	〃	1.780	0.43	+	0.225 - β
	23	3.906	〃	1.700	0.44	+	0.305 - β
	24	4.410	〃	1.540	0.35	+	0.465 - β
	25	3.948	〃	1.980	0.50	+	0.025 - β
	26	3.808	〃	1.880	0.49	+	0.125 - β
	平 均	4.049	〃	1.776	0.44	+	0.229 - β

表中βハ尿中ノ食糞ヲ示ス

前期平均○・二四一瓦ナリシモノ、試験期平均○・二八七瓦トナリ、第三例ニ於テハ前期平均○・二八七瓦ナリシモノ
 試験期ニハ○・三五九瓦トナリ何レモ排泄増加スルノミナラズ總窒素ニ對スル百分率ニ於テモ、第一例ハ前期平均五・
 六二％ナリシモノ試験期ニハ五・八三％トナリ、第二例ハ前期平均七・四八％ナリシモノ試験期ニハ七・八七％トナリ、
 第三例ニ於テハ前期平均七・一九％ナリシモノ、試験期ニハ七・六五％トナリ亦何レモ試験期ニ於テ其値大ナルヲ見ル。

四、くれあちにん窒素。第一例ハ前期平均〇・一四四瓦ニシテ試験期ニハ平均〇・一六一瓦トナリ、第二例ニアリテハ前期平均〇・一六八瓦ニ比シ試験期平均〇・一七八瓦トナリ、第三例ニ於テハ前期平均〇・一五五瓦ナリシモノ試験期平均〇・一七二瓦トナリ何レモ多少ノ排泄増加ヲ來ス即チヒヨリンハクレアチニン窒素ノ排泄ヲ増加トイフ ⁽⁵⁾ Reser Abderhelden u. Budde ノ成績ニ一致セリ、其ノ總窒素ニ對スル百分率ニ於テハ第一例ハ前期平均四・二八%、試験期平均四・六一%ニシテ増大スルモ、第二例ニアリテハ前期平均五・二〇%、試験期平均四・八九%第三例ニ於テハ前期平均三・八一%試験期平均三・六六%ニシテ何レモ寧ロ減少セリ。

五、くれあちん窒素。第一例ハ前期平均〇・〇〇五瓦ニシテ試験期ニハ平均〇・〇〇一八瓦トナリ、第二例ニ於テハ前期平均〇・〇〇一二瓦ナリシモノ試験期ニハ平均〇・〇〇二一瓦トナリ、第三例ニ於テハ前期平均〇・〇〇五瓦ナリシモノ試験期ニハ〇・〇〇二二瓦トナリ何レモ排泄増加ヲ來シ其ノ總窒素ニ對スル百分率モ亦第一例ニアリテハ前期平均〇・一五%ナリシモノ試験期ニハ平均〇・四九八%トナリ、第二例ニ於テハ前期平均〇・三七%ナリシモノ〇・五六%トナリ、第三例ニ於テハ前期平均〇・一二%ナリシモノ試験期ニハ平均〇・四六%トナリ何レモ試験期ニ於テ其値大ナルヲ見ル。

六、尿中あせとん及びあせと酢酸。第一例ニ於テハ前期平均一・三九〇庭ナリシモノ、試験期ニハ平均二・三三二庭ニ増加シ、第二例ニアリテハ前期平均一・八八六瓦ナリシモノ、試験期ニハ二・一七六庭トナリ、第三例ニ於テハ前期平均一・一二八庭ナリシモノ、試験期ニハ平均一・八一三庭トナリ何レモ試験期ニ於テ其値増大セリ。

七、尿中食鹽。第二例ニ於テハ試験期第一日ヨリ排泄増加ヲ來シ前期平均一・八一九瓦ニ比シ試験期ニハ二・一一四瓦トナリ〇・二九五瓦ヲ増加セリ、第三例ニ於テハ試験期第一日ヨリ排泄増加アリ試験期平均二・一二〇瓦ニシテ前期

平均一・八六〇瓦ニ比シ〇・二六〇瓦ヲ増加セリ、財津氏ガ家兎ニ就テノ實驗ニ於テ尿中食鹽ノ絕對排泄量ハヒヨリン注射ニヨリ増加ストイヘルニ一致セリ。次ニ尿中食鹽ト窒素トノ比ヲ見ルニ、第二例ニ於テハ前期平均〇・五六對一、試驗期平均〇・五八對一、ニシテ稍増加ヲ來シ、第二例ニ於テハ前期平均〇・四七對一、試驗期平均〇・四五對一ニシテ稍減少セリ、即チヒヨリン投與ニヨル尿中食鹽排泄量ノ増加ハ尿中排泄ノ總窒素量ニ比シテ第二例ニ於テハ大ニシテ、第三例ニ於テハ小ナルヲ知ル。更ニ食鹽ノ出納ニ就テ見ルニ第一例ニテハ前期平均〇・一九二瓦ノ蓄積アルニ對シ試驗期ニハ〇・一〇三瓦ノ損失ヲ來シ第三例ニ於テハ前期平均〇・一四五瓦ノ蓄積アルニ對シ試驗期ニハ〇・一一五瓦ノ損失ヲ來セリ。

第三章 總括及考按

以上余ハ犬三頭ニ就キ鹽化ヒヨリンノ尿中總窒素、尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素、アセトン及アセト醋酸、並ニ食鹽排泄ニ及ボス影響ニ就キテ實驗シ、得タル成績ヲ序述セリ。今之ヲ一括約言センニ尿中總窒素ハ一例ニ於テハ僅カニ増加ノ傾向ヲ示スニ過ギザルモ、他ノ二例ニ於テハ稍著明ナル増加ヲ來シ、尿素窒素、アムモニア窒素、クレアチニン窒素、クレアチン窒素ハ何レモ其絕對量ニ於テ増加シ、其等ノ總窒素ニ對スル百分率ハ尿素窒素及ビクレアチニン窒素ハ夫々一例ニ於テハ増加スルモ、他ノ二例ニ於テハ減少シ、アムモニア窒素、クレアチン窒素ハ共ニ増大セリ。尿中アセトン及ビアセト醋酸ハスベテノ例ニ於テ僅微ナレドモ増加ノ傾向ヲ示シ、食鹽(二例)モ亦増加シ、注射前ニハ攝取量ヨリモ排泄量小ニシテ、即チ體內蓄積アリシモノ、注射ヲ續クル間ハ排

泄量、攝取量ヲ超エ、即チ其ノ損失ヲ來セリ。而レドモ此等ノ總窒素ニ對スル比率ハ一例ニ於テハ増加シ、一例ニ於
 テハ減少シ其成績一致ヲ缺ケリ。元來ヒヨリンハ緒言ニ於テ述べタルガ如ク動物組織内ニ常存スル一定規成分ニシテ、
 前記諸家及ビ⁽⁹⁾ Abderhalden u. Müller Pal,⁽¹⁰⁾ Ozaki Glanbach u. Pick,⁽¹¹⁾ Kühnlein, Arai, Spatz u. Weichmann 等
 多數學者ノ報告ヲ綜合スルニ、多少ノ異論ナキニ非レドモ大體ニ於テ心臟ニ作用シテハ其活動ヲ抑制シ、末梢血管ニ
 對シテハ之ヲ擴張シ、從ツテ血壓ヲ下降シ、腸筋ニ作用シテハ其運動ヲ敏活ナラシメ、唾腺、腺臟、淚腺等ニ向ツテ
 ハ其分泌ヲ促進スル等副交感神經末梢ヲ刺激スル作用アリ、從テ此等ノ作用點ニ於テハアドレナリント相拮抗スルモ
 ノナリト考ヘラル、ニ余ノ成績ニ於テ窒素代謝ノ亢進ヲ來シタルハアドレナリン⁽¹⁶⁾ニヨリ窒素代謝ノ亢進ヲ來スノ事實
 ト併セ考フルトキ一見奇異ノ感ナシトセズ此ニ於テ更ニ文獻ヲ案ズルニ既述セルガ如ク窒素代謝ニ關スル文獻ノ取ツ
 テ以テ比較考案ノ資ニ供スルモノヲ得ズ。故ニ之ト密接ナル關係ヲ有スル含水炭素新陳代謝ニ就キテノ業績ノ一斑ヲ
 窺ヒ以テ考證ノ一助トナサンニ、⁽¹⁷⁾ Dressel u. Zemin, ハ新陳代謝正常ナルモノ及ビ糖尿病者ニ就キテヒヨリンニ血糖
 低下作用アルヲ檢シ、⁽¹⁸⁾ Weil, ⁽¹⁹⁾ Jacobson, Kohl 等亦夫々ヒヨリンガ血糖ヲ低下スルモノナルヲ認メタルモ、⁽²¹⁾ Klee u.
 Grossmann ハ血壓亢進患者ニ就キテヒヨリンガ血糖ヲ上昇スルヲ報ジ⁽²²⁾ Franke 亦正常血糖ヲ低下スル作用ナキノミ
 ナラズ、アドレナリン過血糖ニ向ツテモ何等ノ影響ヲ及ボサザルヲ報ジ、清松ハ正常血糖ヲ寧ロ上昇スルノミナラズ
 アドレナリン過血糖ニ對シテモ寧ロ共同的作用ヲ示スコトヲ實驗シ Lohmann ハスブラレニンニヨル糖尿ノヒヨリン
 ニヨリテ抑制セラル、コトナキヲ報ズル等此點ニ關スルヒヨリンノ作用ハ成績區々ニシテ一致ヲセザルノミナラズ、
 アドレナリントノ相反作用モ亦之ヲ窺ヒ能ハザル狀態ニアリ、前述セルガ如クヒヨリンハ主トシテ副交感神經ノ刺激

劑ニシテ此點ニ於テアドレナリント互ニ相拮抗作用ヲ有スルモノナルモ新陳代謝機轉タルヤ元ヨリ植物性神經ト密接ナル關係ヲ有スルハ勿論ナルモ其他諸種複雜ナル影響ヲ受クルモノナルガ故ニ本實驗ノ結果ノ如クヒヨリンガアドレナリント同様ニ窒素代謝ニ亢進的作用ヲ呈スルヲ見タルモ却テ奇トスルニ足ラザルベシ。

結 論

鹽化ヒヨリンヲ犬ニ體重一疋ニツキ一〇疋乃至二〇疋ノ割ニ四乃至五日間毎日一回注射ヲ反覆シテ得タル成績ヲ結論スルニ大略左記ノ如シ。

- 一、尿總窒素、排泄増加ス。
- 二、尿素窒素、絶對量ニ於テハ何レモ増加スルモ、總窒素ニ對スル百分率ハ増減アリテ一定セズ。
- 三、アムモニア窒素、絶對量ニ於テモ、總窒素ニ對スル百分率ニ於テモ増加ス。
- 四、クレアチニン窒素、絶對量ニ於テハ何レモ増加ノ傾向ヲ見ルモ、總窒素ニ對スル百分率ニ於テハ増減アリテ一定セズ。

五、クレアチン窒素、絶對量ニ於テモ百分率ニ於テモ排泄増加ス。

六、アセトン及ビアセト醋酸、排泄増加ノ傾向ヲ示ス。

七、食鹽、排泄増加シ注射前ニハ體內蓄積アリシモノ損失ヲ來スモ、 $\text{NaCl}:\text{N}$ ノ比ハ殆ンド差ナク、大體ニ於テ此排泄増加ハ總窒素ト平行セリ。

拙筆スルニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導ヲ忝ウシ、御校閲ノ勞ヲ賜ハリタル恩師辻教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

(昭和二年十月廿三日脱稿)

文 献

- 1) Lohmann; Pflüger's Arch. 118, s. 215 1907 et. 122, s. 203-209, 1908 Zeitschr. f. Biol. 56, S. 1, 1911. 2) Guatrellet; Compt. rend. de la soc. de Biolog. 64, 1908. 3) Schwarz u. Lederer; Pflüger's Arch. 124, S. 353, 1908. 4) Fürth u. Schwarz; Pflüger's Arch. 124, S. 163, 1908. 5) Kinoshita; Pflüger's Arch. 132, S. 607, 1910. 6) Riesser; Hoppe-Seyler's Zeitschr. f. physiol. Chem. 99, S. 221, 1914. 7) Abderhalden u. Buadze; Hoppe-Seyler's Zeitschr. f. physiol. Chem. 164, S. 289, 1927. 8) 財津: 長崎醫學會雜誌: 第5卷, 第1號, 83頁, 昭2. 2. 9) Abderhalden u. Müller; Zeitschr. f. Physiol. Chem. 65, S. 420-430, 1910. 10) Pal; Zentralblatt. f. Physiol. 24, S. 1-2, 1910. Zeitschr. f. exp. Path. u. Therap. 9, S. 191, 1911. 11) Ozaki; 京都帝國大學醫科大學紀要, 2卷, 143-206頁, 大. 6. 12) Glanbach u. Pich; Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 110, S. 212, 1925. 13) Kühlemeln; Pflüger's Arch., 191, S. 99, 1921. 14) Arai; Pflüger's Arch. 193, S. 359, 1922. 15) Spatz u. Wiechmann; Münch. med. Wochenschr. 71, S. 1425, 1924. 16) 青木: 日本内分泌學會雜誌 第3卷, 第2號, 317頁, 昭2. 6. 17) Dressel u. Zemin; Bioch. Zeitschr. 139, S. 463-469, 1923. 18) Weil; Münch. med. Wochenschr. 72, S. 638, 1925. 19) Jacobson u. Rottschild; Zeitschr. f. Klin. med. 105, S. 417, 1927. 20) Kahl; Pflüger's Arch. 211, S. 612, 1926. 21) Klee u. Grossmann; Münch. med. Wochenschr. 72, S. 252, 1925. 22) Franke u. Isaac; Zeitschr. f. exp. Path. u. Therap. 7, S. 326-338, 1910. 23) 清田: 大阪醫學會雜誌 第26卷, 第1號, 89-98頁, 昭2. 1.

as controls.

5. Histologically the suprarenals, thyroid gland and interscapular gland show little pathological change by tubercular toxin.

(Author's abstract)

THE INFLUENCE OF CHOLIN UPON NITROGEN METABOLISM AND THE OUTPUT OF SALT IN THE URINE.

By

K. Aoki.

(From the first medical clinic of the imperial university
of Kyoto. Director: Professor K. Tsuji. M. D.)

This experiment was conducted to ascertain the effect of cholin muriate upon nitrogen metabolism and salt excretion

Three healthy adult female dogs were employed. Each of them, kept in an ordinary metabolic cage, was fed upon a fixed diet composed of rice, lean beef and soy. The urine was analyzed with the following methods:- totalnitrogen, Kjeldahl; urea, Plimmer-Skelton; ammonia- creatinin- and creatinnitrogen, Folin; acetone and aceto-acetic acid, Messinger-Huppert; and salt, Volhard-Salkowski.

As soon as the animals were in nitrogenous equilibrium, cholin muriate (Kahlbaum & Co.) dissolved in distilled water was injected subcutaneously during 4—5 days at the rate of 10—20 mg. for every 1 kilogramm of the bodyweight.

The results of this procedure were as follows:-

1. Totalnitrogen is increased in the excretion.
2. Urea- and creatinin-nitrogen tend to be high in the absolute value, but there are no definite changes in the percentage of totalnitrogen.

3. Ammonia- and creatinnitrogen are definitely increased.
 4. Aceton and aceto-acetic acid tend to be high in the excretion.
 5. Salt is increased in the excretion resulting in a negative balance, but it parallel to the output of total nitrogen, so that NaCl : totalnitrogen ratio is not altered.
- (Autor's abstract)
-