Immunological and Immunohistological Studies on Human Chorionic Gonadotropin (by Fluorescent Antibody Technique)

Kanji KASAI

Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kyoto University,
Kyoto, Japan (Director : Professor Toshio Nishimura, M.D.)

The studies were started by the immunization of albino-rabbits with antigen HCG which was extracted from the urine of normal human pregnancies in the first trimester and highly purified to 5012 or 5427 I.U. per mg. of biological activity.

The antigen protein was separated by the alum precipitate method using 10.0% alum solution. The anti-HCG rabbit antiserum gave only one band in gel diffusion and showed a precipitate in gamma globulin fraction by immunoelectrophoretic analysis.

Crude globulins of the antiserum were extracted by the half-saturated method with saturated ammonium sulfate solution. Crude globulins were conjugated with fluorescein isothiocyanate. Specific anti-HCG fraction was obtained by DEAE cellulose column chromatography with elute of 0.05 M. phosphate buffer solution at pH=6.40. Materials were collected from normal chorionic tissues throughout all the gestational periods, hydatidiform mole in the first trimester and the tumors of chorionepithelioma. They were fixed in 95.0% cold ethanol and embedded in paraffin blocks according to Sainte-Marie's procedure. These paraffin blocks were sectioned into 3 microns' thick slices and exposed to fluorescent microscopy after adequate staining. Control conjugates against anti-HCG conjugate were prepared to certify the specific staining of anti-HCG conjugate.

In the first trimester, chorionic tissues presented linear localization in syncytiotrophoblasts only, which seemingly paralleled the basal membrane. The HCG also localized in the apex area of the villi, which seemed to increase the amount of accumulation in accordance with their arrangement towards the brush border. These findings suggested that HCG in cytoplasm would flow out into the intervillous space through the brush border. The accumulation of HCG in cytoplasm was divided into two different types: one was finely granular and the other a diffuse type. Both of them were characteristic to normal chorionic tissues.

In the second trimester, HCG localized also in syncytiotrophoblasts, especially in the syncytial knots, accumulating in a diffuse way.

In the third trimester, HCG was not distinctly recognized in cytoplasm except at the site of border membranes.

Hydatidiform mole presented bright fluorescence in syncytiotrophoblasts only. No fluorescence was recognized at any site of tissue when the sections were stained with any of the other control conjugates. There were also two different types of intracellular accu-

mulations of HCG: one was a finely granular type and the other was a netted type. The characteristic finding in hydatidiform mole was coexistence of the two different types of accumulation in random arranged syncytiotrophoblasts.

Specific anti-HCG conjugate presented also bright fluorescence in syncytiotrophoblasts of the sections of chorionepithelioma. It was clarified that chorionic tumor cells could synthesize HCG but the intracytoplasmic accumulation of HCG characteristically consisted on only netted type. This was quite a different finding comparing with the accumulation in normal villi, so that the HCG of the tumor HCG seemed to have a different kind of character from that of normal pregnancy. Of secretion mechanism in the case of chorionepithelioma, it was not clear with what process tumor HCG would flow out from the cells.

In the experiments with frozen sections the findings were the same as that with paraffin sections throughout all the cases in the study. Of the control conjugates, no fluorescence was recognized in the sections except where staining with specific anti-HCG conjugate which was absorbed by normal human sera or by urine components was done and the findings of the two were identical.

From the fact that HCG localized only in syncytiotrophoblasts in all cases in these studies, it is suggested that HCG, or at least immunologically specific reactive substance to anti-HCG might be produced in syncytiotrophoblasts only.

The characteristic discrepancy between HCG of normal pregnancy and the tumor HCG was diagnosed by the gel diffusion technique. (pp. 907~936)

人絨毛性々腺刺戟ホルモン (HCG) の免疫学的,

免疫組織学的研究

(蛍光抗体法による)

京都大学医学部婦人科学産科学教室 (指導 西村敏雄教授)

笠 井 寛 司

(昭和43年3月6日受付)

免疫学的妊娠早期診断を可能ならしめた HCG の免疫学的研究は、絨毛性腫瘍患者の予後判定等に拡大されようとしている。妊娠性 HCG と腫瘍性 HCG の間に差異はないか。前者を抗原として得た抗 HCG 抗体に螢光を附加し、絨毛性組織を検討した結果、両者間には細胞内分布状態に明らかな差を認め、gel-diffusion 法でも差を認めた。HCG は絨毛組織中の syncytiotrophoblasts から分泌される。

序 論

人絨毛性々腺刺戟ホルモン (HCG) には既に多方面から研究の手が差しのべられ、幾多の報告をみているところであるが、その本質的な解明にはまだ程遠い現状にある。しかし HCG を更に一步進めて免疫学的、免疫組織学的な立場から検索すれば、少なくともそれが将来の免疫化学的理論に重要な足掛りを提供するであろうことは否定さるべくもない。即ち表題として掲げたこの研究方法はとりまおさず HCG の免疫学的、免疫化学的な研究のみならず更には蛋白化学を通して HCG 周辺の問題解明に役立つ発展性を有する有効なる一助であろうという意である。

第1節 HCG の由来

既に人脳下垂体から性腺活動に関与するホルモンが分泌されることは古くから知られている。下垂体ホルモンについては、貯蔵されているホルモン量が比較的多いことが組織学的、電子顕微鏡に察知されているが、一方下垂体性々腺刺戟ホルモンとは別に人胎盤組織から、同様に性腺へ影響を示す物質が分泌されるらしいことが1920年 Hirose¹⁾ により初めて報告された。即ち人胎盤 homogenate を抽出し、家兎にそれを投与することによつて家兎卵巣に黄体を発生せしめることが知られた。1927年 Zondek & Aschheim²⁾ が妊婦尿を幼若マウスに投与してその卵巣を刺戟する物質の存在を報告した。この事実は多くの追試をうけ³⁾⁴⁾⁵⁾, Evans⁶⁾ らによつて報告された下垂体性々腺刺戟ホルモン (human pituitary gonadotropin, HPG) と区別され、これが絨毛由来であることが明らかになった。従来 HCG については生物学的活性面を主体とした研究がなされてきた感があり幾多の業績も報告されているが、HCG は卵巣に対して必ずしも一定の反応系をもつとはいえず、この点から HCG がもつ生物活性面の分離を行なう試みが多数の研究者によつてなされている。まず Fevold⁷⁾ らがその可能性に光明を投げ、生物学的作用に基づいて FSH 作用と LH 作用に区分命名した。一方 HPG には FSH ならびに LH 作用の他に Evans⁸⁾ らによつて認められた LTH 作用も含まれているが、こうした HPG 及び HCG に共通に認められる FSH 及び LH 作用についても、個々に特異的に検出し得る生物学的活性検定法がなく、従来から幾多の方法が考案実施されてはいるものの尚確定的なものが見当たらないのが現状である⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾²²⁾²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾。これに先立つ1939年 Health Organization of the League of Nations の協定に基づき HCG の国際単位が取決めがなされたが、これはあくまで生物学的活性面から定められており HCG がもつ生物学的成分については考慮が払わ

れていない。しかも HCG はこの標準品との量的反応曲線をもつて活性が決められるため、甚だ不合理であるといえる。これを打開しようとして、生物学的作用を示しつつ HCG のもつ蛋白化学分析を試みようとする動きが出てきた。Proteohormone の一つである ACTH, ADH (antidiuretic hormone) 及び insulin などは既にその化学構造式まで決定されたが、FSH, LH 更には LTH など Gonadotropin に関しては化学構造はおろか蛋白化学的分析は甚だ遅々としたものである。しかし現在 FSH, LH などの標準品として NIH 製品が用いられることが多く、生物学的作用面だけをとりあげるならば可成の高効力をもつ FSH, LH の精製品が出現しているが、尚純品とはいいい難い状態である。これは Gonadotropin のもつ蛋白の species-specificity の問題も多分に関与するし、単に生物学の活性面の強調によることにも大きな要因があるといえる。したがって究極にはこれらもつ蛋白即ち polypeptide 系の解明を待たねばならないことになるう。

第2節 HCG の局在論

HCG の性格分析の詳細は省略し、本論文の重要な問題点でもある HCG の分泌部位ならびに局在に関する現在までの諸報告にみる変遷の概略は次のようである。HCG が絨毛組織から分泌される点は明らかになったが、絨毛組織成分のうち、どれが HCG の産生、分泌に直接関与するかについては今尚論議の絶えぬところである。既に人絨毛組織が内分泌機能をもつことは1902年 Halban が示唆しているが、その後この問題はやや等閑に附されたようであり、上述の Zondek & Aschheim らによつて再認識され、その後迂余曲折の経過をたどり、Bickenbach³⁸⁾ によつて初めて人絨毛組織のホルモン産生作用のより具体的な問題が提起された。これまで、人絨毛組織成分のうち HCG に関与するのは syncytiotrophoblast (S細胞と略記) よりも cytotrophoblast (C細胞と略記) に重点が置かれていた。その根拠としては、1) 妊娠経過中の血中、尿中の gonadotropic activity はC細胞の増殖ならびに退行に平行した推移を示すこと(1943年, Wislocki²⁹⁾), 2) 絨毛組織の培養ではS細胞の outgrowth が不良であるに反してC細胞の増殖は良好であり、これに伴つて培養 medium 中の gonadotropic activity が増加する事実、3) 更には HCG 合成と関係ある mucoprotein が組織学的にC細胞内に認められる点 (Pearse³⁰⁾)、4) 細胞活性を示す acid phosphatase 活性とC細胞の消長が平行する事 5) alkaline phosphatase 活性や RNA がS細胞に多く認められるなどの点からC細胞説が有力であつた。しかし一方では6) 組織中、血中及び尿中の gonadotropic activity は trophoblast 内の小胞体の発達程度と平行し、7) 組織培養では組織細胞の同定が不可能に近いという事実、8) mucoprotein はC細胞に限ることなく、S細胞にも認められており (Palik³¹⁾, Ziliacus³⁴⁾), 亦電顕所見³³⁾ ³⁴⁾, 更には電顕と組織化学所見³⁵⁾からS細胞説の抬頭をみるようになった。これらの諸報告の如く、各々異つた立場から HCG の産生部位、局在に多大の努力が払われているにも拘らず、尚確認の得られないのが実情である。既に ACTH 等では HCG とは比較にならぬ研究の進展をみるにも拘らず、一層複雑な話題が提起されている実情からしても、例えば HCG の前駆物質という概念を導入する 最近の動きをみると、結局 HCG のもつ蛋白解明に問題が帰着せざるを得ないであろう。

第3節 HCG の抗原性

Collip & Anderson³⁶⁾ らは動物に長期にわたり HCG を投与した場合、HCG のもつ生物学的作用が消失または減少することを見出した。これを HCG の生物学の活性に対する中和 (neutralization) と見做し、HCG の長期投与によつて被投与動物体内にある種の物質の産生がみられると考え、これを antigonadotropin と名付けた。

こうした異種蛋白を動物に投与することによつて中和物質の産生を促す事実は Hamburger によつても確認された。即ち HCG のもつ抗原性 (antigenicity) は HCG のもつ分子構造中の蛋白部分によつて発現されるものであらうことが明らかになった。然らば HCG の抗原性とは何であるかを考える時、当然 HCG と HPG の関係を論じなければならない。前述の通り HCG と HPG には生物学の活性が共通しているといつてよい FSH 及び LH 両成分がある。また HPG と HMG (human postmenopausal gonadotropin) の間、HMG と HCG の間にもほぼ同様な生物学的作用の共通面がある。従つて HCG とこれら gonadotropins の間の生物学の共通作用のみならず、免疫学的 cross-linkage の問題を考慮しなければならない。

Goss³⁷⁾ は LH と HCG について, Ely³⁸⁾ は FSH と HCG について, Wilde³⁹⁾ は HMG と HCG の間に, また Paul⁴⁰⁾ は HCG と HPG の間の各々の cross-linkage を報告し, 少なからず単なる contamination 以上の問題 (又は要因) が含まれていると述べている. 総合すると HCG は生物学的な面と共に免疫学的又は蛋白化学的な見地からも追究されねばならないが, 共通の蛋白部分が決定的な意味をもつか否かという点になると判然としないのである. 実際に単に温熱処理を施すだけで生物学的活性と免疫学的活性には discrepancy がみられることは既に報告したところである⁴¹⁾. 一方例えば HCG に含まれる LH 活性を主として考えるならば, 羊の精製 NIH-LH は分子量約 23×10^3 , 構成アミノ酸は Asp. 10, Thr. 14, Ser. 13, Glu. 3~14, Pro. 25, Gly. 11, Ala. 15~16, Cys. 8~10, Val. 12~13, Met. 7, Ileu. 6, Leu. 12, Tyr. 6, Phe. 5, Lys. 10~11, His. 5, Arg. 8, —CONH₂ 12基をもち glucosamin 10, galactosamin 3 をもつ glycoprotein であることがわかつている⁴²⁾. これを用いて免疫学的特異性を検討した報告によれば⁴³⁾⁴⁴⁾, HCG, HMG, 人 LH PMSG などとは免疫学的 cross-reactivity のない事実がつきとめられている. この点からみると単に生物学的共通作用があるからといって, 免疫学的共通抗原性を包含することにはならず, 更に HCG の抗体が, 従来の報告にみる如く生物活性面では共通の作用をもつ non-hormone LH 又は同 FSH 製品との間に cross-link-age があるといつても, 単なる夾雑反応の異型的なものであるかも知れないという危惧をもとり去り得ない. 以上のことから考えて, HCG の抗原性を単一 factor と考えることは不可能であるが, さりとて LH 活性又は FSH 活性を来す components が単離可能かどうかともわからない現状においては, HCG を抗原として用いる場合には, これの抗原性規定を可及的に最少限度にする, 即ち疾患名, 時期等更には抽出方法, 純化方法などにつき可及的に明確にする必要があろう.

第4節 螢光抗体法と HCG 抗体の実用性

1960年 Wide & Gemzell⁴⁵⁾, Brody & Carlström⁴⁶⁾, McKean⁴⁷⁾ らによつて, 従来 Friedman 反応⁴⁸⁾ とか, Mainini 反応⁴⁹⁾ によつて代表されていた尿中 HCG の生物学的検定法が, 免疫学的な方法を用いて検定可能なのが報告されて以来, 急速に HCG の免疫学的研究ならびに実地臨床面における応用研究が進められて今日に至っているが, 上述の如く HCG の抗原性にも亦それを用いて得られる抗 HCG 抗体にも種々の未解決点が多く, 基礎的研究は勿論, 実地臨床面でも尚多くの discrepancy が見られることは衆知のところである. 主として現在は妊娠の比較的早期診断に用いられる程度であり, HCG 様物質の分泌が認められている絨毛性諸疾患への応用も一部行なわれているようであるが, 我々が行なつた実験成績では⁵⁰⁾, 必ずしも臨床の応用に非難のないものでなく, 正常妊娠例に用いても, 定量的にはまだ問題が残されているといえる.

一方特異抗原抗体反応下において, 組織細胞内で展開される生物現象の真の姿を捕えようという試みで免疫組織学の立場から螢光抗体法が考察された. 既に抗体蛋白に色素を標識する試みは1930年 Reiner⁵¹⁾ によつて始められたが, その後1933年 Heidelberg⁵²⁾ らが diazo 化した egg albumin に benzidine 塩を導入することに成功し, 免疫化学面における spectrophotometric な量的研究の端緒を開くことになった.

これらの業績を基盤として, 螢光抗体法への道を開いたのが Hopkins⁵³⁾⁵⁴⁾ ら及び Marrack⁵⁵⁾ である. 一方1941年 Coons⁵⁶⁾ らは蛋白と色素との結合に成功し, 組織内抗原の局在性の追究に成功した⁵⁷⁾. これは極めて画企的な報告であり, これを機会として免疫学的見地に立つ組織学として広い分野で応用され, 単に基礎的事実の追究のみならず, 臨床にも迅速診断などに用いて甚だ有効な手段として益々発展の道を歩む結果となつたのである. 因みに1951年 Marshall⁵⁸⁾ らは初めて螢光抗体法を hormone 物質の研究に応用したのであるが, 1958年になつて Cruickshank & Currie⁵⁹⁾ が human & bovine pituitary ACTH, GH 等についてその体内分布を報告している. 一方 HCG に関する螢光抗体法による研究報告は1962年の Midgley & Pierce⁶⁰⁾⁶¹⁾, 1963年の Thiede⁶²⁾, 1964年の Miyagawa⁶³⁾ ら, 1965年 Notake⁶⁴⁾ ら及び Nakayama⁶⁵⁾ の報告と共に Nishimura⁶⁶⁾ ら及び Kasai⁶⁷⁾ の成績があるが, 報告された内容には方法, 手技等まちまちであり⁶⁷⁾, 成績についても画一的に述べることは出来ない. Cruickshank⁵⁹⁾ らの成績によれば, hormone 相互間の交叉染色性を十分に検討したところ, in vitro の交叉反応性がなくても, 染色性で明らかな交叉性を認めている.

彼等の結論によれば hormone 物質の特異染色を得るためには相当慎重でなければならないということであり、因みに HCG を例にとつてみても、これが属する glycoprotein の category 中には、Schultze⁶⁸⁾ らによれば α_1 -acid glycoprotein 又は orosomucoid, α_1 X-glycoprotein, α_1 -glycoprotein, α_2 -glycoprotein 等があるなかで現今までの報告には、HCG とこれら glycoproteins の詳細を伝えるものではなく、亦免疫化学上の諸方法をもつてすれば、蛋白ならびに carbohydrates の純度の定量的測定、又はその detection に従来 hormonal substances に対する純度とは異なつた criteria を必要とすることは否定出来ないようである⁶⁹⁾⁷⁰⁾。これらの点を考慮しながらまず抗原 HCG の組織内(正常絨毛組織、胞状奇胎組織、絨毛上皮腫々瘍組織)分布と共に各組織内 HCG の組織、細胞外排出経過ならびにその機序について検討した。

第 I 章 実験材料ならびに実験方法

第 1 節 実験材料

(I) 抗 原

正常妊娠初期妊婦尿中から抽出した HCG を精製乾燥し、その生物学的活性値を 5012I.U./mg. 及び 5427I.U./mg. の二種に純化した製品を帝國臓器株式会社から提供をうけたので、この二種の HCG を個別に抗原として用いた。HCG は妊婦尿中に検出されるのみならず、種々の trophoblast 性疾患で、それらの患者尿中などで検出されており、本実験では HCG 又は HCG 様物質の検索の目的からすれば、それら疾患にみられる HCG (又は HCG 様物質) を各々抗原として用いるべきことは論をまたない。

一方 HCG の生物学的活性は甚だ不安定であり、特に純度が高まるにつれて不安定さは増すといわれている。更に生物学的活性と雖も HCG の態度そのものとは、必ずしも平行関係にあるとはいひ難く、免疫学的検索に生物学的単位を直ちに導入することは、今後詳細な研究を待たねばならない点であり⁴⁷⁾⁷¹⁾⁷²⁾⁷³⁾、現段階では差し控えねばならない。したがつてこの実験には、基準になるべきものとして一応上記二種の HCG が含有する蛋白量を選んだ。

(II) 被免疫動物

被免疫動物として、成熟雄白色家兎 (male mature albino-rabbit) を選んだ。抗原の投与量、将来採取すべき抗血清量等を考慮して体重 3.5~4 kg のものを用いた。

(III) 検索資料

次に列記するものを検索資料とした。

1. 人正常妊娠初期絨毛組織
2. 人正常妊娠中期絨毛組織
3. 人正常妊娠末期絨毛組織
4. 胞状奇胎絨毛組織
5. 絨毛上皮腫々瘍組織

(IV) 螢光色素

螢光色素としては、1) isothiocyanates 系及び isocyanates 系、2) acid chlorides⁷⁴⁾ 系、3) Diazo 系、4) その他 triazine chlorides, flavine⁷⁵⁾ 等があるが、抗体蛋白との結合が可能だけでは使用に適しないし、螢光強度の程度及び螢光色素としての安定性などが要求されるため、実際に用いたのは 1) 系中の Riggs⁷⁶⁾ によつて開発された fluorescein isothiocyanate (FITC) と、tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC) の二種類で、後者は Hiramoto⁷⁷⁾ らによつて開発されたものである。製品は共に Baltimore Biological Laboratory, Inc. U.S.A. のものを用いた。FITC は螢光強度も保たれ、色素も安定し、操作も簡単であり、螢光抗体液の長期保存も可能であるという利点をもつ緑色螢光物質である。後者は橙赤色の螢光物質であるが、他にある同色系物質に比べて FITC と吸光スペクトルの最大波長が同じである点で利用しやすいと考えた。色素の発光性が、吸収された励起光の吸収部分における強度の高いもの程推賞されるわけで、螢光波長と吸収光の波長の関係は Stoke の法則により確立している。螢光の主吸収 peak は 490m μ 、その

励起は $525\text{m}\mu$ である。しかし一般に有機化合物の蛍光（蛍光収率及び波長）は、紫外線、pH、温度、乾燥度、溶媒等の要因によって、甚だしく影響を受けるから、各々の要因に対して最も適当と考えられる条件を選んで次の様にした。pH=7.2、温度 $0^{\circ}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 、溶媒は Bouchard⁷⁸⁾ の実験成績及び Yagi⁷⁹⁾ らの成績をみてもわかることであるが⁸⁰⁾、主として phosphate buffer solution（以下 PBS と略記する）が用いられることが多く、この実験でも PBS を用いた。尚この実験中に用いた諸種 PBS 及び緩衝液の処方 Table 1 にまとめて記載した。

Table 1 Buffer solution

Staining B. pH-7.20	
$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	22.50
$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	126.65
NaCl	400.0
Aq. dest.	50.0 lit.
Starting B. pH=8.40 0.005M.	
$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0.276
$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	12.868
Aq. dest.	10.0 lit.
Carbonate B. pH=9.10	
1. Na_2CO_3	5.30 in Aq. 100ml.
2. NaHCO_3	4.20 in Aq. 100ml.
1. and 2.mixed	

Fig. 1.

第2節 抗 HCG 家兔抗血清産生過程

抗原 HCG の蛋白量を窒素微量測定法 (nitrogen microdetermination technique)⁸¹⁾⁸²⁾⁸³⁾⁸⁴⁾⁸⁵⁾⁸⁶⁾ によつて測定したところ、純度 5012I.U./mg のものは 0.602mg/mg HCG となり、純度 5427I.U./mg のものは 0.645mg/mg HCG であった。HCG 重量とその含有する蛋白量とは各製品で、ほぼ直線関係を示すことがわかった。因みに純度約 3000I.U./mg 及び 1 アンプル中 1000I.U. の HCG 製剤では、HCG 重量と含有蛋白量との間には相関関係がみられなかった。したがつて免疫学的検討を行なうためには、抗原 HCG の純度は少なくとも $5.0 \times 10^3 \text{I.U./mg}$ を要すると考えられる。これらの抗原 HCG 用いて次に述べる二通りの免疫方法を行なつた。

(1) Freund's adjuvant⁸⁷⁾ を用いる方法

Freund's adjuvant には incomplete 及び complete の二種類があるが、特異抗体成分の単純化が問題になることを考えると、特に HCG の如く生物学的活性成分の混在をあらかじめ認知しながらその特異抗体を得ようとする場合には、この adjuvant 中に抗酸性菌の死菌（主として結核死菌）を加えないものを用いるべきであろうと考え、incomplete の方を選んだ。まず、5427I.U./mg の HCG 10.0mg、蛋白量として 6.45mg、を家兎一匹当りの単位とし、これに 1.0ml の生食水を加えて完全に溶解し、この上に 0.4ml、Bayol F (Staneco Distribution, U.S.A. 製) 及び表面活性剤として Arlacel A (Atlas Powder, Co. U.S.A. 製) 0.1ml を加え、約 1 時間、water in oil の状態になるように十分攪拌し、家兎足蹠皮下に 5ヶ所に分割注射を行なつた。これを初回免疫とし、投与した HCG 総量の生物学的単位は $5.4 \times 10^4 \text{I.U.}$ となるが、この数値に信用は置けない。その理由は既述したところである。

(2) Alum precipitate method

原法は1943年 Proom⁸⁸⁾ が発表した論文にみられる通りであるが、今回この実験で HCG 抗原に用いた方

法は, 原法を変形し, hormone 抗原特に蛋白性ホルモン抗原に用いて有用ならしめた. この方法を HCG 抗原に用いた報告例はなく, 本実験担当者が最初であり, 既にその概略は報告したところである⁶⁶⁾⁶⁷⁾. 抗原 HCG 5012 I.U./mg のものと, 同 5427I.U./mg のものを用いた. 投与量はそれぞれの 15.0mg (蛋白量として9.25mg及び9.67mg)であり, これを一匹当りの初回免疫量とした. 5427I.U./mg のものは抗原資料の関係から家兎一匹分にとどめ, 5012I.U./mg のものは家兎二匹分用意した. 向後の方法は両抗原 HCG に共通のものであるのでまとめて記述する. 抗原 HCG の 15.0mg を生食水 0.25ml に全量を完全に溶解したあと, 蒸留水0.85mlを加え, 総溶媒量を 1.10ml, とした. これに 10.0% カリ明礬液 ($AlK(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$) 0.90ml を加え, 泡立ちを防ぎつつ十分攪拌したあと, 5.0N の NaOH で pH=6.50 に調整し, 白色雲絮状沈澱を得た. 操作はこの間 ice-bath による低温を厳守した. この沈澱浮遊液を 4°C, 4000r.p.m. で15分間遠沈し, 上清を静かに捨てたあと, 生食水で沈澱を十分に洗滌した. 洗滌操作には, 生食水5.0mlを用い, 1/10000稀釈の merthiolate を一滴加え, 15分間, 4°C, 4000r.p.m. で遠沈したあと上清を静かに捨てた. これを2回繰返したあと2.0mlの生食水で沈澱を完全に溶解した. 更に上述の merthiolate を一滴加え, 全量を一匹の家兎両側下腿筋肉内に注射した.

以上が(1), (2)の方法による初回免疫までの過程である. 以下に述べるのは, 抗体価の上昇を期待して行なつた booster (追加免疫) の方法であつて(1), (2)に共通なため, 一括して述べる. 初回免疫注射の日から数えて第4, 第7及び第9週の初日に各々一回宛初回免疫に用いたと同じ抗原 HCG の各々10.0mg を1.0mlの生食水に溶解して, 家兎耳静脈から booster 注射を行なつた. Booster 注射直前に採取した家兎血清を用いて抗体価の上昇程度を測定しその成績を各 booster 注射後3日目に判定した.

これを一覧出来るようにしたのが Fig. 2 である. 第一回目の booster 注射までに死亡した同図中に示し

Fig. 2. Antibody tioration

た F₁, F₂, F₃ を除いて一様に抗体価の上昇を認めたが, 各家兎の抗体上昇経緯には差が認められた. 初回免疫注射後第10週目には, 満足出来る抗体価の上昇を認めたので, 直ちに心臓穿刺によつて採血した. 尚 F₄ は採血せず, 第3回目の booster 注射以後, 何らの処置も加えず生存させている.

第3節 抗原 HCG ならびに抗 HCG 家兎抗血清の免疫学的検討

抗血清中に存在し, 抗原と特異的に反応する抗体の力価を示す最も合理的且信用度の高い方法として沈降曲線法がある. 従来から行なわれている, タンニン酸処理血球凝集阻止反応 (hemagglutination inhibition reaction with tannic acid treated red blood cells—HAIR と略記されている⁸⁹⁾⁹⁰⁾) であるとか, ラテックス凝集阻止反応 (latexagglutination inhibition reaction, LAIR と略記されている⁹¹⁾) にみられるよう

な、主として感度のみを採り入れた測定法よりも Heiderberger⁸²⁾ によつて開発された前述の窒素微量測定法を用いて、特異的抗体量を量的に表示する方法がより適確さを有するものと考え、抗体の測定にはこの方法のみを採用した (詳細は後述)。

抗原 HCG 及びその抗体検索には次の諸方法を用いた。

(1) Ouchterlony 法 (寒天平板ゲル内拡散法⁹²⁾⁹³⁾⁹⁴⁾)

Ouchterlony 法は抗原と抗体を寒天平板上で拡散させ、その接点に沈降反応を起させる、謂わば二重相拡散法であるが、これとは別に、单相拡散法 (single diffusion technique) が Oudin⁹⁵⁾ によつて開発されている。用いた寒天は Difco 製で二重相拡散用 (double dif. tech.) として 1.0% agar solution とした。溶媒は pH=6.50 に調整した生食水である。検定用抗原 HCG として 5012I.U./mg のものを用い、各々含有蛋白量を1.0ml当り 100 γ , 200 γ , 400 γ , 600 γ , 800 γ , 1000 γ の抗原溶液を作り、寒天孔 (well) 番号 6 $\rightarrow$ 1 の順に各0.015mlを注入し、中央の well には抗血清を抗原と等量注入した。これによつて中央の well と、1, 2, 3, の各 well との間に連続し且つ一本の沈降線を認めることが出来た (Photo. 1)。この事実から、

Photo. 1. Ouchterlony's agar plate : 1-6 ; antigen HCG (5012 i.u./mg).
C ; anti-HCG rabbit antiserum.

抗原 HCG と抗血清との間には特異的に反応する一つの抗原抗体反応系を認めたが、後述する如く、免疫電気泳動所見では、必ずしもこれと一致した成績ではなかつた。

(2) 沈降曲線法 (precipitin curve in vitro)⁹⁶⁾⁹⁷⁾⁹⁸⁾

肝要なことは、抗体量を正確に測定する必要上、抗体と最も強く反応する対応抗原量を上述の Ouchterlony 法で検討した結果に基づいて抗原蛋白のもつ抗原域及び抗体域の凡そその値を予じめ知っておかねばならないことである。

これによつて加えるべき抗原量の大概値を見当づけ、試験管中で抗原抗体反応を起させその complex から抗体に加えた抗原の蛋白量を差し引くことによつて抗体量を知ろうというのがこの方法である。Ouchterlony 法では抗原抗体反応の感度が鈍く、特に沈降線を認めなくなる抗原及び抗体相互の最低濃度附近に注目する必要があるので、沈降曲線法では抗原 HCG の蛋白量として 50 γ , 100 γ , 200 γ , 300 γ , 400 γ , 500 γ の系列と、50 γ , 100 γ , 150 γ , 200 γ , 250 γ , 300 γ の系列を作り各々 1.0ml の生食水に溶かした。これら溶液の各 0.10ml をネスラー試験管に分注し、この各々に 0.10ml の抗血清を加え、既述の merthiolate の一滴を加え

で両者を十分混合せしめ, 37°C, 2時間正確に incubate した後 4°C の低温室にて 30 時間静置した. こうして得た抗原抗体反応による特異的 complex は極めて微量であるため, このままの状態から直ちに上清を捨てず, 冷却 PBS, pH=7.20 及び生理食塩水を約 5 ml 加え, 4°C, 2500r.p.m., 30 分間遠沈し, 管底に complex を密着させて後上清を十分に捨て去り, 窒素微量測定法によつて complex の総蛋白量を求めた. 更に計算によつて抗体蛋白量を求めた. この値をグラフにしたものが Fig. 2 及び Fig. 3 であり, 後者は前者の A₁,

Fig. 3. Precipitin curve

A₄ を例としたものである. Fig. 2 ではこの方法で測定した各時点での最高値を記した.

(3) 電気泳動法 (electrophoresis)

電気泳動法を利用した分析方法として現在広く用いられているものに, 沔紙泳動法 (paper electrophoresis), 分画泳動法 (Zone-electrophoresis) 免疫泳動法 (immunoelectrophoresis) などがあり, 可成の成績が得られることは事実であるが, これらにも当然方法論的な限界があることは言をまたない. 既に多くの報告者が指摘し, 又同一正常人血清について photometric pattern, immunoelectrophoretic pattern の二種及び starch gel electrophoretic pattern をそれぞれ対比しつつ論評を加え, electrophoretic analysis のもつ限界を指摘した報告は枚挙にいとまがない⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾¹⁰¹⁾¹⁰²⁾¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾. 少なくとも, 限界を作り出す要因としては, i) 用いた buffer の pH 値, ii) その pH 値によつて mobility の異なる分子が泳動出来るかどうか, iii) 極めて少量に含まれて, しかも mobility が似た第 2 成分が, 活性面で重要な役割をもつ場合, 果して鑑別

しうるか否か, iv) 例え mobility が同じであつても必ずしも同一物質であるとはいえずその逆も亦成立するといった点があげられる. 特に酵素, ホルモン, 抗体等, 特異的な生物学的活性をもつ蛋白部分が, その物質の含有総蛋白量の極く一部分である場合には, 泳動法によつて得た種々の成分の中で, その裏にかくれて主体をなす蛋白部分が同動する可能性は否定出来ない. 例えば pH=6~8 では血清 albumin は単一組成と見做される成績を得るが, pH=4 となれば, これが少なくとも二つ又¹⁰⁵⁾¹⁰⁶⁾はそれ以上の peak¹⁰⁷⁾を示すという報告がある. この他にも種々の問題点が考えられるが, このような前提にたつて抗原 [HCG, 抗 HCG 抗体及び絨毛上皮腫患者 HCG について電気泳動分析をなつてみた.

(i) 抗原 HCG

沔紙電気泳動法に用いた装置は Spinco Model R (Durrum 式¹⁰⁸⁾) であり, 電気装置は Beckman Duostat である. 緩衝液には Veronal buffer solution, pH=8.6, イオン強度 0.1~0.05μ のものを用いた. 緩衝液の処方 Beckman の方法¹⁰⁹⁾に従つた. 本実験中における buffer のイオン強度は μ=0.075 であつた.

抗原 HCG の溶液濃度は 5012I.U./mg のものの 10.0mg/ml (蛋白濃度 6.0mg/ml) である. 溶媒は生食水とした. 用いた沔紙は Schleicher and Schnell 社製の Beckman #320046 である. 通電条件は定電流 2.5mA, 電圧 70volt, 16時間泳動である. 泳動終了後, 110°C 前後で急速に沔紙を乾燥させ, 約 30 分後 amidoschwartz 染色法と過沃度酸フクシン染色法を併用した. 抗原 HCG のもつ蛋白部分は Fig. 7 の如く, α₂ 部分に peak をもち, α₁ 及び β-globulin 領域に亘る泳動像を得た.

これは Lunenfeld¹⁰⁾ がほぼ同様の条件下で行なつた成績とほぼ一致した. このことから, 5012I.U./mg の純度の, 正常妊娠初期妊婦尿中 HCG は α₂-globulin を主成分とした proteohormone であるといえそう

Fig. 4. Antigen-HCG Paper-electrophoretic Analysis

である (Fig. 4).

(ii) 抗原 HCG 及び抗 HCG 抗体

抗原 HCG 及び抗 HCG 抗体の性状をより正確に把握するためには、電気泳動法における欠点を可及的補いつつ、矢張り Grabar⁽¹¹⁾ の創案した immunoelectrophoretic analysis を行なう必要がある。衆知の通り、これは寒天ゲル内でまず電動泳動を行ない、更に Ouchterlony 法と同じ原理によつて泳動分離された各蛋白分画と抗体又は抗原との間の沈降反応をみようというものである。現在用いられている泳動用支持体としては上述の agar gel のほかに cellulose acetate, cyanogum 及び starch gel がある。本実験でも、一般に用いられる如く agar gel を用いた。この実験で用いた電気装置は菅垣社製で、Hirschfeld⁽¹²⁾ 改良型である。寒天は Difco 製の repurified agar で、寒天濃度 1.0%, slide glass 上の寒天の厚さは 1 mm である。寒天の溶解にはまず 2.0% の agar solution を純水溶媒で作り、全部が加熱溶解されてから 60°C 前後で緩衝液を加えて 1.0% とした。緩衝液は Laurell 処方の変法で⁽¹³⁾、discontinuous buffer system であり、Table 2 に示し通りである。泳動には 2 枚連続の slide agar plate を常用したので通電条件は、定電圧 160volt, 32mA, 45分間である。沈降曲線が適確に得られるためには、抗原過剰もしくは抗体過剰にならないことが必要であるから寒天板上の溝又は孔の大きさも、抗原、抗体の濃度を変化させると同様に種々変化させてみた。

Table 2

1. Paper-E., (Beckman buffer B-2)		
Veronal-Na		15.40
Diethyl barbituric acid		2.76
Aq. dest.		1.0 lit.
pH=8.6 $\mu=0.075$		
2. Immuno-E.,		
	Bath	Agar
Veronal	2.76	3.32
Veronal-Na	17.52	20.02
Ca-lactate	0.766	3.072
Aq. dest.	2 lit.	2 lit.
pH=8.6 $\mu=0.1$ 0.05		

Fig. app. 1.

Photo. 2.

● ; Normal human serum
 anti-HCG rabbit antiserum
 Al. — — — — — Gl.
 ● ; antigen HCG

Photo. 3.

● ; Normal human whole serum
 anti-normal human whole serum rabbit antiserum
 Al. — — — — — Gl.
 ● ; antigen HCG

原法は Fig. app. 1 に示した. 反応停止には寒天板を $\text{pH}=7.2$ の PBS に浸し, 液を数回取換えたあと, 24時間蒸留水で洗滌した. Photo. 3 は正常人全血清 (NHS と略記) 及び抗正常人全血清家兔抗血清 (anti-NHS と略記) を中介として 5012I.U./mg の抗原 HCG 10.0mg/ml (蛋白量 6.02mg/ml) の場合の分析成績である. 前二者間には 21本の沈降線が識別された. 抗原 HCG と anti-NHS との間には α_2 から β -globulin 領域に沈降線を一本認めたに過ぎない. このことから, 抗原 HCG は濾紙電気泳動所見とほぼ同じ成績を得たのであつて, これらを総合すると, 現段階では, 本実験に用いた抗原 HCG は α_2 -globulin を主蛋白成分とするホルモン物質ということが出来る. 一方抗 HCG 家兔抗血清中に含まれる HCG 抗体の存在する分画を検索するため, 抗血清の種々の希釈液を作つてみた. 即ち原濃度抗血清量を 1 とし, 希釈生食水量との比をとつて Table 3 に示した希釈系列を作り, 抗原 HCG についても原液を 10.0mg-HCG/ml とし, 同じく希釈溶媒として生食水を用いた希釈系列を作つた. これは既に前節で述べたように, 抗 HCG 家兔抗血清中の抗体蛋白量は peak 値 0.169mg-N/ml を示したから, これに相当する蛋白量を含むように

Table 3

	original, folding with isotonic saline,
Antigen ...0 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8	(10.mg. HCG/ml.)
Antibody...0 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64 ; 128	(whole antiserum)

Table 4 Eluting buffers

Fx. I. 0.05M. pH=6.40	
Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	7.504
NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	9.936
Aq. dest.	2.0lit.
Fx. II. 0.10M. pH=6.40	
Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	15.008
NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	19.872
Aq. dest.	2.0lit.
Fx. III. 1.0-N. NaCl	
pH=7.0	

抗血清ならびに正常人血清の希釈液を用いて泳動及び拡散を行なつたわけである。Photo. 2 は抗 HCG 家兔抗血清中の抗体分画を示すものであり、NHS と抗 HCG 家兔抗血清との間には γ -globulin 領域と共に albumin 領域にも沈降線を認めた。この albumin 領域における沈降線に対する解釈は、抗 HCG 家兔抗血清中に含まれる albumin 分画の夾雑物が正常人全血清中の albumin 分画中のものと夾雑反応を惹起したものであろうとの結論に達した。尚 albumin 領域における抗体の局在は理論的に不可能であるが、albumin と HCG の結びつきは、HCG の血中移送と関連して考えるならば必ずしも否定出来るものではなくこの点については目下検討中である。

第4節 粗グロブリン抽出

心臓穿刺法により採血した抗 HCG 家兔血液を、血清分離後に 4℃、30分間、2500r.p.m. で遠沈した。血清の保存は一切低温 (4℃) を厳守した。飽和硫酸溶液 (saturated ammonium sulfate) を用いて粗グ

Photo. 4. Outerlony's agar plate : 1-6 ; patient's serum of hydat. mole. C ; gamma globulin extracted from anti-HCG rabbit antiserum. (1 ; 1, 2 ; 12, 3 ; 1/3, 4 ; 14 5 ; 1/5, 6 ; 1/10 original concentration).

● ; 1
● ; 6 ● ; 2
● ; 5 ● ; C ● ; 3
● ; 4

Photo. 5. Ouchterlony's agar plate ; 1-6 ; patient's serum of chorionepithelioma. C ; gamma globulin extracted from anti-HCG rabbit antiserum. (1 ; 1, 2 ; 12, 3 ; 1/3' 4 ; 14, 5 ; 1/5, 6 ; 1/10, orig. concentration).

● ; 1
● ; 6 ● ; 2
● ; 5 ● ; C ● ; 3
● ; 4

ロブリン (crude globulin, Cg と略記) を抽出するのに, 半飽和法と1/3飽和法の二通りがあり, 抗 HCG 免疫グロブリン抽出にも二通りが用いられている. 半飽和法によれば Cg のみならず, albumin の抽出をも包含する可能性が考えられ, 報告例によれば後者の方法によるものが多い. あらかじめ行なつた両方法で抽出物を電気泳動したところ, 共に albumin の混入を認めなかつた (Fig. 5). したがつて半飽和法を採

Fig. 5. Crude globulin of anti-HCG rabbit antiserum

り, Cg と考えられる蛋白分画の収量を多くならしめた. 採取出来た血清量は家兎3匹分で総量98.7ml, であり, 1家兎当り 22.90ml. であつた. 以下の記述は1家兎当りの抗血清量に対して採つた方法である. 22.90ml. 中, 0.90ml. を諸検査のために残し, 22.0ml. に対し, 等量即ち 22.0ml. の飽和硫酸溶液を徐々に抗血清に滴下しつつ攪拌し, 白色絮状沈澱が次第に濃くなるのを観察した. 滴下し終り, 十分攪拌したあと, この沈澱浮遊液をそのまま 4°C, 24時間遮光静置した. すでに報告した処では⁶⁶⁾, 飽和硫酸液を血清量の1/2としたが, これは1/4飽和法に相当し, その際 albumin の混入なきことを確め更に血清量の1/2量の飽和硫酸液を滴下したことを附記する. 24時間後 4°C, 15間, 4000r.p.m. で遠沈し, 上清を分離した. この上清を濾紙電気泳動にかけたところ, globulin 分画は根跡的でありほぼ確実に Cg は抽出され, 沈澱に移行したことを確認した. 4°Cの条件で, 取り出した沈澱を 11.0ml の生食水で十分に溶解し, これに等量

Fig. 6. Extracted gamma globulin of anti-HCG rabbit antiserum

Fig. 7. Paper-electrophoretic patterns of anti-HCG rabbit antiserum

Fig. 8
DIALYSIS

の飽和硫安液を加えて沈澱を生ぜしめ、前回と同じ条件で遠沈し上清を分離した。この際溶解する生食水量は適当でよいが、原血清量の1/2量とした。この操作を二回繰返し、Cgの洗滌操作を終った。洗滌後の沈渣は最終的に5.0mlの生食水に溶解し、透析膜に封入し、Fig. 8に示す方法で攪拌透析を行なった。

透析液はpH=7.20のPBSを用い、頻回の透析液の交換を行ないViolet反応、Nestler反応が共に陰性になるまで十分な透析を行なった。透析開始後72時間で両反応共に陰性になったが急のため更に24時間透析を続けた。

第5節 螢光色素附加過程ならびに螢光抗体液の採取

螢光抗体液を作製する過程として次の二つの方法を採用したので、その概要を記述する。

(1) Cg・螢光色素直接結合法

これはCg溶液に直接螢光色素を結合(conjugate)したあと、螢光結合免疫グロブリン分画を採取する方法である。透析を終了したCg生食溶液中の含有蛋白量を窒素微量測定法を用いて測定したところ、総量131.28mgであった。

上述の通りCgの免疫学的諸検査のため、その0.1ml(Cg=2.61mg)を消費したので、実際に螢光色素結合に用いた量は128.67mgということになる。総Cg量の1.0%の割合にcarbonate-bicarbonate buffer solutionを加え、Cg生食溶液中のCg重量が10.0%となるよう更に生食水を添加した。螢光色素は過去の報告例によれば、通常含有Cg量対色素の重量比が20:1~40:1の割合が適当とされているが、螢光染色の結果の良否の一つの要因とされている色素対蛋白のモル比(F/P ratio)を可及的低く且特異的染色力価が高くなるようにしなければならない。しかしCgの如く凡ゆる血清globulin蛋白を含有すると考えられる場合には、画一的に比率を決めるのは困難である。一応従来の重量比を参考にし、且つ気温、湿度条件を併せて色素の吸湿性を含めて不可避免の実験誤差を20%と見做し、実質的重量比が60:1となるよう色素量を2.58mgとした。Cg生食水溶液に螢光色素を加え、攪拌によりconjugateしたが、色素はFITCを用いたので4℃、6時間の攪拌で十分であった。言うまでもなく、色素・蛋白のconjugateは一様でなければならず、満足な攪拌状態維持には細心の注意を払った。攪拌終了後は前述のPBSで透析を行ない、non-conjugated aminesを徹底的に除去した。透析効果は通常4~5日間の頻繁な外液交換で十分とされているが、この実験では外液量2lの容器で14回交換し、透析開始後80時間で外液中のfree aminesの検出

は陰性となつた. Cg に結合した螢光色素液から, 抗 HCG 抗体蛋白に結合した分画だけを採取し非特異因子を除去しなければならない. 抗 HCG 抗体は, 前述の如く γ -globulin 分画に含まれているので, この分画を採取するために DEAE-cellulose (Serva 製⁽¹¹⁵⁾⁽¹¹⁶⁾⁽¹¹⁷⁾) column chromatography 法を用いた. Cellulose の capacity 0.93, 螢光色素結合 Cg 液1.0mlに対して乾燥 cellulose を 1.0 g の割合にした. この cellulose を 1N-NaOH, 1N-HCl, 1N-NaOH 各500ml宛, この順序で洗い, cellulose の ion-activation を行なつた.

Cellulose は pH=12 以上の強アルカリ性を示しているため, 蒸留水で更に洗滌し, pH=8.40 に調整した上で column chromatography 管に充填した. 24時間, 4°Cに静置したあと, 更めて pH 測定を行なつたところ pH=9.50 を示した. 再度蒸留水で cellulose を洗滌し, pH=8.40 になつたことを確かめて再度充填し24時間静置した. 翌日 column chromatography 管内液が pH=8.40 を示すことを確かめて, まず starting PBS を十分流下せしめ管内 cellulose の環境を整え更に24時間静置した. 第1分画用 PBS を流下せしめて以降それを取り終るまでの経過は Fig. 9 に示した通りである. Autofraction tube は1管当り17 ml採取出来るようにした. 採取管番号18から22に至る 5 本, 総量85mlを1つにまとめ, 透析膜に封入して,

Fig. 9.

Fig. 10. Fx. II. and Fx. III. of Anti-HCG conjugate fraction O.D.=280mμ.

corbowax で濃縮し, F/P=1.3 の第1分画 (Fx. I) を得た. Fx. I の最終収量は8.5mlであつた. これを更めて透析膜に封入し直し staining PBS で4℃, 約100時間透析した. このあと第1分画に続いて第2分画用 eluting PBS, 第3分画用食塩水 eluting solution を順次流下せしめて第2分画 (Fx. II), 第3分画 (Fx. III.) を採取した. 経過は Fig. 10 に示した.

また各々の eluting PBS は Table 3 に一括した.

(2) γ -globulin 分画に蛍光色素を結合する方法

この方法は, 半飽和硫酸法によつてまず Cg を抽出し, 直ちに透析後 DEAE-cellulose を用いて γ -globulin 分画を採取しこれに蛍光色素を結合させる方法である. (1)に用いたのとは別の抗 HCG 家兎抗血清総量20.0mlを用い(1)に述べた方法で Cg を抽出し, 透析したあと column chromatography で分画した. 1tube 当り15.0mlの eluted solution が集まるようにした. 操作ならびに cellulose は(1)と同じである. Fig. app. 2 に示した経過で γ -globulin 分画を得た. 図中 tube #4 から9までの6本, 総量90mlを carbowax で濃縮し, ほぼ全体量が5 ml以下になるようにした. これを再び透析し, 終了後測定したところ総容

Fig. app. 2. Antiserum by DEAE-cellulose column chromatography

量3.1ml, 総含有蛋白量32.5mgであつた. (1)の方法に従つて生食水及び carbonate-bicarbonate buffer を加えて10.0%蛋白溶液とし, これに60:1となるように FITC を加えた. 色素量は0.67mgである. 十分攪拌してから Sephadex G25⁽¹¹⁸⁾⁽¹¹⁹⁾⁽¹²⁰⁾ (pharmacia fine chemicals, Sweden) を用いて column chromatography により非結合色素の除去を行なつた. Sephadex の量は conjugate 1ml に対し4gとした. Eluting buffer は0.01M, pH=7.1, saline PBS を用いた. Eluted conjugate は(1)と同じく F/P 比を測定し, これが1.3となるように濃縮した. F/P の計算式は下記の如くである.

$$F/P = \frac{\text{色素 } \gamma/\text{ml}}{\text{色素分子量}} \div \frac{\text{蛋白量 } \gamma/\text{ml}}{\text{蛋白分子量}} (\text{FITC 分子量 } 389.38 \text{ Rhodamin 分子量 } 536.08 \text{ 蛋白分子量 } 16 \times 10^4)$$

第6節 非特異因子の除去

1950年 Coons & Kaplan⁽⁵⁷⁾ は臓器を用いて非反応性蛍光色素の吸着を提唱し, 用いる臓器は当面する抗原抗体反応系に従つて決めるべきであるといつてゐる. 亦 Coons は1958年陽 ion 交換樹脂 (Dowex 2 chloride, 20-50 mesh, 4% cross linked) を見出し⁽¹²¹⁾⁽¹²²⁾, これを用いて合理的に多量の非反応性蛍光色素の排除が可能なることを指摘した. 1961年, Consden⁽¹²³⁾ らにより non-ionic gel filtration medium (Sephadex G25) が開発され, 低分子 (非反応性蛍光色素) と高分子 (蛋白結合性蛍光色素) を分離可能にした. しかし, 2-band system による分離法のためこの Sephadex 法も尚臓器吸着⁽⁵⁷⁾⁽¹²⁷⁾⁽¹²⁵⁾を経れば一層その効果を高めるものであり, 本実験過程でも次に記すような臓器吸着を試みた. この際最も問題になるのは, 既に諸報告にみる, 抗 HCG 抗体が生物活性面からみた他の gonadotropins と Ouchterlony 法において沈降反応

がみられるという点である。

現在こうした pituitary gonadotropins のみならず non-species specific gonadotropins の存在も否定し得ない (NIH-Sheep LH or FSH の存在と human LH との関係等⁴³⁾⁴⁴⁾¹²⁶⁾¹²⁷⁾) ところであれば, それらの生体内分布, 動態 (人及び供用動物) が十分には明らかにならないのに, 従来の臓器吸着法を無批判に採用するのは避けなければならない。しかし諸点を考察の上, 正常家兎肝 homogenate で吸着することが最も可なる方法であろう。肝 homogenate を用いず, DEAE-cellulose による場合と比較しても得た所見からは差を認めなかつた。これは単に DEAE-cellulose のみで非特異因子の除去が可能なることを物語るが, より念を入れて一旦 DEAE-cellulose を念た蛍光抗体液を更に肝 homogenate で吸着した。その方法を述べる。蛍光抗体液 1 ml に対し正常家兎肝 10 g を用い, 等量 (W. vol.) の生食水を加え, 低温で waring blender を用いて homogenate とし, 更に生食水を加えて 20% homogenate suspension 20% を作り, 蛍光抗体液を混じて 10 分間, 12000 r.p.m. の遠沈を行ない, その上清を用いた。かくして得た蛍光抗体液は抗 HCG 特異抗体から成り立つといえるが, 尚抗 HCG 抗体の含まれる分画に対して抗人 gamma globulin 抗体 (Anti-HGG) に, 更にこれを specialize して抗人 7S-gamma globulin 抗体 (anti-7S) に各々蛍光色素を附加して control とした。その他 Control に用いた conjugates は, Table 5 に示した通りである。

第7節 組織切片作成法

この実験を通じて最も大切なことは, 水溶性蛋白 hormone である HCG を如何にして組織内に留め且つその抗原性を保存するかということである。過去の報告者達によれば⁶¹⁾⁶²⁾, 組織の新鮮さと抗原性の保存のために, 主として凍結切片を用いているようであるが, この実験では蛍光抗体法の諸研究者達の報告を参照にして, Sainte-Marie¹²⁸⁾ の方法による paraffin 包埋組織に主体を置いた。その他塗抹標本¹²⁹⁾による方法, 凍結標本による方法¹³⁰⁾¹³¹⁾¹³²⁾¹³³⁾¹³⁴⁾

¹³⁵⁾などがあるが paraffin 包埋法¹²⁸⁾¹³⁸⁾について述べる。凍結切片法に比してこの方法が優れていると考えられる点は, i) 切片を遙かに薄く出来ること, ii) 組織保存が延長出来ることであろう。反対に組織の収縮が認められ, 細胞, 組織から特に脂質の遊出が認められるなどの点は短所といえるであろう。しかし 1959 年 Carver 及び Goldman¹³⁸⁾, 亦 1962 年 Sainte-Marie¹²⁸⁾ により十分検討され, 抗原に適する固定法を選ぶことによつて利用価値の広いものとなり得るという結論に達したのである。尚固定後の paraffin 切片では細胞内抗原が顆粒状に認められることが多いといわれているが, この原因を paraffin に求めてよいか否かわからない。Paraffin 包埋法における注意点は paraffin 融点とその温度での抗原活性消失の問題である。HCG の活性は温度に比較的敏感なのは生物学的活性面であるが, この実験で行なつた包埋時間では生物活性面の消失は最小限に防止出来ると考えられる⁴¹⁾。まず新鮮組織を 2 mm 以下の厚さとし, dry ice に埋めた 95.0% ethanol に数分間浸し, その後 4°C, 95.0% ethanol で 24 時間固定, 次いで 99.0%, 100.0% ethanol の順に各 24 時間固定した。その翌日冷 Xylol に 30 分浸し直ちに paraffin 包埋した。切片は 3 μ 以下の厚さとし, 脱 paraffin 操作は Xylol を用い, 脱 Xylol は上記 ethanol を濃度の高いものを順次低くし, 45% ethanol を通してから冷 PBS で十分洗滌して染色に供した。

第8節 染色方法

蛍光抗体法で用いられる染色方法は一般に次の 4 つである。この実験では (1) と (2) を用いたのでこれを詳述

Table 5 Control conjugates against HCG

1. Anti-human gamma globulin
2. Anti-human 7-S gamma globulin
3. Fx. II. } of anti-HCG
4. Fx. III. }
5. Absorbed Fx. 1. of anti-HCG with ;
a : Normal human whole serum
b : Non-pregnant urine
c : Urine of children
d : HCG (antigen)
6. Anti-human albumin
7. Anti-pregnant mare serum gonadotropin
Ad. 1. Antigen blocking test on tissue sections
2. Adsorption of Fx. 1. of HCG by normal rabbit liver
3. Frozen sections

Jan., 1965 K.

する。

- (1) 直接法 (direct method 又は Coons 法¹³⁹⁾)
- (2) 間接法 (indirect method ; Watson 法¹⁴⁰⁾ Coons 法¹⁴¹⁾⁽¹⁴²⁾)
- (3) 補体法 (complement method 又は Goldwasser 法¹⁴⁷⁾)
- (4) 二重染色法 (double staining method)

尚補体法では上述の Goldwasser ら又 Klein ら¹⁴⁸⁾によつて始められた方法の他に Hinuma¹⁴⁹⁾らの報告があり、二重染色法に関しては Nairn ら¹⁵⁰⁾の報告 Clayton¹⁵¹⁾, Poetschke¹⁵²⁾, Emmart¹⁵³⁾ら, White¹⁵⁴⁾, Scott¹⁵⁵⁾らの報告がある。

直接法は1942年及び1950年 Coons らによつて始められた原法で、螢光抗体液で直接資料を染色する方法である。非特異染色の可能性も少なく操作も(2)に比べて簡単である。一方間接法には Watson 原法とその後 Weller 及び Coons が mumps 及び herpes virus に用いた方法がある。前者は抗原に非螢光性特異抗体を用いて処理した後抗 γ -globulin 螢光抗体液を滴下するものである。一方後者は切片内における抗体側の証明に用いられた方法であり、抗体を含有する切片を0.05%抗原液で作用させ、余剰抗原を洗滌除去させたあと螢光抗体で染色する方法である。一般に間接法は抗 γ -globulin 螢光抗体液を広く利用出来る利点をもつが、非特異染色性の範囲を拡大する可能性をもっている。

しかし Jankovic¹⁴³⁾ などはこの方法で血球免疫¹⁴⁴⁾, Rh 因子の追究成果¹⁴⁵⁾を報告し、Hamashima¹⁴⁶⁾ は SLE にみる抗核抗体の証明に成果を報告している。

(I) 直接法染色

染色直前の段階にまで処理した paraffin 切片及び凍結切片の各々は、資料部分1 cm²当り抗 HCG 螢光抗体液1～2滴下し、moist box に静置した。6時間、12時間及び24時間の染色時間の差を作り、染色状態を検討した。moist box は室温放置した。

(II) 間接法染色

これには抗正常人 γ -globulin 螢光抗体液と共に抗人 7S- γ -globulin 螢光抗体液をも併用した。抗 HCG 家兔抗血清を資料上に滴下し、37°C, 30分間又は1時間 incubate したあと PBS で十分洗滌した。これに上述二種の螢光抗体液を各々別個に1～2滴滴下し、直接法の要領で染色した。間接法は非特異染色の多いことを利用して抗 HCG 染色直接法に対する control とした。

第II章 螢光染色所見

第1節 人正常妊娠絨毛組織

第1項 人正常妊娠初期絨毛組織

抗 HCG 抗体第1分画(既述, Fx. I), 同第2分画 (Fx. II), 同第3分画 (Fx. III) を用いて人正常妊娠初期絨毛組織を染色して得られた所見は次の如くである。

絨毛組織の trophoblasts 即ち絨毛の外側を形成する S 細胞及びその内側で間質組織の外側に位置する C 細胞及び間質組織の三者に大別して観察した。Fx. I. による特異螢光は S 細胞にのみ存在し、C 細胞、間質組織のいずれにも存在しなかつた。S 細胞内の特異螢光像には二種の異なつた集積状態が認められた。一つは微細顆粒状、他の一つは瀰漫性に細胞内を一様に埋めるものである。微細顆粒状螢光像は S 細胞基底膜に沿つて、ほぼ直線状に配列された螢光点列、あるいは謂ゆる S 細胞の外側膜 (brush border) に沿う部分に同じく螢光点列として認められ、後者は前者よりも螢光顆粒の大きさは不規則で極論すれば大小様々であつた。絨毛全体からみれば同一 S 細胞配列においても絨毛附着部よりも尖端部の S 細胞に集積する場合が多い。一方瀰漫性集積を示す場合は殆んど一つの S 細胞全体を埋めるかまたは S 細胞質内で外側膜に連なるような螢光集積像を呈し、基底部の螢光が認められないのが通例であつた。Fx. II. による染色では S 細胞に限局する螢光を認める点は Fx. I. と同じであるが、間質組織内の処々に瀰漫性小範囲の螢光像を認めた。この間質組織内螢光像の所在は組織学的には画一的なものではなかつた。Fx. III. による染色では S 細胞、C 細胞

胞の区別なく一様に瀰漫性に染色され, 間質組織については Fx II. と同様の所見を得た. また S 細胞内蛍光も C 細胞内のそれも瀰漫性であり両細胞間の境界細胞膜は識別不可能であつた.

一方 S 細胞の外側膜を越えて部分的に絨毛間腔に流出したような蛍光像, 即ち S 細胞の外側細胞膜の破壊像を伴う如き蛍光像を認めた. Fx. I. を NHS で吸収した蛍光抗体液 (NHS-ab. Fx. I. と略す) で染色した所見は非吸収 Fx. I. による染色所見と異なるところはなかつた. 亦 Fx. I. 非妊正常成人尿又は小児尿で吸収した蛍光抗体液 (U-ab. Fx. I. と略す) で染色しても非吸収 Fx. I. による染色所見と異なる点を認めなかつた. 抗人 γ -globulin 家兎抗血清から, 抗 HCG 蛍光抗体液と同じ方法で得られた第 1 分画 (既述の Anti-HGG) で染色すると, S 細胞外側膜外 (即ち絨毛間腔) に沿う free human γ -globulin の染色像が得られた. しかし S 細胞, C 細胞共に蛍光像を認めなかつた. Anti-HGG と特異抗 HCG 家兎抗血清を用いた間接法では Fx. I. でみられた顆粒状蛍光像は認められず, 瀰漫性の蛍光像のみであつた. したがつて S 細胞内蛍光像の詳細な分布状態は認められなかつた. 抗人 7S γ -globulin 家兎抗血清の, 同様にして得られた第 1 分画 (既述の Anti-7S) で染色した場合にも得られた所見は Anti-HGG とほぼ同様のものであり, S 細胞, C 細胞共に蛍光像は認められなかつた. 抗人 albumin 家兎抗血清に Rhodamine を標識した第 1 分画 (Anti-HAL と略記) では, 絨毛組織間質部にみられる小血管腔に極めて弱い瀰漫性の蛍光像を認めたに過ぎず, S 細胞, C 細胞共に蛍光所見は認められなかつた. 抗 PMS 家兎抗血清に同じく Rhodamine を標識した第 1 分画 (Anti-PMS と略記) では, 間質組織全体に亘る蛍光像が認められ, 恰も間質組織の構成繊維走行を示すかの如くであつた. S 細胞, C 細胞共に蛍光像は認められなかつた. しかし C 細胞の基底膜には明らかな蛍光像が認められ, それは間質部に移行していた. 一方妊娠第 10 週の絨毛組織で, S 細胞の発芽状態と考えられる像を捉えた. S 細胞は基底膜から離脱し, C 細胞を残すだけの絨毛間質には Fx. I. による蛍光像を認めず (Photo. 11), 離脱した S 細胞には瀰漫性蛍光像を認めた. 全体を通じて, Fx. I. を抗原 HCG で吸収した蛍光抗体液 (正確には単なる 蛍光液 に過ぎぬ) で染色しても何らの蛍光像も認められなかつた. 組織上で antigen blocking を行なつた場合も同じであつて蛍光像は認められなかつた (Photo. 6~9).

第 2 項 人正常妊娠中期絨毛組織

Fx. I. の染色で S 細胞に局限した瀰漫性蛍光像が認められた. 特に形成されつつある S 細胞結節 (syncytial knot) にある S 細胞成分にはほぼ集中的に蛍光像が認められた. C 細胞成分には蛍光像なく且つ細胞そのものの自体の数も甚だ減少していた. 一方絨毛間腔を浮遊しているとみられる巨大な円形, 無核 (直径約 30μ) の細胞に蛍光像を認めた. この細胞々体内の蛍光は一様に瀰漫性であつて顆粒状ではなかつた. 一般にこの時期の絨毛組織の示す蛍光は瀰漫性集積状態であり, 顆粒状のものは認めなかつた. Fx. II. では S 細胞の

Photo. 6. Normal chorionic tissue in the 7th week of gest. Co-existence of diffuse and granular fluorescence (Fx. I.).

Photo. 7. Normal chorionic tissue in the 8th week of gest. diffuse type (Fx. I.).

Photo. 8. Normal chorionic tissue in the 10th week of gest. Transitional localization between fine and rough granules (FX. I).

Photo. 9. Normal chorionic tissue in the 12th week of gest. Linearly localized fine granules in syncytiotrophoblasts (Fx. I).

Photo. 10. Normal chorionic tissue in mid-trimester. Localization in syncytial knot with free HCG-containing cells (6. M. ; Fx. I).

Photo. 11. Embudding trophoblasts with HCG in cytoplasm of normal chorionic tissue in midtrimester (Fx. I).

Photo. 12. Normal chorionic tissue in mid-trimester. (6.M.) Localization in syncytiotrophoblasts.

Photo. 13. Normal chorionic tissue in the 3rd trimester (10M). Free HCG-containing cells can be recognized

胞体内瀰漫性の小範囲に集積する蛍光像を認めた。特に比較的拡張した絨毛間質血管腔内外にまたがって存在する場合が多い。Fx. III. では、S細胞の細胞質内、絨毛間質成分にも蛍光像を認め、限定的に染別出来る部位はなかつた。NHS-ab. Fx. I., 又 U-ab. Fx. I. の染色所見では共に Fx. I. による染色所見と同じ部位に同様の集積状態の蛍光像であつた。Anti-HGG 及び Anti-7S では共に蛍光像を認めなかつた。一方 Anti-HAL では、絨毛間質に在る様々の血管壁に瀰漫性の蛍光像を僅かに認めたに過ぎなかつた。Anti-PMS では、絨毛間質内に点在する、やや粗大な顆粒状蛍光を認めたが、これがS細胞又はC細胞内に認められることはなかつた。他方 Anti-HGG による間接法では Fx. I. の如く明確なS細胞限局性の蛍光像は認められなかつたが、S細胞以外の他の絨毛成分にも認められるものではなかつた。既述の絨毛間腔内浮遊性の円形、無核の巨大細胞の蛍光像は Fx. I., Fx. II. 及び Fx. III. いずれでも瀰漫性であつたが間接法では一部顆粒状を呈する部分があつた。Anti-HAL, Anti-HGG, Anti-7S 及び Anti-PMS のいずれでも蛍光像は呈しなかつた (Photo. 10, 12)。

第3項 人正常妊娠末期絨毛組織

絨毛組織は広大な間質組織と極く一部に限られたS細胞結節から成立ち、且つ間質組織には大小様々の血管が認められた。Fx. I. では絨毛をとりまくように直線状の、個々には顆粒としては認められない蛍光像を示した。この所見は絨毛の横断切片でより一層明確になる。

末期では、初期又は中期絨毛組織に認められた如き明確な細胞組織内 HCG の局在は認められなかつた。一方中期に認められた巨大細胞に瀰漫性蛍光像が認められたが、この時期には胞体内に必ずしも蛍光をもつとは限らず、蛍光を呈しないものもあつた。尚この種の細胞数も中期に比して可成増加している。Fx. II. では蛍光像は絨毛間質を広く埋め、特に血管周囲ならびに血管内膜にまで波及するものであつた。遊走細胞の所見は Fx. I. によるのと同様であつた。蛍光像をもつ遊走細胞数の増減もなかつた。Fx. III. では絨毛組織、遊走細胞と共に赤血球、白血球を含めて種々の血球成分にも蛍光を認めた。NHS-ab. Fx. I. 及び U-ab. Fx. I. による所見は共に Fx. I. の所見と変らなかつた。

Anti-HGG 染色では絨毛間腔に認められる血球成分に蛍光を認めた。上述の遊走細胞には蛍光を認めなかつた。Anti-HAL では特記すべき蛍光像を認めなかつた。尚遊走細胞にも全く認めなかつた。Anti-7S では間質血管腔ならびにS細胞々体外即ち絨毛間腔でS細胞外側膜に沿う雲絮状蛍光を認めた。Anti-PMS では絨毛間質の瀰漫性蛍光像が認められた。遊走細胞についても蛍光像は認められなかつた。

他方間接法では Fx. I. による直接法所見とほぼ同様であり、顆粒状蛍光像は認められなかつた (Photo. 13, 14)。

更に妊娠全期間を通して paraffin 切片と frozen 切片の両者について Fx. I. 及び他の control conjugates を用いて染色した所見では、両者間に差はなかつた。

以上、人正常妊娠絨毛組織を、ほぼ妊娠全期間に亘り通覧すると、抗 HCG 抗体に特異的に反応する組織内 HCG はS細胞に限局して存在し、C細胞には全く蛍光像として認められないことがわかつた。しかも上述の諸種の control conjugates では各時期の絨毛組織でほぼ共通の所見を得た。この中、初期絨毛組織では、S細胞の発芽状態と考えられる所見を得、且つそれらの細胞に蛍光像を認めた。

第2節 胞状奇胎絨毛組織

組織形態学的に自然排出の胞状奇胎組織は萎縮変性が強いので、まず子宮内膜搔把術により得た組織を用い、自然排出のものを併用した。尚一般に trophoblasts 群の変性萎縮は絨毛附着部に少なく、S細胞、C細胞両成分が比較的顕著に区別出来るといわれている。

Fx. I. 染色ではS細胞に限局した蛍光像を認めた。S細胞内蛍光像の分布状態には二つの異なつた pattern があり、一つは瀰漫性分布、他の一つは一見網状を呈する (netted pattern) 連続性粗大顆粒状分布を示すものである。この各々異なつた分布をもつS細胞は、相互に自ら造つた境界をもつかの如くであり、決して一つのS細胞内には二つの異なつた分布状態を同時にもちことはなかつた。Fx. II. では間質組織に瀰漫性蛍光像を認め、S細胞内蛍光像には上述の pattern の区別はなく一様にC細胞膜に繋がる瀰漫性分布

Photo. 14. Normal chorionic tissue in the 3rd trimester (8M.). Transverse section which was surrounded by HCG-containing syncytial layer (Fx. I.).

Photo. 15. Hydatidiform mole ; diffuse localization in syncytiotrophoblasts (Fx. I.).

Photo. 16. Hydatidiform mole ; Co-existence of diffuse and netted type of localization (Fx. I.).

Photo. 17. Chorionepithelioma ; Netted type of localization of HCG in cytoplasm (Fx. I.).

Photo. 18. Chorionepithelioma ; 'All or none' accumulation of HCG in syncytiotrophoblasts (Fx.I.)

Photo. 19. Chorionepithelioma ; Granular localization in stromal region stained with Anti-PMS.

を認めた。しかし胞体内に侵入する像は認められなかった。Fx. III. でも同様の所見であり、C細胞内に蛍光像が及ぶことはなかった。Anti-HGG 及び Anti-7S 共に蛍光像は認められず亦 Anti-HAL によつても蛍光像は認められなかった。間接法でも蛍光像はS細胞にのみ分布し、直接法と同様に二つの異なつた分布状態を呈した。Anti-PMS で行なつた染色では主として間質部分に蛍光を認めたが著明という程のものではなかった。S細胞、C細胞共に蛍光像は認められなかった。NHS-ab. Fx. I. 及び U-ab. Fx. I. では共に Fx. I. で得た所見と変らなかつた。Paraffin 切片と frozen 切片での蛍光分布像には殆んど差を認めなかつたが、frozen 切片の蛍光像にはやや透明度を欠くものがあつた。これは切片の厚さによると思われる (Photo. 15, 16)。

第3節 絨毛上皮腫々瘍組織

採取した絨毛上皮腫子宮内腫瘍は明確に二つの trophoblasts 成分を含んでいた。S細胞性及びC細胞性 trophoblast 群は相互に不規則に配列され、その度合の強い点から悪性度も亦強いものと考えられる。検索に供した部分は変性又は萎縮した組織を可及的除外して選んだ。

Fx. I. によれば、明確にS細胞とC細胞の染別が出来た。即ち蛍光はS細胞由来の trophoblast 群に限つてその胞体内に分布し、C細胞性のそれらとははつきりと境界を作つていた。しかも個々のS細胞内の蛍光像はすべて網状 (netted pattern 既述) を呈し、正常妊娠初期絨毛に認められた微細顆粒状または瀰慢性蛍光像でもなかつた。その上、極めて特徴的なことは、相隣したS細胞といへども、胞体内に蛍光をもつか否かはその細胞個々の状態如何によると考えられ、胞体内に蛍光を認める場合には少なくとも胞体全域を一樣の強さの蛍光が網状に埋め、特に正常妊娠初期絨毛組織S細胞に見た如き胞体内の、ある部分域に蛍光像を認めるということとはあり得なかつた。NHS-ab. Fx. I. または U-ab. Fx. I. での染色所見は共に Fx. I. の所見と変わらず、また Fx. II., Fx. III. のいずれを用いても共にS細胞蛍光像は Fx. I. と同じであつた。しかし後二者ではC細胞にも蛍光を認めるようになり、しかも瀰慢性であつた。

Anti-HGG 又は Anti-7S を用いてもS細胞、C細胞及びそれらを境する細胞膜いずれの部分にも蛍光像は認められなかつた。間接法でもS細胞内蛍光像は網状であつて、直接法と同じであつた。またC細胞内での蛍光は認められなかつた。Anti-HAL ではどこにも蛍光像を認めず、Anti-PMS では間質部特に萎縮又は変性の強いところに根跡的に蛍光像を呈した (Photo. 17-19)。一方 paraffin 切片と frozen 切片の両者の蛍光像は大差がなかつたといえるが、後者での網状構造がやや粗雑不透明になる傾向が認められた。

以上第II章では、Fx. I. 及び他の control conjugates による直接法ならびに間接法による比較所見と共に paraffin 切片と frozen 切片による比較所見を述べたが、既に本章第I節第1項で述べた組織内 HCG blocking test および Fx. I. 抗原 HCG で吸収した Fx. I. を用いて各々得た所見は、Fx. I. が組織内 HCG と特異的に反応する蛍光抗体液であることを証明した。

第三章 総括ならびに考按

第1節 人正常妊娠絨毛組織

第1項 人正常妊娠初期絨毛組織

人正常妊娠第6週から同15週までの各週毎の絨毛組織を検索したが、この時期は trophoblast の組成としてほぼC細胞とS細胞に区分され、両者は絨毛細胞の内外二層を形作るようになり、しかも胎盤としては未完成の時期であるため、絨毛のもつ primitive mechanism を追究するにも適した時期であるといえる¹⁵⁶⁾。一方妊娠経過中を通じて、生物学的に検出される尿中、血中の HCG 活性が最も豊富な時期であり且つこの実験を通じてほぼこの時期に当る妊娠尿中に排泄された HCG を純化し抗原にして用いるため、抗原抗体反応の特異性を考えるならば、免疫学的、免疫組織学的に、検索対象として最も基本的な時期といえる。既述の如く、抗 HCG 家兎抗血清から採取した、抗原に特異的に反応する蛍光抗体と、組織内抗原は HCG S細胞に局在し、瀰慢性 (diffuse type) と顆粒状 (granular type) の集積状態に二大別出来る。既に第I章で述べた如く、固定法その他の条件で組織内蛍光の集積状態を異にするといわれており、特に ethanol 固

定では組織の凝固収縮によつて顆粒状になるといわれているが、本実験では既述の如く操作方法並びに条件等を統一したため、顆粒状集積と共にそれと同時に瀰慢性集積状態を認めたことは一応細胞内 HCG の量的問題あるいは細胞内 HCG の抗原性に差のあることを示唆しているものであらうと考えられる。これを確認する一つの手掛りとして、連続切片による細胞内 HCG の量的、部位的推移を追究せねばならないであらう。単に量的、部位的推移のみならず同時に多数の S 細胞内 HCG を、種々の角度から眺めることによつて、細胞内 HCG が、細胞内でどのような動きを示すか、換言すれば、局在する細胞における HCG が、どのような道程を経て細胞外に出て行くかを推測することも可能であり、これらを相互に関連させることによつて、ひいては将来の問題である HCG の性状の解明への何等かの手掛りを期待しているのである。しかし現段階においては尚々断定的結論を導くに致つてないことはいふまでもない。初期絨毛組織内 HCG が S 細胞にのみ限定局在しているという蛍光抗体法上の所見は、抗 HCG 抗体に特異的に反応する組織内抗原 HCG が S 細胞にのみ存在することを意味するものであるが、発生学的にみれば、S 細胞といえども C 細胞に由来するものであるからには、C 細胞には S 細胞の発生分化の過程に伴つて、HCG となるべき要因が既に存在しており、謂ば HCG の先駆物質 (precursor) としてのある種の物質の存在を C 細胞中に想定することはあながち無謀とはいひ切れない¹⁵⁷⁾。従つて HCG の precursor protein を追究すべき論議は十分すぎる程あることになるが、この点は将来の問題とし、本題では生物学的作用をもつ HCG そのものを免疫学的、免疫組織学的に追究するにとどめたのである。抗原 HCG をもつて免疫された家兎血清における抗 HCG 抗体そのものが、用いる量差によつて少なくとも、in vivo 及び in vitro における HCG のもつ生物学の活性を減弱もしくは消失せしめている事実は、この抗 HCG 抗体に特異的に反応する物質こそ、本来の目的をもつ HCG であることを示唆しているとしてよいであらう。このことは HCG そのものが S 細胞に局在していることを示す。また HCG は S 細胞が C 細胞から分化した後になつてはじめてその産生がなされることも否定され得ない。HCG がその機能をもつようになり、S 細胞の局在から尿中に検出される過程については、本章第 3 節にゆずるが HCG の細胞外排泄過程について得た成績から考察してみたい。一旦採取した絨毛組織から経時的な細胞内 HCG の排泄動態を観ることは不可能である。しかし連続切片から特定細胞内 HCG の動態と共に種々の相における細胞内 HCG の集積状態を併せ考える以外に組織学的に選べる方法はない。この点を前提として眺めると、細胞内蛍光像の種々に異なつた集積状態を捉え得る。即ち(1)蛍光像が極めて微細な顆粒として S 細胞基底膜に沿つてほぼ直線状に並ぶ像、(2)蛍光像は次第にその大きさを増し、(3)漸次細胞外側即ち絨毛間腔に向つて細胞内拡散を示す状態、(4)細胞内全体を瀰慢性に蛍光像を満たし、顆粒状として識別出来ない状態、(5)基底膜に沿う蛍光像は認められず、S 細胞の外側膜即ち謂ゆる Dempsey¹⁵⁸⁾ のいう S 細胞の brush border に沿う部分¹⁵⁹⁾にはほぼ直線状に大小不規則な顆粒として認められる時期が区別された。これらのものを一連として考えると、HCG は S 細胞内で合成あるいは産生され、brush border を経て絨毛間腔に排出されるものといえる。上述(1)~(5)の順を逆に考え C 細胞へ排出される経路は C 細胞における HCG の免疫活性基の分解又はその活性の消滅要因が明らかでなく且つ C 細胞内蛍光像を認めないことから、この立場は現段階では取り難い。一方電顕所見から Yoshida³⁵⁾、¹⁶⁰⁾ は同様な排出経路を想定している (Fig. 11)。

第 2 項 人正常妊娠中期絨毛組織

この時期に相当する絨毛組織では C 細胞層で消失しはじめ、ほぼ妊娠第 7 月の末頃には消失し終る。事実この時期の絨毛組織の横断切片では間質成分が次第に絨毛組織の広い分野を占めるようになり、S 細胞自身も縮小、融合したような形態をとり、謂ゆる S 細胞結節を形成しつつあつた。蛍光像はこの部分にのみ存在したことから、S 細胞における HCG の局在はほぼ間違いないようである。この時期で興味あることは、絨毛間腔に浮遊する円形無核の大形細胞に蛍光像を認めたことである。形態学的にも機能的にも血球成分との判別は困難な点が多いが、胞体内には一様に瀰慢性に拡散した蛍光像をもち、細胞の大きさは直径約 20~30 μ と推定され、血液性遊走細胞とは考え難い。また特定の組織性遊走細胞であるかどうか疑わしい。しかし Hamazaki¹⁶¹⁾ のいう産褥子宮にみられる光輝細胞などとも異なつたものであることは、その形態並びに染

Fig. 11. Outflow of intracytoplasmic HCG

色性からも明らかである。胞体内には ketoenol 顆粒や eosinophile 顆粒は認めなかつた。この際第Ⅱ章第1節で述べたS細胞の発芽性が問題になるが HCG の血液中の態度を検討する上に重要であるが段階では「絨毛間腔内遊走性 HCG 含有細胞 (free HCG-containing cell in intervillous space)」と仮称せざるを得ない。

第3項 人正常妊娠末期絨毛組織

既に絨毛組織はC細胞を含まずS細胞結節と共に広大な部位を占める間質組織の中に拡張された血管小腔を認めるのみである。S細胞と雖ども、絨毛全体からみれば殆んど根跡的なものである。このような絨毛組織では、螢光像の存在部位も極めて根跡的なものに過ぎないが、少なくとも絨毛をとりまくようにして結節部に存在することは確認出来た。しかも螢光像は間質部への波及は認められていない。この時期で最も著明なことは、前述の如く絨毛間腔に遊走する「HCG 含有細胞」の著しい増加である。遊走細胞内 HCG は瀰慢性螢光像として認められ、且つ細胞周辺部により著しく螢光像が集積する所見を得た。これらの細胞も前述の如く円形無核であつて、第2項で述べたと同じ種類に属する細胞であろうと考えられる。第2項で述べた遊走細胞も亦この時期のそれらも、この実験でとりあげた種々の control conjugates により明らかにされた如く、HCG に特異的に螢光像を示すわけであるが、何故これらの遊走細胞が胞体内を埋めるようにを含有し、この細胞がどういう運命をたどるかは、尚未解決なるも甚だ興味ある点と考える。

第2節 胞状奇胎絨毛組織

病理組織学的に胞状奇胎の成因については明らかでないが、Schiller¹⁶²⁾ などによれば胎児の第3週前後の死亡によつて、絨毛血管の形成が行なわれず、胎児死亡に続いて通常の流産が起るのをさまたげる程に強力な trophoblast 群の活動力が本病発の発生原因と考えられているようであり、諸説があるがいずれにしても妊娠初期に見られる多量の HCG 検出と trophoblast 群の異常増殖との間に密接な関連があるだろうことは当然考えられるところである。しかし排出材料について、かかる点について追求することはほとんど不可能であるといつてよい。しかし絨毛附着部では、殆んどS細胞のみからなる著しい trophoblast の増殖が認められる。この際これら増殖性S細胞々体内に空胞変性も強まっている。HCG の局在を調べるためには、いずれの trophoblast 群一つに片寄つた部位のみの検討では無意味であり可及的広い局在部位にわたつて慎重に検索した。即ちS細胞C細胞共にほぼ平等に存在し且つ変性細胞のない部位を選んだのである。結果として螢光像は著明にS細胞由来の細胞に局在しC細胞性のものには認められなかつた。

このことは、既述の HCG を抗原とした抗 HCG 抗体に特異的に反応する抗原物質が胞状奇胎S細胞にも存在することが明らかになり、一方C細胞には上述の抗体に特異的に反応する物質は存在しないとみてよい。勿論既述の抗原 HCG の他に胞状奇胎に特有の HCG なる概念を導入すれば、C細胞に関してまた異なつた所見あるいは結果の惹起される可能性もあろうが、今後の問題としてこの場では触れないでおく。S細胞内 HCG の分布は既述の如く正常妊娠例に比して異なつたものであつた。即ち胞状奇胎では瀰慢性か

または連続性粗大顆粒状（しかし顆粒として明らかな像ではない）で、しかも正常妊娠例の如く両者間の関連性は全く認められなかつた。これは胎状奇胎排出組織の萎縮又は変性には無関係であると同時にいずれの型の分布を示すかはS細胞個々によつて異なり、同一細胞内に両者が同居した像は認めなかつた。これが何を意味するか明らかなでないが、連続性粗大顆粒（あるいは網状）分布は後述の絨毛上皮腫々瘍組織の場合に一層明らかになり、これと規を一にする分布である。既に諸報告にみる如く胎状奇胎の患者尿中 HCG 又は血中 HCG の biological assay 値は正常妊娠時の peak 値に比してはるかに高値を示すが、螢光像あるいは免疫学的に判断する限り、これを裏付ける証拠は何も得られておらず、したがつて biological な面と immunological な面との分離ということが考えられる。一方如様な分布を示す限り、どのような経過過程を経て細胞内 HCG の排出がなされるのか不明である。

第3節 絨毛上皮腫々瘍組織

組織学的に特徴的なことは、絨毛構造 (Villous pattern) の欠如と共に trophoblast 群はS細胞性とC細胞性のものが不規則な複合配列を示し特にC細胞性 trophoblast が胎状奇胎にみられる以上に明らかに判別されることである。近年悪性腫瘍に hormone 様物質が認められるという執報告があり、特に肺癌と hormone 様物質との関係については比較的報告例が多い。例えば肺癌と steroidhormone の関係については Krant¹⁶³⁾ らが、腫瘍原性 ACTH と下垂体 ACTH の生物学的活性についての Liddle¹⁶⁴⁾ らの報告、Cushing 症候群にみられる ACTH と肺癌についての Nichols¹⁶⁵⁾ らの報告にみられる corticotropin-like substance の存在、更には Marmorston¹⁶⁶⁾ らによる腺癌と患者尿中 estrogen 等の関係についての報告があるが、絨毛上皮腫と gonadotropin-like activity をもつ物質の併存は生物学的には既に常識である。絨毛性腫瘍の悪性か良性かの論議は別として¹⁶⁷⁾、本症では腫瘍が hormone 様物質を産生し且つ免疫学的、免疫組織学的にそれが検出可能である興味ある疾病であることに異論はない。しかし近年本患者尿中 gonadotropin と妊娠性 gonadotropin との間の生物学的測定値と免疫学的測定値との間に差を認め、両者間に性状の差を想定する報告が散見されるようになった。しかも絨毛上皮腫について、Delf¹⁶⁸⁾ ら以降、性状の差を無視して生物学的測定値によつて疾病の予後を判定している傾向が強いが臨床的にこれが明らかな誤謬を生じ、実情に合わない例も多々あるため、生物学的測定値のみに頼る態度そのものが見直されつつあることも事実である。他方免疫学の長足の進歩に伴い単に免疫学のみならず免疫化学的な検討によつて生物学的な腫瘍性 gonadotropin の登場といったことが判別される時も近いということは決して否定されるべきでないように思われる。以上の観点から、免疫組織学的にみた絨毛上皮腫々瘍組織内 HCG を追究せんと試みたのである。この際組織内 HCG の細胞外排出機構を検討して絨腫における転移性の問題解決への足掛りともしたいのである。正常妊娠初期妊婦尿中 HCG と絨毛上皮腫にみる HCG とを同一視することには既述の如く尚重要な問題を含み、事実絨腫性 gonadotropin の一面しか見てないという欠点は否定しようもなく、また正常妊娠性 HCG を用いて絨腫組織内 HCG の検出を試みたという幾多の障碍となるべき事項の存在も承知である。資料切片ではS細胞性とC細胞性 trophoblast が複雑に入り、しかも個々の細胞は明確に相隣する細胞と境界を作り、これらのうちS細胞にのみ特異的に反応する抗原 HCG を含有し、細胞内螢光像の集積は胎状奇胎像の一部としてみられた如く連続性粗大顆粒状ではあつたが全体として網状構造が一層著明であつた。しかし胎状奇胎における他部の像である瀰漫性あるいは純顆粒状の螢光集積像は全く認められず、しかも特徴的なことは、細胞内における螢光像には量的に増減する姿、即ち正常妊娠初期絨毛にみられた顆粒状から瀰漫性へ、更には再び顆粒状に移る姿は全く認められず、S細胞内螢光像は個々のS細胞をみた場合、含まれるか (all) 否か、(none)、換言すれば「all or none accumulation」ということに踏み切ることが出来る (Fig. 12)。したがつて細胞内集積からみる限り、正常妊娠初期性 HCG と絨毛上皮腫性 HCG には性状に差があると考えの方が妥当のようである。即ち、網状集積を来す原因が、絨毛上皮腫S細胞に存在する空胞変性などと何等かの関連があるとは考えたくないのであり、もつぱら抗 HCG 抗体に反応する細胞内における HCG の存在が問題である限り、その抗体に反応する HCG の形が正常妊娠のそれとは異なると考えたいのである。

Fig. 12. All or none accumulation in S-cell

上述の如く、この点の解明にはさし当り先ずは絨毛上皮腫の gonadotropin を抗原として正常絨毛組織内 HCG (または gonadotropin 反応性物質) の検索を慎重に行なう必要がある。

結 論

以上の実験成績から次の如き結論を得た。

(1) 正常妊娠初期妊婦尿中 HCG の構成蛋白成分は主として α_2 -globulin から成り、 α_1 および β -globulin をも一部構成成分としたものであり、これは濾紙電気泳動法、免疫電気泳動法による分析でもほぼ同様の成績であつた。

(2) 正常妊娠初期妊婦尿中 HCG を抗原として得た抗 HCG 抗体は抗原 HCG と特異的に反応するものであり、正常妊娠絨毛組織のみならず胎状奇胎絨毛組織、絨毛上皮腫々瘍組織における組織内 HCG の検索に幸にして成功した。

(3) 上記抗原 HCG を用いて家兎を免疫する際に、従来の関連実験諸報告にみられる Freund's adjuvant を用いると共に、初めて alum precipitate method を用いることによつて、微量の抗原 HCG 量に対して甚だ有効なる免疫促進効果のあることを知つた。

(4) 上記抗 HCG 抗体に特異的に反応する絨毛組織内 HCG は正常妊娠絨毛ならびに胎状奇胎絨毛いずれの場合にも S 細胞に局限して存在し他の組織学的部位には認められなかつた。このことは絨毛上皮腫々瘍組織の場合でもあてはまつた。

(5) 正常妊娠初期絨毛組織における S 細胞内 HCG の集積状態には二つの異なつた pattern があり、一つは微細顆粒状、他は瀰慢性であり両者は種々の移行型をもつていた。

(6) 中期以降の正常絨毛における HCG の集積は瀰慢性のものだけであつた。

(7) 胎状奇胎にみられる組織内 HCG は瀰慢性のものと共に網状集積の二通りがあり、個々の S 細胞はいずれか一方の集積状態をとり、両者の混在形は認められなかつた。

(8) 絨毛上皮腫々瘍細胞内 HCG の集積はすべて網状であり、S 細胞個々については all or none accumulation であつた。

(9) 正常妊娠初期絨毛組織内 HCG の分泌機転については、S 細胞基底膜から同外側膜に向つて移動するような形で外側膜 (謂ゆる brush border membrane) を経ての絨毛間腔へ排出であるような模様であることが窺われた。

(10) 胎状奇胎組織と絨毛上皮腫々瘍組織内 HCG の分泌機転については、それらの集積状態からみても正常絨毛のそれとは異なっているだろうことが示唆されるだけで、現段階ではそれ以上のことを認識することは出来なかつた。

(11) 正常妊娠絨毛組織で、胞体内に HCG を含有する S 細胞の絨毛からの発芽状態を捉えにが、それらの運命については不明である。

(12) 正常妊娠絨毛組織の検索において中期以降の絨毛間腔に浮遊性巨大細胞の出現が認められ、これらに HCG が含まれることのある場合があることを捉えたが、細胞形態学的にみて、相当するものがなく、free HCG-containing cells と仮りに命名した。

(13) 性腺刺激ホルモンの一つであり、今回、HCG の対照の一つとして用いた抗 PMS 抗体を用いて人絨毛組織における組織内 PMS の局在を検索したところ、主として間質部に存在し絨毛上皮組織には存在しなかつた。これは絨毛上皮腫々瘍組織で著明であつた。

(14) HCG と PMS との間には免疫学的交叉性は認められなかつた。

掲筆するにあたり、終始御鞭撻、御指導、御校閲を頂いた恩師、西村敏雄教授に深甚の謝意を表します。実験に際し終始御指導を頂いた京都大学医学部病理学教室浜島義博助教授に深謝します。HCG の提供を頂いた帝国臓器株式会社に感謝の意を表します。

本論文の要旨は第39回日本内分泌学会総会において、また一部は第3回アジア太平洋内分泌学会において発表した。

本論文は京都大学審査学位論文である。

参 考 文 献

- 1) 広瀬豊一：日婦会誌，61；1055，(1920).
- 2) ASCHHEIM, S. and ZONDEK, B. : Klin. Wschr., 6 : 1322, (1927)
- 3) PHILIPP, E. : Zbl. Gynäk., 54 : 450, 1858 & 2754, (1930)
- 4) GEY, G.O. et al. : Science, 88 : 306, (1938)
- 5) JONES, G.E.S. et al. : Bull. Johns Hopkins Hosp., 72 : 26, (1943)
- 6) EVANS, H.M. and LONG, J.A. : Anat. Res., 23 : 19, (1922)
- 7) FEVOLD, H.L. and LEONARD, D.L. : Amer. J. Physiol., 97 : 291, (1931)
- 8) EVANS, H.M. et al. : Endocr., 28 : 933, (1941)
- 9) SEALEY, J.L. and SONDERN, C.W. : Endocr., 27 : 813, (1940)
- 10) BISHOFF, F. : Endocr., 30 : 667, (1942)
- 11) DICZFALUSY, E. and LORAIN, J.A. : J. Clin. Endocr. & Metab., 15 : 424, (1956)
- 12) ZONDEK, B. et al. : J. Amer. Med. Assoc., 128 : 939, (1945)
- 13) ALBERT, A. and BERKSON, J. : J. Clin. Endocr., 11 : 895, (1951)
- 14) SMITH, G.V. and SMITH, O.W. : Amer. J. Physiol., 107 : 128, (1938)
- 15) HAMBURGER, C. and PEDERSEN-BJERGAARD, K. : Quart. J. Pharm., 10 : 662, (1937)
- 16) DICZFALUSY, E. : Acta Endocr., 12 : Suppl. XII, (1953)
- 17) FRIEDMAN, M.H. and LAPHAM, M.E. : Amer. J. Obst. & Gynec., 21 : 405, (1931)
- 18) GALLI-MAININI, C. : Endocr. 43 : 349, (1948)
- 19) MOHANTY, J.K. and PABRAI, P.R. : J. Pharm. and Pharmacol., 3 : 17, (1951)
- 20) WOHLYOZEN, F.X. : Arch. Expl. Path. & Pharm., 207 : 482, (1953)
- 21) WATTS, R.M. and ADAIR, F.L. : Amer. J. Obst. & Gynec., 46 : 183, (1943)
- 22) LORAIN, J.A. : J. Endocr., 6 : 319, (1950)
- 23) DICZFALUSY, E. : Acta Endocr., 17 : 58, (1954)
- 24) APOSTOLOKIS, M. and VOIGT, K.D. : Acta Endocr., 28 : 54, (1958)
- 25) DICZFALUSY, E. et al. : Acta Endocr., 5 : 226, (1950)
- 26) DELFS, E. : Endocr., 28 : 196, (1941)
- 27) HEARD, R.D.H. and WINTON, S.S. : J. Physiol., 96 : 248, (1939)
- 28) BICKENBACH, W. : Arch. Gynäk., 17 : 152, (1941)
- 29) WISLOCKI, G.B. : Amer. J. Anat., 73 : 335, (1943)
- 30) PEARSE, A.G.E. : Nature, 162 : 651, (1948)
- 31) PALIK and JAJOS, L. : Gynaec., 133 : 37, (1952)
- 32) ZILLIACUS, H. : Gynaec. 135 : 161, (1953)
- 33) 山田英智：日内分泌誌，41；593，(1965)
- 34) WYNN, R.M. : Amer. J. Obst. & Gynec., 88 : 618, (1964)
- 35) YOSHIDA, Y. : Exp. cell Res., 34 : 293, (1964)
- 36) COLLIP, J.B. and ANDERSON, E.M. : Lancet, 229 : 76, (1936)
- 37) GOSS, D.A. and LEWIS, J. : Endocr., 74 : 83, (1964)
- 38) ELY, C.A. and TALLBERG, T. : Endocr., 74 : 314, (1964)

- 39) WILDE, C.E. : J. Endocr., 32 : 117, (1965) 40) PAUL, W.E. and ROSS, G.T. : Endocr., 75 : 352, (1964) 41) 西村敏雄, 他 : 産婦人科の世界, 17 : 161 & 255, (1965) 42) WARD, D.N. et al. : Biochem. Biophys. Acta, 50 : 224, (1961) 43) MOUDGAL, N.R. and LI, C.H. : Arch. Biochem. Biophys., 95 : 93, (1961) 44) SEGAL, S.J. et al. : Gen. Comp. Endocr. Suppl., 1 : 12, (1962) 45) WIDE, L. and GEMZELL, C.A. : Acta Endocr., 35 : 261, (1960) 46) BRODY, S. and CARLSTROEM, G. : Lancet, 9 : 99, (1960) 47) McKEAN, C.M. : Amer. J. Obst. & Gynec., 80 : 596, (1960) 48) FRIEDMAN, M.H. : Amer. J. Physiol., 90 : 653, (1929) 49) MAININI, C. : J. Clin. Endocr., 7 : 653, (1947) 50) 東条伸平, 笠井寛司, 余語郁夫 : ホと臨, 14 : 813, (1966) 51) REINER, L. : Science, 72 : 483, (1930) 52) HEIDERBERGER, M. et al. : J. exp. Med., 58 : 137, (1933) 53) HOPKINS, S.J. and WORMALL, A. : J. Biochem., 27 : 740, (1933) 54) HOPKINS, S.J. and WORMALL, A. : J. Biochem., 28 : 228, (1934) 55) MARRACK, J. : Nature, 133 : 292, (1934) 56) COONS, A.H. et al. : Proc. Soc. exp. Biol. Med., 47 : 200, (1941) 57) COONS, A.H. and KAPLAN, M.H. : J. exp. Med., 91 : 1, (1950) 58) MARSHALL, J.M. Jr. : J. exp. Med., 94 : 21, (1951) 59) CRUICKSHANK, B. and CURRIE, A.R. : Immunology, Oxf., 1 : 13, (1958) 60) MIDGLEY, A.R. and PIERCE, G.B. : Fed. Proc., 21 : 198, (1962) 61) MIDGLEY, A.R. Jr. and PIERCE, G.B. : J. exp. Med., 115 : 289, (1962) 62) THIEDE, H.A. et al. : Obst. & Gynec., 22 : 310, (1963) 63) 宮河昭夫, 他 : 日産婦誌, 16 : 750, (1964) 64) 野嶽幸雄, 他 : 臨産誌, 19 : 7, (1965) 65) 中山徹也, 他 : 日産誌, 40 : 特別号, 139, (1965) 66) 西村敏雄, 他 : 産婦人科治療, 12 : 326, (1966) 67) 浜島義博, 京極方久著 : 免疫組織学, p.133. 68) SCHULTZE, H. and SCHWICK, G. : Behringwerke Mitteilungen, 35 : 37, (1958) 69) KABAT, E.A. : J. Immunol., 47 : 513, (1943) 70) COHN, M. : Methods in Medical Research, 5 : 268, (1952) 71) CLEASSON, L. et al. : Acta Endocr., 1 : 1, (1948) 72) MORRIS, C.J.O.R. : Brit. Med. Bull., 11 : 101, (1955) 73) KATZMAN, P.A. and DOSY, E.A. : J. Biol. Chem., 106 : 125, (1934) 74) PEARSE, A.G.E. : Histochemistry-Theoretical and Applied, 2nd Ed., 137 & 722, (1959) 75) NAIRN, R.C. et al. : Brit. J. exp. Path., 41 : 214, (1960) 76) RIGGS, J.L. et al. : Amer. J. Clin. Path., 34 : 1081, (1958) 77) HIRAMOTO, R. et al. : Proc. Soc. exp. Biol. Med., 97 : 611, (1958) 78) BOUCHARD : J. Chim. Physique., 33 : 127, (1936) 79) 八木国夫, 吉田善一, 太幡利一 : 蛍光, 南光堂, (1936) 80) FRANK and WAWILLON : Z. Physik., 69 : 100, (1931) 81) KOCH, F.C. and McMEEKIN, T.L. : J. Amer. Chem. Soc., 46 : 2066, (1924) 82) HEIDELBERGER, M. and KENDALL, F.E. : J. exp. Med., 50 : 809, (1929) 83) PETERS, J.P. and Van SLYKE, D.D. : Quantitative Clinical Chemistry, Vol. II, (1932) 84) BULL, H.B. : J. Amer. Chem. Soc., 66 : 1499, (1944) 85) KIRK, P.L. : Advances in Protein Chemistry, 3 : 139, (1947) 86) BOYD, W.C. : Fundamentals of Immunology, III Ed., (1956) 87) FREUND, J. and McDERMOTT, K. : Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.) 49 : 548, (1942) 88) PROOM, H. : J. Path. Bact., 55 : 419, (1943) 89) WIDE, L. : Acta. Endocr. Suppl. 70 : (1962) 90) WIDE, L. et al. : Acta Endocr., 37 : 445, (1961) 91) ROBBINS, S.L. et al. : Proc. Soc. exp. Biol. Med., 109 : 321, (1962) 92) OUCHTERLONY, O. : Acta Path. Microbiol., 26 : 507, (1945) 93) OUCHTERLONY, O. : Arkiv. Kem. Min. Geol., B. 26 : 1, (1949) 94) OUCHTERLONY, O. : Acta Path. Microbiol. Scand., 32 : 231, (1953) 95) OUDIN, J. : Ann. Inst. Pasteur, 75 : 30, (1948) 96) BOYDEN, S.V. : J. exp. Med., 93 : 107, (1951) 97) BORDUAS, A.G. and GRABAR, P. : Ann. Inst. Pasteur, 84 : 903, (1953) 98) STAVITSKY, A.B. : J. Immunol., 72 : 360, (1954)

- 99) BIER, M. (Ed.) : Electrophoresis, Acad. Press, N.Y., (1959) 100) MOULD, D.L. and SYNGE, R.L.M. : Analyst., 77 : 964, (1952) 101) BLOCK, R.J. et al. : Paperchromatography and Paperelectrophoresis, II Ed., (1958) 102) GRABAR, P. : Advances in Protein Chemistry, Acad. Press, N.Y. Methods of Biochemical Analysis, Interscience, N.Y., (1959) 103) COOPER, D.R. : Nature, 181 : 713, (1958) 104) GARBERS, C.F. and JOUBERT, F.J. : Nature, 182 : 530, (1958) 105) LUETSCHER, J.A. Jr. : J. Amer. Chem. Soc., 61 : 2888, (1939) 106) SHARP, D.G. et al. : J. Biol. Chem., 144 : 139, (1942) 107) SAIFER, A. and COREY, H. : J. Biol. Chem., 217 : 23, (1955) 108) DURRUM, E.L. : J. Amer. Chem. Soc., 73 : 4875, (1951) 109) LONGSWORTH, L.G. : Chem. Rev., 30 : 323, (1942) 110) LUNENFELD, B.B. et al. : J. Clin. Endocr. & Met., 21 : 478, (1961) 111) GRABAR, P. and BURTIN, P. : Immuno-electrophoretic Analysis, Elsevier, (1955) 112) HIRSCHFELD, J. : Science Tools, 8 : 17, (1962) 113) LAURELL, C.B. et al. : Clin. Chem., 2 : 99, (1956) 114) WIEME, R.J. : J. Immunol., 84 : 93, (1959) 115) GOLDSTEIN, G. et al. : J. Exp. Med., 114 : 89, (1961) 116) HUDSON, B.W. : Bull. W.H.O., 24 : 291, (1961) 117) PETERS, J.H. et al. : Fed. Proc., 20 : 17, (1961) 118) PORATH, J. and FLODIN, P. : Nature (London), 183 : 1657, (1959) 119) ZWAAN, J. and VANDAM, A.F. : Acta Histochemica, 11 : 306, (1961) 120) WAGNER, M. : Zbl. Bakt., 185 : 124, (1962) 121) COONS, A.H. : Public Health Rep., 73 : 884, (1958) 122) COONS, A.H. : In General Cytological Methods, I, 399, Acad. Press, N.Y. 123) CONSDEN, R. et al. : In Immunological Methods. Scientific Pub., Oxford, (1961) 124) COONS, A.H. et al. : J. exp. Med., 102 : 49, (1955) 125) HIRAMOTO, R. et al. : Cancer Res., 18 : 686, (1958) 126) MOUDGAL, N.R. and LI, C.H. : Nature, 191 : 192, (1961) 127) WAKABAYASHI, K. and TAMAOKI, B. : Endocr., 77 : 264, (1965) 128) SAINTE-MARIE, G. : J. Histochem. Cytochem., 10 : 250, (1962) 129) CHERRY, W.B. et al. : Bull. W.H.O., 25 : 159, (1961) 130) THORNBURG, W. : J. Histochem., 4 : 403, (1956) 131) MERYMAN, H.T. : Science, 124 : 515, (1956) 132) THORNBURG, W. and MEYERS, P.E. : J. Histochem. Cytochem., 5 : 47, (1957) 133) LOUIS, C.J. : Stain Technol., 32 : 279, (1957) 134) BURKHOLDER, P.M. et al. : Stain Technol., 36 : 89, (1961) 135) TOBIE, J.E. et al. : Exp. Parasit., 11 : 50, (1961) 136) LINDERSTROEM-LANG, K. and MOGENSEN, K.R. : C.R. Lab. Carlsberg Ser. Chim., 23 : 27, (1938) 137) COONS, A.H. : Fed. Proc., 10 : 558, (1951) 138) CARVER, R.K. and GOLDMAN, M. : Amer. J. Clin. Path., 32 : 159, (1959) 139) COONS, A.H. et al. : J. Immunol., 45 : 159, (1942) 140) WATSON, B.K. : Proc. Soc. exp. Biol. Med., 79 : 222, (1952) J. exp. Med., 96 : 653, (1952) 141) COONS, A.H. et al. : Annals of the N.Y. Academy of Science, 59 : 951, (1955) 142) LEDUC, E.H. et al. : J. exp. Med., 102 : 61, (1955) 143) JANKOVIC, B.D. : Acta Haemat., 22 : 278, (1959) 144) JANKOVIC, B.D. and ARSENIJEVIC, K. : Acta Haemat., 22 : 387, (1959) 145) JANKOVIC, B.D. and LINCOLN, T.L. : Dxperientia, 15 : 61, (1959) 146) 浜島義博 : 最新医学, 20 : 1123, (1965). 147) GOLDWASSER, R.A. and SHEPARD, C.C. : J. Immunol., 80 : 122, (1958) 148) KLEIN, P. and BURKHOLDER, P. : Schweiz. Z. Path. Bakt., 22 : 729, (1959) 149) HINUMA, Y. and HUMMELER, K. : J. Immunol., 87 : 367, (1961) 150) NAIRN, R.C. et al. : Fluorescent Protein Tracing, E & S Livingstone, (1962) 151) CLAYTON, R.M. : Exp. Cell Res. Suppl., 7 : 275, (1959) 152) POETSHKE, G. et al. : Schweiz. Z. Path. Bakt., 22 : 758, (1959) 153) EMMART, E.W. and TURNER, W.A. : J. Histochem. Cytochem., 8 : 273, (1960) 154) WHITE, C.E. et al. : Analyt. Chem., 32 : 438, (1960) 155) SCOTT,

- D.G. : Ann. Rheum. Dis., 18 : 207, (1959) 156) 渡辺行正, 村上正名 : 最新医学, 13 ; 3234, (1958). 157) 沢崎千秋 : 日産婦誌, 19 ; 259, (1967). 158) DEMPSEY, E.W. et al. : Amer. J. Anat., 96 : 65, (1955) 159) BOYD, J.D. and HUGHES, A.F.W. : J. Anat., 88 : 356, (1954) 160) YOSHIDA, Y. : Exp. Cell Res., 34 : 311, (1964) 161) HAMAZAKI, Y. : Virchows Arch., Bd. 295, (1935) 162) SCHILIER, W. : Amer. J. Cancer, 35 : 2, (1939) 163) KRANT, M.J. : Arch. Intern. Med., 115 : 464, (1965) 164) LIDDLE, G.W. et al. : Arch. Intern. Med., 111 : 471, (1963) 165) NICHELS, J. and GOURLEY, W. : J.A.M.A. Aug., 31, 696, (1965) 166) MARMORSTON, J. et al. : Amer. Rev. Resp. Dis., 92 : 404, (1965) 167) NOVAK, E.R. : Gynec. & Obst. Pathology, p. 677, (1962) 168) DELFS, E. : Obst. Gynec. 9 : 1, (1957)