Adrenocortical Hormones and Aging Process

Hisashi YOSHIDA

Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Tokyo Medical and
Dental University, Tokyo, Japan

Concerning the adrenocortical hormones and the aging process, especially in childhood and adolescence, the results by age level of the studies by the author and coworkers on the following items are summarized: 1) Plasma levels of cortisol and corticosterone, 2) Plasma transcortin binding of C-14 cortisol (% bound) and erythrocyte C-14 cortisol uptake, 3) Plasma cortisol levels after ACTH stimulation and also the values in patients immediately after death, 4) Certain important urinary metabolites of cortisol, 5) Urinary excretion of tetrahydroaldosterone, 6) Urinary excretion of 17-KS fractions.

The level of cortisol in the plasma was slightly low during the newborn period, however transcortin binding of C-14 cortisol (% bound) was also low in newborns and young infants and cortisol value in the plasma after ACTH stimulation or immediately after death increased more markedly, showing higher values in young infants than in older children. Urinary metabolites of cortisol also showed age-specificity more markedly after ACTH stimulation. Even in young infants, urinary aldosterone excretion was increased after Na-restriction in most of the cases examined. The production of adrenal androgens increased sharply before puberty and a close relationship was observed between the urinary excretion of 11-deoxy 17-KS fractions and the growth spurt during the adolescence period.

These results showed that the secretion and metabolic pathways of the adrenocortical hormones of the children are different from those of the adult and even in the children they are not the same during each period of childhood. We would like to emphasize that some of these differences due to age becomes more marked under conditions when the adrenal glands become stimulated.

(See pp. 705~708)

The Function of the Adrenal Gland in Aged Subjects

Yutaka NAKANO

Second Division, Department of Medicine, Kyoto University School of Medicine, Kyoto, Japan

To study the alternation of functions of adrenal cortex and adrenal medulla and the relationship between them in aged persons, plasma levels of cortisol and corticosterone, urinary excretion of 17-ketogenic steroid fractions, pregnanediol (P-diol), pregnanetriol (P-triol), catecholamines (CA), total metanephrine (TMN) and VMA were measured by J.v.d. Vies', modified Morris', Kloppe's, modified Stern-Few's, modified Euler-Lishajko's, Pisano's and Sandler's method respectively. Hormones and their metabolites above mentioned in young and adult subjects also were measured as a control. Both groups of examined persons were healthy. The plasma levels of cortisol and corticosterone were within the range of the control. Daily urinary excretions of 17-ketogenic steroid (17-KGS), 11-oxygenated 17-KGS (11-oxy 17-KGS), 11-deoxy 17-KGS, P-triol and P-diol decreased in the aged but the ratio of 11-deoxy 17-KGS to 11-oxy 17-KGS elevated in over 8th decade. Following the intramuscular administration of ACTH-Z, the increase of 17-KGS, 11-oxy 17-KGS, P-diol and P-triol in the aged was less than in the control, but that of 11-deoxy 17-KGS was as much as that of the control. Therefore, the ratio of 11-deoxy 17-KGS to 11-oxy 17-KGS elevated in the aged. In the aged, the increase of 11-deoxy 17-KGS following the oral administration of SU-4885 was greater than that in the control, consequently showing a remarkable elevation of the ratio of 11-deoxy 17-KGS to 11-oxy 17-KGS. These results from both ACTH-Z test and SU-4885 test suggested that there was some disturbance of cortisol synthesis in adrenal cortex in the aged.

In the aged, daily urinary excretions of noradrenaline (NA) and TMA increased more than in the control. The control showed significant difference as to sex, but the aged did not. Daily urinary excretion of adrenaline (A) in the aged showed large variation, but the mean value was within the range of the control. Urinary excretion of VMA in the aged was also within the range of the control. In the aged, the ratio of A to NA was lower, and that of TMN to VMA was higher than in the control, but that of CA to TMA was within the range of the control. In both aged and young subjects, urinary excretion of A increased within 2-4 hrs following the intravenous administration of glucagon in a dosage of 1 mg, but the mean increased value of A was less in the aged than in the control. The types of urinary excretion of A following the administration of glucagon in the aged were classified into three types. The first was a close type to the control, the second was a delayed response type, and the third was a poor response type. Urinary excretion of NA in the aged following the intravenous administration of tyramine in a dosage of 1 mg was classified

into the similar three types, and most of aged subjects, however, showed delayed response type and the poor response type. Types of response to glucagon and tyramine tests carried out on the same aged subjects, were almost the same. These results suggested that the sympathico-adrenal medulla in the aged was always in the overacting state, and the poor reserve to some kind of stress. In the aged subjects, it was observed no correlation between urinary 17-KGS fractions and urinary CA both at resting state and at irritated state by glucagon and tyramine administration. (See pp. 709)

Changes with Age of Urinary Levels of Dehydroepiandrosterone in Adolescent Females

Etsuro NISHIDA

Department of Obstetrics & Gynecology, School of Medicine,
Kanazawa University, Kanazawa, Japan

In a previous report of this series on dehydroepiandrosterone (DHA) in females it was reported that administration of DHA induced decrease of levels of serum mucoprotein and of serum cholesterol, and decrease and/or return to normal in accelerated erythrocyte sedimentation rate in normal women and female patients. In the present report urinary 17-ketosteroids (17-KS) in adolescent females were estimated by means of a 2-step hydrolysis (solvolysis and hot acid hydrolysis) and of a fractionation by a elution column chromatography. Various ratios between the fractions were calculated. Changes with increasing age of 17-KS fractions and the ratios were discussed. Total 17-KS level showed a remarked increase between the ages of 10 and 12, and reached a maximum at about 23 years. Data on the fractionated 17-KS indicated that changes in androsterone (AS, fraction 4.), etiocholanolone (EC, fr. 5), and 11-oxy-17-KS (fr. 6+7) with advancing age are similar to that in total 17-KS. However, the fluctuation for excretion of DHA (fr. 3). with age was different from them. Excretion level of DHA between the ages 10 to 15 was lower than those of other 17-KS fractions. Excretion of DHA was remarkably increased at the ages of 17 to 18.

A ratio of AS+EC (fr. 4+5) to DHA+11-oxy-17-KS (fr. 3+6+7)—so called 'gonadal fractions' to 'adrenal fractions'—showed no change with age. A ratio of DHA+AS+EC to 11-oxy-17-KS, however, was remarkably increased with increasing age. The average value of the ratio was 1.51 for the ages of 10 to 14, 1.85 for the ages of 15 to 19, and 3.01 for the ages of 20 to 24, respectively.

Administration of DHA resulted in remarkable increase of DHA, AS and EC, in particular DHA and EC, in urine of female subjects. However, increase of urinary 11-oxy-17-KS was very slight or negligible after administration of DHA. Therefore the sum of DHA, AS and EC in female urine approximately indicate fluctuation of secretion rate of DHA from adrenals. It was proposed that it is reasonable to designate the sum of fraction 3, 4 and 5 (DHA, AS and EC) as 'DHA-group' or 'anabolic group' in the female.

A ratio of AS+EC to 11-oxy-17-KS was slightly increased, and ratios of AS+EC to DHA and of 11-oxy-17-KS to DHA were remarkably decreased with increasing age in adolescent females. These results may indicate that metabolism and consumption of DHA were accelerated in growing females.

(See pp. 710~711)

シンポジウム I 加齢と内分泌

1. 加齢と副腎皮質ホルモン

東京医科歯科大学医学部小児科学教室

吉 田 久

新生児期は副腎皮質機能からみて、はなはだ興味深い時期といえることができる。それはこの時期には他の小児期や成人期にみられない特有の変化、すなわち出血を伴う生理的な退縮が起るからである。乳幼児期にはショック症状を呈する疾患が多い。この意味からその副腎皮質機能、ことに予備能については大きな関心が持たれる。思春期にみられる発育のスパートは古くから adrenarche として注目されている。演者は対象を新生児から思春期までにとり、標題に関連する自験成績を述べた。なお日本小児内分泌学研究会と東京医歯大病理教数室の成績も 2, 3 紹介した。これらのうち自験成績については次のように要約される。

1. 血漿 cortisol, corticosterone と加齢.

Van der Vies 法を若干改変して求めた所謂遊離型 cortisol (F), corticosterone (B) の値は図示の如くであつた (Fig. 1, Fig. 2) (広瀬安之). 分娩時母体血の値は何れも高かつた。他の年令層の値に比べてみると、臍帯血、新生児では F と B とで差があり、新生児の F は B と異つて他の年令に比べて低い値を示した。

Fig. 1. Plasma cortisol levels

Fig. 2. Plasma corticosterone levels

2. 血漿 transcortin binding of ^{14}C -cortisol 及び赤血球 ^{14}C -cortisol uptake と加齢.

前者を Slaunwhite and Sandberg 法に、後者を Farsee 法に準じて求めた結果は図示の如くであつた (Fig. 3, Fig. 4). 臍帯血並びに幼児乳児において血漿 transcortin binding of ^{14}C -cortisol, すなわち血漿蛋白結合率 % bound は低く (若林靖伸, 竹内慎), 逆に臍帯血における赤血球 ^{14}C -cortisol uptake, すなわち赤血球への摂取率は高い値を示した (坂井昭彦, 赤羽太郎).

(小括) 以上の成績より出生直後における副腎皮質ホルモンの分泌及至代謝は他の年令相とやゝ異なるところがあるように思われる。しかしこれは、従来一部の学者によつて想定されてきた如きこの時期における副腎皮質機能の不全を示すものとは必しも考えにくい。新生児期における副腎皮質機能の不全は cortisol production rates からみた慶大小児科 (加藤, 岡島, 興水) などの成績からも考えにくいように思う。

3. ACTH 連続負荷時の血漿 11-OHCS 並びに死亡時の血漿 cortisol と加齢.

各年令の小児に体表面積 (m^2) 宛同量 (20μ) の ACTH を連続 5 日間負荷し, De Moor 変法で血漿遊離型

Fig. 3. Plasma transcortin binding of C-14 cortisol

Fig. 4. RBC C-14 cortisol uptake

11-OHCS の maximal response を調べた成績は、最近別の機会に発表した (藤森克之, 日児誌72:1368, 1968年). この結果によると負荷開始後5日間を通じて乳児の値は幼児, 年長児に比べてつねに高かった. 乳児の最高値は第5日目にえられ $141.9 \pm 61.7 \mu\text{g}/100\text{ml}$ であつたのに反し, 幼児では $39.5 \pm 6.1 \mu\text{g}/100\text{ml}$ (第3日目), 年長児は $29.9 \pm 5.7 \mu\text{g}/100\text{ml}$ (第4日目) であつた (図略). 次に自然に加えられた大きなストレスとして種々の疾患により死亡した小児につき死後可及的速かに心穿刺により採血, 血漿 cortisol を測定した. その結果は図示のようになり, 高い値は年令別には幼若例にむしろ多くえた (Fig. 5 の左). またこのような際の cortisol の値は死亡の原因にもよるようであり, その低値は重い脳疾患で死亡した例に多くえられた. 片側の特発性副腎出血で死亡した新生児では相当高い値がえられた (Fig. 5 の右) (広瀬安之).

Fig. 5. Plasma cortisol levels immediately after death

(小括) 副腎から分泌された後のホルモンの代謝の問題は残されるが, 以上の成績からみると, 幼若小児における副腎皮質予備能が不良であるということとは言えないように思われる.

4. 尿中 tetrahydrocorticosteroids, polar-corticosteroids 排泄量と加齢並びにACTH 負荷によるそれらの変動.

幼若例における酵素系の発達がしばしば未熟であることは周知であり, 副腎皮質ホルモンの体内における代謝過程も年令によつて異なるとされる. cortisol の主な metabolites を tetrahydrocorticosteroids と 6β -hydrocortisol などの polar corticosteroids に分けて尿中の排泄状況を CH_2Cl_2 で抽出, 薄層ク

ロマトにより展開測定してみると前者の排泄は幼若例において著しく少い (新生児6例平均: $19.5 \mu\text{g}/\text{日}$, 長年児同: $1446.0 \mu\text{g}/\text{日}$). 之に反して後者の排泄は加齢によつてこのような大きな差を示さず (新生児同: $55.0 \mu\text{g}/\text{日}$, 長年児同: $99.6 \mu\text{g}/\text{日}$), その排泄量は比較的な意味では幼若例に明らかに多い, 詳細は先般印刷公表 (安倍泰夫日児誌: 本年5号) されたので本稿では省略するが, このことは慶大小児科の isotope を用いた成績からも明らかである. しかしこのような代謝 pattern の差は ACTH を負荷することによつて一層明らかとなる. 各年令の小児に ACTH をを負荷して尿中の polarcorticosteroids の tetracorticosteroids に対する比を負荷前後につき比較すると, 幼若小児においてのみこの比はさらに上昇した (ACTH 負

Fig. 6. Urinary polarcorticosteroids excretion in pre-adolescence and adolescence following ACTH administration

Fig. 8. Urinary tetrahydroaldosterone excretion and body surface area

荷前における polarcorticosteroids/tetrahydrocorticosteroids 比は新生児2.8, 長年児 0.09, ACTH 負荷後におけるその値は新生児9.2, 長年児0.10 (同上). さらにまた思春期になると ACTH 負荷による変動には性別による差異が明らかとなり, 女児で polarcorticosteroids の著しい上昇を示すものがみられた (Fig. 6) (小宮山淳).

(小括) 副腎皮質ホルモンの体内代謝過程が加齢によつて異なるのは疑いないが, このような差は生体にストレスが加わつたときにさらに明らかとなるよ

Fig. 7. Urinary tetrahydroaldosterone excretion

Fig. 9. Urinary excretion of 11-deoxy 17-KS fractions in childhood and adolescence

Fig. 10. Urinary 11-deoxy 17-KS excretion and appearance of secondary sex characters

うに思われる。新生児期とともに思春期におけるこれらの変動が注目される。

5. 尿中 tetrahydroaldosterone 排泄量と加令。

重要な副腎皮質ホルモンの一つである aldosterone に関して tetrahydroaldosterone の尿中排泄量と加令との関係を調べた結果は図示の如くなつた (Ulick 法) (Fig. 7, Fig. 8)。その1日排泄量は加令とともに増加するが、体表面積との間には正の相関がみられた。また Na 摂取量を制限すると生後数日の幼若小児においても排泄量の増加がみられた (渡辺長文, 鈴木宏平)。

(小括) 幼若小児の副腎皮質機能のうち mineralcorticosteroids については尿中の tetrahydroaldosterone からみる限り、幼若例が特に劣るとは考え難い。しかし従来形態学的にいられている幼若例の zona glomerulosa の未発達や新生児期では renin 活性の高いものがあるという今井 (東大小児科, 未発表) の成績と対比すると、この結果は小児期の aldosterone 分泌機序と関連して興味があり、今後さらに検討が期待される。

6. 尿中, 17-KS, その分画の排泄量と加令。

尿中の総 17-OHCS や 17-KS 排泄量が加令とともに増加することはすでによく知られている。五十嵐 (東大小児科) によると尿中 17-KGS も加令により著明な変動を示し、しかもこの場合は体表面積宛に換算しても10才頃から急に増加するという。我々が尿中 17-KS につき, solvolysis, 薄層クロマト, ガス, クロマトグラフィーを用いてその分画と加令との関係を調べた結果は図示のようになつた (Fig. 9)。加令に伴うその変動を 11-oxy と deoxy 分画に分けてみると一般に 11-oxy 分画が余り動かなかつたのに比べて 11-deoxy 分画が10才頃から増加してくることが目立つた。ことに DHEA などに比べて A (androsterone) や E (etiocholanolone) がまず増加してくること、個体差は大きいが男女別にみると増加はまず女兒のみられ、やがて男児が女兒に比べて高い値を示すことが注目された。またこの時期における加令に伴う大きな変化である2次性徴の発現との関係は図示のようになり (Fig. 10), 11-deoxy 分画排泄量との間に相当密接な関係がみられた。身長のスパートの関係も男女を問はず相当に密接であつた (図略) (江口光興, 竹内慎)。

(小括) 副腎性ホルモンの分泌増加が思春期の発育に大きな影響を与えるのは周知であるが、尿中 17-KS の分画からみると, androsterone や etiocholanolone がまず増加してくる。男女別にみると初め女兒の値が高くなり、やがて男児の方が高くなると思われる。

総括 以上より、小児期における3種の副腎皮質ホルモンの分泌乃至代謝は加令とともに、それぞれ特有の動きを示しつつ変化をなし、ヒトの発育と成熟に大きな影響を与えているように思われる。

拙筆に当つてこの機会を与えられた会長七条教授、座長西川教授に感謝します。最近演者は転任したがこの研究を実施された信州大学医学部小児科各位 (各種実験の主担当者は本文中に記した) と当日未発表を含めて成績の引用を許された東大小児科五十嵐良男、今井正、慶大小児科加藤精彦、岡島昌子、興水隆 (以上日本小児内分泌学研究会)、医歯大病理畠山茂の諸氏に感謝します。

追加発言

加 令 と 副 腎 機 能

京都大第二内科

中 野 裕

研究目的 高令者における副腎皮質、交感神経—副腎髄質機能を知り、両者の相互関係を解明するため次の研究を試みた。

研究対象 高血圧、糖尿病そのほか特別の疾患を有せず、心電図、理学的診察にて異常を認めない60才以上の健康高令者（男子平均年令71才、女子平均年令74才）を対象とし、16～52才の健康青壮年者と比較検討した。

研究方法 血中コーチゾール、コルチコステロン、尿中 17-KGS 分画、プレグナンジオール、(P-diol)、プレグナントリオール (P-triol)、尿中カテコールアミン (CA)、総メタネフリン (TMN)、VMA をそれぞれ、J. v.d. Vies 法、Morris 法変法、Klopper 法、Stern-Few 変法、Euler-Lishajko 法変法、Pisano法、Sandler 法に準じて測定し、さらに ACTH-Z、SU-4885 負荷前後の24時間尿中ステロイドの変動、グルカゴン、チラミン静注時の経時的な尿中カテコールアミン、17-KGS 分画、血中糖質 コルチコイドの変動を検討し、副腎皮質、副腎髄質機能を比較検討した。

成績 高令者の血中コーチゾール、コルチコステロン値はいずれも青壮年者と同一範囲内にあつた。尿中 17-KGS は60才をこえと減少し、青壮年者にみられた性差は消失した。この傾向は 11-oxygenated 17-KGS (11-oxy 17-KGS)、11-deoxy 17-KGS ともにみとめられるが、70才以上では 11-deoxy 17-KGS 対 11-Oxy 17-KGS 比は上昇傾向を示した。P-triol、P-diol も高令者では減少し、特に70才以上で著明であつた。P-diol 対 17-KGS、P-triol 対 11-Oxy 17-KGS 比には有意の変化はみとめなかつた。高令者に ACTH-Z を負荷したさい、尿中 17-KGS、11-Oxy 17-KGS の増加率は青壮年者とほぼ等しく、11-deoxy 17-KGS は約2倍に上昇した。また 17-KGS、11-Oxy 17-KGS の増加量は減少し、11-deoxy 17-KGS には青壮年者と有意の差をみとめなかつた。従つて 11-deoxy 17-KGS 対 11-oxy 17-KGS 比は高令者で上昇した。また P-triol、P-diol の増加量も高令者では減少した。SU-4885 負荷による 17-KGS、11-deoxy 17-KGS の反応性増加率、増加量の高令者では青壮年者にくらべて大なる傾向をしめし、11-oxy 17-KGS は減量した。従つて 17-KGS 最大反応時における 11-deoxy 17-KGS 対 11-oxy 17-KGS 比は高令者では著明な高値を示した。

高令者では1日尿中アドレナリン (A) は相当のばらつきを示すが、その平均値は青壮年者と同一範囲内にあり、尿中ノルアドレナリン (NA) は明らかな高値をしめした。また青壮年者にみられた CA の性差は高令者では消失した。高令者では尿中総メタネフリン (TMN) は青壮年者にくらべ高値をしめしたが、VMA は有意の差をみとめなかつた。従つて高令者では A 対 NA 比は低値、TMN 対 VMA 比は高値をしめしたが、CA 対 TMN 比は青壮年者と差をみとめなかつた。青壮年者では尿中 A はグルカゴン投与後2時間以内に、亦尿中 NA 排泄量はチラミン投与後2時間以内にそれぞれ最高値に達し、後漸減するが、高令者ではその平均 A あるいは NA 増加量が減少した。尚グルカゴン投与後の血糖曲線は高令者と青壮年者の間に有意の差はみられなかつた。以上のグルカゴンならびにチラミン投与後の A、NA の排泄態度は高令者ではほぼ3つの型に分類された。即ち青壮年者と同じ態度を示す正常型、2時間以後に最高値をとる反応遅延型、正常型を示すがその増加量の少い反応減弱型で、後2者が高令者では多数を占めた。

また同一個体でのグルカゴン、チラミンに対する反応型はほぼ同一であつた。

高令者では安静時、グルカゴン、チラミン投与時共、血中コーチゾール、コルチコステロン、尿中 17-KGS 分画、尿中 CA の間には相関関係はみられなかつた。

結語 以上の成績から高令者では副腎皮質機能の低下傾向が考えられ、stress 時における comp. S からコーチゾール生成、代謝過程での障害が推定された。また交感神経—副腎髄質系は常に hyperfunction の傾向にあり、stress に対する予備能は減少しているものの如く推定された。また副腎皮質、髄質の間の明らかな相互関係は見出しえなかつた。

追加発言

女子思春期前後における副腎皮質由来 androgen の動態

金沢大学医学部産科婦人科学教室

助教授 西 田 悦 郎

女子において思春期に副腎性 androgen 分泌は急増するが、その生理学的意義についてのわれわれの知識はさほど多くない。すなわち、一般的 androgen の作用から類推的に、思春期女子の全身的発育、および性器、とくに外性器、性毛の発育などに副腎性 androgen 分泌の急増が関与していると推測されながら、実際的にどの分画がどのように作用しているのか、またいずれが最も dominant であるのかという点になると、実験的研究は乏しく、根拠となる資料も少ない。著者らは以前より女子副腎性 androgen とくにその主要分画とされる dehydroepiandrosterone (DHA) の生物学的作用および意義について一連の研究を続けてきており、副腎摘除による anabolism 不全状態は mineralocorticosteroid, glucocorticosteroid と共に DHA を添加投与することにより著しく改善され、androgenic 作用の強い testosterone (T) や androsterone (AS) 投与によつては正常状態には復旧しなかつたこと、DHA 投与によりヒト血清中 mucoprotein, glycoprotein の低下、cholesterol 値の低下傾向、赤沈値の改善などが認められることなどを報告したが、今回は、solvolysis を応用した 2-step hydrolysis により水解、測定した思春期前後の女子尿中 17-ketosteroid (17-KS) 各分画値の推移について、2, 3 考察を加えたので追加したい。

17-KS 総値は10才頃から急上昇し、4～5年の間に3～4倍の値に急増し、さらに増加して20才代に peak に達するが、この場合第3 (DHA) 分画、4(AS) 分画、5 (etiocolanalone, EC) 分画、および 6+7 (11-OH-AS, 11-OH-EC) 分画の各分画値、および分画比を比較検討した。

4 (AS) 分画、5 (EC) 分画、6 + 7 分画は、総値の上昇 curve とほぼ平行に、10才頃より急上昇を始め20才代の peak に達するが、3 (DHA) 分画のみは10才代の前半には殆んど上昇せず、10才代の後半17～8才頃より漸く急上昇を開始し、20才代の peak に達した。

この場合、種々分画比を検討すると、従来性腺系/副腎系とされる $4 + 5 / 3 + 6 + 7$ 分画比では10才代の前半の平均値は、0.95、後半では平均 1.15、および20才代前半では平均 0.85で加令との間には全く相関が認められなかつた。一方、 $4 + 5 / 6 + 7$ 分画比ではそれぞれ1.25, 1.51および1.85と加令と共に軽度上昇傾向を示し、さらに $3 + 4 + 5 / 6 + 7$ 分画比では1.51, 1.83および3.01と加令と共に明らかに増加した。また、 $4 + 5 / 3$ 、および $6 + 7 / 3$ 分画比はそれぞれ5.92, 4.85, 1.59、および4.72, 3.21, 0.86と加令と共に急激に減少した。

上記のように女子思春期においても、第3分画すなわち DHA の動態に特徴ある成績がえられ、DHA の分泌増加は女子思春期の性器および extragenital に重要な影響を及ぼしていることが示唆され、また10才代前半の尿中 DHA 分画の低下は、その時期における DHA の代謝、利用の著しいことを示すものと考えられた。

女子に DHA-acetate を投与した場合 (50mg/日×4日)、尿中 17-KS 分画値は3, 4, 5分画が著増し、とくに3, 5分画の増加が著しかつたが、一方、6, 7分画はほとんど全く増加しなかつた。この結果は DHA を内服した場合や H^3 -DHA を投与した場合も同様であつた。すなわち DHA の代謝経路の上からは、DHA が6, 7分画になる可能性はあるとしても、実際にはその量は negligible であり、また、卵巣由来の androgen も極めて微量である。従つて女子の場合は、性腺系、副腎系の分類はほとんど全く無意味であり、第3分画を6, 7から分離し、逆に、4, 5分画と関連づけて、例えば「DHA 系」あるいは「anabolic 系」として考察するのが適当とみなされた。

追加：東大中尾内科 大沢伸昭 副腎皮質機能の中 Glucocorticoid 産生能は一生よく維持されるが、adrenal

androgen 産生能は小児期には低く、思春期に急速に増加し、18~20才で peak に達し、以後加齢と共に徐々に低下する。此は怖らく C_{17-20} Lyase の活性の低下によると思われるが、我々はその機序として副腎内の Lipid peroxidation を想定している。生後1ヶ月、6ヶ月、1年のモルモットの副腎を用い、その Lipoperoxide 産生能を検討した結果、加齢と共に著明に増加するのが認められた。