Aging and Thyroid

Shozo TSUJI and H. OGURA

2nd Division of Internal Medicine, Kobe University, School of Medicine, Kobe, Japan

The problem was discussed from two viewpoints, the one from the pathological changes of the thyroid accompanying the aging, and the other from the role of the thyroid expected to be playing in the process of aging. A) Change of the thyroid function in aged people. (1) Morphological findings of thyroid in 153 autopsy materials disclosed increasing formation of lymphfollicles and connective tissues with the advance of age, but simultaneous TA-Test, precipitation test, and TRC-Test showed no positive incidence in 20 cases over 65 years of age. As summary although a general aging tendency of thyroid is suspected from weight decrease etc., pictures corresponding to euthyroidism are still abundantly found, indicating the sufficient response of thyroid to the hormonal need of peripheral tissue in old age. (2) Changes of thyroid hormone with the advance of age. A gradual decrease of Tetrasorb-125 and a decrease of TSH activity of blood (Bakke-Ogura's method), which starts relatively early, were shown in old people but PBI were not changed. Studies on the distribution of thyroid hormone in the plasma disclosed significant increase of total TBG capacity and decrease of TBPA. Increase of TBG in the old people was postulated as to be playing a role of buffer effect in the process of turn over of thyroxine to free active form. Analysis of free Thyroxine disclosed increase of free T_4 % corresponding to the decrease of TBPA but no difference in free T_4 iodine and free T_4 concentration between old and young people. As summary decrease of TBPA was evaluated as to be responsible for the increase of free T_4 % in old people. (3) Metabolism of thyroxine in the peripheral tissue. Investigation of turnover of I^{131} -Thyroxine was carried out under medication of potassium perchloride 600 mg/day disclosed prolonged half-life and decrease of turnover rate in old people. (4) TSH-Test on old people, disclosed sufficient response of thyroid to TSH. Relation of free T_4 % to TBG, endogenous TBG and TBPA were studied in young and old people after administration of thyroid powder. A significantly lower increase of 1.8% was observed in old people in comparison to 16.6% of young people. This finding seems to point upon the possible buffer effect of increased TBG of old people. (5) Arteriosclerosis and thyroid. Determination of secretory capacity of TSH was carried out in normal old people and patients suffering from senile dementia, caused by cerebral arteriosclerosis both under excessive antithyroid medication. TSH secretion of senile dementia patients was clearly lower than normal old people. Furthermore, dogs with bilateral ligation of internal carotid arteries, showing in average 18% decrease of circulating cerebral blood flow was treated with hemithyroidectomy. A much lower TSH increase

in blood was shown compared with the normal response of untreated dogs. The authors postulated a possible impairment of feed back mechanism in old age basing upon the decrease of cerebral circulating blood volume caused by cerebral arteriosclerosis. B) (1) Age estimation using standard point system consisting of various physiological finding such as vital capacity, retractivity of skin, auditory activity and skeletal X-ray findings was carried out on 33 cases of hypothyroidism and on 882 cases of euthyroidism. In average 10 years of advanced age was found in hypothyroid patients in comparison to normal subjects of corresponding age. Consequently promotion of pathological aging was suspected in hypothyroid patients. (2) Prognosis of hypothyroid patients was followed up from the view point of life-expectancy. Statistical studies in 83 cases of thyroidectomized patients on account of Hashimoto's disease revealed 14 deaths, which did not exceed the expected death percent as regard to life expectancy. The conclusion was, that the thyroidectomized patients did live longer than normal subjects and hypothyroidism may be advantageous for long life.

SUMMARY

Thyroid seems to undergo gradual lowering of its function along with the advance of age parallel with the lowering of cellular metabolism, but under reservation of potent capacity to react upon TSH for long time. Significant increase of TBG capacity in old age seems to be playing a role as a buffer system against over normal increase of thyroid hormone in blood. Furthermore a distinct impairment of feedback mechanism between thyroid and hypothalamo-pituitary system was demonstrated in old people. As a cause of this impairment possible decrease of cerebral circulating blood volume, basing upon cerebral arteriosclerosis, was postulated. Hypothyroidism seems to promote the pathological aging and this corresponds to the clinical impression of hypothyroid patients showing frequently far more advanced age than real age. But from the standpoint of life expectancy mild hypothyroidism seems to be advantageous for long life. The last postulation is supported by the relatively mild lowering of thyroid function, corresponding to the lowered metabolism of the tissue, in old people.

(See pp. 723~732)

Thyroid Function in Childhood

Hironori NAKAJIMA

Department of Pediatrics, Chiba University School of Medicine, Chiba City, Japan

Until the 5th day after birth in the neonatal period, ^{131}I -thyroidal uptake, serum T_4 , ^{131}I - T_3 resin uptake, and free T_4 index are high, definitely indicating the state of physiological hyperactivity of the thyroid.

In the course of development from the infantile to adult period, none of these 4 parameters showed significant variations. However, plasma inorganic iodine is lower and renal iodide clearance and thyroidal iodide clearance is higher as the age of the subject is younger, indicating more active iodine metabolism in younger age.

Since iodine uptake is abundant in each age group, no possibility of deficiency is expected. With regard to T_4 metabolism, both T_4 turnover rate and T_4 degradation rate was higher in younger age. TBG and TBPA also varied according to age. Male to female difference was seen after adolescence probably due to the influence of sex hormone. Based on these results, the physiological goiter frequently seen in adolescent females is probably not due to the increase in the requirement of thyroid hormone, iodine deficiency, and increase of renal iodide clearance but is apparently under the influence of estrogens.

(See pp. 732~733)

シンポジウム I 加齢と内分泌

4. 加 齢 と 甲 状 腺

神戸大学第二内科

辻 昇 三
小 倉 一

甲状腺は身体の諸機能を調節している重要な内分泌腺で、これと加齢との相関をみることは、きわめて大切な課題と考える。吾々の教室では、この問題に対して次の3つのシンポジウムを担当してきた。1つは第11回日本内分泌学会西部地方会における、“動脈硬化と内分泌”であり、1つは、第17回日本医学会総会で“老化の内分泌学的背景”であり²⁾、今1つは、第19回の日本体質学会における“長寿と内分泌”というテーマである³⁾。今回はこれらの報告の内、加齢と甲状腺についての成績をまとめ、二、三の新しい知見を追加して報告する。

まづ本題に対し次の2つの観点から論じたい。1つは加齢にともなう甲状腺の変化であり、今1つは、加齢現象に及ぼす甲状腺の役割である。

A. 加齢にともなう甲状腺の変化

1) 形態学的変化

当大学病理学教室で剖検した153例の甲状腺重量の統計から加齢的变化は Tabel. 1, Fig. 1 の如く30才

Table 1. Changes of thyroid weight along with aging

Age	cases	♂	cases	♀
21~25	3	18.4±2.9	3	19.0±5.6
26~30	8	19.0±5.6	7	18.7±5.7
31~35	7	16.6±3.8	4	15.4±5.9
36~40	4	17.7±2.9	3	16.2±4.0
41~45	5	18.0±4.1	4	16.2±4.5
46~50	4	17.0±3.5	3	16.6±4.0
51~55	11	17.8±4.5	8	16.2±2.8
56~60	7	17.3±5.3	5	16.3±3.7
61~65	12	15.8±3.0	9	15.2±4.5
66~70	9	16.5±5.6	7	15.4±3.8
71~75	7	15.2±2.7	7	13.5±6.1
76~80	3	15.2±2.7	4	14.4±3.8
81~85	3	15.0±7.4	3	13.9±1.8
86~90	2	13.5, 14.0	1	12.8
	85		68	

Fig. 1. Changes of weight of endocrine organs along with aging

Table 2. Age changes of weight of endocrine organs along with aging

		I	II	III	IV	lymphfollicle			connective tissue			cases
						+	++	+++	+	++	+++	
-19	M		⋯									5
	F	•	⋯									5
20-29	M		⋯	⋮					•			9
	F		⋯									11
30-39	M		⋯	⋮					⋯	•		12
	F		⋯	⋯		•			⋮			13
40-49	M		⋯	⋯					•	•		12
	F		⋯	⋯		•						10
50-59	M		⋯	⋯		•			⋯			12
	F		⋯	⋯	•		⋮		⋯			11
60-64	M		⋯	⋯					⋮	•		9
	F		⋮	⋯			•		⋮	•		8
65--	M	•	⋯	⋯	•	•	•	•	⋯	⋮	•	13
	F		⋯	⋯	⋮	•	⋮		⋯	⋮	•	13

以後漸次減少してゆく結果をえた。次に組織像からみた所見をのべると、教室の入江⁴⁾の分類にしたがつて甲状腺機能状態を4つに分類した。I型は機能亢進像を、II型は正常像を、III型は機能低下を、IV型は機能休止乃至萎縮像を示す。Table 2は、133例の結果を示す。表の如く、加齢にともないIII型が多くなるが、65才以上ではIV型も多くなり、II型を示すものもかなりみられる。又一例の機能亢進を思わせる71才男子の像もみられた。

又、中欄はリンパ濾胞形成の度合を示すが、やはり加齢にともない増加の傾向がみられたが、65才以上の20例について、TA-Test、沈降反応、TRCなどを行なつたが全て陰性であつた。右欄は、間質の増生度を示し、加齢にともない老化の傾向はみられるが、65才以上でもかなり正常像を示すものが多く、末梢組織の甲状腺ホルモン需要に充分対処しようと推定された。

2. 甲状腺ホルモン量の加齢に伴う変化

PBI 値, Tetrasorb-125, TSH 活性 (Bakke-Ogura 法), の加齢にともなう変動を実測値で示し, (Table 3, Table 4, Table 5) これを 図示した. (Fig. 2, Fig. 3) PBI 値は大きな変動を示さず, Tetrasorb

Table 3. PBI in aging

Age	Cases	♂	Cases	♀
10~19	7	6.3±1.08	6	6.2±1.02
20~29	7	6.3±1.31	8	6.4±1.17
30~39	8	6.4±0.72	5	6.4±0.83
40~49	5	6.4±1.00	4	6.0±0.63
50~59	7	6.2±0.77	6	6.1±0.89
60~69	7	6.3±1.86	7	6.3±2.34
70~79	6	5.1±1.14	6	5.1±0.09
80<	4	5.1±0.98	5	4.9±1.40

Table 4. Tetrasorb in aging

Age	Cases	Male	Cases	Female
~20	7	9.1±1.1	10	8.8±1.9
21~30	8	8.8±1.9	9	8.7±1.5
31~40	6	8.1±1.9	6	7.4±1.7
41~50	7	7.2±2.0	9	7.8±1.9
51~60	7	7.4±1.4	8	8.3±2.2
61~70	6	7.4±1.4	6	6.6±2.4
71~80	8	6.0±3.0	16	6.3±1.7
81~90	1	6.1	1	8.1
91~100	—	—	2	5.5, 8.6
Average	50	7.7±2.1	67	7.6±2.0

は、徐々に減少を、TSH 値は、比較的早期より低下傾向がみられた。Table 6 は、平均令27才の若年群と、平均令80才の老人群について甲状腺ホルモンの存在様式を示したものである。老人では有意の total TBG capacity の増加と、TBPA の減少がみられた。この老人における TBG の増加は、何らかの原因で甲状腺ホルモンが血中で増加した場合には、この TBG に結合して、サイロキシンの遊離型への移行をおくらせる Buffer 様の作用を演じるのではないかと推定した。Table 7 は、starling の平衡透析法⁵⁾によつて測定した free T₄ 値を示す。表の如く老人において free T₄ % は有意に高く、これに対して free T₄ iodine, free T₄ concentration

Table 5. Plasma TSH level in aging (mu/ml)

Age	Cases	♂	Cases	♀
10~19	4	0.091±0.033	6	0.103±0.048
20~29	6	0.077±0.048	7	0.096±0.060
30~39	4	0.079±0.033	5	0.099±0.061
40~49	5	0.073±0.043	6	0.093±0.064
50~59	4	0.064±0.027	4	0.070±0.032
60~69	5	0.051±0.040	5	0.062±0.054
70~79	3	0.038±0.026	3	0.038±0.043
80	2	0.046, 0.014	1	0.037

TSH-assay by Bakke-Ogura's method

Fig. 2. Average value of thyroid hormones in aging male

Fig. 3. Average value of thyroid hormones in aging female

Table 6. Comparison of thyroid function in old and young age group

	Old	cases	Young	cases	P
PBI $\mu\text{g/dl}$	5.4±1.2	31	5.8±2.5	32	N. S
Triosorb %	39.5±3.7	40	31.1±2.9	60	N. S
total TBG Cap. $\mu\text{g/dl}$	35.9±4.3	21	21.5±4.3	14	<0.01
end. TBG $\mu\text{g/dl}$	8.3±1.9	6	7.2±0.8	5	N. S
TBPA $\mu\text{g/dl}$	96.6±9.5	8	125.0±8.1	5	<0.01
free T ₄ Index	4.7±0.8	15	5.5±0.6	5	N. S

Table 7. F-T₄ in old and young aged

	Old 21 cases	Young 14 cases	P
F-T ₄ %	0.041±0.008	0.034±0.004	<0.01
F-T ₄ iodine m $\mu\text{g/dl}$	2.37±0.75	2.27±0.57	N. S
F-T ₄ concent. m $\mu\text{g/dl}$	3.5±1.0	3.5±1.0	N. S
PBI $\mu\text{g/dl}$	5.8±1.6	6.7±1.4	N. S

は老若に全く差をみなかった。又, free $T_4\%$ は, TBG capacity と相関を示さず, TBPA と逆相関が成立した。即ち, 老人では TBPA の減少が free T_4 の相対的濃度の増加と深い関係があると考えられ, 前述の如く, 老人の TBPA の有意の減少は, この free $T_4\%$ の有意の増加を説明するに足ると考えられた。

3. Thyroxine の末梢代謝に関する老人の特徴

Table 8 は健常人97例の体表面積当りの消費熱量を示し, 加令にともなう減少することから, 老人で

は末梢における甲状腺ホルモンの消費の低下が推定される。Shock⁶⁾ はアンチピリン法によつて体水分量を測定し, 老人における基礎代謝率の低下は, 脂肪組織や, 間質の割合が増加しているためで, 個々の実質細胞の代謝は老若で不変であろうと結論している。本邦においても篠原⁸⁾ の業績があり, 又, 田内⁹⁾ は肝の組織学的な検索から老年期にみられる臓器組織重量の減少は, 実質細胞数の減少による面が多く, 個々の細胞はむしろ活発な状態にあると推論している。従つてこれらの所見から老人の甲状腺が単にその機能をおとしているというよりは, むしろ甲状腺ホルモンの働く場所が量的に減少していると考えられる。従つて末梢における Thyroxine の turnover をみることはきわめて興味あることと考えられる。予め過塩素酸カリ 600mg を毎日分4にして経口投与し, 甲状腺への無機ヨードのとりこみをブロックした状態で I^{131} Thyroxine を約100 μ c 静注し, 経日的にその消費を PBI¹³¹ のカウント数でみたものである。Fig. 4, Fig. 5 はその結果を示す。平均年令77才の老人9例の半減期の平均値は 6.8日で, 若年者6例のそれは 5.5日と短く, turn over rate の計算では, 老人の方が少い結果がえられた。即ち老人における末梢組織の thyroxine の消費は若年者に比して減少しており, このためにも血中のホルモン値は低くて足りていると考えられる。

Table 8. Calorie expenditure in different age

Age	Cases	Male	Cases	Female
20~29	3	41.0 $\pm$ 6.24	1	38.0
30~39	13	40.3 $\pm$ 4.53	3	39.3 $\pm$ 1.53
40~49	16	38.0 $\pm$ 4.55	7	34.8 $\pm$ 4.60
50~59	20	37.2 $\pm$ 4.67	10	34.3 $\pm$ 6.57
60~69	14	37.3 $\pm$ 5.13	7	34.1 $\pm$ 6.17
70~79	2	33.0 $\pm$ 1.41	1	35.0

Fig. 4. Disappearance curves of PBI

Fig. 5. Turnover data

Table 9. Changes of PBI after TSH administration

	Old 15 cases		Young 5 cases	
	PBI	% Increase	PBI	% Increase
Before	5.3±1.1	100.0	5.3±0.5	100.0
24hrs	6.5±1.3	124.8±22.9	6.1±0.5	115.7±13.4
48hrs	6.3±1.1	121.4±18.1	5.9±0.6	110.7±17.8

Mean age 77yrs. Mean age 22yrs.

Table 10. Change of Triosorb after TSH administration

	Old 35 cases		Young 16 cases	
	Triosorb	% Increase	Triosorb	% Increase
Before	29.5±3.9	100.0	31.4±2.1	100.0
24hrs	33.1±4.8	112.0±7.6	34.5±3.5	109.6±7.6
48hrs	32.3±4.8	109.3±7.9	33.1±3.0	106.3±6.3

Mean age 75yrs. Mean age 22yrs.

4. TSH 負荷試験

高令者に下垂体の tropic hormone を負荷した場合、老化した target organ が果して反応するであろうかということは、内分泌の老化が下垂体の先行によるものか、或は target organ の先行によるものかという問題の解決に一つの足がかりとなると考えられる。吾々は6年前から約40例の平均令77才の高令者にTSH (Thyropar, Armour 社) を5 USP 単回筋注してこれに対する反応を、前、24時間、48時間後に採血して、夫々 PBI, Triosorb, TBG, endogenous TBG, TBPA, Free T_4 Indexなどを測定し、若年群と比較してきた。予想に反して老人にTSHを負荷すると、Table 9, Table 10の如く、PBI, Triosorb, Tetra-sorbの何れを指標にとつても、かなりの高令者においても、よく反応することが判明し、このことは、前述の老人の甲状腺の組織学的な検索からもうかがわれるところである。又、この場合のtotal TBG, TBPA, endogenous binding TBG, free T_4 Index (clark 法) などについても同時に観察し、教室の鴻山⁷⁾が報

Table 11. Free T_4 after TSH administration in old and young aged
young 6 cases, old 5 cases

		Before	24hrs.	48hrs.
PBI	old	6.1 ± 1.1	8.2 ± 1.2	7.7 ± 0.7
	Young	6.7 ± 0.4	7.9 ± 2.2	7.3 ± 2.0
F- T_4 %	Old	0.038 ± 0.007	0.040 ± 0.003	0.038 ± 0.002
	Young	0.035 ± 0.007	0.036 ± 0.007	0.036 ± 0.005
F- T_4 Iodine	Old	2.40 ± 0.80	3.32 ± 0.51	2.88 ± 0.08
	Young	2.31 ± 0.30	2.82 ± 0.93	2.59 ± 0.68
F- T_4 Concent	Old	3.7 ± 1.2	5.0 ± 0.8	4.4 ± 0.4
	Young	3.3 ± 0.3	4.3 ± 1.4	4.0 ± 1.0

Fig. 6. % Increase of free- T_4 after TSH administration in old and young aged

告しているが、TSH 負荷によつても、total TBG capacity はわずかに3.1%の増加をみるのみで、前値とは間に有意差はみられなかつた、

次に TSH 負荷時の free T_4 との相関をみると Table 11 の如く、free T_4 iodine, free T_4 concentration 共に増加するが、free T_4 % は、殆んど増加せず、Fig. 6 は、前値を 100% とした時の増減率を图示したものである。更に free T_4 % と、TBG, endogenous TBG, TBPA など同一人につき、同時に測定しえた老若 3 例づつの変化を示すと、Table 12 は、その実測値を、Fig. 7 は、前値を 100% とした場合の増減率を图示したものである。即ち、TSH の負荷により endogenous binding TBG は、当然のことながら増加するが、free T_4 % は老人において増加せず、老人の大きな TBG が TSH によつて動員されたサイロキシンを捕束し、遊離型への移行をおくらせる Buffer 作用を示したものと考えた。更にこの点を確認するために、老若各々 3 例づつの健康人に 7 日間乾燥甲状腺末 0.04 g を 7 日間投与し、最後の投薬後 3 時間後に採血して、その前後の free T_4 % の動きをみたのが、Table 13 表である。老人例の値は 1.8% のみで、若年者群の 16.6% の増加に比して少く、吾々の推論をうらづけたものと考えている。

5. 動脈硬化症と甲状腺

Table 12. TBP and Free T₄ after TSH administration in old and young aged, each 3 cases

		Before	24hrs.	48hrs.
TBG	Old	28.6±2.4	31.9±2.8	30.9±2.0
	Young	21.2±0.3	21.3±2.7	22.4±3.8
end. TBG	Old	8.0±0.6	9.9±2.1	8.5±0.8
	Young	6.1±0.5	7.1±0.9	6.9±0.5
TBPA	Old	123.6±4.9	125.3±1.6	126.0±3.1
	Young	121.9±2.8	120.9±3.0	116.0±9.7
PBI	Old	6.9±0.1	8.7±0.4	7.5±0.8
	Young	6.8±0.4	9.1±1.7	8.5±1.6
F-T ₄ %	Old	0.042±0.004	0.040±0.003	0.039±0.004
	Young	0.030±0.002	0.032±0.004	0.032±0.003
F-T ₄ iodine	Old	2.90±0.41	3.39±0.13	2.91±0.18
	YounF	2.11±0.14	2.95±1.05	2.82±0.77
F-T ₄ concent.	Old	4.4±0.6	5.2±0.2	4.5±0.3
	Young	3.2±0.2	4.5±1.6	4.3±1.2

Fig. 7. % Increase of TBP and free T₄ after TSH administration in old and young aged

Table 13. % F-T₄ after thyroid-powder administration for 7 days in old and young aged (each 3 cases)

	Old		Young	
	% F-T ₄	% Increase	% F-T ₄	% Increase
Before	0.041±0.004	100	0.031±0.005	100
After	0.042±0.006	101.8±8.9	0.036±0.004	116.6±8.3

Table 14. Effect of Mercapto-imidazole (120mg for 7days) on PBI and TSH in normal young subjects and patients with senile dementia

	PBI % change	TSH % change
normal young subjects	80.6±16.26 (10)	186.1±131.53 (9)
patients with senile dementia	80.4±22.96 (11)	80.9±42.17 (8)

加齢にともなう Pathological aging に最も関係の深い動脈硬化病と甲状腺との関係はきわめて重要な課題である。さきに小倉は、第11回日本内分泌西日本地方会において、動脈硬化症には、潜在性の甲状腺機能低下症の存在が推測されると報告したが、脳動脈硬化症に基因すると考えられる老人性痴呆症に抗甲状腺剤を大量投与して、その TSH の分泌を McKenzie 法で測定し、対照の正常人群に比して後者では TSH の分泌が障害されていることを証明した。(Table 14), 更に、3匹の両内頸動脈結紮犬(但し、予め Xe¹³³ 注入法で脳循環血流量が平均して18%おちていることを確認しておいたもの)に片側

甲状腺を剔除し、血中の TSH 量を同様に測定し、片甲状腺剔除術のみをおこなった対照犬に比して、両内頸動脈結紮群では片甲状腺剔除術をおこなっても TSH の上昇度が図の如くわるいことをみとめた(Fig. 8)。一般に老人では若年者に比して Feed Back 機構の障害があるといわれているが、その原因の一つとして動脈硬化による脳循環血流量の減少が重要な因子として考えられることを示した。

Fig. 8. % changes of plasma TSH and PBI in dogs after bilateral ligation of carotid arteries

B. 加齢現象に及ぼす甲状腺の意義

1. 老化度について

甲状腺機能の低下が、所謂加齢現象にどの程度の影響を有するかを検討するため、甲状腺機能低下症33例をえらびその老化度を測定した。老化の基準となる老化度の判定については、第8回日本老年医学会総会において報告したが、肺活量、皮膚の退縮率、聴力、骨のレントゲン線透過度等、諸々あげられるが、Table 15の如く生理的年令評価点はきわめてよく年令と一致して上昇するのでこれを採用した。Fig. 9は、正常人群と甲状腺機能低下症群との加齢による生理的年令評価点の相関を示したもので大体後者で約10才ぐらいの点数の増加がみられた。

このような相関は、年令の因子をのぞいても成立し、即ち、同じ年令層についてみても、甲状腺ホルモンの低下している場合に、その生理的年令評価点の上昇がみられた。勿論、生理的年令評価点の上昇が、ただ

Table 15. Grade of aging in euthyroid and hypothyroid subjects estimated by point system, increasing point shows advanced age

Age	Normal				Hypothyroid	
	Cases	Male	Cases	Female	Cases	
<24	8	6.3±5.8	6	4.5±3.4		
25~29	11	6.8±7.1	4	6.8±5.9	2	6.3, 20.0
30~34	33	9.5±5.7	11	9.8±4.5		
35~39	71	13.9±6.7	24	12.6±6.7	4	19.6±7.8
40~44	88	13.7±8.1	25	13.3±9.2		
45~49	87	19.5±10.6	26	19.8±9.7	7	32.0±11.0
50~54	109	23.1±10.1	35	25.6±10.7		
55~59	99	27.9±10.2	25	28.3±13.7	11	34.6±6.0
60~64	104	31.5±10.7	21	30.9±11.8		
65~69	56	34.3±10.5	12	38.5±10.2	9	43.5±8.9
70~74	16	39.7±10.7	4	40.5±6.6		
75~79	5	38.8±13.5	2	20.0, 26.7		
	687		195		33	

Fig. 9. Graphic comparison of aging sign of euthyroid and hypothyroid subjects, hypothyroidism is accompanied by advanced aging sign

ここに i は観察開始時の年齢, S は調査時の年齢 (死亡の場合は死亡年齢) q_x は各才毎の死亡率, n は症例数を示す. 又, 各才毎に累加する死亡率は, なるべくその年に近い時期の生命表によつた. その結果によると, 83例の予定死亡数は, 23,78人となり, 実死亡数14例の場合の危険率 5%の最低予定死亡数を Poason の数表からもとめると21,65人となり, 83例の手術例の予定死亡数より有意に少く, 長命であるという予想外の結果がえられた. 一般に甲状腺ホルモンは生体にとって catabolic に, あるいわ calorogenic に作用することは周知のことであるが, このホルモンの低下は, 前述の加齢現象を促進するようであるが, 細ぼそと生ながらえ, 長寿を全うするためにはかえって少い方が有利であるという推論がなされる.

結 語

以上加齢と甲状腺という課題に対して, 結果論的と, 原因論的な観点の両面から考察をおこなつた.

ちに老化の促進とはいえないが, Hypothyroidism の患者では, Pathological aging の促進が推定される.

2. 甲状腺機能低下症の予後調査

前述の如く, 本症では, 所謂 Pathological aging の促進のために, 長寿を全うするものは少いであろうとの想定のもとで, 本症の予後調査をおこなつた. 対照は神戸市隈病院で, 昭和10年から同32年まで甲状腺切除術をうけた4359例中, 顕微鏡学的に橋本氏病と診断されたもので, 何れも術後, 甲状腺機能低下症状ありと, カルテに記載のあつた208例に, アンケートを出して回答がえられた83例について, 日本生命学術調査課の協力をえて, その予定死亡数を算出した. 予定死亡数は $\sum_{n=1}^S \sum_{x=i}^S q_x$ で算出される.

日本医学会総会においてのべた如く、吾々の観察でも、甲状腺の老化が先行して所謂老化の支配的な原因となりうるとは考えがたく、一般臓器の老化と平行して、甲状腺も徐々にその機能をおとしてゆくようである。しかし TSH で刺激をおこなえば、かなりの高令になつてもこれに対処しうだけの能力を有していることが判明した。無事安静の時には末梢の細胞代謝の低下に応じて、その機能をおとし、又、老人における TBG capacity の有意の増加は急激な甲状腺ホルモン増加に対して一つの Buffer の作用を演じているとも考えられ、この説をうらづける結果もえた。しかし甲状腺と間脳下垂体との Feed-Back 機構は明かに若年群に比して障害されており、これには脳動脈硬化にともなう脳循環血流量の減少がその一因となつていることを実験犬を用いて観察した。

又、甲状腺機能低下症における先述の老化指数の上昇は、Pathological aging を促進せしめると考えられ、外見上の老化の促進は、臨床的にもしばしば経験されることである。しかし、加齢にともなう甲状腺機能の低下は、長寿という目的には、必ずしも不利なものではなく、このような方面にも生物の合目的な適応乃至 Homeostasis が考えられた。

文 献

- 1) 小倉 一, 新光 毅: 第11回日本内分泌学会西日本地方会シンポジウムにて発表, 第17回日本医学会総会学術講演集, 3: 631, (1967).
- 2) 小倉一: 3) 辻 昇二・他: 高令医学, 7: 29, (1969).
- 4) 入江一彦: 東北医誌, 55: 321, (1957).
- 5) STERLING, K., LASHOF, J.C., and MON, E.B.: J. Clin. Invest., 33: 1031, (1954)
- 6) SHOCK, N.W.: "Symposium on problems of gerontology." The National Vitamin Foundation, New York, (1954), p. 20
- 7) 鴻山千秋: 高令医学, 6: 399, (1969).
- 8) 篠原恒樹: 第6回日本老年医学会総会シンポジウム講演, 東京, (1964).
- 9) 田内 久: 第17回日本医学会総会シンポジウム講演, 名古屋, (1967).

追加発言

小児期及び青春期の甲状腺機能

千葉大学小児科

中 島 博 徳

新生児の甲状腺機能は生後数日迄は、Triosorb 値, T_4 -I 値は異常に高く、文献的に見られる thyroidal uptake と合せて、生理的に hyperactive といえる。

新生児期以後、乳児、幼児、学童、青春期、成人の Triosorb 値, T_4 -I 値, free T_4 index, thyroidal uptake (24時間値), PBI 値等は何れも有意の差がない。従つて之等の検査からは小児期甲状腺機能の特殊性を知ることができなかつた。

そこで、33人についてヨード代謝を検査した所、血漿無機ヨード値は、小児期<青春期<成人であり、腎ヨードクリアランスは、小児期>青春期>成人であり、甲状腺ヨードクリアランスは同じく、小児期>青春期>成人の関係を示した。即ちヨード代謝は幼若程活発であり、これらの変化は年令的に略直線的に推移する。一方、尿中ヨード量から算出したヨード摂取量は 100~800 μ g/日であり、諸外国の data に比し著しく高く、ヨード欠乏の起る可能性は少ない。

次に、57人について T_4 代謝を検査した所、血中半減期は、小児<青春期<成人、従つて turnover rate は、小児>青春期>成人となり、 T_4 末梢崩壊量は、小児>青春期>成人となつた。従つて T_4 代謝も幼若程活発で、年令的に略直線的に変化する。以上から小児の甲状腺機能は成人に比し hyperactive であるといえる。

甲状腺重量の年令的推移を文献的にみると、小児期は絶対重量は勿論、体重当りでも成人より小さく、これだけで機能は hyperactive であることは興味深い。甲状腺重量は青春期に急激に増大する。これは女性に於て著明である。

視触診による甲状腺の大きさを、千葉市の小、中、高校生7000人について調べると、明らかに青春期の女子に於て、甲状腺腫大がみられ、2.5度以上のものは2%に相当する。

青春期女子の生理的甲状腺腫大の成因は、従来からなされている青春期の成長促進に伴うホルモン需要量の増大とする考えは、小児期から成人期へ直線的に減少する上述の T_4 代謝成績からも否定され、又腎ヨードクリアランスの高まりによるヨードの相対的欠乏とする考えも小児期は青春期より高いという上述の成績からも否定される。更に女子に特異的であることより、estrogen の役割に注目せざるを得ない。

estrogen の甲状腺に及ぼす効果は古くより論じられているが未だに定説がない。我々もラットに estradiol benzoate 50 μ g/日、progesterone 3.5mg/日、methylthiouracil 1mg/day を単独又は併用で3週間観察したが、estradiol の甲状腺重量増加作用を認め、従来の一部の報告と一致した。

次に、estrogen の T_4 結合蛋白に及ぼす影響をみた。201例でみた T_4 distribution % (affinity) と maximal binding capacity は、TBG は小児期より成人に向つて次第に減少し、TBPA は逆に次第に増加する。注目すべきは、小児期では見られなかつた性差が青春期より認められ、TBG は女子が男子よりも優位で、TBPA はその逆であつた。この差は青春以降に於ける内因性の estrogen と androgen の量的関係によつて生じたものであると考えられる。

この結合蛋白の年令的、性的変化が甲状腺に如何なる影響を与えらるか不明である。しかし1つの可能性として、estrogen 分泌の周期性に注目したい。estrogen の周期的変化は、当然 T_4 結合蛋白の周期的変化につながり、これが下垂体、甲状腺系を不安定に導く因子、ひいては青春期に多発する青春期性甲状腺腫を始めとした種々の甲状腺疾患の成因の1つになり得ると考えたい。

体甲状腺系を不安定に導く因子、ひいては青春期に多発する甲状腺腫を始めとした種々の甲状腺疾患の成因の1つと考えたい。

質問：虎の門病院内分泌科 鎮目 和夫 1) 加齢により Tetrasorb で測定した T_4 は低下するのに PBI はあまり低下していないという結果であるがその差異は何によるか、

2) 老人では TBG は増加しているのにも拘らず Free T_4 の%が若年者より高いという結果が示されたが何故に Free T_4 が高いのか

3) 甲状腺機能低下症の予後調査の結果本症患者は長命であるという結果を示されたが、その様な患者は甲状腺ホルモンの投与を受けていたのか。若し治療されていた群とされていなかった群とがあるのならその間に寿命に差は認められたか。