諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……(齋藤)

一八三二

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響

京都帝國大學醫學部辻内科教室
大學院學生 醫學士 齋藤 隆

目次

第一章 緒論	五、沃度加里及ビ甲状腺末投與
第二章 實驗方法	六、沃度加里及ビ副腎皮質粉末投與
第三章 實驗成績	七、沃度加里投與及ビアドレナリン注射
一、對照正常家兎ノ各臟器沃度含有量	八、沃度加里投與及ビインスリン注射
二、沃度加里投與ノ影響	第四章 考按
三、甲状腺取出時ニ於ケル沃度加里投與	第五章 結論
四、甲状腺取出時ニ於ケル沃度加里及ビ甲状腺末投與	附、主要文献

第一章 緒論

一八九五 Baumann⁽¹⁾ ガ人及ビ動物ノ甲状腺ニ沃度ヲ含有セル事實ヲ發表セシ以來、甲状腺機能ト沃度ニ關スル研究

ハ幾多ノ學者ニヨリ報告セラレタリ。即、甲狀腺ハ生體臟器中最モ多量ニ沃度ヲ含有スル事、甲狀腺沃度含有量ハソノ機能如何ニヨリ差違アル事、甲狀腺ハ沃度ト特殊ノ親和力ヲ有シ沃度ノ使用ハソノ機能上ニ一定ノ影響ヲ與フル等ノ事實ニ徴スル時ハ甲狀腺ト沃度トハ特別緊要ナル關係ヲ有スル事ハ疑フベカラザル事實トナレリ。特ニKocher⁽²⁾空地⁽³⁾地ノ業績ニヨレバ甲狀腺ノ沃度代謝ヲ司ル中樞器官トシテ缺クベカラザルモノナル事一層明カニナレリ。

抑モ生體內ニ於ケル沃度代謝ニ關スル文獻ヲ回顧スルニ Kocher⁽²⁾, Maurer⁽⁴⁾, Fellenberg⁽⁵⁾, Veil⁽⁷⁾、空地⁽³⁾、岡野⁽⁸⁾、鈴木等⁽⁹⁾ハ排泄セラレタル尿中ノ沃度量ヲ觀察シ、Loeb⁽¹⁰⁾, Fellenberg⁽¹¹⁾, Maurer u. Ducreue⁽¹²⁾, Takemura⁽¹³⁾、藤澤⁽¹⁴⁾、山瀬等⁽¹⁵⁾ハ體內各臟器ノ沃度含有量ヲ檢索シテ生體內ニ於ケル沃度ノ運命ヲ明カニセントセリ。即之等ノ報告ニヨレバ投與セラレタル沃度ハソノ大部分約七〇%以上ハ尿中ニ排泄セラル、モ他ハ皮膚粘膜ヨリ排泄セラル、カ或ハ一時體內ニ貯溜シ甲狀腺其他ノ臟器ニ分布沈着スルモノ、如シ。空地⁽³⁾ノ研究ニヨレバ甲狀腺機能如何ハ沃度新陳代謝ニ重要ナル影響ヲ與フルモノトセリ。果シテ甲狀腺機能ノ變調ガ尿中沃度排泄量ニ變化ヲ及ボスモノトセバ同時ニ生體各臟器沃度含有量ニモアル變化ヲ來ス事ハ想像ニ難カラズ。又甲狀腺ト密接ナル機能關係ヲ有スル副腎或臍臟ホルモンモ之等沃度代謝ニ一定ノ關係ヲ有セザルベカラズ。本問題ニ關シテハ文獻甚ダ寥々タルモノニシテコノ間ノ消息未ダ闡明ノ域ニ達シタリトイフベカラズ。於茲、余ハ家兎ニ於テ經口のニ與ヘラレタル沃度ハ甲狀腺機能如何ニヨリ各臟器沃度含有量ニ如何ナル變化ヲ來スカ、又アドレナリン、副腎皮質、インスリンハ之ニ如何ナル影響ヲ與フルカヲ知ラント欲シテ辻教授指導ノ下ニ本實驗ヲ企テタリ。

第二章 實驗方法

試驗動物トシテ二疋前後ノ白色健康ナル家兎ヲ選ビ豆糟ヲ以テ飼養シ沃度加里〇・〇五瓦一週間經口のニ投與セリ。
カ、ル動物中一群ヲ對照トシ、他群ニハ沃度加里ト同時ニ甲狀腺末(當教室製)〇・二一〇・五瓦、副腎皮質末(當教室製)〇・五瓦ヲ内服投與シ又ハアドレナリン〇・二坵、インスリン「リリー」(體重一疋ニ對シ〇・三單位)ヲ下腹部皮下ニ注射セリ。又他群ニ於テハ全甲狀腺ヲ剔出シ二一四週後前述ト同様ナル方法ニテ沃度加里或ハ沃度加里ト同時ニ甲狀腺末ヲ投與セリ。

カ、ル動物ハ一週後即チ最後ノ沃度加里投與後約二十四時間ニシテ頸動脈ヲ切斷シ可及的完全ニ除血シテ検査ニ供セリ。

被檢臟器ハ甲狀腺、肝臟、腎臟、副腎、腦下垂體、脾臟、生殖腺(睾丸、卵巢)、肺臟(右下葉)、腸(盲腸上部)筋肉(左後肢、四頭股筋)、血液(右頸動脈血)ヲ選ベリ。沃度測定法ハ⁽¹⁶⁾₍₁₃₎⁽¹⁷⁾₍₁₈₎Baumann-Antenn 氏法ニヨリ甲狀腺、副腎、腦下垂體、脾臟、生殖腺等ハ全量ヲ以テ測定シ他臟器ハ二一五瓦ヲトリテ測定ニ供シタリ。

第三章 實驗成績

家兎ニ於テ沃度加里〇・〇五瓦宛一一二週間投與シ左表ノ如キ條件ニ於テ各臟器沃度含有量ヲ測定シ次ノ如キ結果ヲ得タリ。

實驗方法	例數	實驗成績	正常動物	沃度加里投與	甲狀腺剝出	甲狀腺剝出
					沃度加里	沃度加里
			5	5	5	5
			I	II	IV	V
		甲狀腺平均一瓦中〇・八四庭ヲ證明シタレドモ他ハ血液二例、脾二例、生殖腺一例ニ於テ沃度痕跡證明シタルノミニテ他ハイブズレモ沃度陰性ナリ。		各臟器共沃度測定シエタル例ニ於テハ明カナル増加ヲ示シ、生殖腺之ニ次ギ血液、肝、腎、脾、肺之ニ次グ。	正常家兎ニ沃度加里ヲ投與セル對照(Ⅱ表)ニ比スルニ著明ナル沃度含量増加ヲ認メタリ。 血液、副腎、腦下垂體ニ於テ著明ニシテ肝、腎、脾、肺、生殖腺之ニ次グ。	各臟器共沃度相當ノ増加ヲ示スモ前IV表ニ比スル時ハ明カナル減少ヲ認メ正常家兎ニ沃度加里ヲ投與セルⅡ表ニ相近似セル結果ナエタリ。
		ハ再ビ沃度ヲ證明セズ。		各臟器共Ⅱ表ニ比スル時ハ明カナル減少ヲ示シ特ニⅡ表ニ於テ沃度ヲ證明セル腦下垂體、筋、肺等ニ		Ⅲ
		各臟器共明カナル増加ヲ示シⅡ表ニ比スルモ尙増加ノ傾向アリ。				VI
		Ⅱ表ニ比スルニ甲狀腺ヲ始メトシイブズレノ臟器モ減少ノ傾向アリ。				VII
		甲狀腺ニ於テハ明カナル増加ヲ認メ生殖腺、肺、腦下垂體、副腎、脾之ニ次グ、シカレドモ血液、腎、肝ニ於テハⅡ表ニ比スレバ増加ヲ示スモⅡ表ニ比スル時ハ却ツテ減少ノ傾向アリ。				VIII

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……(齋藤)

第一表 (臓器一瓦(血液一坵)中ノ沃度量(単位 1/100 坵))

	番 號	性	甲 狀 腺		肝 臟	腎 臟	脾 臟	副 腎	腎	胸下垂體		生 殖 腺	筋 肉	腸	肺 臟	血 液
			重 量 (瓦)	沃 度 量		重 量 (瓦)	沃 度 量	重 量 (瓦)	沃 度 量	重 量 (瓦)	沃 度 量	重 量 (瓦)	沃 度 量	重 量 (瓦)	沃 度 量	重 量 (瓦)
I 對 照	1	♂	1.800	0.121	128.89	5.89 6.17	—	0.60	±	0.084	—	0.023	—	—	—	—
	2	♂	2.300	0.107	60.55	6.07 6.47	—	1.30	±	0.201 0.221	—	0.020	—	—	—	—
	3	♂	2.000	0.110	80.53	5.20 5.35	—	0.85	—	0.155 0.157	—	0.020	—	—	—	±
	4	♀	1.800	0.114	89.17	4.95 4.95	—	0.97	—	0.135 0.130	—	—	—	—	—	—
	5	♀	2.000	0.140	62.86	6.10 6.15	—	0.89	—	0.140 0.140	—	—	—	—	—	±
II 沃 度 加 里	6	♂	2.200	0.167	91.74	6.16 6.25	1.99	0.93	+	0.095 0.118	+	0.024	±	—	+	1.84
	7	♂	2.000	0.180	95.10	6.01 6.26	1.99	0.75	+	0.099 0.110	+	0.025	+	—	+	0.77
	8	♂	2.300	0.160	172.01	4.69 4.83	2.45	2.71	1.53	0.110 0.120	15.90	0.028	109.22	—	1.84	0.69
	9	♂	2.100	0.221	155.65	5.18 5.42	5.24	1.10	4.59	0.094 0.091	+	0.017	113.26	—	2.45	5.05
	10	♀	2.000	0.240	107.31	6.09 6.12	2.80	0.83	+	0.100 0.098	+	0.020	+	—	+	2.01
	11	♂	2.100	0.250	110.09	5.39 5.96	2.02	1.06	+	0.103 0.105	±	0.02	—	—	±	1.91
III 甲 狀 腺 里	12	♀	2.100	0.260	79.98	5.40 5.60	1.90	0.82	—	0.290	5.66	0.01	—	—	—	1.77

	番 號	體 重 (斤)	性	甲 狀 腺 重 量 (瓦)	肝 臟 沃 度 (瓦)	腎 臟 沃 度 (瓦)	脾 臟 重 量 (瓦)	副 腎 沃 度 (瓦)	腎 沃 度 (瓦)	腦下垂體 重 量 (瓦)	生 殖 腺 沃 度 (瓦)	筋 肉 沃 度 (瓦)	腸 沃 度 (瓦)	肺 臟 沃 度 (瓦)	血 液 沃 度 (瓦)					
IV	甲 狀 腺 剝 出	沃 度 加 里																		
	13	2.700	♀		3.67	7.83 8.30	6.42	1.17	5.20	0.340	19.11	0.038	104.62	0.34 0.33	6.88	3.36	1.07	10.86	9.17	
	14	2.700	♂		5.96	6.02 6.26	7.03	1.00	6.42	0.139	+	0.020	+	1.50 1.60	3.93	0.31	2.60	5.96	8.16	
	15	2.500	♀		5.05	6.92 6.45	7.34	0.59	9.79	0.105	+	0.035	+	0.16 0.14	10.24	2.29	3.06	5.81	7.19	
	16	2.500	♂		4.91	7.06 7.06	6.89	1.05	5.02	0.120	+	0.027	132.45	1.90 1.96	6.91	2.00	2.01	4.31	5.10	
V	甲 狀 腺 剝 出	沃 度 加 里																		
	17	2.800	♂		4.01	5.09 5.07	5.10	0.93	4.93	0.098	+	0.030	+	2.00 2.10	5.67	2.00	1.90	4.90	8.00	
	18	1.800	♀		1.37	4.57 4.37	5.03	0.75	+	0.30 0.34	+	0.020	76.45	0.06	+	1.00	1.83	4.88	3.24	
	19	2.300	♂		2.01	4.95 5.05	2.86	0.63	+	0.15 0.17	11.47	0.020	70.45	2.51 2.28	+	1.54	2.59	+	1.93	
	20	2.350	♂		2.25	5.00 5.20	2.75	0.40	+	0.11 0.15	-	0.030	-	1.60 1.75	1.82	+	+	3.24	2.85	
VI	副 腎 皮 質 加 里	沃 度 加 里																		
	21	2.200	♂		1.74	4.90 4.70	2.95	1.20	2.55	0.15	±	0.020	-	1.70 2.00	1.65	+	+	2.18	2.79	
	22	2.300	♂		1.92	4.96 4.90	3.01	1.03	1.93	0.12 0.12	+	0.022	+	1.95 1.98	1.91	-	0.91	3.10	3.41	
	23	2.000	♂		3.69	4.50 4.60	3.99	0.64	+	0.17 0.17	+	0.020	76.45	2.60	1.29	+	2.78	3.06	3.47	
	24	2.200	♂		3.01	5.10 5.20	2.47	0.89	+	0.15 0.17	+	0.020	76.45	2.16 2.30	0.96	+	+	+	3.47	
		2.100	♂		0.200	103.93	3.76	5.10	3.79	3.09	0.29	5.04	0.021	83.50	1.90	4.80	0.98	+	2.81	4.00

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……(齊藤)

	番 號	體 重 (起)	性	甲 狀 腺		肝 臟	腎 臟		脾 臟	副 腎	腎	膈下垂體		生 殖 腺		筋 肉	腸	肺 臟	血 液	
				重 量 (瓦)	沃度量 (瓦)		重 量 (瓦)	沃度量 (瓦)				重 量 (瓦)	沃度量 (瓦)	重 量 (瓦)	沃度量 (瓦)					
Ⅶ アドレナリ ン	26	2,500	♂	0.200	82.32	2,79	5,10	2.52	0.63	±	0.09	0.10	+	0.020	+	2.30 3.20	0.50	+	1.61	1.21
	27	1,900	♂	0.130	87.62	2.47	4.90 5.10	2.38	1.13	±	0.13	0.13	+	0.020	+	1.39 1.38	1.44	+	4.22	1.53
	28	2,000	♂	0.190	96.62	2.14	5,00 5.10	1.96	0.93	+	0.22	0.20	+	0.020	+	2.10 2.08	3.09	+	0.99	3.01
Ⅷ インスリ ン	29	2,400	♀	0.240	100.37	1.07	5,05 5.35	1.47	0.83	3.68	0.24 0.28	7.28	0.030	76.45	0.090 0.090	16.99	+	3.73	2.68	1.71
	30	2,100	♂	0.150	99.64	2.20	6,00 6.00	1.53	0.77	+	0.25	5.88	0.025	50.94	0.130 0.100	13.04	1.60	5.56	3.15	1.32
	31	2,000	♂	0.130	120.25	2.21	5,80 5.80	1.85	0.65	4.30		7.09	0.025	93.05	2.14 2.10	10.35	2.05	3.95	3.25	2.30

第 二 表

		甲 狀 腺	肝 臟	腎 臟	脾 臟	副 腎	膈下垂體	生殖腺	筋 肉	腸	肺 臟	血 液
對 照		84.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沃 度 加 里	甲 狀 腺	124.36	2.54	2.88	3.06	15.90	111.287	3.18	+	1.04	2.83	2.07
沃 度 加 里	甲 狀 腺	95.03	1.53	1.96	±	5.67	—	1.23	+	+	—	1.81
甲 狀 腺(沃 度 加 里	甲 狀 腺		4.72	6.56	6.28	19.11	118.53	6.74	1.99	2.13	6.37	7.51
剝 出(沃 度 加 里、甲 狀 腺			1.86	3.32	2.24	11.47	76.45	1.80	1.27	1.78	3.10	2.84
沃 度 加 里、副 腎 皮 質			4.78	3.72	3.09	5.04	78.80	2.35	+	+	1.95	3.64
沃 度 加 里、アドレナリ ン			2.47	2.75	+	+	+	1.68	+	+	2.27	1.92
沃 度 加 里、インスリ ン			1.83	1.62	3.99	6.75	73.48	13.13	1.22	4.41	3.03	1.78

實驗成績總括

以上得タル所ノ成績ヲ平均シタルモノ第二表ナリ。

即チ實驗成績ヲ總括スルニ、

正常家兎ニ於テハ甲狀腺ヲ除キ他ノ臟器ニハイヅレモ沃度ヲ證明セズ。沃度加里ヲ投與セルモノニ於テハ、イヅレノ臟器ニモ明カナル沃度沈着ヲ認ム。特ニ甲狀腺、腦下垂體、副腎、生殖腺、肝、腎、脾ニ於テ明カナリ。

甲狀腺剔出家兎ニ沃度加里ヲ投與スル時ハ各臟器沃度沈着一層著明ナリ。

正常又ハ甲狀腺剔出家兎ニ沃度加里ト同時ニ甲狀腺末ヲ投與スル時ハ、沃度加里ノミヲ與ヘタルモノニ比シ、各臟器沃度沈着ハ減少ノ傾向ヲ示ス。

副腎皮質ト同時ニ沃度加里ヲ投與セバ、各臟器沃度量ハ一層増加ノ傾向ヲ示シ、アドレナリン注射ト同時ニ沃度加里ヲ投與セバ減少ノ傾向アリ。インスリン注射ト同時ニ沃度加里ヲ投與セバ多クノ臟器ニ於テ沃度量増加ノ傾向アリ。

第四章 考 按

一、生體各臟器イヅレモ沃度ヲ含有スルモノナルヤ否ヤニ關シテハ未ダ學者ノ意見一致セザル所ナリ。

甲狀腺ニ比較的多量ニ沃度ヲ含有スル事ハ⁽¹⁾ Baumann, ⁽¹⁹⁾ Baumann Ross, ⁽²⁰⁾ Oswald 以來多數學者ノ等シク承認スル所ナルモ、腦下垂體ニ沃度ヲ含有スルヤニ就テハ⁽²¹⁾ Baumann, ⁽²²⁾ Denis, ⁽²³⁾ Seaman, ⁽²⁴⁾ Halliburton ハ之ヲ否定シ⁽²⁵⁾ Wells 山瀬等ハ微量ナレドモ之ヲ證明シウトナセリ。胸腺、脾、生殖腺、副腎等ニハ時ニ沃度ヲ證明シウトナセルモ

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……(齋藤)

一般ニ未ダ認めラレス。⁽²⁶⁾ Justus ハ生體各臓器ハイヅレモ沃度反應アリトナシ、Maurer u. Ducrue, Fellenberg ハ動物體內ニハ一樣ニ沃度ヲ含有スルモノニシテ甲状腺ハ比較的多量ヲ含有スルニスギズト思考セリ。⁽²⁶⁾ Justus, Maurer u. Ducrue, Palasoff, Veil 等ハ人體屍ニ就テ檢索シ各臓器イヅレモ沃度ヲ含有シ甲状腺最モ多ク、脾、肝、卵巢等之ニ次グト報告セリ。然レドモ⁽¹⁴⁾ 藤澤、⁽¹⁵⁾ 山瀬ノ檢査ニヨレバ動物體內ニハ甲状腺、腦下垂體ヲ除キ他ニハ沃度ヲ證明セズ。余ノ成績ニ於テモ甲状腺ニノミ比較的多量ノ沃度ヲ證明シタレドモ他ハスベテ陰性ニ終リキ、恐ラクハ他臓器ニ沃度ヲ含有スルトスルモ測定シ難キ程微量ナルモノナルベシ。

二、動物ニ沃度劑ヲ投與セバ大半ハ尿中ニ排泄セラル、事ハ⁽⁵⁾ Fellenberg, ⁽⁴⁾ Maurer, ⁽⁷⁾ Veil 空地、⁽³⁾ 鈴木等ノ詳細ナル研究ニヨリ明カナル所ナルモ、排泄セラレザル殘餘ノ沃度ハ他ノ方法ニヨリ排泄セラル、カ或ハ體內ニ貯溜セザルベカラズ。體內ニ貯溜スルモノトセバ體內ニ如何ナル分布ヲナスカニ就キ體內各部ノ沃度ヲ檢査シタル文献又少ナカラズ。動物ニ沃度劑ヲ投與スル時ハ甲状腺ニ多量ノ沃度沈着スル事ハ曩ニ余モ亦實驗セル所ナルガ生體各部ニ於ケル沃度沈着ノ度ヲ系統的ニ檢索セルハ⁽⁶⁾ Loeb ⁽¹¹⁾ヲ初メトシ⁽⁵⁾ Fellenberg, ⁽¹³⁾ Takemura, ⁽¹²⁾ Maurer u. Ducrue ⁽¹³⁾ 山瀬、⁽¹⁴⁾ 藤澤等ノ業績アリ。之等ノ文献ニヨレバ甲状腺ニ次イデ血液、皮膚、腎、肺等ニ著シク沃度ヲ認メタルハイヅレモ一致スル所ナリ。Loeb ニヨレバ體內沃度分布ハ沃度投與方法、量ニヨリ大ナル影響ナク各部一樣ニ分布スルモノニシテ特種臓器ニ貯溜セラル、事ナシト。然レドモ體內沃度ハ時日ノ經過ト共ニ漸次排泄セラル、所ナルハ⁽¹⁰⁾ Loeb, ⁽¹¹⁾ Fellenberg, ⁽¹²⁾ Maurer u. Ducrue ⁽¹⁴⁾ 藤澤ノ認ムル所ナリ。⁽¹¹⁾ Fellenberg ニヨレバ注入セラレタル沃度ハ甲状腺ニノミ主トシテ沈着スルモノニアラスシテ肝、脾、卵巢ニモ一樣ニ沈着スルモノニシテ肺ニ常ニ多量ノ沃度ヲ證明スルハ肺ガ沃度排泄ノ一作用ヲ營

ムモノナラントセリ。

余ノ成績ニヨレバ甲狀腺最モヨク沃度沈着ヲ示シ、腦下垂體、副腎之ニ次ギ血液、肝、腎、肺、生殖腺之ニ次グ。コノ成績ハ大體ニ於テ前實驗者ノ結果ト一致スルモノナリ。

三、甲狀腺ガ沃度新陳代謝ニ重要ナル役目ヲ演ズル事ハ空地⁽³⁾ノ研究ニヨリ明カナル所ニシテ、甲狀腺機能亢進症患者或ハ甲狀腺末飼養動物ハ沃度ノ尿中排泄正常ニ比シ非常ニ促進シ、甲狀腺機能低下症ニ於テハソノ遲延ヲ見タリ。岡野⁽⁸⁾ハ沃度加里ヲ注射シテ尿中沃度ヲ定性的ニ検査シタルニ甲狀腺剔出動物ニ於テハ陰性ヲ呈スルニ甲狀腺末飼養動物ニ於テハ沃度反應陽性ナルヲ認メタリ。鈴木⁽⁹⁾ハ甲狀腺剔出家兔ノ沃度尿中排泄ハ減少スルヲ實驗セリ。Fellenberg⁽¹¹⁾ハ二十四時間内ニ於ケル尿中沃度排泄量ハ殆ド一定ス、然レドモ甲狀腺末ヲ以テ飼養セシメタルモノニ於テハ沃度吸收機能低下シ沃度排泄ハ速カニ行ハルトセリ。

以上ノ文獻ヲ綜合シテ考フルニ甲狀腺機能亢進アル時ハ新陳代謝同様沃度代謝ヲ亢進シテ沃度ハ早く尿中ニ排泄セラレ、甲狀腺機能障礙アル時ハ反對ノ結果ヲ招來スルガ如シ。余ノ實驗成績ヲ見ルニ甲狀腺剔出家兔ニ於テハイヅレノ臟器ニ於テモ著明ニ沃度沈着ヲ認メウベシ。之恐ラク前述ノ如ク甲狀腺剔出ニヨリ沃度代謝ハ低下シ尿中沃度排泄量少キヲ以テ體內貯溜スル事多キガタメナルベシ。

又甲狀腺剔出家兔ニ沃度加里ト同時ニ甲狀腺末ヲ投與セルモノヲミルニ各臟器沃度量ハ對照ニ比スル時ハ増加ストイヘドモ前者即チ沃度加里ノミヲ與ヘタルモノニ比スル時ハ減少ヲ示セリ。之恐ラク甲狀腺剔出ニヨル甲狀腺機能脫落症狀ハ甲狀腺末投與ニヨリテソノ機能ノ一部ハ償ハレ沃度代謝機能又正常値ニ近ヅカントスルタメナラン。即ソノ

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……(齋藤)

成績ハ正常家兎ニ沃度加里ヲ與ヘタルモノ、成績ニ近カラントスル結果ヲ得タリ。正常動物ニ沃度加里ト同時ニ甲状腺末ヲ與ヘタル時ハ沃度加里ノミヲ與ヘタルモノニ比シ各臟器沃度量ハ減少ノ傾向ヲ示ス。之空地ノイヘルガ如ク甲状腺飼養ニヨリテ動物ハ甲状腺機能亢進状態ニアルヲ以テ沃度代謝ハ促進セラレ沃度ハ多量ニ體外ニ排泄セラル、ヲ以テ體内ニ沈着スル事少キニヨルモノナルベシ。即チ正常、甲状腺剔出イヅレノ動物ニ於テモ沃度劑ト共ニ甲状腺末ヲ投與スル時ハ沃度加里ノミヲ投與セルモノニ比シ體内沃度量ノ減少ヲ示ス事實、及ビ甲状腺剔出家兎ニ體内沃度沈着ノ度著シキ事、コノ二事實ヲ考察スル時ハ先ニ空地ノイヘルガ如ク、甲状腺ガ沃度代謝ヲ支配シ體内沃度沈着ハ甲状腺機能如何ニヨリ重要ナル關係ヲ有スル事ヲ示スモノニシテ興味アル事實トイフベシ。⁽¹²⁾ Maurer u. Ducue ハ羊ニ於テ實驗シ甲状腺部分或ハ全剔出ナスモ沃度投與後ノ各臟器沃度量ハ多少増加ノ傾向アリトイヘドモ、血液沃度量ハ變化ヲ來サズ、Maurer ハ恐ラク臟器及ビ血液沃度量ハ甲状腺機能ニ關係ナシト論ゼリ。⁽⁷⁾ Veil ハ甲状腺剔出犬ノ臟器沃度含有量ハ對照ニ比シ減少セリトナシ余ノ成績ト一致セザル所ナルモ、石川ハバセド⁽²⁸⁾氏病屍ニ於テ各臟器沃度含量ハ正常ニ比シ比較的減少ヲ來ストセリ、コハ余ノ動物實驗ヲ裏書スルモノトイフベシ。

四、副腎ニハ皮質及ビ髓質ノ兩相反スル作用ヲ有スル二物質ヲ有シ髓質主要ホルモンハ所謂アドレナリンニシテ皮質ホルモンハ髓質ト拮抗作用ヲ有スルト同時ニ甲状腺トモ拮抗作用ヲ有スル事ハ曩ニ辻教授ノ唱ヘラレシ所ナリ。副腎ガ甲状腺機能ヲ抑制シ又甲状腺沃度含有量ヲ増加セシメル事ハ西村⁽³⁰⁾、Rogers⁽³¹⁾ノ實驗ニヨリ明カナル所ニシテ余モ亦之ヲ證明シタリ。空地⁽³⁾ハ副腎ノ沃度代謝ニ及ボス影響ニ關シ詳細ナル實驗ヲナシ正常動物ノ尿中沃度排泄量ハ副腎飼食ニヨリテ減少シ甲状腺機能亢進患者或ハ動物ニ於テモ増加セル沃度排泄ヲ副腎ニヨリ抑制セシメエタリ。即副腎

ハ甲狀腺機能ノ抑制ニヨリ一般新陳代謝ト共ニ沃度代謝ノ亢進ヲ抑制スルノミナラズ、健康甲狀腺ノ沃度代謝ヲモ緩慢ナラシムルモノナリト結論セリ。

余ノ成績ヲ見ルニ副腎皮質ヲ投與セルモノハ沃度加里ノミヲ投與セルモノニ比シ各臟器共沃度含量増加ノ傾向ヲ示セリ。之恐ラク副腎皮質ガ沃度代謝ヲ緩慢ナラシメタル結果沃度體外排泄ヲ抑制シ沃度ノ組織内沈着ヲ見タルモノナルベシ。空地ハ副腎ニヨリ尿中沃度排泄量ノ減少ヲ來スハ副腎ガ甲狀腺機能ヲ抑制スルタメニ甲狀腺ハ膠様物質ヲ貯溜スル事旺盛ナルヲ以テ沃度ハ主トシテ甲狀腺ニ沈着スルモノナラントセリ。然レドモ余ノ成績ヨリ考察スレバ甲狀腺ニ多量ノ沃度ヲ證明ストイヘドモ甲狀腺ニノミ特ニ沃度沈着ヲ來スモノニアラズシテ各臟器一樣ニ分布沈着スルモノ、如シ。副腎皮質ガ沃度代謝ヲ抑制スル作用機轉ニ關シテハ甲狀腺機能抑制セラレテ即チ甲狀腺機能低下狀態ト同一ナル理論ニヨリテ沃度代謝ヲ緩慢ナラシメタルモノカ、又副腎皮質ガ直接沃度代謝ヲ低下セシメタルモノナルカニ關シテハ、余ノ實驗ノミヲ以テハ確言ヲ憚ルトイヘドモ既ニ前記諸實驗成績ノ示ス如ク副腎皮質ハ甲狀腺ニ沃度ヲ沈着セシメ、其機能ヲ低下（膠様甲狀腺腫）セシムル作用アルガ故ニ、寧ロ前說ニヨルモノトスルヲ妥當トス。

五、アドレナリンガ一般新陳代謝ヲ亢進セシムル事、甲狀腺ト共同作用ヲ有シ、インスリン或ハ副腎皮質ト拮抗作用ヲ有スル事ハ幾多文献ノ證スル所ニシテ、⁽³⁶⁾井倉ハアドレナリン連續注射ニヨリテ甲狀腺機能ハ亢進セシムルモノナリトセリ。然レドモ沃度新陳代謝ニ及ボス影響ニ關シテハ殆ド文献ヲ見ズ。⁽³⁵⁾只 Veil und Sturm ハ植物神經系ト血液沃度ノ消長ニ關シ實驗シ、健康人ニ於テアドレナリンヲ注射スル時ハ血液沃度ハ甲狀腺投與ノ場合ノ如ク上昇ヲ來ス。之恐ラク交感神經亢奮ノ結果甲狀腺ホルモンノモビリジローレンシタルモノナラントセリ。⁽³⁴⁾石川モ人ニ於テアドレ

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……（齋藤）

ナリンヲ注射シタルニ血液沃度ハ一時間後ニハ最高値ニ達シ、三時間後ニハ注射前ノ狀態ニ復歸セントスルヲ見タリ。

余ノ成績ヲ見ルニ臟器沃度含有量ハ對照ニ比シ減少ノ傾向ヲ示セリ。之恐ラクアドレナリンガ甲狀腺同様一般新陳代謝ヲ亢進セシムルト同時ニ沃度代謝ヲモ亢進セシメタル結果ニシテ、沃度代謝ニ對シテモアドレナリンガ甲狀腺ト促進的ニ作用シ副腎皮質ト相抑制的ニ作用スル事ヲ示スモノナリ。然レドモ其ノ度甲狀腺ニ比スレバ及バザル事遠シ。

六、インスリンガバセドー氏病ノ亢進セル窒素及ビ基礎新陳代謝ヲ抑制スル事ハ⁽³³⁾溝上、⁽³⁷⁾原ノ研究ニヨリテ明カナリ。又インスリンガ甲狀腺機能ヲ抑制スル事ハ⁽¹⁸⁾井倉及余ノ實驗ニヨリ明カナル所ナルガ、沃度代謝ニ如何ナル影響ヲ來スカニ關シテハ未ダ確實ナル報告ニ接セズ。

⁽³⁵⁾Veil und Sturm ⁽³⁴⁾ハインスリンハ甲狀腺ト拮抗作用ヲ營ミ、⁽²⁸⁾ピロカルピン、⁽²⁸⁾ヒヨリント同様ニ血液沃度ヲ下降セシムト論ゼリ。石川⁽³⁴⁾モ犬ニ於テインゼリンニヨリ血液沃度ノ下降ヲ認メタリ。石川⁽²⁸⁾ハ亦人體ニ於テ研索シ、健康者ニ於テハインゼリン注射ハ尿中沃度排泄量ニ殆ド變化ヲ及ボサバルモ、バセドー氏病ニ於テハ不變ノモノ及ビ減少セルモノナリト報告セリ。

余ノ成績ヲ見ルニ臟器沃度含有量ハ血液、肝、腎ニ於テハ對照ニ比シ減少ヲ示ストイヘドモ、肺、筋、副腎、甲狀腺等ニ於テハ却ツテ増加ヲ示セリ。特ニ甲狀腺ニ於テ沃度量ノ増加著明ナルハ余モ亦先ニ實驗セル所ナリ。余ノ成績ニ於テハ一定ノ結果ヲ得タリトイフ能ハザルモ一般ニ沃度量増加ヲ來セル臟器ヨリ多キ事實カラ考察スルニ、インスリンハ沃度代謝ヲ抑制下降セシメテ、副腎皮質同様ニ甲狀腺機能ヲ抑制スルト同時ニ沃度排泄ヲモ抑制シ、體內ニ沃度沈着ヲ招來セシメル傾向ヲ有スルモノトイフヲ得ベシ。

以上全實驗成績ヲ總括シテ考按スルニ左ノ如シ。

生體內ニ於ケル沃度新陳代謝ヲ臟器沃度含有量ノ變化ヨリ觀察スルニ、甲狀腺ハ沃度代謝ニ密接ナル關係ヲ有スルモノニシテ、ソノ機能亢進ハ沃度代謝ヲ促進シ、ソノ機能障礙ハ之ヲ下降セシムルモノ、如シ。

又副腎皮質ハ沃度代謝ヲ緩慢ナラシメ、インスリン之ニ次ギ、アドレナリンハ之ヲ促進セシムルモノ、如シ。即チ沃度代謝機能ニ於テモ甲狀腺、アドレナリンハ共同的ニ副腎皮質、インスリンハ甲狀腺或ハアドレナリント拮抗作用ヲ有スル事ヲ認メ得ベシ。

然レドモ副腎皮質、アドレナリン、インスリンノ沃度代謝ニ對スル作用ハ直接的ナルカ甲狀腺機能ヲ介シテ即チ二次的ナルカハ不明ナリ。

第五章 結 論

余ハ體內諸臟器（甲狀腺、肝臟、腎臟、脾臟、副腎、腦下垂體、生殖腺、筋肉、腸、肺臟、血液）ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響ヲ檢シ次ノ如キ結論ニ到達セリ。

- 一、家兎ニ於テ甲狀腺以外ノ他臟器ニハ沃度ヲ證明シ得ズ。
- 二、沃度加里投與ハ各臟器ニ沃度ノ沈着ヲ觀ルモ甲狀腺ニ於テ最も著明ナリ。
- 三、甲狀腺剝出家兎ニ沃度加里ヲ投與スル時ハ各臟器沃度沈着ノ度一層著明ナリ。

諸種臟器ノ沃度含有量ニ及ボス内分泌腺ノ影響……（齋藤）

四、正常及甲状腺剔出家兎ニ沃度加里ト同時ニ甲状腺末ヲ與フル時ハ沃度加里ノミヲ與ヘタルモノニ比シ各臓器沃度含有量ハ減少ヲ示ス。

五、副腎皮質投與ハ各臓器沃度含有量ヲ増加セシム。

六、アドレナリン注射ハ各臓器沃度含有量ヲ減少セシム。

七、インスリン注射ハ臓器ニヨリ差違アリトイヘドモ一般ニ沃度含有量ヲ増加セシムル傾向ヲ有ス。

拙筆スルニ當リ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜リタル恩師辻教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表スルモノナリ。(昭和三年十二月下旬稿)

文 献

- 1) Baumann; Zeits. f. Physiol. Chemie, Bd. 21, 1896.
- 2) Kocher; Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chir. 14, S. 359, 1905.
- 3) 空地純一; 辻内科甲状腺論文集 第1巻.
- 4) Maurer; München. Med. Wochens. Nr. 51, S. 2201, 1927.
- 5) Th. v. Fellenberg; Kl. Wochens. 5Jg. Nr. 30, S. 1392, 1926.
- 6) Th. v. Fellenberg; Biochem. Zeits. Bd. 174, S. 341, 1926.
- 7) W. H. Veil; München. Med. Wochens. Nr. 6, S. 268, 1928.
- 8) 岡野権吉; 辻内科甲状腺論文集 第1巻.
- 9) 鈴木徳郎; 未發表.
- 10) Oswald Loeb; Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 56, S. 320, 1907.
- 11) Th. v. Fellenberg; Biochem. Zeits. Bd. 174, S. 354, 1926.
- 12) E. Maurer u. H. Ducreux; Biochem. Zeits. Bd. 193, S. 356, 360, 364, 1928.
- 13) M. Takemura; Zeits. f. Physiol. Chemie Bd. 72, S. 78, 1911.
- 14) 藤澤幹二; 東京醫學會雜誌 第31巻, 483, 1023頁, 大正6年.
- 15) 山瀬鑑; 慶應醫學 第5巻, 605頁, 大正14年.
- 16) Baumann-Anten; Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 48, S. 331, 1902.
- 17) 田中賢三, 齋藤隆; 日本内分泌學會雜誌 第3巻, 3號, 569頁, 昭和2年.
- 18) 齋藤隆; 日本内分泌學會雜誌 第4巻, 5號, 958頁, 昭和3年.
- 19) Baumann u. E. Röss; Zeits. f. Physiol. Chemie Bd. 21, 1896.
- 20) Oswald; Zeits. f. Physiol. Chemie Bd. 23, S. 265, 1897.
- 21) E. Baumann; München. med. Wochens. 43Jg. S. 309, 1896.
- 22) W. Denis;

- Journ. of biol. Chemie Vol. 9, S. 363, 1911. 23) Emilly C. Seaman; Journ. of biol. Chem. Vol. 43, S. 1, 1920.
- 24) Schnitzler; Wien. Kl. Wochens. 9, S. 657, 1896. 25) H. Gideon Wells; Journ. of biol. Chem. Vol. 7, S. 259, 1909-10. 26) J. Justus; Virchow's Archiv f. Path. u. Physiol. Bd. 170, S. 501, 1902, u. Bd. 176, S. 1, 1904.
- 27) E. Maurer, H. Ducreux, u. W. Palasoff; München. med. Wochens. S. 271, 1927. 28) 石川九; 日本内科学會雜誌 第16卷, 8號, 773頁, 昭和3年. 29) 辻寛治; 日本内分秘學會雜誌 第4卷, 3號, 381頁, 昭和3年. 30) 西村俊一; 日本内分秘學會雜誌 第4卷, 1號, 74頁, 昭和3年. 31) E. M. Black, Marjorie Hupper & John Rogers; Americ. Journ. of Physiol. Vol. 59, p. 222, 1922. 32) 井會談; 日本内分秘學會雜誌 第3卷, 3號, 611頁, 昭和2年. 33) 井會談; 日本内分秘學會雜誌 第3卷, 5號, 1271頁, 昭和2年. 34) 石川九; 日本内科学會雜誌 第15卷, 4號, 330頁, 及第15卷, 8號, 553頁, 昭和2年. 35) W. H. Veil u. Alexander Sturm; Deutsch. Archiv f. Kl. Medizin, Bd. 147, S. 106, 1925. 36) 井會談, 日本内分秘學會雜誌 第3卷, 4號, 929頁, 昭和2年. 37) 溝上三保; 日本内分秘學會雜誌 第3卷, 3號, 409頁, 昭和2年. 38) 原順造; 日本内分秘學會雜誌 第4卷, 3號, 433頁, 昭和3年.

dagegen in Nebenniere und Pankreas, während der Sauerstoffverbrauch der Milz keine Veränderung zeigt.

2. Der Sauerstoffverbrauch der weiblichen kastrierten Tiere vermehrt sich deutlich in der Schilddrüse, weniger in der Nebenniere. In Pankreas und Milz bleibt die Atmung unverändert.

3. In der Leber der kastrierten Tiere beiderlei Geschlechts bleibt der Sauerstoffverbrauch fast unverändert, während sich die Kohlensäureproduktion vermehrt.

Ueber den Einfluss der innersekretorischen Drüsen auf die Jodverteilung in den tierischen Organen.

Von

Dr. T. Saito.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto,
Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verf. bestimmte den Jodgehalt nach der Baumann-Antonschen Methode in einzelnen Organen von Kaninchen (Schilddrüse, Hypophyse, Nebenniere, Sexualdrüse, Leber, Milz, Niere, Lunge, Darm, Muskel, Blut) nach Verabreichung von Jodkali, nach Einverleibung verschiedener innersekretorischer Drüsensubstanzen oder nach der Schilddrüsenexstirpation.

Die Resultate sind die folgenden:

1. In den meisten Organen ausser der Schilddrüse war kein Jod nachzuweisen.

2. Nach Jodkaliaufnahme (täglich 0.05 g eine Woche lang) fand sich Jodanhäufung nicht nur in der Schilddrüse, sondern auch in allen anderen Organen, jedoch in grösster Menge in der Schilddrüse.

3. Die Organe zeigten nach Jodverabreichung höheren Jod-

gehalt bei den schilddrüsenlosen Tieren als bei normalen.

4. Die Jodretention der mit Jodkali und Schilddrüsen-substanzen (täglich 0.05 g eine Woche lang) gefütterten Tiere war geringer als bei den nur mit Jodkali gefütterten, bei normalen oder der Schilddrüse beraubten Tieren.

5. Die Jodretention nach Jodaufnahme zeigte Zunahme durch Fütterung mit Nebennierenrindensubstanzen (tägl. 0.3 g eine Woche lang).

6. Die Jodretention verminderte sich durch Adrenalininjektion (tägl. 0.1 ccm eine Woche lang).

7. Bei Insulininjektion (täglich 0.3 kl. E. H. per Kilogramm K. G. eine Woche lang) zeigte sich Neigung zur Vermehrung der Jodverteilung in den meisten Organen. (Autoreferat)

Ueber die Beziehungen zwischen innerer Sekretion, einigen Pharmaka und Serumanaphylaxie.

II. Mitteilung : Ueber die Beziehungen zwischen einigen Pharmaka und der Serumanaphylaxie.

Von

Dr. H. Mayeda.

(Aus der I. med. Klinik. d. Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan. Direktor : Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser untersuchte an Meerschweinchen die Einwirkungen einiger Elektrolyte und Gifte auf den Anaphylaxieschock.

Die Resultate sind die folgenden :

(1) Die intravenöse Injektion von 3 % iger Chlorcalciumlösung (0.5 ccm pro 100 g K. G.) ca. 30 Minuten vor der Reinjektion wirkt schützend gegen den anaphylaktischen Schock,