青酸加里反復注射が臓器乳酸量並ニ筋肉ラク トアチドゲーン量ニ及ボス影響ニ就テ、特ニ 之レニ及ボスインスリン作用ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 田 中 賢 三 述

目 次

第一章 緒 言	第三節 筋肉ラクトアチドゲーン 量ニ就テ
第二章 實驗材料及ビ方法	第四章 總括及ビ考按
第三章 實驗成績	第五章 結 論
第一節 血中乳酸量ニ就テ	主要文獻
第二節 肝臓及ビ筋肉乳酸量ニ就 テ	

第一章 緒 言

青酸ハ一般酵素毒ニシテ血液ヘヘモグロビント結合シ又細胞組織ノ機能ヲ侵害シ、爲ニ酸素攝取能力ヲ強ク障碍スルモノナルハ Schoenbein, Geppert, Zillesen, Noorden, Warburg, Knoop, Tatum a. Alkinson, 矢野及ビ桐田等ノ

青酸加里反復注射が臓器乳酸量並筋肉ラクトアチドゲーン量ニ及ボス影響ニ就テ：(田中) 九一一

業績ニ觀ルモ明カナル所ナリ。故ニ青酸ニ由リテ生體組織ガ一種ノ酸素缺乏状態ニ置カル、モノナルハ之レ亦諸家ノ一致シテ認ムルモノナリ。

抑々酸素缺乏ガ臓器乳酸並ニラクトアチドゲイント密接ナル關係ニアルコトハ余ノ屢々詳述セル所ニシテ當教室織田ハ青酸加里反復注射家兔ノ過血糖及ビ血液乳酸量増加ヲインスリンヲ以テ抑制シ得ト説ク。於茲余ハ青酸加里注射ニヨル臓器乳酸量並ニ筋肉ラクトアチドゲイン量ノ消長ヲ檢シ更ニ之ニ及ボスインスリン作用ノ如何ヲ窺ハントシ恩師辻教授指導ノ下ニ本問題ノ解決ヲ企テタリ。蓋シカ、ル研ニ至リテハ未ダ全ク文献ヲ缺クヲ以テナリ。

第二章 實驗材料及ビ方法

供試動物 二疋内外ノ成熟家兔ニシテ一定量ノ豆腐粕ヲ以テ十日間以上飼養シ食慾可良、元氣旺盛ニシテ體重ノ増減少ナキモノヲ使用シ、殊ニ雌性家兔ニ於テ妊娠セルモノハ之レヲ除外セリ。

青酸加里ハメルク製九八一〇〇%ノモノヲ減菌蒸溜水ヲ以テ一%溶液トナシ一日量毎疋〇・五乃至〇・六疋(青酸加里五乃至六疋)ヲ家兔腹側部皮下ニ午前九時午後六時ノ二回ニ分チ三日間連續注射ヲ行フ。

インスリン「トロント」ハ生理的食鹽水ヲ以テ三倍ニ稀釋シ一日量毎疋〇・二疋即チ三分ノ二單位ヲ青酸加里注射ト同時ニ二回ニ分チ家兔腹側部皮下ニ三日間連續注射ヲ行フ。

材料 採血ハ前篇ニ述ベシ所ニ從ヒ細心ナル注意ノ下ニ注射開始十日前ニ耳朶靜脈ヨリ採血シ、ソノ一定量ニ就キ乳酸定量ヲ行ヒ之レヲ前試驗トナス。次デ注射終了翌日早朝(對照ニテハコノ時期ニ)前試驗同様耳朶靜脈ヨリ採血

ソノ一定量ヲ取り、次ニ手術臺上ニ縛シ頸動脈ヲ露出、採血、脱纖維ヲナシ、何レモ乳酸定量ニ用フ。筋肉ハ常ニ一定ノ右上腿白色筋ヲトリ乳酸並ニラクトアチドゲーン量測定ニ用フ。肝臓ハ左葉ノ一片ヲトリ乳酸定量ヲ行ヒタリ。

乳酸定量法 *Embsden-Hirsch-kaufmann* 氏改良法ヲ使用ス。之レガ操作ニ關シテハ當教室劉、寺田並ニ余ノ度々記述セル所ナリ。

ラクトアチドゲーン定量法 *Embsden* 寺田氏法ヲ使用ス。ラクトアチドゲーンハ之レニアルカリ(二%重曹水)ヲ加ヘ一時間四十五度ニ温ムル時ニハ、完全ニ乳酸及ビ磷酸ニ分解スルモノナルヲ以テ(*Embsden, Schmitz u. Meincke*)供試筋肉ヲ氷上ニ細挫シ(*Kondo*) A 所置、B 所置ノ二群ニ分ツ。A 所置ハ其儘 *Schenck* 氏法ニヨリテ一晝夜氷室内ニテ溶解性磷酸結合物質ヲ溶出セシメ、B 所置ハ二%ノ重曹液中ニテ二時間四十五度ニ加温シ後 A 所置ト同方法ヲ以テ全溶解性磷酸結合物質ノ溶出ヲ行ヒ、兩液ノ磷酸含有量ヲ測定シテ A、B 兩筋ノ溶解性磷酸含有量ヲ知り、B 筋磷酸含有量ヨリ A 筋磷酸含有量ヲ除去シタル殘餘ノ磷酸量ヲ以テラクトアチドゲーン磷酸ト命名シ以テ標準トナス、(*Wechselmann*)。詳細ナル所置ニツキテハ寺田氏論文參照。磷酸定量法ハ寺田氏磷酸微量定量法ヲ使用ス。(寺田氏論文參照)

第三章 實驗成績

第一節 血中乳酸量ニ就テ

第一表ニ示ス如ク對照例ニ於テハ耳朶靜脈血中乳酸量ハ七日乃至十日ノ間隔ヲ置キ採血ヲ行フモ著變ヲ來サザルモ

青酸加里反復注射ガ臟器乳酸量並筋肉ラクトアチドゲーン量ニ及ボス影響ニ就テ：(田中) 九一三

第二表 青酸加里液注射ノ場合

番 號	性	體 重(疋)		乳 酸 含 有 量(疋%)	
一	♂	前 試 驗	後 試 驗	耳 朵 靜 脈 血	頸 動 脈 血
一	♂	一九五〇	一九八〇	一一・五二	六九・三〇
二	♂	二・一五〇	二・二〇〇	一五・三六	八七・三〇
三	♀	二・二七〇	二・二五〇	一二・四八	七八・三〇
四	♀	二・〇〇〇	一九五〇	一〇・二〇	八六・二四
五	♀	一・八六〇	一九〇〇	八・一〇	七三・九二
六	♀	一・九〇〇	二・〇〇〇	一〇・五六	七三・九二
平均		二・〇二〇	二・〇四〇	一三・四四	七一・〇四
前 試 驗		二・〇二〇	二・〇四〇	一一・八五	七七・一八
後 試 驗		一九五〇	一九八〇	一三・四四	六九・三〇

第一表 對 照

番 號	性	體 重(疋)		乳 酸 含 有 量(疋%)	
一	♀	前 試 驗	後 試 驗	耳 朵 靜 脈 血	頸 動 脈 血
一	♀	二・二五〇	二・二〇〇	九・九〇	五〇・一八
二	♀	二・一〇〇	二・一五〇	一二・四八	五六・六四
三	♀	二・一五〇	二・〇九〇	一〇・五六	八二・五六
四		二・五五〇	二・五五〇	一〇・五六	八七・三六
平均		二・二六二	二・二四七	一〇・八七	六九・一九
前 試 驗		二・二六二	二・二四七	一〇・八七	六九・一九
後 試 驗		二・五五〇	二・五五〇	一〇・五六	八七・三六

ノニシテ其ノ變動範圍ハ僅少ナルモノナリ。平均値ヲ見ルニ前試驗一〇・八七疋(血液百耗中)後試驗一〇・五九疋ナリ。然レドモ頸動脈血中乳酸量ハ各個家兎ニ由リ大イニ異レリ。之レ恐ラク採血時頸動脈ヲ露出スルニアタリ束縛ス

第三表 青酸加里インスリン併用注射ノ場合

番號	性	體重(疋)		乳酸含有量(疋%)	
				耳朶靜脈血	頸動脈血
一	♂	前試驗	二・二〇〇	九・九〇	
		後試驗	二・一〇〇	一〇・五六	七七・七六
二	♀	前試驗	二・一五〇	一二・六〇	
		後試驗	二・一五〇	六・七二	四八・九六
三	♀	前試驗	二・二〇〇	一一・五二	
		後試驗	二・二〇〇	一一・五二	五六・六四
四	♀	前試驗	二・三〇〇	一一・五二	
		後試驗	二・二四〇	八・六四	一二四・八〇
五	♀	前試驗	二・二五〇	一三・四四	
		後試驗	二・一五〇	五・七六	七三・九二
平均		前試驗	二・二二〇	一一・一三	
		後試驗	二・一六八	八・六四	七六・四一

釋セルインスリン一日量毎疋三分ノ二單位ヲ二回ニ分チ三日間腹側部皮下ニ連續注射セル家兎ニ於テハ前試驗一一・

一、第三例ノ如ク對照ノ變動範圍ニ存スルモノアレドモ、他ノ三例ニ於テハ乳酸量下降シ平均値ニ於テハ前試驗一一・一三疋、後試驗八・六四疋ナルヲ見ル。而シテ頸動脈血ニ於テハ一例ニ一二四・八〇疋ナル高位ヲ示セルモノアリシタメ平均値七六・四一疋ヲ來シ對照ヨリ稍上昇セル如キモ、青酸加里ノミ注射ノ際ニ比シ多少下降セルモノ、如シ。

青酸加里反復注射ガ臟器乳酸量並筋肉ラクトアチドゲン量ニ及ボス影響ニ就テ(田中) 九一五

ルコトニ由來セルモノナランモ平均値ニ於テハ 六九・一九疋ヲ示セリ。

第二表ニ示ス如ク一%青酸加里溶液一日量毎疋〇・六乃至〇・五疋ヲ二回ニ分チ腹側部皮下ニ三日間連續注射セル家兎ニ於テハ耳朶靜脈血中乳酸量ハタゞ第六例ノ一例ニ於テ下降ヲ見タレドモ、他ノ五例ニアリテハ顯著ナル上昇ヲ認メ得タリ。而シテ第二、第三例ノ如ク下痢ノ傾向ヲ惹起スルニ至レルモノハソノ上昇ノ度殊ニ著明ナルヲ思ハシム平均値ニ於テ見ルモ前試驗一一・八五疋、後試驗一六・五二疋ヲ示セリ。又頸動脈血中乳酸量ニ於テハ平均七七・一八疋ヲ示シ、之レヲ對照ニ比スルニ稍乳酸量上昇セルカノ觀アリ。

次ニ第三表ニ示ス如ク青酸加里溶液注射ト同時ニ三倍ニ稀

第四表 對 照

番 號	性	體 重 (kg)	肝 臟	筋 肉	ラクトアチドゲイン 量(%)	ラクトアチ ドゲイン量
一	♀	二・二〇〇	九・九・五六	二・一五・七二	〇・三五三七	〇・二七三八
二	♀	二・一五〇	六・九・四八	二・三〇・四一	〇・二九四三	〇・二六二四
三	♀	二・〇九〇	八・三・一四	二・九五・六三	〇・三四二三	〇・二九〇九
四	♂	二・五五〇	九・三・八四	三・〇九・八六	〇・三〇〇〇	〇・三〇六六
五	♂	二・〇〇〇	一・〇三・三八	二・七三・三五	〇・三一五五	〇・三一七六
平均		二・二〇〇	八・九・八八	二・六四・九九	〇・三二一二	〇・二九〇二

第二節 肝臟及ビ筋肉
乳酸量ニ就テ

肝臟乳酸量ハ對照最大一
〇・三・三八 g (臟器百瓦中)
最小六・九・四八 g 、平均八
九・八八 g ナリ。青酸加里
溶液單獨注射ニ於テハ最大

第五表 青酸加里液注射ノ場合

番 號	性	體 重 (kg)	肝 臟	筋 肉	ラクトアチドゲイン 量(%)	ラクトアチ ドゲイン量
一	♂	一・九八〇	七・六・三一	三・七五・〇八	〇・二七五八	〇・二〇八五
二	♂	二・二〇〇	一・〇九・六四	三・四九・四六	〇・二九二三	〇・一八五四
三	♀	二・二五〇	八・九・九〇	三・一四・六七	〇・三二三三	〇・一七九二
四	♀	一・九五〇	八・二・七五	三・五五・六五	〇・四八九四	〇・二一七三
五	♀	一・九〇〇	九・三・一五	三・三〇・九六	〇・三七一九	〇・二一〇六
六	♀	二・〇〇〇	六・三・七三	二・七一・六一	〇・三六二八	〇・二七八七
平均		二・〇四〇	八・五・九一	三・三二・九一	〇・三五二六	〇・二一三三

一・〇九・六四 g 、最小六・三・
七三 g 、平均八・五・九一 g ナ
リ。青酸加里溶液及ビイン
スリン併用注射ニ於テハ最
大九・二・七 g 、最小三・六・
八九 g 、平均七・三・五七 g ナ
リ即チ青酸加里溶液注射ノ
場合ハ對照ニ比シ平均値ヨ

第六表 青酸加里液インスリン併用注射ノ場合

番號	性	體重(尨)	乳酸含有量(尨%)		ラクトアチドゲイン磷酸量(%)		ラクトアチドゲイン量
			肝	臟	筋	肉	
一	♀	二・二〇〇	七五・九〇	二三七・八三	〇・三九五九	〇・七五三三	〇・三五七四
二	♀	二・二五〇	九〇・七四	三一・二二五	〇・四〇四九	〇・六五七一	〇・二五二二
三	♀	二・二〇〇	三六・八九	二八九・〇六	〇・四三八五	〇・七三九七	〇・三〇一二
四	♀	二・二四〇	九九・二七	三一四・一二	〇・三五二一	〇・六五一八	〇・三〇〇三
五	♀	二・二五〇	六五・〇九	二七〇・五二	〇・三二五六	〇・五七七九	〇・二五二一
平均		二・二六八	七三・五七	二八四・七六	〇・三八三四	〇・六七六〇	〇・二九二六

リ見レバ多少減少セル如キ
モ著明ナラズ。青酸加里及
ビインスリン併用ノ際ハ青
酸加里單獨注射ニ比シ稍著
シク乳酸量ノ減少ヲ來ス。
次ニ筋肉乳酸量ニ就テハ
對照最大三〇九・八六尨、最
小二二五・七二尨、平均二

六四・九九尨ナリ。青酸加里溶液單獨注射ニ於テハ最大三七五・〇八尨、最小三七一・六一尨、平均三三二・九一尨ナリ。
青酸加里溶液及ビインスリン併用注射ニ於テハ最大三一四・一二、最小二三七・八三尨、平均二八四・七六尨ナリ。即
チ對照ニ比スルニ青酸加里溶液單獨注射ノ際ニハ筋肉乳酸量著明ニ上昇シ、インスリンヲ併用スレバ青酸加里ニヨル
乳酸量上昇ヲ防止シテ筋肉乳酸量ハ青酸加里單獨注射ノ際ヨリモ下降ヲ示セリ。

第三節 筋肉らくとあちどげん量ニ就テ

筋肉ラクトアチドゲイン量ハ對照ニ於テ最大〇・三二七六%、最小〇・二六二四%、平均〇・二九〇三%ヲ示ス。
青酸加里溶液單獨注射ニ於テハ最大〇・二七八七%、最小〇・一七九二%、平均〇・二二三三%ナリ。

青酸加里反復注射ガ臟器乳酸量並筋肉ラクトアチドゲイン量ニ及ボス影響ニ就テ：(田中) 九一七

青酸加里反復注射が臓器乳酸量並筋肉ラクトアチドゲイン量ニ及ボス影響ニ就テ(田中) 九一八

青酸加里溶液及ビインスリン併用注射ニ於テハ最大〇・三五七四%、最小〇・二五二%、平均〇・二九二六%ナリ。

即チ青酸加里溶液注射ニヨリ筋肉ラクトアチドゲイン量ノ顯著ナル減少ヲ招來シ、インスリン併用ニヨリテ筋肉ラクトアチドゲイン量ハ對照例ノ夫ニ近似シ或ハ夫以上ニ増昇セルヲ認ム。

第四章 總括及ビ考按

青酸中毒ニ關シテ Geppert ハ詳細ナル研究ヲ行ヒ青酸ハ生體臓器酸素消費量ノ減少ト炭酸瓦斯發生ノ減退トヲ招來シ其中毒症狀ハ組織ノ innere Erstickung ナリト結論セリ。即チ青酸中毒ハ一種ノ窒息狀態ニ外ナラザルモ矢野、桐田ノ實驗ニ由レバ兩者ソノ間自ラ相異ナルモノアルガ如シ。然レドモ本中毒ニ於テハ生體組織ガ酸素缺乏狀態ト同一ノ結果ニ置カル、モノナラントハ諸家其見解ヲ同ジクセル所ナリ。

一方生體內乳酸ノ消長ニ就テハ種々ナル要約ノ之レヲ左右スルモノアレドモ、内分泌臓器モ亦重大ナル影響ヲ與フルモノニシテ生體內乳酸量増加ガ主トシテ生體組織ノ酸素缺乏狀態ニ由來スルモノナランハ余ノ先ニ屢々推論セル所ナリ。

又筋肉内含水炭素新陳代謝研究ニ偉大ナル功績ヲ實セル Hill, Meyerhof, Embden 等ノ業績ヲ見ルニ、筋肉内ニ於テ糖原質 $\uparrow$ ラクトアチドゲイン $\downarrow$ 乳酸ナル反應方式ニヨリ乳酸生成ハ非酸化期ニ行ハル、モ、產出セル乳酸ノ一部ハ酸素ヲ得テ再ビラクトアチドゲイン $\downarrow$ 糖原質ニ合成シ得ラル、モノナルヲ示セリ。

而シテ青酸中毒ニ際シ Zillesen, 織田ハ血糖及ビ血液乳酸ノ増加ヲ、矢野、桐田ハ血糖ハ一時下降スレドモ血液乳

酸ノ増量スルヲ報告セリ。余ノ實驗ニ於テハ耳朶靜脈血、頸動脈血ニ乳酸量ノ増加スルヲ認メタリ。コレ耳朶靜脈ニ於テハ織田ノ短期間大量反復注射セシ場合ニ略一致セリ。

肝臟並ニ筋肉乳酸量ニ就テ見ルニ肝臟乳酸量ハ對照ニ比シ殆ンド變化ヲ認メ得ザリシモ之レ肝臟グリコゲンモビリジールング或ハ肝臟オキシダーゼ反應ガ青酸ニ由リテ如何ナル影響ヲ受クルカ尙不明ナル點多キ今日ニ於テハ簡單ニ夫ガ理由ヲ説明シ能ハズ。

次ニ筋肉ニ於テ顯著ナル乳酸量ノ増加トラクトアチドゲン量ノ減少ヲ認メタルハ恐ラク本中毒組織ハ酸素攝取能力ヲ奪ハレ產出セル乳酸ガ再ビ酸素ヲ得テラクトアチドゲンヲ生成スルニ停頓ヲ來スガ故ニ筋肉内乳酸ノ蓄積ヲ來タシ、從ツテ一方ラクトアチドゲンノ減量ヲ誘致セシナルベシ。

更ニ青酸加里、インスリンヲ併用セシ場合ニ就キ考察スルニ當リ先ヅインスリンガ生體內乳酸、ラクトアチドゲン並ニ無機燐酸ニ如何ナル影響ヲ有スルカニ就キ文献ヲ按ズルニ、C. F. Cori ハインスリン痙攣時ニハ血中乳酸量ノ上昇ヲ認メシモ痙攣ナキ時ハ血中、肝臟、筋肉乳酸量ニ變動ヲ來サズト。C. H. Best a. J. H. Ridout ハ健康者並ニ糖尿病患者ニ於テ特殊ナル條件ノ伴ハザル時ハインスリンニヨリ血中乳酸量ハ影響サレズト言フ、Mendel, Eugel u. Goldscheider 亦之レニ贊ス。

一方 Briggs, Koeching, Doisy a. Weber ハインスリン注射ニヨリ血糖及ビ血中無機燐酸ノ減少ト乳酸ノ増加ヲ認メ、無機燐酸ノ減少ハラクトアチドゲン生成ニ使用セラレシタメナランカト想定シ、Isaac u. Adler 亦インスリンニヨリ血中乳酸ノ上昇スルヲ知レリ。Collazo, Mendel u. Rubino ハ in vitro ニ於テ筋肉乳糜ニインスリンヲ作

用セシメシニラクトアチドゲインノ分解ト乳酸ノ上昇ヲ來シ同時ニ Audova u. Wagner ノ認メシ如ク無機磷酸ノ増加スルヲ報ジ、A. I. Virtanen u. Karstrom ハインスリンニヨリ血中無機磷酸ノ減少ト乳酸ノ上昇ヲ來スト述ベ、Katayama u. Kilian ハインスリンニヨル血糖下降期ニ乳酸量最モ上昇スルヲ證明セリ。即チ此等諸家ハ何レモインスリンニヨリテ血中乳酸量ノ増加スルヲ認ムルモ反之、Collazo u. Supniewski ハインスリン大量ニテハ痙攣ノタメ血中乳酸量増加スレドモ少量ノ場合ニハ減少ストナシ、松岡亦血中乳酸量ノ減少ヲ見、寺田ハインスリン少量ニテハ影響不定ナルモ大量或ハ連續注射ニテハ血中並ニ臓器乳酸量ノ減少ヲ招來ストナス。

カ、ル混沌タル中ニ Kuhn u. Baur ハインスリン注射ニヨリテ先ヅ乳酸ノ上昇ヲ來シ次デ下降スルヲ認メインスリンノ二相作用ニ由ルモノナリト説明セシハソノ間ノ消息ヲ窺フニ興味ノ存スル所ナリ。

Straus, Günther, Fröhlich ハ Coma diabeticum ニ於ケル血中並ニ尿中無機磷酸ノ上昇ハインスリン注射ニヨリ減少スルヲ認メ、之レチインスリン缺乏ノタメ含燐中間代謝物質ノ分解亢進ヲ起スニ由ルナラント説明シ、暗ニインスリンニ由リラクトアチドゲインノ増量ヲ來スヲ肯定セルモノ、如シ。Key a. Robison ハインスリン注射後筋肉ニ於テラクトアチドゲインPハ増加ストナシ、當教室寺田モ先キニ同様ナル成績ヲ得タリ。

以上文献ヲ通覽スレバインスリンハラクトアチドゲイン量ニ對シテ増昇的ニ作用スルハ一般ニ認メラル、所ナルモ乳酸量ニ對シテハ成績區々タリ。之レ勿論生體內乳酸量ノ變動範圍ノ大ナルコトモ一原因ナレドモインスリンノ注射量、回数、注射後ノ時間等ノ相異モ亦看過シ得ズ。然レドモインスリンノ適當量ヲ連續注射ヲ行ヘル場合ニハ血中並ニ臓器乳酸量ノ減少ヲ招來スルハ當教室寺田ノ實驗ノ結果ニヨリテモ明カナル所ナリ。

サテ、余ノ青酸加里インスリン併用試験ノ成績ヲ見ルニ青酸加里單獨注射ノ際ヨリモ耳朶靜脈血、頸動脈血、肝臓及ビ筋肉ニ於テ乳酸量減少シ筋肉ラクトアチドゲイン量ノ増加ヲ認ム。ナホ耳朶靜脈血、並ニ肝臓ニ於テ乳酸量對照ヨリモ減量シ筋肉ラクトアチドゲインモ對照ヨリモ増加セルモノアルヲ知ル。コレ Foss ハ青酸中毒ニインスリン及ビ葡萄糖ヲ使用シ好結果ヲ得タリト報ジ、織田ハ本中毒ニヨル過血糖並ニ血液乳酸増加ヲインスリンヲ以テ全ク抑制シ正常以下ニ減少セシメ得ト言ヘル事實ト對比シ興味深シ。勿論カ、ル事實ノミニテハインスリン作用機轉ノ僅カニ一班ヲ窺フニ過ギザルモ余ノ實驗ニ於テ血中肝臓並ニ筋肉乳酸量ノ減少及ビ筋肉ラクトアチドゲイン量ノ著明ナル増加ヲ認メシハ青酸加里中毒ニ於テモインスリンハ糖乳酸ヨリ酸化機轉ニヨリテラクトアチドゲインノ成生セラル、ニ際シ促進的ニ作用スルモノナルヲ推定シ得ルモノナルベシ。

第五章 結 論

以上ノ實驗ヨリ次ノ結論ヲ得タリ。

一、青酸加里溶液反復注射家兎ニ於テハ耳朶靜脈血、頸動脈血、筋肉乳酸量ノ増加、筋肉ラクトアチドゲイン量ノ減少著明ナリ然レドモ肝臓乳酸量ハ對照ニ比シ大差ナシ。

二、インスリント青酸加里溶液トヲ同時ニ反復注射セル家兎ニ於テハ青酸加里溶液ノミ反復注射セル家兎ニ比スルニ耳朶靜脈血、頸動脈血、肝臓、筋肉乳酸量ハ減少シ、筋肉ラクトアチドゲイン量ノ増加顯著ナリ。

三、即チインスリンハ青酸加里溶液中中毒ノ際ニ於ケル酸化機轉障礙ニ對シテモ好影響ヲ與フルモノナリト思考ス。

圖書ニ就テ醫師生於醫學ノ御業ヲ修メテ御醫術ヲ顯シタルニ就テノ稱號ヲ授ケルモノ(昭和四年六月)

主 要 文 献

- 1) Geppert; Zeitschr. f. Klin. Med. Bd. 15, S. 208, 307, 1889.
- 2) Zillesen; Zeitschr. f. Physiol. Chemie Bd. 15, S. 387, 1891.
- 3) 桐田 矢野; 中外醫事新報 大正15年, 1096頁.
- 4) 井倉; 内分泌學雜誌 第2卷, 第3號, 大正15年.
- 5) 織田; 日本内分泌學雜誌 第5卷, 第2號, 昭和4年.
- 6) 寺田; 内分泌學雜誌 第1卷, 第1, 2號, 大正14年.
- 7) 寺田; 内分泌學雜誌 第2卷, 第2號, 大正15年.
- 8) C. F. Cori; Journ. of biolog. Chemistry Vol. 63, P. 253, 1925.
- 9) C. H. Best a. J. H. Ridout; Journ. of biolog. Chem. Vol. 63, P. 197, 1925.
- 10) Mendel, Engel u. Goldscheider; Kl. Wochenschr. Jg. 4, S. 804, 1925.
- 11) Briggs, Koechig, Doisy a. Weber; Journ. of biolog. Chem. Vol. 58, P. 721, 1925.
- 12) Isaac u. Adler; Klin. Wochenschr. Jg. 3, S. 1208, 1924.
- 13) Collazo Mendel u. Rubino; Deutsch. Med. Wochenschr. Jg. 50, S. 747, 1924.
- 14) A. I. Virtanen u. Karstrom; Zeitschr. f. Phys. Chemie Bd. 161, S. 218, 1926.
- 15) Karayama u. Killian; Journ. of biolog. Chem. Vol. 71, P. 707, 1926—7.
- 16) Collazo u. Supniewski; Bioch. Zeitschr. Bd. 154, S. 423, 1924, Bd. 158, S. 136, 1925.
- 17) 松岡; 日新醫學 第17年, 第5號, 昭和3年.
- 18) Kuhn u. Baur; Zeitschr. f. Physiol. Chem. Bd. 141, S. 68, 1924.
- 19) Straus, Günther u. Fröhlich; Klin. Wochenschr. Jg. 2, S. 2337, 1923.
- 20) Key a. Robison; Journ. of Biochem. Vol. 18, P. 1139, 1924.
- 21) Post; Archiv f. exp. Pathol. u. Pharm. Bd. 128, H. 3/6, S. 150, 1928.
- 22) 田中; 日本内分泌學雜誌 第4卷, 第5號, 第5卷, 第4號, 未發表.

Daraus darf man schliessen, dass Milz und Schilddrüse bezüglich der Blutmilchsäure antagonistisch zueinander wirken.
(Autoreferat)

**Ueber den Einfluss der chronischen Cyankaliver-
giftung auf die Organmilchsäure und das
Lactacidogen des Muskels, insbesondere
über die Beziehung der Cyankaliver-
giftung zur Insulinwirkung.**

Von

Dr. K. Tanaka.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserlichen Universität
zu Kyoto, Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Die Resultate sind die folgenden:

1) Wiederholte subkutane Injektion von 1 % iger Cyankalilösung bewirkt bei Kaninchen Vermehrung des Milchsäuregehaltes im Ohrvenenblute, Karotisblute und den weissen Muskeln des Oberschenkels sowie deutliche Verminderung des Lactacidogengehaltes dieser Muskel. Aber man sieht in bezug auf den Milchsäuregehalt der Leber keine deutliche Veränderung.

2) Bei gleichzeitig wiederholter Injektion von Cyankalilösung und Insulin zeigen Ohrvenenblut, Karotisblut, die Leber und der Muskel deutlichere Verminderung des Milchsäuregehaltes und der Muskel ausserdem beträchtlichere Vermehrung des Lactacidogen als bei wiederholter Injektion der Cyankalilösung allein.

3) Aus den oben beschriebenen Tatsachen darf man schliessen, dass Insulin auch auf die Oxydationsstörung bei der chronischen Cyankalivergiftung einen guten Einfluss ausübt.

(Autoreferat)