乳汁中甲状腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗

甲状腺機能亢進症患者乳汁ノ剔出子宮筋攣縮
作用ニ及ボス影響ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室
大學院學生 醫學士 高 橋 敏 行 述

目 次

第一章 緒 言	能亢進症患者乳汁ノ剔出子
第二章 實驗方法及材料	宮筋攣縮作用ニ及ボス影響
第三章 健康人乳汁ノ剔出子宮攣縮作用ニ及ボス影響	第五章 總括結論
第四章 バセドウ氏病並ニ甲状腺機能	主要文獻

第一章 緒 言

乳汁中甲状腺ホルモンノ排泄ニ關シテハ、之ヲ内外文獻ニ求ムルニ、實ニ、寥々タルモノニシテ、只僅カニ、Spol-
veriniノ報告及浮田吉富ノ業績ヲ見ルノミニシテ、曩ニ余ハ、母體甲状腺機能障礙ト、其ノ乳兒ノ成長發育及内分
泌系統ノ病理組織學的檢索ニ於テ、明ニ、母體甲状腺ホルモンハ、乳汁中ニ排泄セラレ、乳兒ニ移行スルモノナルコ

トヲ、立證セシガ、他方我辻内科教室久保園ハ、臨床的ニ、又實驗的ニ、甲狀腺ホルモンハ恐ラク摘出子宮筋運動ヲ興奮シ、シカモ其ノ興奮ハ、筋肉自己ニ作用スルモノニシテ、神經系ハ關與セズト述ベタリ、今此事實ヲ應用シテ果シテ斯ルホルモンガ乳汁中ニ存在シ得ルヤヲ決定スルハ、余ガナセル前記業績ト相待チテ、實ニ、興味アル點ナレド、未ダ先人ノ説カザル所ニシテ、之レ余ガ恩師辻教授提案ノ下ニ本研究ヲ企テシ所以ニシテ、甲狀腺機能亢進症患者乳汁ノ摘出子宮筋攣縮作用ニ及ボス影響ニ就キ、檢索ナシ、乳汁中甲狀腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗トシテ、興味アル結果ヲ得タレバ、茲ニ、以下章ヲ追ヒ報告セントス。

第二章 實驗方法及材料

摘出子宮ハ、其ノ各部ニ於テ、藥物感受性ニ稍々差違アルコトハ既ニ、Kehrer 長町、岡本、下井、品川等ノ述ブル所ナリ。サレバ余ハ、使用セシホルモツト子宮ハ、充分發育セル健常不妊子宮ニシテ、〇・五—一・〇耗ノ長サニ切斷セルモノヲ、子宮腹膜附着部ニ於テ、更ニ縱斷シ、其各半ヲフューネル氏法ニヨリ、各二五耗ヲ有シ、酸素ヲ以テ、飽和セル攝氏三九度ノロツク氏養液中ニ懸垂シ、其ノ運動ヲ槓桿ヲ介シテ、キモグラフィオン上ニ描出セシメ、一ヲ供試トシ他ヲ對照トシ、感受性ニヨル差違ヲ可及的ニ避ケ、供試乳汁ノ子宮筋攣縮ニ對スル最少興奮量ヲ確定セリ。使用セル乳汁ハ、使用時之ヲ三七度ニ溫メ、搾取後一定ノ時間ニ於テ之ヲ用ヒ、使用ロツク氏液ハ、クロールナトリウム〇・九、葡萄糖〇・一、重碳酸ナトリウム〇・〇二、クロールカルチウム〇・〇二、クロールカリウム〇・〇二、鹽水一〇〇・〇ナリ。

第三章 健常人乳汁ノ擠出子宮筋

攣縮作用ニ及ボス影響

第一例。平○初○、二八歳、健康。

子宮運動整調ナルヲ俟チ、五%乳汁ヲ注加スルニ、何等子宮運動ニ變調ヲ來サズ、八%ニテ、多小緊張ト昇、振幅稍々増大、直チニ舊ニ復ス、一〇%ニ於テ、明ニ緊張上昇シ、振幅増大ス、一〇%以上ニテハ、興奮差違ナシ。アトロピンノ影響ヲ受ケズ(第一圖)。

第二例。高○駒○、二三歳、健康。

七%乳汁注加ニヨリ、多少緊張ヲ高メ、振幅稍々増大シ八%ニテ、明ニ緊張ノ上昇、振幅ノ増大ヲ認ム、アトロピンノ影響ナシ。

第三例。鈴○花○、二四歳、健康。

八%乳汁注加ニヨリ、未ダ充分ニ子宮攣縮作用ニ影響ヲ及ボサズ。九%ニ於テ稍々緊張ノ上昇、振幅ノ増大ヲ來シ、一〇%ニテ緊張著明ニ上昇シ、振幅縮少ス、アトロピン影響ナシ。

第一圖 平○初○ (健康)

↑ 10% 乳汁

第四例。佐○ノ○、二四歳、健康。

第二圖 佐〇ノ〇 (健康)

第八例 塩〇静〇、三〇歳、健康。

八%乳汁注加スレバ、緊張ハ、稍々上昇シ、振幅ハ、増大シ、九%ニ於テ、緊張ノ上昇振幅ノ縮小著明ナリ。アト

乳汁中甲状腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗……(高橋)

一〇六九

六%ニ於テ緊張上昇シ振幅ハ縮小シ、六%以上ニ於テハ其ノ興奮状態常ニ同様ニシテ、興奮時アトロピンヲ注加スルモ、其ノ影響ヲ認メズ。

第五例。松〇花〇、二一歳、健康。

六%ニ於テハ、未ダ、充分ナル子宮興奮作用ニ變化ナク、八%ニ於テ、其ノ緊張ヲ上昇シ、振幅ハ、縮小シ、明ニ、攣縮作用ニ變化ヲ認メ、アトロピンノ影響ヲ受ケズ。(第二圖)

第六例。田〇房〇、二三歳、健康。

八%乳汁ヲ注加スルモ、子宮攣縮作用ハ、同様ニシテ、變化ナク、九%ニ於テ、緊張上昇シ、攣縮著明ニシテ、振幅振小シ、アトロピンノ影響ヲ見出シ得ズ。

第七例。藤〇タ〇、二八歳、健康。

九%ニ於テ、稍々緊張上昇シ、振幅増大スレド、數分ニシテ常態ニ歸ス。

一〇%ニ於テ、緊張上昇シ、振幅著明ニ増大シ、アトロピンノ影響ヲ受ケズ。

ロビンノ影響ナシ。

第九例。小〇數〇、二七歳、健康。

七%ニ於テハ、未ダ充分ナル變化ヲ來サズ。八%ニテ、緊張上昇シ、振幅ハ増大シ、子宮筋攣縮作用ニ、影響ヲ及

第一表 健康人乳汁ノ子宮攣縮作用ニ及ボス影響

番 號	姓 名	年 齡	區 別	作用乳汁%	アトロピ ン作用
第一例	平〇初〇	二八	健康	八%—一〇%	(—)
第二例	高〇駒〇	二三	健康	七%—八%	(—)
第三例	鈴〇花〇	二四	健康	九%—一〇%	(—)
第四例	佐〇ノ〇	二四	健康	六%	(—)
第五例	松〇花〇	二一	健康	八%—九%	(—)
第六例	田〇房〇	二三	健康	九%	(—)
第七例	藤〇タ〇	二八	健康	九%—一〇%	(—)
第八例	樋〇靜〇	三〇	健康	八%—九%	(—)
第九例	小〇數〇	二七	健康	八%	(—)
第十例	武〇小〇子	二四	健康	九%—一一%	(—)

第十例。武〇小〇子、二四歳、健康。

九%ニ於テ稍々振幅ノ増大、緊張ノ上昇ヲ認メ、一%ニ於テ、明ニ、子宮筋ハ興奮シ、緊張上昇シ、振幅縮少シ、アトロピンノ影響ナシ。

以上ノ實驗成績ヲ通ジテ觀ルニ、健康人ノ乳汁ガ摘出子宮筋攣縮作用ニ及ボス影響ハ、六%以下ニ於テハ、一例ノ例外モナク、其ノ影響ヲ認メズ、六%ニ於テハ、只一例(第四例)ニ於テ、其ノ影響ヲ認メ、大多數ニ於テ、七%—九%ノ間ニ於テ、攣縮作用ヲ高メルモノニシテ、神経系トノ影響關係ニ於テハ、比較的多量ノ

硫酸アトロピンヲ、使用セシニモ拘ラズ、全例ヲ通ジテ何等ノ變化ヲ認メズ、即チアトロピンハ乳汁攣縮作用ヲ抑壓シ得ザルヲ以テ、該乳汁作用ハ神経系ニ關與セズ、寧ロ、平滑筋自己ノ興奮ヲ高メルモノニシテ、曩ニ我辻内科教室

久保園ガ健康人血清作用ニ於テ認メシ事實ト、全ク其ノ所見成績ヲ同一ニスルモノナリ。

第四章　ばせどウ氏病並ニ甲状腺機能亢進症患者

乳汁ノ摘出子宮筋攣縮作用ニ及ボス影響

バセドウ氏病及甲状腺機能亢進症患者ニシテ、哺乳セル例ハ、其ノ材料ヲ得ルニ、比較的困難ニシテ、我辻内科ニ入院セシ一例ノ、バセドウ氏病患者及外來ニテ得シ、二例ノバセドウ氏病患者、一例ノ甲状腺機能亢進症患者、合計四例ニ就キ本實驗ヲ行ヒシモノニシテ、以下臨床的所見ト、併セテ、實驗成績ヲ記載スベシ。

第一例。田〇レ〇、二六歳、バセドウ氏病。

主訴　眼球突出。甲状腺肥大、心悸亢進、體重減少。

臨床的所見　眼球突出、甲状腺肥大著明ニシテ、脈搏一二〇グレイフエ・メービウス・ステルワグ氏症狀陽性。

乳汁作用　〇・九％ノ乳汁ヲ子宮運動ヲ待チ、其整調タルニ及ンデ、注加スルニ、子宮運動ハ影響セラレ、緊張興奮シ、振幅小トナル、一％ニ於テハ、明ニ、興奮性ヲ高メ、其ノ振幅ハ縮少シ、アドレナリン、アトロピンノ神経系ヲ介シテノ子宮運動作用ニ影響セラレズ。(第三圖A、B)

第二例。木〇き〇、二六歳、バセドウ氏病。

主訴　眼球突出、甲状腺肥大、心悸亢進、手指震顫。

臨床的所見　眼球突出著明、脈搏一二五、甲状腺肥大著明心尖部ニ於テ輕度ナル收縮期雜音ヲ聴取、グレイフエ・

乳汁中甲状腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗……(高橋)

第三圖 (A) パセドウ氏病患者乳汁 (田○シ○)

↑ 1% パセドウ氏病乳汁

第三圖 (B) パセドウ氏病患者乳汁 (田○シ○)

↑ 0.00002% アドレナリン
↑ 0.0002% アドレナリン + 3% 乳汁

アドレナリン作用ヲ表シ得ル分量ト、本患者乳汁トヲ同時ニ注加スルニアドレナリンノ作用ハ弱メラレ、子宮ハ緊張

乳汁作用 子宮運動ノ
整調ヲ俟チテ、○・八%乳
汁ヲ注加スルニ其ノ運動
ニ及ボス影響ハ未ダ充分
ナラザレド○・九%ニ於
テハ、明ニ、其ノ興奮作
用ヲ高メ、著シク攣縮作
用ヲ起シ、緊張ハ、高マ
リ、振幅ハ、縮少ス。又
一方モルモット子宮運動
作用ニ及ボスアドレナリ
ンノ影響ハ○・○○○○
五%ニテ最モ著明ニ其ノ
抑制作用ヲ觀、コノ充分

第四圖 (A) バセドウ氏病患者乳汁 (木〇き〇)

第四圖 (B) バセドウ氏病患者乳汁 (木〇き〇)

ヲ高メ、緊張状態ヲ漸時持續シ其ノ時間ノ延長ヲ來ス。(第四圖A)

乳汁中甲状腺線ホルモン排泄ニ關スル一小實驗……(高橋)

次ニ、アラカジメ〇・〇〇二ノ硫酸アトロピンヲ加ヘオキ、更ニ、〇・〇〇二ノ硫酸アトロピント本患者四％乳汁ト、同時ニ注加スルニ、子宮運動ハ興奮セラレ緊張ヲ高メ振幅ハ減少ス。(第四圖B)

殊ニ本患者ニ於テハ治療後稍々症状ヲ輕減シ、自覺症狀ヲモ輕快ヲ來セシ後、本患者乳汁ノ子宮筋作用ヲ檢セシニ、治療前〇・九％ニテ著明ノ影響ヲ觀シモノガ、治療後五％乳汁ヲ注加スルモ、其ノ影響極メテ微弱ニシテ、稍々緊張ヲ上昇シ、振幅一時減少ヲ來タスレド、直チニ、舊態ニ復シ、即チ乳汁ノ作用ガ臨床的

治療前

第五圖 (A) パセドウ氏病乳汁 (木〇き〇)

↑ 1% パ氏病乳汁

治療後

第五圖 (B) パセドウ氏病乳汁 (木〇き〇)

↑ 5% パ氏病乳汁

所見ニ並行スルハ、興味アル點ナリ。(第五圖A、B)
第三例。木〇縫〇、二二歳、甲状腺機能亢進症。

第六圖 バセドウ氏病患者乳汁 (山〇ノ〇)

主訴 心悸亢進、甲状腺肥大、手指震顫。
臨床的所見 脈搏九〇、甲状腺肥大著明、眼症陰性、手指震顫ヲ認ム。

乳汁作用。〇・九％ニ於テハ、未ダ、充分ナル影響ナケレドモ、一％ニ於テハ、明ニ、緊張ヲ高メ、其ノ振幅ハ増大シ、緊張時アトロピンノ作用ヲ受クルコトナク、アドレナリンニ對スル關係ハ第二例ト同ジ。

第四例。山〇ノ〇、二八歳、バセドウ氏病。

主訴 眼球突出、心悸亢進、甲状腺肥大。

臨床的所見。脈搏一〇〇、眼球突出顯著、甲状腺肥大シ、グレイフェーメービウス氏現象陽性ステルワーク、陰性。

乳汁作用 一％乳汁注加ニ於テハ、殆ンド其ノ影響ナク、二％ニテハ、子宮筋攣縮作用ハ乳汁ニヨリ影響セラレ、緊張ハ上昇シ、振幅ハ稍々縮少ス、神経系ノ影響ヲ、乳汁ノ子宮攣縮作用ニ及ボス變化ハ、之ヲ受ケズ。

即チ余ガ得シ例ヲ以テセバ、バセドウ氏病及甲状腺機能亢進症患

者乳汁ハ、既ニ、〇・八％ニテ影響シ、全體トシ〇・八％—二・〇％ニテ、子宮筋運動ニ影響シ、緊張ノ上昇ヲ來シ、

乳汁中甲状腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗……(高橋)

第二表

バセドウ氏病並甲状腺機能亢進症患者乳汁ノ
子宮攣縮作用ニ及ス影響

番 號	姓 名	年 齡	病 名	作用乳汁%	アトロピ ン作用
第一例	田○し○	二六	バセドウ氏病	〇・九一—〇・〇%	(—)
第二例	木○き○	二六	バセドウ氏病	〇・八—〇・九%	(—)
第三例	木○縫○	二二	甲状腺機能亢進症	〇・九一—〇・〇%	(—)
第四例	山○ノ○	二八	バセドウ氏病	二・〇%	(—)

振幅ノ増大又ハ縮少ヲ來シ、該乳汁ノ影響ハ、アトロピンノ抑制作用ヲ受ケズ。又アドレナリンニテ、子宮運動ノ抑制ヲ來セシモノニテモ、乳汁ヲ同時ニ注加スレバ、明ニ、子宮筋ハ興奮シ攣縮作用ニ影響シ、緊張上昇シ、振幅ノ増大又ハ縮少ヲ來シ、神経系ノ興奮又ハ麻痺ガ何等其ノ作用ニ影響ヲ及ボサズ、乳汁ノ攣縮ハ平滑

筋自己ノ興奮ヲ高メルモノナルコトハ、第三圖B、第四圖A、B及第六圖ノ明ニ示ス所ナリ。然シテ、健康人乳汁ニ於テハ、其ノ攣縮作用ハ、七・〇%—一〇・〇%ノ如キ濃厚度ニ於テ始メテ之ヲ見、六%以下ニ於テ何等ノ影響ヲアラハセシモノ一例モナク、バセドウ氏病並甲状腺機能亢進症患者ノ乳汁ハスデニ〇・八%ニ於テ其ノ影響ヲアラハシ健康人ノソレニ比シ多量ノ興奮物質ヲ含有スルコトヲ、明ニ考察シ得、乳汁中ノ興奮物質ノ分量ハ、臨床的症狀ノ消長ニ並行スルモノナルコトハ、ソノ臨床的所見ト、乳汁作用ヲ相照ス時、之ヲ、想像スルニ、敢テ、至難ノ事ナラズ。即チ余ガ觀察セシ第二例ニ於テ、治療前既ニ〇・八%ニテ其ノ興奮作用ヲ呈セシモノガ、治療後臨床的症狀ガ輕快ナスト共ニ、ソノ興奮物質分量ハ漸次減少シ五%ニ於テモ、ソノ興奮狀態著明ナラズ。即チ、臨床的症狀ガ、輕快スルニ並行シテ、其ノ興奮分量ハ健康人ノ分量範圍ニ、近ヅカントセルハ、實ニ、興味アル點ニシテ、又此ノ興奮物質ノ乳汁中ニ於ケル多寡ハ、甲状腺機能ト相離ルベカラザル關係ヲ有スルコトヲ、有力ニ、物語ル事實ト謂フベシ。

然シテ甲状腺エキ스가平滑筋ノ興奮作用ヲ來サシムルコトナルハ、既ニ、Fawcett, Rahe, Hackett, Rogers, Eiger, Boenheim, Fränker, 木場、久保園等ノ證明スル所ニシテ、更ニ、久保園ハ、シカモ其興奮作用ハ、神経系ニ關與セズ、筋自身ノ緊張ヲ上昇セシムルモノナルコトヲ立證セシガ、余ガ觀シ、本實驗ノ子宮攣縮作用ハ、前記先進諸家ノ述ブル、甲状腺物質ノ興奮作用ト、全ク、同一ノ作用機轉ニシテ、久保園ガバセドウ氏病及甲状腺機能亢進症患者血清ニテ得タル事實ハ、又余ガ乳汁ニテナセル、本實驗成績ト何等異ナル所ナシ。以上ノ余ノ實驗成績ヨリ乳汁中ノ興奮性物質ヲ直チニ甲状腺ホルモンニ歸セントスルハ餘リニ早計ノ譏ナシトセザレドモ前記セル如ク乳汁中ノ興奮物質ノ分量ノ多寡ハ、臨床的甲状腺機能ト全ク、並行シ、ソノ興奮作用機轉ハ、甲状腺物質ノソレト全ク其ノ軌ヲ一ニスルモノナレバ、ソノ物質ハ甲状腺ホルモント、全然離ルベカラザル關係ニアリ、シカモ、曩ニ、余ガ得タル母體甲状腺機能ト乳兒ノ成長發育及内分泌系統トノ關係ニ於テ甲状腺ホルモンハ乳汁中ニ排泄セラルベキモノナル事實ト對比シテ考フル時ハ明ニ本實驗ニ於テ觀ル其ノ興奮物質中、甲状腺ホルモンモ其ノ作用機轉ノ一大要素ナルベシトハ敢テ不當ノ見解ニハアラザルベシ。

第五章 總括及結論

以上ノ實驗成績ヲ通ジ余ハ次ノ如ク總括結論セントス。

一、健康人乳汁ノ摘出子宮筋ニ對スル最小興奮量ハ六%—九%ナリ。

二、バセドウ氏病及甲状腺機能亢進症患者乳汁ノ最小興奮量ハ、〇・八%—二%ニシテ、正常乳汁ニ比シ、興奮物質

乳汁中甲状腺ホルモン排泄ニ關スル一小實驗……(高橋)

ヲ多量ニ含有ス。

- 三、該乳汁ノ興奮作用ハ、平滑筋自個ニシテ神経系ハ、之ニ關與セズ。
- 四、該乳汁ノ興奮作用ハ、甲状腺エキスノ興奮作用ト、其ノ軌チニス。
- 五、乳汁中ニ、含有セラル興奮物質ノ多寡ハ、大略臨床的甲状腺機能亢進状態ト並行シ、臨床的症狀輕快ト共ニ、其ノ興奮物質ハ漸次減少シテ健康人ノ其レニ接近ス。

拙筆ニ當リ本檢案ヲ命ゼラレ且御懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ贈リシ恩師辻教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表シ併セテ多大ノ御助言トサ
レシ久保園博士ニ對シ感謝ス。
(昭和四年五月十五日脱稿)

出 版 文 献

- 1) 高橋；日本内分泌學會雜誌，第5卷，第5號，959頁，昭和4年。
- 2) 久保園；日本内分泌學會雜誌，第3卷，3號，482頁，昭和2年，第4卷，第3號，470頁，昭和3年。
- 3) 木場；辻内科甲状腺論文集。
- 4) Spolverini；Zit. nach. Hernando.
- 5) Hernando；Weschelbeziehungen zwischen den Störung der inneren Sekretion und dem Verdauungssaparat.
- 6) Kehrer；Arch. f. Gyn. Bd. 81, S. 160, 1907.
- 長町；京都醫學會雜誌，18卷，1020，頁，大正10年。
- 8) 品川；日本藥物學雜誌，1卷，421頁，大正14年。
- 9) A. Fränkel；Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 60, S. 395, 1930.
- 10) Fawcett, Rahe, Hackett a. Rogérs；Amer. Journ. Phys. Vol. 39, p. 154, 1916.
- 11) Eiger；Zeitschr. f. Biolog. Bd. 67, S. 372, 1917.
- 12) Bohenheim；Zeitschr. f. d. gesamt. exper. Med. Bd. 32, S. 179, 1923.
- 13) 澤田，吉富；滿洲醫學會雜誌，10卷，429頁，昭和4年。

Tieren, die infolge der Injektion von Thyroxin synth. (Roche) nur eine sehr leichtgradige Thyreotoxikose aufweisen, das Insulin einen reizenden Einfluss auf die obengenannten 3 Vorgänge ausübt. (Autoreferat)

Studien ueber die Ausscheidung von Schilddrüsenhormon in die Milch.

Ueber die Wirkung der Milch von Hyperthyreosen auf die Kontraktion der isolierten glatten Muskelorgane.

Von

Dr. T. Takahashi.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto
in Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser studierte die Einwirkung der Milch von Menschen, bei welchen klinisch Morbus Basedowii oder Struma mit Hyperfunktion der Schilddrüse festgestellt worden waren, auf die Kontraktion der isolierten glatten Muskelorgane (Meerschweinchen)

Die Resultate sind die folgenden: —

- 1) Bei der minimalen Konzentration von gesunder Menschenmilch, die den Uterus zu kontrahieren vermag, handelt es sich meist um eine 6.0—9.0 % ige.
- 2) Die Milch von Basedowikern und Strumakranken mit Hyperthyreose ruft schon in 0.8—2.0 % iger Lösung deutliche Uteruskontraktion hervor, d. h. diese Krankenmilch kontrahiert die isolierten glatten Muskelorgane stärker, als es die normale Menschenmilch vermag.
- 3) Der Angriffspunkt der Milch bei der Uteruskontraktion liegt nicht in der Nervenendigung, sondern im Muskel selbst.
- 4) Die Milch kontrahiert den Uterus ganz gleich wie das Schilddrüsenextrakt.

5) Die Menge der erregenden Substanz in dieser Milch geht meist parallel mit der Intensität der klinischen Symptome der Hyperthyreose, d. h., mit dem Nachlassen der klinischen Symptome geht auch die Muskelwirkung der Milch zurück, und diese wirkt nach und nach wie die Milch von gesunden Personen.

Auf Grund der oben erwähnten Resultate und seiner früheren Mitteilungen (Fok. Endocrin. Jap. Bd. V. H. 5) ist der Verfasser der Ansicht, dass das Schilddrüsenhormon in die Milch übergeht.

(Autoreferat)

Ueber die Veränderung der vegetativen Nerven bei der idiopathischen Oesophagusdilatation.

Von

Dr. T. Takahashi.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universitaet zu Kyoto,
Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Um die histologische Veränderung der vegetativen Nerven bei der idiopathischen Oesophagusdilatation festzustellen, hat der Verfasser pathologisch-histologisch die vegetativen Nerven eines an dieser Krankheit leidenden Patient untersucht, der ueber Schluckbeschwerden klagte und sich durch Adrenalininjektion wohl fühlte, während Atropin dabei wirkungslos war. Bei der Autopsie fand sich Hypertrophie der Muskelschicht des Oesophagus. Histologisch wurden folgende Nerven untersucht:

Ggl. nodosum, Ggl. cervicale sup., Ggl. cervicale med., Ggl. cervicale inf., der Vagusfaser und der Sympathicusfaser der beiden Seiten.

Die Veränderungen waren die folgenden: —

1) Das Ggl. nodosum zeigte keine Veränderung. Nur waren die Vagusfasern leichtgradig degeneriert.

2) An der Sympathicusfaser und allen obengenannten Sympathicusganglien bemerkte der Verfasser hochgradige degenerative Veränderungen.

(Autoreferat.)