アドレナリン及ビインスリン血糖作用ニ 對スル脾臓ノ態度ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 小 室 昌 義 述

緒 言

目 次

第一章	實驗方法及ビ材料	第三章	脾臓剔出及ビ脾臓剔出後甲狀腺剔 出ガインスリン血糖下降ニ及ボス 影響
第二章	脾臓剔出及ビ脾臓剔出後甲狀腺剔 出ガアドレナリン血糖上昇ニ及ボ ス影響	第四章	總括及ビ結論 主要引用書目

緒 言

脾臓ガ諸種新陳代謝ニ重要ナル關係ヲ有スル臟器タルコトハ明カナル所ナルガ、之ガ含水炭素新陳代謝殊ニ血糖量トノ關係ニ就テハ研究業績少ク未ダ不明ノ點少カラズ。即チTosawa氏ハ家兎ニ於テ脾臓ヲ剔出セルニ、其血糖量ニハ著シキ變化ナク、血糖量ノ動搖範圍モ正常家兎ニ於ケル時以上ノ差ヲ認メザリキ。又脾臓エキスを皮下ニ注射スル時ハ確實ニ輕度ノ血糖上昇ヲ認ムルモ、糖尿ハ惹起セズ、殊ニ興味アル事實ハ肝臓エキスを皮下注射ニヨリテ脾臓エキスを血糖上昇作用ハ抑制セラルト述べ、且脾臓ヲ以テ約二週間飼育セル家兎ニ於テハ、何等血糖量ノ増減ハ認メザ

リキト報告セリ。Bierry, Rathery et Levina 氏等ノ犬ニ於ケル實驗ニ依レバ脾臓剔出後血液ブラスマ中ノ糖量ハ翌月中ニ約五〇%増加スト述べ、野間氏ハ家兎ノ脾臓ヲ剔出セルニ、其空腹時血糖量ハ手術前ニ比シテ變化無キモノアリ又術後五日乃至十日間迄血糖量ハ手術前ニ比シテ少シク高ク且ツ其後時日ヲ經ルニ從ヒテ漸次手術前ノ値ニ近似セルモノアルヲ見タリト言ヘリ。如斯二三ノ文献ニヨリテ想像スルニ脾臓剔出後、血糖量ニハ著シキ變化ハ無キモノ、如シ。

脾臓ノアドレナリン過血糖ニ對スル關係ニ就テモ其文献極メテ少ク、前出ノTogawa 氏ノ實驗ニヨレバアドレナリン過血糖及ビアドレナリン糖尿ハ脾臓剔出動物ニ於テモ健常家兎ト同様ニ現レ、又脾臓エキスハ此際ニモ一定ノ血糖上昇作用ヲ有スルト雖モ、脾臓ハアドレナリン過血糖及ビアドレナリン糖尿ニハ著シキ役目ヲ爲サズト言ヘリ。Marino 氏ハ含水炭素新陳代謝ニ及ボス脾臓ノ影響ニ就テ述べタル内ニ、アドレナリンヲ犬ノ皮下ニ注射セル場合、脾臓剔出犬ニ於テハ健常犬ト同様ニ作用スト言ヒ、野間氏ハ家兎ニ於テ脾臓ヲ剔出シテ、アドレナリン過血糖ニ及ボス影響ヲ觀察セルニ、脾臓剔出ニヨリテアドレナリン過血糖曲線ハ剔出前ノ夫ニ比シテ低ク、徐々ニ最高ニ達シ、徐々ニ下降セリ。然シ剔出後二週間以上ヲ隔スレバ復タ剔出前ノ値ニ近似セリト報告セリ。如斯前ノ二氏ハ脾臓ノ剔出ニヨリテアドレナリン過血糖ハ影響サレズト言ヒ、野間氏ハ抑制サル、ト述べタリ。

更ニインスリン血糖下降ニ及ボス影響ニ關シテハ余ノ寡聞ニシテ全ク文献ヲ見ズ。

如斯血糖量ニハ全ク相反スル影響ヲ及ボスアドレナリン及ビインスリンノ兩ホルモント脾臓トノ關係ハ未ダ頗ル不明ニシテ、之ガ檢索ハヤガテ脾臓ト含水炭素新陳代謝トノ關係ヲ明カニスル一助ナラザル可カラズ。茲ニ於テ余ハ

辻教授指導ノモトニ本實驗ヲ企テタリ。

第一章 實驗方法及ビ材料

實驗動物トシテハ二胚乃至三胚ノ雄性ニシテ成熟セル健康ナル家兎ヲ使用セリ。血糖測定ニハバング氏新法ヲ用ヒ煮沸時間ニ關シテハ堀内氏ノ實驗ヲ參照シテ七分間トセリ。

實驗方法トシテハ先ヅ十五時間以上饑餓ニセル家兎ノ空腹時血糖量ヲ檢シ、次デアドレナリン或ハインスリンヲ後述ノ如キ方法ニテ注射シテ初メ三十分間ハ十分毎ニ、以後一時間目ヨリハ一時間毎ニ。注射後五時間採血シ、アドレナリン或ハインスリンニヨル血糖量ノ變化ヲ檢シテ之ヲ對照試驗トセリ。

次ニ一週間以上ノ間隔ヲ置キテ脾臓ノ剔出ヲ行ヒタルガ、脾臓剔出後日ヲ經ルニ從ツテ、其機能ハ他ノ臟器ニヨリテ代償セラル、事ハ周知ノ事實ナル故、手術後傷口ノ癒エタル頃即チ五日乃至八日後ニ再ビ對照試驗ト同様ニアドレナリン或ハインスリンニヨル血糖量ノ變化ヲ測定シ、更ニ二三日ヲ經テ甲狀腺ノ剔出ヲ行ヒ、約二週間後ニ三度同様ニ血糖量ノ變化ヲ檢シテ實驗ヲ了レリ。採血ハスベテ耳朶靜脈ヨリシ、注射前後トモ同一血液ニ就キ二回測定シテ其平均値ヲ取り、以テ實驗ノ正確ヲ期シ、注射器ハスベテ乾燥消毒セリ。

第二章 脾臓剔出及ビ脾臓剔出後易甲狀腺出ガあどれなりん血糖上昇ニ及ボス影響

アドレナリンハ三共千倍鹽化アドレナリン溶液ヲ常ニ家兎體重每胚〇・〇五珄ヲ腹部皮下ニ注射シテ、血糖量ノ變

化ヲ對照、脾臓剔出後及ビ脾臓、甲狀腺剔出後ノ三回ニ亘リテ比較セリ。其結果ハ第一表ノ如シ。

第一表 アドレナリン血糖量ノ變化 (註、脾ハ脾臓、甲ハ甲狀腺ノ略、)

例	手術前後	體重	注射量 c.c.	前 後 血 糖	十分	二十分	三十分	一 時	一 時 半	三 時	四 時	五 時	備 考
例 一 第	前 剔 出 後 三 日 驗	二 三 〇 〇	〇・二 〇・二 〇・二	〇・八 〇・五 〇・六	〇・二 〇・一 〇・三	〇・三 〇・二 〇・三	〇・四 〇・三 〇・四	〇・五 〇・四 〇・五	〇・六 〇・五 〇・六	〇・七 〇・六 〇・七	〇・八 〇・七 〇・八	〇・九 〇・八 〇・九	脾 剔 出 後 八 日 目 ニ 甲
例 二 第	前 剔 出 後 七 日 驗	二 三 〇 〇	〇・二 〇・二 〇・二	〇・八 〇・五 〇・六	〇・二 〇・一 〇・三	〇・三 〇・二 〇・三	〇・四 〇・三 〇・四	〇・五 〇・四 〇・五	〇・六 〇・五 〇・六	〇・七 〇・六 〇・七	〇・八 〇・七 〇・八	〇・九 〇・八 〇・九	脾 剔 出 後 九 日 目 ニ 甲
例 三 第	前 剔 出 後 六 日 驗	二 三 〇 〇	〇・二 〇・二 〇・二	〇・八 〇・五 〇・六	〇・二 〇・一 〇・三	〇・三 〇・二 〇・三	〇・四 〇・三 〇・四	〇・五 〇・四 〇・五	〇・六 〇・五 〇・六	〇・七 〇・六 〇・七	〇・八 〇・七 〇・八	〇・九 〇・八 〇・九	脾 剔 出 後 九 日 目 ニ 甲
例 四 第	前 剔 出 後 五 日 驗	二 三 〇 〇	〇・二 〇・二 〇・二	〇・八 〇・五 〇・六	〇・二 〇・一 〇・三	〇・三 〇・二 〇・三	〇・四 〇・三 〇・四	〇・五 〇・四 〇・五	〇・六 〇・五 〇・六	〇・七 〇・六 〇・七	〇・八 〇・七 〇・八	〇・九 〇・八 〇・九	脾 剔 出 後 七 日 目 ニ 甲
例 五 第	前 剔 出 後 七 日 驗	二 三 〇 〇	〇・二 〇・二 〇・二	〇・八 〇・五 〇・六	〇・二 〇・一 〇・三	〇・三 〇・二 〇・三	〇・四 〇・三 〇・四	〇・五 〇・四 〇・五	〇・六 〇・五 〇・六	〇・七 〇・六 〇・七	〇・八 〇・七 〇・八	〇・九 〇・八 〇・九	* 印ハ注射後五分 脾 剔 出 後 十 日 目 ニ 甲

アドレナリン及ビインスリン血糖作用ニ對スル脾臓ノ態度ニ就テ……(小室)

之等ノ成績ヲ見ルニ、先ヅ脾臟剔出前後ニ於ケル空腹時血糖量ノ變化ハ第一例及ビ第三例ニ於テハ脾臟剔出後ハ血糖量ノ上昇ヲ示シ、第四、第五例ニ於テハ血糖量ハ反ツテ下降シ、第二例ハ變化ナシ。

次ニ個々ノ場合ノアドレナリン血糖曲線ノ變化ヲ見ルニ、先ヅ第一例ニ於テハ、アドレナリン血糖曲線ハ脾臟剔出後ハ對照曲線ニ比シテ注射後ノ最高血糖量ハ稍々低キモ、血糖量ノ下降ハ稍々緩慢ニシテ注射後四時間目ニ略々同ジ

第一圖 第一表第三例家兎血糖曲線

價迄下降セリ。更ニ甲状腺剔出後ニ於テハ最高血糖量ハ對照ニ比シテ同ジク稍々低キモ其全曲線ハ略ボ相似タリ。即チ本例ニ於テハ著變ヲ見ザルナリ。第二例ハ脾臟剔出後ハ血糖量ノ上昇度著シク、注射後二時間目迄上昇ヲ續ケ、從ツテ其下降度モ緩慢ニシテ對照ニテハ注射後四時間ニシテ既ニ正常値ニ歸セルモ、五時間後ニモ尙正常値ニ比シテ稍高シ。更ニ甲状腺剔出後ハ注射後初期ノ上昇度ハ前二回ニ比シテ稍々弱キモ最高血糖量ハ對照ニ比シテ稍高ク、以後急ニ下降シテ對照ニ比シテ速ニ正常値ニ復セリ。之ヲ脾臟ノミ剔出後ノ血糖曲線ニ比スレバ其下降度ハ更ニ著シキヲ知ル。第三例(第一圖)ニ於テモ脾臟剔出後ハアドレナリン過血糖狀態ハ愈々強ク現レタリト雖モ、更ニ甲状腺

ヲ剔出セル場合ニハ著シク抑制セラレタリ。第四例モ同様ニシテ脾臟剔出後ノアドレナリン過血糖狀態ハ對照ニ比シテ強ク且ツ長時間持續セリ。而テ更ニ甲状腺剔出後ハ最高血糖量ハ對照ニ比シテ稍々大ナリト雖モ、其下降狀態ハ更

ニ急激ナリ。最後ニ第五例ニ於テハ脾臓剔出後ノ過血糖状態ハ更ニ著シク、其最高價ハ對照ニ比シテ〇・〇三八%ノ増加ヲ示セリ。下降曲線ハ元來對照試驗ニ際シテモ著シク緩慢ナリシ爲メ之ト比較セバ寧ロ急ナリト言ハンモ然モアドレナリン過血糖ヲ著シク助長セル事實ハ認ムルヲ得ベシ。更ニ甲狀腺剔出後モ最高血糖量ハ對照ニ比シテハ稍々高キモ脾臓剔出ノミノ時ハヨリ著シク低下セリ。而テ下降曲線モ對照ニ比シテ急ナリ。

之ヲ要スルニ脾臓剔出ハアドレナリン過血糖状態ヲ助長セシメ、更ニ甲狀腺ヲ剔出スル時ハ之ヲ抑制スルモノト考ヘラル。

第三章 脾臓剔出及び脾臓剔出後甲狀腺剔出ガいんすりん

血糖下降ニ及ボス影響

インスリンハリリ製品ヲ用ヒ、之ヲ殺菌蒸溜水ニテ三倍ニ稀釋シ、常ニ家兎體重毎瓩〇・一瓩(即三分ノ一單位)ヲ腹部皮下ニ注射シテ血糖量ノ變化ヲ對照及ビ脾臓剔出後ニ比較檢査シ、其内ノ三例ハ脾臓剔出後更ニ甲狀腺ノ剔出ヲ爲シ同様ニインスリン注射ヲ行ヒテ其血糖下降状態ヲ檢セリ。其結果ハ第二表ノ如シ。

第二表 インスリン血糖量ノ變化 (註、脾ハ脾臓、甲ハ甲狀腺、)

例	手術前後	體重	注射量 c.c.	後血糖		十分	二十分	三十分	一 時	二 時	三 時	四 時	五 時	備	考
				前血	糖										
第一例	前 試 驗	1100	0.3	0.07	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
脾剔出後	六 日	1100	0.5	0.07	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		

アドレナリン及ビインスリン血糖作用ニ對スル脾臓ノ態度ニ就テ……(小室)

アドレナリン及ビインスリン血糖作用ニ對ルル脾臟ノ態度ニ就テ……(小室)

例二第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二五〇〇	〇・三六	〇・一〇七	〇・一〇八	〇・〇九〇	〇・〇六九	〇・〇四八	〇・〇四〇	〇・〇四四	〇・〇七四
例三第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・三四	〇・一〇三	〇・一〇三	〇・〇九三	〇・〇六六	〇・〇五六	〇・〇五〇	〇・〇五五	〇・〇七九
例四第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・三四	〇・一〇三	〇・一〇三	〇・〇八九	〇・〇五四	〇・〇五一	〇・〇三七	〇・〇四七	〇・〇九七
例五第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・三〇	〇・〇九五	〇・一〇四	〇・〇九三	〇・〇六八	〇・〇五六	〇・〇四〇	〇・〇五三	〇・〇九〇
例六第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・二六	〇・一〇九	〇・一〇九	〇・〇九一	〇・〇七〇	〇・〇六〇	〇・〇五一	〇・〇七五	〇・〇九二
例七第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・二八	〇・〇八四	〇・〇九三	〇・〇九二	〇・〇七四	〇・〇七一	〇・〇四九	〇・〇六九	〇・〇七〇
例八第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二五〇〇	〇・二五	〇・〇九二	〇・一〇七	〇・一〇八	〇・〇九三	〇・〇七〇	〇・〇五〇	〇・〇七四	〇・〇八八
例九第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二四〇〇	〇・二四	〇・〇九〇	〇・〇九八	〇・〇八七	〇・〇七二	〇・〇五二	〇・〇三〇	〇・〇六〇	〇・〇九六
例十第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二五〇〇	〇・二五	〇・一〇一	〇・一〇〇	〇・一〇八	〇・〇九六	〇・〇七〇	〇・〇四九	〇・〇六八	〇・〇九三
例十一第	脾 前 剔 試 出 驗 後	二五〇〇	〇・二五	〇・一〇一	〇・一〇〇	〇・一〇八	〇・〇九六	〇・〇七〇	〇・〇四九	〇・〇六八	〇・〇九三

例	手術前後	體重	注射量 c.c.	前 後 血 糖	十 分	二十 分	三十 分	一 時	二 時	三 時	四 時	五 時	備 考
例第二十第	前 試 驗 脾 剔 出 後 八 日 甲 剔 出 後 二 五 日	二六五〇 二七〇〇 二八〇〇	〇・二六 〇・二七 〇・二八	〇・〇九三 〇・一〇六 〇・一〇三	〇・一〇六 〇・〇九八 〇・〇九七	〇・一〇四 〇・〇九三 〇・〇九六	〇・一〇〇 〇・〇九五 〇・〇九六	〇・〇九七 〇・〇九〇 〇・〇九六	〇・一〇一 〇・〇九六 〇・一〇二	〇・一〇六 〇・一〇六 〇・一〇六	〇・一〇一 〇・一〇五 〇・一〇六	〇・一〇八 〇・一〇五 〇・一〇七	脾 剔 出 後 十二 日 目 ニ 甲 剔 出
例三十第	前 試 驗 脾 剔 出 後 七 日 甲 剔 出 後 二 三 日	三〇〇〇 二九〇〇 三〇〇〇	〇・二三 〇・二九 〇・三〇	〇・〇九八 〇・一〇〇 〇・一〇三	〇・一〇九 〇・一〇九 〇・一〇七	〇・一〇二 〇・一〇三 〇・一〇七	〇・一〇三 〇・一〇七 〇・一〇三	〇・一〇五 〇・一〇九 〇・一〇〇	〇・一〇五 〇・一〇五 〇・一〇一	〇・一〇四 〇・一〇五 〇・一〇四	〇・一〇九 〇・一〇八 〇・一〇七	〇・一〇九 〇・一〇一 〇・一一八	脾 剔 出 後 十一 日 目 ニ 甲 剔 出
例四十第	前 試 驗 脾 剔 出 後 六 日 甲 剔 出 後 一 六 日	二七〇〇 二六〇〇 二七〇〇	〇・二七 〇・二六 〇・二七	〇・〇八九 〇・〇九七 〇・〇七四	〇・〇九七 〇・一〇一 〇・〇九五	〇・〇八〇 〇・〇九八 〇・〇八七	〇・〇九五 〇・〇七六 〇・〇八〇	〇・〇五六 〇・〇六一 〇・〇六三	〇・〇五八 〇・〇四九 〇・〇五三	〇・〇五〇 〇・〇五三 〇・〇四七	〇・〇六七 〇・〇五五 〇・〇六三	〇・〇九〇 〇・〇八六 〇・〇六二	脾 剔 出 後 九 日 目 ニ 甲 剔 出

之等ノ實驗成績ニ於テ、先ヅ脾臟剔出前後ニ於ケル空腹時血糖量ヲ比較スルニ、三例ニ於テハ剔出後ノ血糖量ハ下降シ、二例ニ於テハ略ボ相等シク、九例ニ於テハ上昇ヲ示セリ。即チ先ノアドレナリン試験ノ際ヲ通ジ、脾臟剔出家兎十九例中五例ニ於テハ剔出後血糖量ハ下降シ、三例ハ變化ナク、十一例ハ上昇セリ。即チ大多數例ニ於テ脾臟剔出後ハ血糖量ハ増加セリ。

次デ各例ノ場合ニ於ルインスリン血糖曲線ノ變化ヲ見ルニ、第一、四、九、十及ビ十一例ニ於テハ脾臟剔出後ハインスリンノ血糖下降作用ハ著シク抑制セラレ、殊ニ第一及ビ第十一例ニ於テハ此抑制作用ハ著シク現ハレ、インス

アドレナリン及ビインスリン血糖作用ニ對スル脾臟ノ態度ニ就テ……(小室)

第二圖 第二表第十四例家兎血糖曲線

リンニヨル血糖下降作用ハ極メテ僅少ニ現ハレタルノミナリ。第二、第七及ビ第八例ニ於テモ、其程度ハ前五例ノ如ク著シカラズト雖モ、同ジク抑制作用ヲ示ス。第三例ニ於テハ脾臟剔出後ハ反ツテインスリンノ血糖下降作用ヲ助長セルモ、其正常値ヘノ回復期ハ對照ヨリモ速カナリ。即チ對照ニ於テハ注射後四時間ニシテ血糖量ハ〇・〇七〇%五時間ニシテ尙〇・〇七九%ナルモ、脾臟剔出後ハ其血糖量ハ注射後四時間ニシテ既ニ〇・〇九〇%ヲ示シ、五時間ニハ〇・〇九七%ニ達セリ。第五例ニ於テハ脾臟剔出後ハ其最低血糖量ハ對照ニ比シテハ稍々高キモ著シカラズ、而モソノ回復狀態ハ對照ニ比シテ稍々緩慢ナリ。第六例ニ於テハ脾臟剔出後ハインスリン血糖下降ヲ全ク助長セシメタル如キ結果ヲ示セリ。第十二、第十三及ビ第十四例ニ於テハ脾臟剔出後更ニ甲状腺剔出ヲ行ヒテ其血糖量ニ及ボスインスリン作用ヲ檢セルガ、第十二例ニ於テハ脾臟剔出後ハインスリン注射後二時間迄ハ對照ニ比シテハ抑制作用ヲ示シ、夫以後ハ稍々遅レテ漸次正常値ニ復セルモ、大體ニ於テインスリン作用ヲ抑用セリ。更ニ甲状腺剔出後ハ全クインスリン作用ハ助長セラレ血糖下降狀態ノ持續時間長ク正常値ヘノ回復期モ甚ダシク遅延セリ。第十三例ニ於テハ脾臟剔出後ハインスリン作用ハ大體ニ於テ抑制サレ居ルモ稍々回復期ノ遅延セルヲ認メタリ。更ニ甲状腺剔出後ハインスリン作用ハ著シク抑制サレ、第十二例トハ全ク反對ノ結果ヲ呈セルモ、更ニ第十四例(第二圖)ヲ見ルニ、本例ニ於テモ脾臟剔出後ハインスリン作用ヲ抑制セルモ回復期ハ稍々遅延セリ。更ニ甲状腺剔出

後ニ於テハ其血糖量ハインスリン注射後三時間迄ハ對照ニ比シテ稍々高く、脾臓剔出後ノ曲線トノ略ボ中間ニ位スルモ、其以後ニ於ケル回復狀態ハ極メテ遲延セリ。

如斯脾臓ヲ剔出セバ、インスリン血糖下降作用ハ一二ノ例ヲ除キ大多數例ニ於テ抑制セラル。更ニ甲狀腺ヲ剔出セラル場合ハ一例ハ此抑制作用ヲ増強シ二例ハインスリン血糖下降作用ヲ助長セリ。

第四章 總括及ビ結論

以上ノ實驗ヲ總括スルニ、先ヅ脾臓剔出前後ニ於ケル血糖量ノ變化ヲ見ルニ、大多數例ニ於テ脾臓剔出後一週間以內ニ於テハ血糖量ノ上昇セルヲ見タリ。而テ此際惹起セラレタル血糖上昇ガ手術操作ニヨルモノナルヤ否ヤノ疑問ニ關シテハ、一般ニ開腹手術後ノ血糖上昇ハ認メラル、所ナルモ、夫ハ極メテ輕度ニシテ且ツ短時間ニ消失スルモノナル事ハ當教室美間氏及ビ前出ノ野間氏ノ實驗ニヨルモ明カナル所ニシテ、本例ニ現ハレタル血糖上昇ハ全ク脾臓剔出ニヨル結果ナリ。

次ニ脾臓摘出後ニ於ケルアドレナリン及ビインスリンノ血糖作用ハ前者ニアリテハ脾臓剔出ニヨリテ其血糖上昇作用ハ助長セラレ、後者ニ在リテハ其血糖下降作用ハ抑制セラレタリ。此結果ハ脾臓ガアドレナリンニ對シテハ拮抗作用ヲ有シ、インスリンニ對シテハ合加作用ヲ有スルモノナル事ヲ想像シ得ルモノニシテ、更ニ脾臓剔出後ニ甲狀腺ヲ剔出セル場合ニ於ケルアドレナリン及ビインスリンノ血糖作用ヲ見ルニ、脾臓ノミ剔出ノ場合トハ全ク相反セル結果ヲ得タリ。而テ甲狀腺ハアドレナリンニ對シテ合加作用ヲ示シ、インスリンニ對シテハ抑制作用ヲ有スルモノナル事

ハ既ニ周知ノ事實ニシテ、此點ヨリ考フル時ハ脾臟ト甲狀腺トハ相反セル作用ヲ有スルモノ、如ク、脾臟剔出ノ際ハ甲狀腺劑投與ト同ジキ結果ヲ得タリ。此事ハ空腹時血糖量ニ於テモ相同ジク、脾臟剔出後ハ大多數例ニ於テ血糖量ノ上昇ヲ見タルガ、甲狀腺劑投與ニヨリテモ空腹時血糖量ノ増加スル事ハ曩ニ拙著ニ於テモ發表セル所ニヨリテ明カナル事ナリ。之ニ依リテ考フルニ脾臟ト甲狀腺トハ血糖量ニハ少クトモ何等カノ關係ヲ有スルモノニシテ、脾臟ノ剔出ニヨリテ之ガ、代償的ニ甲狀腺ノ機能亢進ヲ來スモノニ非ザランカト言フ事ハ、血糖外ノ他ノ方面ヨリモ既ニ證明セラレタル事ナリ。然レドモ一方脾臟ヲ剔出セル際ニ、時ヲ經ルニ從ツテ網狀織内被細胞ノ Hyperplasia 或ハ脾臟樣組織ノ新生等ニヨリテ、脾臟機能ノ代償セラル、事ハ諸家ノ說ク所ナルモ、脾臟剔出直後ハ少クトモ一時的ニ他ノ網狀織内被細胞組織其他ニ何等カノ變化ヲ來ス事モ想像セラル、所ニシテ、之等ノ關係ニ與ツテカアル所有ラン。

以上ノ實驗成績ヨリ次ノ如ク結論スル事ヲ得ベシ。

- 一、脾臟剔出家兎ニ於テ手術後一週間前後ニ於テハ其空腹時血糖量ハ大多數例ニ於テ上昇ス。
- 二、アドレナリン血糖上昇ハ脾臟剔出ニヨリ助長セラレ更ニ甲狀腺ノ剔出ニヨリテ抑制セラル。
- 三、インスリン血糖下降ハ脾臟剔出ニヨリテ抑制セラレ、更ニ甲狀腺ノ剔出ニヨリテ助長セラル。

摺筆ニ際シ恩師辻教授ノ御懇篤ナル御指導ヲ深謝ス。

本論文ノ要旨ハスデニ昭和三年四月第二回日本内分泌學會總會ニ於テ發表セリ。

(昭和二年十二月廿五日脱稿)

主要引用書目

- 1) Bang, L.: Mikromethoden Zur Blutuntersuchung, S. 39, 1922.
- 2) Bierry, Rathery et Levina: Cpt. rend. des séances de la soc. de biol., Bd. 91, Nr. 26, S. 537, 1924. (Clt. n. Berichte über die gesamte Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 29, S. 105, 1925)
- 3) 堀内樂: 東京醫學雜誌, 第38卷, 第1號, S. 1.
- 4) 小室昌藏: 日本内分泌學會雜誌, 第4卷, 第6號, S. 1038, 昭和3年9月.
- 4) Martino, S.: Problemi d. mitriz, Jg. 3. H. 1/2 S. 1, 1926. (Clt. n. Berichte über die gesamte Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 38, S. 688, 1927)
- 6) 美間武: 日本内分泌學會雜誌, 第3卷, 第4號, S. 796, 昭和2年10月.
- 7) 野間新: 岡山醫學會雜誌, 第428號, S. 920, 大正14年9月及第443號, S. 1310, 大正15年12月
- 8) Togawa, T.: Biochem. Zeitschr. Bd. 109, S. 1, 1920.

Pferdserums und bei Serumanaphylaxie.

2) Die mit Gemüse ernährten Kaninchen des gleichen Wurfes sind gegen Adrenalin unempfindlich, gegen Insulin dagegen empfindlich. Die mit Hafer ernährten Kaninchen sind gegen Adrenalin empfindlich, gegen Insulin dagegen unempfindlich. Doch ist dies nicht stets der Fall.

3) Bei den Kaninchen, die durch Gemüsenahrung vagotonisch geworden sind, zeigt sich nach Insulininjektion stärkere initiale Hyperglykämie.

4) Aus den obenerwähnten Resultaten ist ersichtlich, dass die initiale Hyperglykämie nach der Insulininjektion auftreten kann, wenn die Konstitution durch irgend eine Ursache verändert wird und es dadurch zu Vagotonie kommt.

5) Die initiale Hyperglykämie nach der Insulininjektion tritt stark hervor, wenn es im Tiere zu Vagotonie gekommen ist, gleichgültig auf welche Weise man das bewerkstelligt hat.

(Autoreferat)

Ueber die Stellung der Milz zum Adrenalin- und Insulinblutzuckerspiegel.

Von

Dr. M. Komuro.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univ. zu Kyoto in
Japan. Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser studierte die Beziehung zwischen der Milz und den zwei Hormonen, Adrenalin und Insulin, die den Blutzuckerspiegel antagonistisch beeinflussen.

Als Versuchstiere wurden Kaninchen gebraucht und als Methode der Blutzuckerbestimmung das neue Bangsche Verfahren.

Die Resultate waren die folgenden:—

1) Bei den milzlosen Kaninchen stieg der Blutzuckerwert

des nüchternen Tieres in vielen Fällen eine Woche nach der Operation an.

2) Die Adrenalinhyperglykämie wurde nach der Milzexstirpation verstärkt und durch die spätere Schilddrüsenexstirpation gehemmt.

3) Die Insulinhypoglykämie wurde nach der Milzexstirpation gehemmt und durch die spätere Schilddrüsenexstirpation verstärkt. (Autoreferat)

**Experimentelle Untersuchung über die Funktion
des Epithelkörperchen. (I Mitteilung).
(Epithelkörperchen und Durchlässigkeit
des Magen-Darmkanals für
heterogene Eiweiss.)**

Von

Dr. Piung-Hun Ri.

(Aus der chirur. Klinik d. Kaiserl. Universität zu Keijo.
Vorstand: Prof. Dr. Shigeshi Ogawa.)

1) Wenn man dem erwachsenen Kaninchen per os ziemlich grosse Menge von Eiereiweiss gibt, so sieht man, dass es durch die Schleimhaut des Magens in den Kreislauf kaum übergehen kann, aber dass es durch die Schleimhaut des Darmes in geringer Menge in den allgemeinen Kreislauf resorbiert wird. Von Darmschleimhaut resorbiertes Eiereiweiss wirkt als Antigen und lässt ziemlich starke Immunisierung des Versuchstiers erzielen.

Bei Parathyreoidektomiertem Kaninchen geht das per os gegebene Eiereiweiss reichlich durch die Schleimhaut des Magens und des Darmes in den allgemeinen Kreislauf über, aber bei diesem Kaninchen, trotz der reichlichen Resorption des Antigens, ist die Erzielung der starken Immunisierung unmöglich.