甲狀腺粉末試食及ビインスリン注射ノ 可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室
大學院學生 醫學士 小 屋 迫 鶴 雄
八 木 貫 一 共 述

目 次

緒 言	第二章 實驗成績
第一章 甲狀腺粉末試食ノ家兔肉腫及白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響	第一項 インスリン注射ノ家兔肉腫増殖ニ及ボス影響
第一節 供試材料並ニ實驗方法	第二項 インスリン注射ノ白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響
第二節 實驗成績	第三章 移植腫瘍ノ被移植動物血糖ニ及ボス影響
第一項 甲狀腺粉末試食ノ家兔肉腫増殖ニ及ボス影響	第一節 供試材料並ニ實驗方法
第二項 甲狀腺粉末試食ノ白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響	第二節 實驗成績
第二章 インスリン注射ノ家兔肉腫及ビ白鼠癌腫ノ増殖ニ及ボス影響	第四章 總括及考按
第一節 供試材料並ニ實驗方法	第五章 結 論

緒 言

元來腫瘍ナルモノ、多クハ純粹ナル局所的疾患ニアラズ、寧ろ全生體ノ不調和即チ、體質素因ニ依リテ惹起セラレタル全身病ノ一症候トシテ局所的ニ現出シタルモノト見做スベキナリ、扱フ、内分泌系統ハ體質ノ重要ナル、多分其レヲ支配スル要約ナルコトハ明カナリ、然リトスレバ、内分泌系統ト體質的疾患タル腫瘍ノ發生増殖トノ間ニ密接ナル關係アルコトハ想像ニ難カラズ、此ノ間ノ消息ヲ明カニセントシテ先進諸家ノ諸種内分泌腺ノ可移植性腫瘍並ニタール癌腫ノ發生増殖ニ對スル影響ヲ檢シタル幾多ノ業績アルモ、其成績一定スルニ至ラズ吾人何レヲ採ルヤニ迷フモノアリ、是ニ於テ余等ハ此ノ間ノ關係ヲ窺知セントシテ、先ヅ甲狀腺粉末試食及インスリン注射ガ移植動物腫瘍ノ發育増殖ニ及ボス影響ヲ研究セントシテ本實驗ヲ企テタリ。

尙腫瘍ノ本態ヲ究ムルニ重要ナリト思惟セラレルガ故ニ、腫瘍増殖ガ當該個體ノ新陳代謝ニ就中、含水炭素新陳代謝ニ如何ナル障害ヲ惹起スルカヲ檢セントシテ含水炭素新陳代謝ノ重要ナル表徵タル血糖量ノ變化ヲ腫瘍増殖ノ經過ニ隨イテ本實驗中ノ肉腫動物ニ就テ併セ測定セリ。

第一章 甲狀腺粉末試食ノ家兎肉腫並ニ

白鼠癌腫ノ増殖ニ及ボス影響

甲狀腺ト惡性腫瘍トノ關係ハ古クヨリ注目セラレ、Jones⁽¹⁾ハ手術後三ヶ月ニシテ再發セシ腋下皮膚癌ガ約一ケ年間

ノ甲狀腺劑服用ニヨリ消失セシ一例ヲ報告シ、Dising⁽²⁾ハ甲狀腺錠使用ニヨリテ胃腸癌ガ縮小シ一般狀態ガ頗ル良好ニナリシ十五例ヲ報告セリ、又甲狀腺機能低下デアルト考ヘラル、甲狀腺腫患者ガ癌腫ニヨク犯サレルコトハ屢々唱ヘラレシ所ナリ。⁽³⁾(Fraenkel, Straus)⁽⁴⁾實驗の方面デハ Korentschewsky⁽⁵⁾ハ甲狀腺剝出ニヨリテ、犬肉腫ノ増殖發育ガ促進セラレ、甲狀腺劑投與ニヨリテ、白鼠癌腫ノ移植率ノ低下、腫瘍増殖ノ緩慢ニナレルヲ見、且ツ白鼠肉腫ニ對シテモ同様増殖ヲ抑制スルヲ見タリ。⁽⁶⁾Engel⁽⁶⁾ハ甲狀腺ノ Abderhaldense Optone⁽⁶⁾ノ投與ニヨリテマウス腫瘍 (Jensen tumor)⁽⁷⁾増殖ヲ抑制セシメ得タリ、Eisner⁽⁷⁾ノ實驗ハ之ニ反シ、甲狀腺越幾斯投與ハ、マウス腫瘍増殖ニ對シテ一回ハ促進的次回ハ影響ヲ見ザリキ、⁽⁸⁾本間氏⁽⁸⁾ハ白鼠癌腫増殖ガ甲狀腺末投與ニヨリテ緩慢ニナルヲ認メ、Rhodenburg, Bullock & Johnston⁽⁹⁾等ハ之ニ反シ、甲狀腺剝出ニヨリテ白鼠癌 (Flexner-Jobling's)⁽⁹⁾ノ移植率ガ低下スト報告セリ。余等ハ甲狀腺粉末ノ試食ガ移植家兔肉腫及白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響ヲ見ントシテ實驗シ聊カ、興味アル結果ヲ得タレバ今茲ニ報告ス。

第一節 供試材料並ニ實驗方法

實驗動物トシテハ、家兔及白鼠ヲ用ヒ、成ル可ク同年齡タルコトニ努メ、家兔ハ二妊内外白鼠ハ一〇〇瓦内外ノモノヲ選ベリ、食餌ハ家兔ニオカラ白鼠ニハ玄米及水ヲ用ヒ、⁽¹⁰⁾實驗前少クトモ七日乃至一〇日間我ガ飼育ニ馴レシメ且ツ妊娠ノ有無ヲ觀察セリ、移植腫瘍トシテハ、加藤型家兔肉腫及京大病理系白鼠癌腫ヲ使用シ、移植法ハ腫瘍ノ健全ナル部分ノ切片ヲトリ、更ニ此レヲ細切シ、殆ド糊狀トナラシメ、特ニ移植ノタメニ作製シタル、小套管針ヲ用ヒテ

甲狀腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響（小屋迫、八木）一五五四

其一定量ヲ取り、實驗動物及對照動物ノ背部皮下ニ注射セリ、總テ此等ノ操作ハ無菌的ニ取扱ハレタリ、移植前數日ヨリ或ハ移植後翌日ヨリ、我教室製甲狀腺粉末ヲ家兎一頭ニ就キ〇・〇五瓦白鼠一頭ニ就キ〇・〇〇五乃至〇・〇〇七瓦宛一日一回經口的ニ投與セリ、腫瘍ノ發育増殖ノ狀態ヲ檢スルタメニハ腫瘍測定可能ニナリタル、移植後六日目或ハ九日目ヨリ以後毎五日一回腫瘍ノ長徑幅徑厚サノ三徑ヲ精密ニ測定シ便宜上此三徑ノ和ヲ以テ腫瘍ノ大サヲ表示スルモノト假定セリ、此際耗ヲ以テ單位トス。

第二節 實驗成績

第一項 甲狀腺粉末試食ノ家兎肉腫増殖ニ及ボス影響

實驗動物總數二〇頭、其中一〇頭ニ甲狀腺粉末ヲ上述ノ如ク經口的ニ與ヘ他一〇頭ヲ對照トセリ、移植後九日目ヨリ毎五日一回腫瘍ノ大サヲ測定セリ、成績第一表ニ示セル如シ、表中數字ハ腫瘍ノ長幅厚三徑ノ和ノ一頭ニ就テノ平均値ヲ示ス、（單位耗）表ニ明カナル如ク、甲狀腺粉末ヲ與ヘシ甲狀腺動物肉腫ハ對照ヨリ遙ニ小サキヲ見ル。

表 一 第

對 照	移植後					
	九 日	十四日	十九日	二十四日	二十九日	三十四日
甲狀腺家兎	一五・四	一七・七	二一・八	二九・八	四八・八	六七・二
對 照	一四・五	一八・七	二八・五	三七・六	五七・〇	七四・五

第二項 甲狀腺粉末試食ノ白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響

實驗動物總數二〇頭其中一〇頭ニ甲狀腺粉末ヲ前記ノ量ニ經口的ニ投與ス一〇頭對照、移植後七日ヨリ毎五日一回最大ナル長幅厚三徑ヲ測定シ其和ヲ以テ腫瘍ノ大サヲ示表セシム、表中數字ハ三徑ノ和ノ一頭ニ就キテノ平均値ニシテ耗ヲ以テ單位トス、此實驗ニ於テハ腫瘍増殖極度ニ達シタリト考ヘラレシ頃三十二日目ニ白鼠ヲ死ニ至ラシメ腫瘍ヲ剔出シ秤量セリ、成績第二表ニ示ス。

第 二 表

移植後										
	七日	十二日	十七日	二十二日	二十七日	三十二日	三十二日目腫瘍重量			
甲狀腺白鼠	二六・三	三二・一	四三・五	五二・七	六〇・〇	六八・七	一一・七瓦			
對 照	二三・七	三〇・〇	四〇・四	五五・二	六八・六	七七・三	一七・七瓦			

表ニ示ス如ク、前半ハ兩者大差ナキモ後半期ニ至レバ明カニ實驗動物腫瘍ハ對照腫瘍ヨリ小サキヲ認ム、腫瘍重量モ亦此關係ヲ裏書セリ。

第二章 いんすりん注射ノ家兎肉腫及白鼠癌腫

發育増殖ニ及ボス影響

インスリン注射ノ實驗的動物腫瘍ノ發生増殖ニ及ボス影響ニ關スル業績ヲ見ルニ、⁽¹¹⁾ Haendel u. Tadenuma、⁽¹²⁾ スリン注射ニヨリテ白鼠癌増殖ガ促進セラレルヲ見タリ、然ルニ之ニ反シ、⁽¹³⁾ Münzner, Rupp 及 Witzleben 並ニ、

甲狀腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響…(小屋迫、八木) 一五五五

甲狀腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響(小屋迫、八木) 一五五六

Silberstein, Freud, revesz⁽¹⁴⁾等ハマウスタール癌腫増殖ガインスリン注射ニヨリテ抑制セラルト稱シ、又加藤氏ハイ
ンスリン注射ガ家兎肉腫増殖ニ對シ、抑制的ニ作用スルヲ認メタリ、如斯、インスリンノ動物腫瘍ニ對スル影響ニ就
テ諸家ノ意見相乖離スルヲ見ル、余等ハインスリンヲ肉腫家兎及癌腫白鼠ニ注射シテ腫瘍増殖ニ影響セシメントシテ
實驗シ其結果ヲ得タルヲ以テ報告ス。

第一節 供試材料及實驗方法

實驗動物、移植腫瘍、移植法、食餌及ビ腫瘍測定法等ハ第一章第一節ニ述ベシト同様ナリ、インスリン(リリー)注
射量ハ家兎體重一疋ニ就キ 0.03cc 白鼠體重 1.00瓦 ニ就キ 0.03cc 宛毎日一回、腫瘍移植後翌日より腫瘍遠隔
部皮下ニ注射セリ、實驗中折々、動物體重ヲ測リ體重ニ著シキ減少ナキヲ確メタリ。

第二節 實驗成績

第一項 インスリン注射ノ家兎肉腫増殖ニ及ボス影響

實驗動物二十一頭其中一二頭ニ前記ノ量ニ於テインスリンヲ腫瘍移植翌日より注射シ、他一〇頭ヲ對照動物トセリ、
移植後六日目より毎五日一回腫瘍ノ最大ノ長幅厚サノ三徑ヲ測定シ此等ノ和ヲ以テ其ノ大サヲ表示スルモノト假定セ
リ、表中ノ數字ハ此和ノ一頭ニ就テノ平均値ヲ示ス(單位耗)、是處ニ於テモ最後ニ動物ヲ死ニ至ラシメ腫瘍ヲ剔出シ
テ秤量セリ、成績第三表ニ示ス、表ニ明カナル如ク、インスリン注射家兎肉腫ハ始メヨリ終リ迄對照腫瘍ヨリ小ナル

ヲ見ル。

第三表

移植後	イ ン ス リ ン	家 兔	對 照
六日	二九・一	三八・〇	三四・九
十一日	四四・四	五五・〇	四三・四
十六日	五八・七	六五・五	五五・〇
二十一日	七四・三	八三・二	六五・五
二十六日	八八・四	九八・一	八三・二
三十一日	四一・八瓦	四九・六瓦	九八・一
三十七日	腫瘍重量	腫瘍重量	腫瘍重量

最後ノ剔出腫瘍重量モ此ノ關係ヲ示ス。

第二項 インスリン注射ノ白鼠癌腫増殖ニ及ボス影響

實驗動物總數二〇頭其中一〇頭ニインスリンヲ注射シ他一〇頭ヲ對照トセリ、表中數字ハ移植後七日ヨリ毎五日一回腫瘍ノ長幅厚サノ三徑ヲ測定シ、其和ノ一頭ニ就テノ平均値ヲ示ス、成績第四表ニ示ス如シ、即、インスリン注射ハ此場合ニ於テハ多少増殖ヲ昂進セシメタルガ如シ、表ニ見ル如ク十八日迄ハ變化ナキモ二十三日後ヨリインスリン白鼠癌腫ハ稍々對照ヨリ大ナリ。

第四表

移植後	イ ン ス リ ン	白 鼠	對 照
七日目	二一・〇	三二・七	二二・四
十三日	四三・九	五二・一	三二・九
十八日	五七・八	六三・五	四二・七
二十三日	七四・六	八三・二	五二・一
二十八日	九八・一	一二・八瓦	五九・三
三十三日	一七・八瓦	一六・三瓦	六九・一
三十七日	腫瘍重量	腫瘍重量	腫瘍重量

甲状腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響：(小屋迫、八木) 一五五七

第三章 移植腫瘍ノ被移植動物ノ血糖ニ及ボス影響

移植腫瘍ノ被移植動物ノ新陳代謝ニ及ボス影響ヲ究明スルコトハ腫瘍ノ本態ヲ明カニスルタメ重要ナル事ト思惟ス殊ニ最近腫瘍増殖ト含水炭素トハ密接ナル關係アルコト唱導セラレ、腫瘍ノ含水炭素新陳代謝ノ重要ナル一表徴タル血糖ニ及ボス影響ヲ知ルコトハ甚ダ意義アル事ナリト信ズ。

今、腫瘍ト血糖トニ關スル業績ヲ觀ルニ、Trinkler⁽¹⁶⁾ハ癌患者ニ血糖増加セルヲ認メ、John, Killiam and Ludwig⁽¹⁷⁾ハ癌患者一一九例中大部分ニ於テ血糖増加ヲ見タリ。之ニ反シ Theis and Stone⁽¹⁸⁾ハ一一八九例ノ惡性腫瘍患者ニ於テ血糖増加セズシテ一三%ニ於テ寧口減少セルコトヲ報告シ、又、吉田氏⁽¹⁹⁾ハ肉腫家兎及肉腫家鶏ニ就テ、腫瘍増殖ニ伴ヒ血糖減量血中乳酸増加スルヲ認メタリ、如斯腫瘍ノ血糖ニ及ボス影響ニ就テ報告統一のナラズ、余等ハ本實驗中ノ肉腫家兎ニ於テ血糖ヲ測定シ幸ヒ聊カ興味アル成績ヲ得タルヲ以テ報告セントス。

號一節 供試材料並ニ實驗方法

實驗動物ハ家兎ヲ用ヒ甲狀腺粉末試食ノ家兎肉腫増殖ニ及ボス影響（第一章第二節第一項參照）ヲ檢シタル實驗及對照動物二〇頭（此ノ中早期ニ死亡セシ一頭除外ス）及インスリン注射ノ家兎肉腫増殖ニ及ボス影響試驗ニ用ヒタル實驗及對照動物（第二章第二節第一項參照）合計四〇頭ヲ此實驗ニ利用セリ、此ノ他健常家兎六頭ニ就テ日差ニヨル

血糖動搖ヲ検査シ對照トセリ、血糖ハ腫瘍移植前ニ測定シ置キ移植後ハ每週一回ノ割リニ腫瘍増殖ノ經過ヲ追ヒ月餘ニ亘リテ測定セリ、血糖測定ハバング氏新法⁽²⁰⁾ヲ用ヒ、堀内氏⁽²¹⁾ノ變法ニヨリ、同一血液ニ就キ少クトモ二回測定シ其平均値ヲ採リ正確ヲ期セリ、動物ハ試驗前十乃至十五時間絶食セシメ且ツ雌性家兎ハ妊娠セザル様努メタリ。

第二節 實驗成績

先ヅ對照タル健全家兎(第五表第二十及二十一號家兎第六表第二十二ヨリ二十五號)六頭ニ就テ日差ニヨル血糖ヲ檢スルニ同一個體ニ於テハ著シキ動搖ヲ見ズ。

第五表中ノ第一號ヨリ第十號家兎迄ハ腫瘍移植後毎日一頭ニ就キ〇・〇五瓦宛甲狀腺末ノ投與セラレシ家兎ニシテ第六表第一號ヨリ第十一號迄ハ移植後體重一貳ニ就キ毎日インスリン(リリー)〇・〇三cc宛皮下ニ注射セラレシ家兎ナリ。

第五表ノ第十一號ヨリ第十九號迄第六表ノ第十二號ヨリ第二十一號迄ハ腫瘍移植セラレシ他何ラ處置ノ加ヘラレル所無キ家兎ナリ。

甲狀腺末投與及インスリン注射ハ血糖測定前日ニ於テハ午前中ニ施行シ藥劑ノ血糖ニ及ボス影響ヲ成ル可ク避ケタリ、或ハ甲狀腺末連續投與インスリン連續注射ガ施行セラレシ家兎ノ血糖變化ハ腫瘍ノミノ血糖ニ及ボス血糖變化ヲ見ルニ不適當ナリトノ非難ニ對シテハ暫ク措キ、余等ハ腫瘍移植ノ他何等處置ノ施サレザリシ前記ノ十九頭ノ家兎ノ實驗成績ニヨリテ所期ノ目的ニ到達シ居ルヲ知ル。

甲狀腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響：(小屋迫、八木) 一五五九

第五表第六表ヲ通覽スルニ第五表中ノ第二、五、六、九、十一、十五、十七號家兎及第六表ノ第三、四、十二、十

表

腫瘍移植動物									健常家兎	
XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♀	♂	♀
2145	2080	2140	1890	2060	2020	2015	2065	2070	2220	2130
0.106	0.104	0.108	0.108	0.097	0.108	0.106	0.109	0.110	0.109	0.100
0.099	0.104	0.115	0.107	0.095	0.107	0.106	0.108	0.096	0.105	0.098
0.096	0.102	0.103	0.097	0.100	0.110	0.108	0.108	0.108	0.107	0.104
0.093	0.102	0.109	0.103	0.096	0.107	0.106	0.110	0.109	0.111	0.097
0.090	0.100	0.113	0.101	0.094	0.101	0.090	0.101	0.118	0.105	0.101
0.068	0.091	0.108	—	0.077	0.090	—	0.105	0.115	0.109	0.104

表

腫瘍移植家兎									健常家兎			
XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
♂	♀	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♀
2030	2250	1810	2090	1950	1845	2060	1970	2065	2030	1945	1900	2000
0.114	0.101	0.106	0.105	0.102	0.097	0.099	0.109	0.095	0.099	0.105	0.112	0.090
0.098	0.097	0.104	0.098	0.099	0.085	0.093	0.104	0.085	0.110	0.110	0.112	0.089
0.111	0.111	0.097	0.108	0.097	0.086	0.094	0.105	0.083	0.103	0.104	0.110	0.095
0.091	0.107	0.104	0.096	0.095	0.075	0.091	0.101	0.031	0.099	0.106	0.106	0.091
0.110	0.100	0.110	0.109	0.092	0.075	0.080	0.091	0.081	0.095	0.107	0.111	0.094
0.106	0.095	0.105	0.101	0.090	0.062	0.079	0.034	0.068	0.096	0.106	0.110	0.093

第 五

甲 狀 腺 未 投 與 及 腫 瘍 移 植											
番 號	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
性	♂	♀	♂	♂	♀	♀	♀	♂	♀	♂	
體 重	2020	1820 瓦	1970	2000	1935	2060	1880	1985	2025	2025	
前 血 糖	0.102	0.104	0.107	0.107	0.100	0.100	0.105	0.107	0.111	0.108	
後 血 糖	7日	0.093	0.106	0.103	0.106	0.101	0.109	0.112	0.110	0.121	0.100
	15日	0.105	0.092	—	0.108	0.115	0.106	0.114	0.111	0.120	0.096
	28日	0.113	0.107	—	0.100	0.102	0.099	0.112	0.111	0.122	0.107
	35日	0.100	0.108	—	0.103	0.095	0.100	0.105	0.108	0.081	0.097
	42日	0.102	0.080	—	0.104	0.080	0.069	—	0.103	—	0.108

第 六

インスリン注射及腫瘍移植													
番 號	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
性	♀	♂	♂	♀	♀	♂	♂	♂	♂	♀	♀	♂	
體 重	1975 瓦	1750	1993	1795	1905	1735	2115	1975	2045	2115	1930	1825	
前 血 糖	0.111	0.098	0.120	0.113	0.107	0.097	0.099	0.099	0.095	0.110	0.101	0.106	
後 血 糖	7日	0.103	0.088	0.106	0.107	0.110	0.108	0.101	0.094	0.100	0.105	0.111	0.109
	14日	0.108	0.099	0.104	0.103	0.120	0.107	0.098	—	0.099	0.104	0.100	0.093
	21日	0.102	0.087	0.098	0.104	0.121	0.096	0.091	—	0.101	0.106	0.099	0.101
	28日	0.111	0.098	0.094	0.097	0.107	0.102	0.093	—	0.100	0.104	0.089	0.107
	35日	0.111	0.094	0.094	0.093	0.109	0.101	0.093	—	0.099	0.102	0.085	0.109

八、十九、二十、二十一號家兎ニ於テ即約三十五%ニ於テ明カニ血糖ノ降下ヲ見ル、血糖ハ移植後十日乃至十五日頃迄ハ變動無ク二十日以後、腫瘍ノ増大ニ伴ヒテ下降スル如シ、血糖下降ヲ見ザル他ノ家兎ニ於テハ大體ニ於テ血糖變動ナク血糖ノ上昇ヲ來セルモノハ一モ無カリキ。

第四章 總括及考按

余等ハ叙上ニ於テ甲狀腺粉末經口的投與及インスリン注射ノ移植家兎肉腫及白鼠癌腫ノ増殖ニ及ボス影響及移植肉腫ノ血糖ニ及ボス變化ヲ説述シタリ、即余等ノ實驗ニ於テハ甲狀腺粉末試食ハ家兎肉腫及白鼠癌腫ノ増殖ヲ緩慢ナラシメタリ、最近 Falls²²⁾ ハ白鼠ノ甲狀腺實質内ニ腫瘍切片 (Jensen's tumor) ヲ移植シ或ハ腫瘍切片ト、剔出甲狀腺トヲ一緒ニ、上腿皮下、或ハ筋肉内ニ相接觸スル如ク移植シ、以テ生體内ニ於テ、甲狀腺ノ腫瘍組織ニ對スル直接ノ影響ヲ檢索シテ、甲狀腺ニ接觸セル腫瘍切片ハ、然ラザル切片ヨリ、増殖ノ強大ナル事ヲ確メタリ、然ルニ、甲狀腺ガ生體ニ投與セラレタル場合、移植腫瘍ニ及ボス影響ハ自ラ異ナル機轉ニ依ルト思ハル、抑モ、各内分泌腺臟器間ニハ互ニ補助或ハ抑制的ホルモンヲ產出シ相互間ニ平衡ノ得ラレルコトニヨリテ、始メテ生體ノ健全ナル生活ガ營マレルモノナレバ、甲狀腺末ノ投與セラレタ際生體ニ及ボス影響ハ頗ル複雑ニシテ、サレバ其腫瘍ニ及ボス作用機轉モ亦、簡單ニ理解スルコトハ困難ナリ。

次ニ、余等ノ實驗成績ニ依レバインスリン注射ハ家兎肉腫増殖ヲ抑制シ、白鼠癌腫増殖ニ對シテハ其後期ニ於テ多少促進的ニ影響シタル傾向ヲ見ル、而テ、動物血糖ニ對シテハ大體ニ於テ寡血糖ヲ招來スルモノ、如シ、近年腫瘍増

殖ト營養及新陳代謝間ノ關係ノ研究頓ニ進歩シ、Braunstein⁽²³⁾ハ、in vivoニ於テ、癌組織ハ糖分解作用アルヲ確メ、
 Warburg u. Minami⁽²⁴⁾モ白鼠癌組織ハ正常組織ヨリ七〇倍ノ糖分解作用ヲ有シ、而テ此際糖ヲ乳酸迄分解スルコトヲ
 認メ、Warburg, Posner u. Negelin⁽²⁵⁾等ハ人類癌腫組織モ同様糖分解作用ヲ有スルト稱ス、Cori⁽²⁷⁾ハ白鼠癌及マウス癌
 ニ於テ、糖液ヲ腹腔内ニ注射セシニ、肝臓ノ乳酸量ハ不變ナルニ腫瘍組織ニ於テハ、増量セシヲ認メタリ、Glässner⁽²⁸⁾
 ニヨリ、癌患者及癌マウスハ靜脈内葡萄糖注射ニ對シ、尿ニ乳酸反應ヲ呈スルコトガ證明セラレ、加之、Braunstein
 ハ糖尿病患者ガ新ニ癌ニ罹患セシニ、糖尿ガ消失シ、耐糖力ノ増加セシ例ヲ報告シ而テ彼ハ此事實ヨリ、腫瘍ニハイ
 ンスリン様物質ノ存在ヲ主張シテ居ル、吉田氏モ亦彼ノ實驗ニヨリテ、家兎及家鶏肉腫ノ發育ニ伴ヒ、血糖減少、血
 中乳酸増量スルヲ認メテ、腫瘍發育ニ糖消費セラレルト共ニ、血液内ニ血糖ヲ降下セシメ、乳酸ヲ増量セシムル物質
 ガ存スルナラント推論シテ居ル、一色氏⁽²⁹⁾ハ家兎肉腫及家鶏粘液腫ニ於テ血糖降下作用アル、インスリン様物質ノ存在
 ヲ證明シテ居ル、近時、又腫瘍ノ組織呼吸ノ研究ニヨリ、腫瘍ノ生活ニ對シ含水炭素ノ必要ナル事ガ明カトナレリ、
 即 Russel u. Woglom⁽³⁰⁾ハ組織呼吸ヲ檢シテ、増殖速度ノ大ナル腫瘍ハ主トシテ含水炭素ヲ必要トスルト説キ、我ガ
 教室龜井氏モ同様ノ事ヲ認メタリ、更ニ蓼沼、堀田、本間氏等⁽³¹⁾ハ肉腫ヲ家鶏ノ一側翼ニ移植シ兩側翼靜脈ノ血液ニ就
 キ比較研究シ、肉腫ニヨリ、血液中ヨリ糖ガ大ニ消費セラレルヲ認メタリ。
 以上述べ來リシ所ニヨリ、惡性腫瘍組織ニハ糖分解作用アリテ多分其際乳酸ノ產出セラレルコト、及腫瘍ノ生活ニ對
 シテハ含水炭素ノ必要ナルコト而テ腫瘍ハ、in vivoニ於テモ亦血液ヨリ糖分ヲ奪取スル事ヲ明カニシ得タリト信ス、
 是レニ依ツテ觀レバ余等ノ實驗ニ於テ肉腫増殖ニ伴ヒ血糖下降ヲ來スコトハ Braunstein 及吉田氏ノ説ク所ノ如ク、

血糖ガ腫瘍ニヨリ盛ニ消費セラレルト共ニ、腫瘍中ニ於ケル糖分解作用ヲ有スル物質ガ、血中ニモ移行シテ血糖ヲ降下セシムル如ク作用スルナラント思ハル、余等ノ實驗ニ於テ血糖下降ヲ見ザリシ家兎ニ於テハ肝臓其他組織ニ於テ糖化盛ンニ行ハレテ以テ平衡ガ保持セラレシタメナラン。

以上ノ事實ヨリ推スレバ、文献ニ於テ殆ド統一のニ現ハレタル、含水炭素供給ノ腫瘍増殖促進作用ハ理解スルニ容易ナリ、即腫瘍ノ増殖ニ必須ナル含水炭素供給ハ當然腫瘍増殖ヲ促進スベシ、即 *Händel u. Tadenuma* ハ含水炭素豐富ナル食物ガ⁽³³⁾マウス癌増殖ヲ促進セルヲ認メ、*Goldfied*ハ⁽³²⁾惡性腫瘍ガ含水炭素ニヨリ増殖昂進セラレルト證シ、*Roudoni*ハ⁽³³⁾癌白鼠ニ加藤氏⁽³⁴⁾ハ肉腫家兎ニ同様葡萄糖ヲ與ヘテ腫瘍發育良好トナリシヲ報告セリ、扱テ余等ノ實驗例ニ就テ、即インスリン注射ガ家兎肉腫發育ニ對シテハ抑制的ニ影響シ白鼠癌ニ向ツテハ促進的ナリシコトヲ考フル前ニ先ヅ、インスリンニ就テ考察サレナケレバナラス、インスリンノ作用機轉ニ就テハ種々議論アルモ、肝臓ニ於テ其造糖原作用ヲ亢進セシメ糖原ヨリ糖形成ヲ抑制シ、或ハ含水炭素新陳代謝ヲ促進セシメ以テ呼吸商數ヲ増加セシム即含水炭素ノ燃焼ヲ増加セシム、又ハ、インスリンハ含水炭素ヨリ脂肪生成ヲ促進セシム、此等ノ事ハ大體ニ於テ認めラレル所ノ如シ、兎ニ角、インスリンハ血糖ヲ降下セシメル事ハ明カナル事實ナリ、然リトスレバインスリン注射ハ腫瘍動物ニ於テ含水炭素食餌投與或葡萄糖注入ト至ク反對ニ立ツ條件ヲ生體ニ與フルモノナレバインスリン注射ニヨリ肉腫増殖ガ抑制セラレタル事ハ理解スルニ難カラズ、然ラバ何ガ故ニインスリン注射ガ白鼠癌増殖ニ對シテハ促進的ニ影響シタルカノ疑問ニ對シテハ家兎ト白鼠トノ個性ノ差違ニ基ヅクカ、或ハ肉腫ト癌腫トノ性質ニ關スルモノナルカ判斷ニ迷フモノナルモ余等ハ現在ノ所ハ、只次ノ *Händel u. Tadenuma* ノ意見ヲ引用スルニ止メン、即氏等ハ

含水炭素ニ豊富ナル食餌ヲ以テ養ヘル白鼠ノ癌腫ガ他ヨリモ増殖速カニシテ、尙之ニインスリン注射ヲ行フ時ハ尙一層促進セラレルコトヲ認メテ次ノ如ク説明セリ、インスリン注射ニヨリ血中或ハ腫瘍内ニ乳酸ノ產出旺盛トナリ、該乳酸ガ腫瘍増殖ニ關係ヲ有スト稱セラル、表面張力ヲ低下セシメテ、由テ、腫瘍増殖ニ促進的ニ影響ヲ與フルモノナリ。

第五章 結 論

- 一、甲狀腺粉末試食ハ家兎肉腫並ニ白鼠癌腫ノ發育増殖ニ對シ抑制的ニ影響ス。
- 二、インスリン注射ハ家兎肉腫増殖ヲ抑制シ、白鼠癌腫増殖ニ對シテハ後半期ニ於テ多少促進的ニ影響シタリ。
- 三、移植腫瘍ノ増殖ニ伴ヒ被移植動物ノ血糖ハ多少低下スル傾向ヲ見ル。

擧筆ニ際シ、終始態篤ナル御指導ヲ賜ハリシ恩師辻教授ニ深ク謝意ヲ表ス。(昭和三年十二月十二日脱稿)

文 献

- 1) Jones: zit. n. Engel. 2) Diesing: med. Klin, 1911, Nr. 12, S. 1911. 3) Fränkel: Dtsch. med. Wochenschr., 1921, Nr. 9. u. zit. n. Engel. 4) Strauss, Dtsch. med. Wochenschr., 1922, S. 385 u. 416. 5) Korentschewsky: zit. n. Engel u. Korentschewsky, Copt. rend. des séances de la soc. de biol. 83, Nr. 18, S. 779, 1920. 6) Engel: Zeitschr. f. Krebsf., Bd. 19, S. 339, 1923. 7) Elsner: Zeitschr. f. Krebsf., Bd. 23, 41, u. Krebsentstehung und endokrines System. 1926. 8) 本間: 癌, 大正13年234頁. 9) Rhodenburg, Bullock u. Johnston: Arch. internal med. Bd. 7, S. 491, 1911. 10) 加藤: 日本病理學會雜誌, 大正8年12月. 11) Händel u. Tadenuma: Zeitschr. f.

甲狀腺粉末試食及インスリン注射ノ可移植性腫瘍ノ増殖ニ及ボス影響…(小屋迫、八木) 一五六五

- Krebsf., Bd. 21, 1924. 12) Münzner, Rupp: Dtsch. med. Woch. Jg. 51. S. 1113, 1925. 13) Witzleben: Klin. Woch., 1925, Nr. 44, S. 2115. 14) Silberstein, Freund u. Revesz: Wien. Klin. Woch. 1925, Nr. 13. 15) 加藤: 癌, 大正15年10月291頁. 16) Trinkler: Centrbl. f. d. med. Wissensch., Bd. 28, S. 408, 1890. 17) John, Killian and Ludwig: Arch. of internal med., No. 6, p. 813, 1921. 18) Theis and Stone: Journ. Cancer Research, Vol. 4, p. 319, 1919. 19) 吉田: 實驗消化器精學, 第1巻, 1339頁. 20) Bang: Mikromethoden zur Blutuntersuchung, 1920. 21) 堀内: 東京醫學會雜誌, 第38巻, 第1號, 大正13年. 22) Falke: Zeitschr. f. Krebsf. Bd. 27, H. 6, 1928. 23) Braunstein: Dtsch. Med. Woch., Nr. 27, S. 880, 1923, u. Klin. Woch. Nr. 18, S. 778, 1924. 24) Warburg u. Minami: Klin. Woch., Jg. 2, Nr. 17, S. 776, 1923. 25) Minami: Bioch. Zeitschr., Bd. 142, S. 334, 1923. 26) Warburg, Posner u. Negelein: Bioch. Zeitschr., Bd. 152, S. 309, 1924. 27) Corti: Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med., Vol. 22, p. 254, 1925. Journ. of Biol. Chem., Vol. 64, p. 11, 1925. 28) Glässner: Wien. Klin. Woch., Nr. 15, S. 358, 1924. 29) 一色: 臨床醫學, 15年4號, (昭和2年4月) 30) Russel u. Woglom: zit n. Händel u. Tadenuma. 31) 藤沼, 堀田, 本間: 癌, 17年14冊, 529頁. 32) Goldfeder: Zeitschr. f. Krebsf., Bd. 27, H. 6, S. 503, 1928. 33) Roudoni: Klin. Woch., Nr. 11, S. 465, 1926. 34) 加藤: 癌, 大正15年10月291頁.

erkennen lässt.

(Autoreferat)

Ueber den Einfluss der Schilddrüse und des Insulins auf das Wachstum des Impftumors.

Von

Dr. T. Koyasako. u. Dr. K. Yagi.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Univers. zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Die Verfasser studierten an normalen Tieren den Einfluss des Schilddrüsenpräparats und des Insulins auf das Tumorstadium und an geimpften die Beziehung zwischen dem Tumorstadium und dem Blutzucker.

Die Resultate waren die folgenden:—

- 1) Das Schilddrüsenpräparat hemmt das Wachstum des Kaninchensarkoms u. des Rattenkrebses.
- 2) Das Insulin hemmt das Wachstum des Kaninchensarkoms, aber fördert das Wachstum des Rattenkrebses in geringem Grade.
- 3) Der Blutzucker des geimpften Tieres neigt nach dem Wachstum des Tumors abzunehmen.

Ueber den Einfluss der Splenektomie und der Thyreoidektomie auf den löslichen Stickstoffgehalt des Blutserums und verschiedener Organe (Leber, Niere und Skelettmuskel) beim Kaninchen.