馬尿酸形成ニ及ボス甲状腺ノ影響

京都帝國大學醫部辻内科教室

大學院學生 醫學士 小屋迫 鶴雄

目次

第一章 緒論	第四章 馬尿酸形成ニ對スル甲状腺取出ノ影響
第二章 實驗方法並ニ供試材料	第五章 總括及ビ結論
第三章 馬尿酸形成ニ對スル甲状腺粉末投與ノ影響	附 主要文献

第一章 緒論

馬尿酸ハ草食動物殊ニ馬尿中ニ多量ニ含有セラレ、肉食動物ノ尿中ニハ比較的少ナク、人尿ニハ極メテ少量ナレドモ常存シ、二十四時間ニ排泄セラレル馬尿酸ノ量ハ 0.2 乃至 2.0 瓦、平均 0.7 瓦ナリ。植物性食品、例之、果實蔬菜等ヲ食セル場合ニハ其ノ尿中排泄量増加ス。馬尿酸ハ生體內ニ於テ安息香酸トグリコロールトノ合成ニヨリテ生ジ安息香酸ハ主トシテ植物性食品ヨリ由來シ、グリコロールハ體內ニ於ケル蛋白分解產物トシテ發生スルモノナリ。然ルニ馬尿酸ハ饑餓狀態ニアル犬ノ尿中ニモ (Salkowski) 亦專ラ肉食ノミ與ヘシ犬ノ尿中ニモ (Meissner und Shepard, Salkowski u. a.) 出現ス。故ニ馬尿酸合成ニ必要ナル安息香酸ハ單ニ植物性食品ヨリ由來スルノミナラズ、蛋白質ヨ

馬尿酸形成ニ及ボス甲状腺ノ影響……(小屋迫)

リモ由來スルコトハ明白ナリ。即チ腸内ニ於ケル蛋白質腐敗ノ際ニ生ズル Phenylpropionsäure ガ吸收セラレテ体内ニ於テ酸化セラレテ安息香酸ヲ生ズト云フ。Baumann 氏ガ犬ニ甘汞ヲ與ヘ腸内腐敗ヲ十分抑制スレバ尿中ノ馬尿酸ノ排泄ハ消失スルコトヲ認メシ實驗ハ此ノ間ノ消息ヲ明カニス。

人間及ビ動物ニ於テ、安息香酸或ハ体内ニ於テ安息香酸ヲ形成シ得ル物質(例之、桂皮酸、トルオール、苦扁桃油、キナ酸、Phenylpropion 酸等)ノ輸入増加ハ尿中馬尿酸排泄ノ著シキ増加ヲ來ス。然ルニグリコルノ投與ハ顯著ナル影響ナシ。

馬尿酸ノ合成ノ場所ハ動物ニヨリ多少異ナルモノ、如ク、犬ニ於テハ主トシテ腎臟ニ行ハレ (Schmiedeberg u. Bunge) 又 Jackner, Levinson u. Morse 氏等ニヨレバ腎臟ノ他、肝臟モ亦之ニ與ルガ如シ。一方草食動物タル家兎ニ於テハ腎臟ノ他、肝臟、小腸及ビ筋肉ニ於テモ合成作用行ハルト云フ (Jaarsveld u. Stokvis, Salomon u. Salkowski, Friedmann u. Tachau)。轉ジテ人間ニ於テハ主トシテ腎臟之レニ與ルト云フ人アリ (Kingsburg u. Swanson)。

斯クノ如ク生体内ニ移入セラレシ異物タル安息香酸ガ蛋白分解產物タルグリコルト結合シテ馬尿酸ヲ合成シテ尿中ニ排泄セラレルハ、生體ノ異物ニ對スル保護作用ニシテ、一種ノ解毒作用ト云フヲ得ベシ。

翻ツテ文献ヲ按ズルニ、馬尿酸形成ニ對スル内分泌ノ影響ニ就テハ、文献極メテ寥々タルモノニシテ、僅カニ佐方氏ガ家兎ニ就キテインスリンガ馬尿酸合成ヲ促進スルヲ認メシ實驗アルノミ。茲ニ於テ余ハ恩師辻教授ノ命ニヨリ、甲状腺ガ馬尿酸合成ニ及ボス影響ヲ窺知セント欲シ本實驗ヲ企テ聊カ興味アル成績ヲ得タルヲ以ツテ是所ニ報告セン
トス。

第二章 實驗方法及び供試材料

供試動物ハ二疋前後ノ健康ナル、雄性家兎ヲ用ヒ、食餌トシテハ豆腐粕ヲ用ヒ、毎日一定量（二二〇瓦）ヲ秤量シテ與ヘタリ。尿ハ毎日午前八時ニカテーテルヲ以テ採尿セリ。而テ其ノ間ニ家兎ノ出ス尿ハ稀硝酸一〇蚝及ビ少量ノチモールヲ入レタル採尿瓶ニ採集セリ、此レ馬尿酸ハアルカリ性液中ニテ容易ニ分解シ（Van de Velde and Stokvis）又細菌ノ混入ニヨリ馬尿酸ノ分解ヲ生ズルガ故ナリ。

安息香酸附加試験ニ於テハ三五・七%ノ安息香酸曹達液ヲ家兎體重毎疋五蚝ヲ午前十時及ビ午後三時ノ二回ニ分チテ皮下ニ注射セリ。

馬尿酸ノ定量ハ尿ニ就テ全安息香酸及ビ遊離安息香酸ヲ定量シ全安息香酸量ヨリ遊離安息香酸量ヲ減ジタル結合安息香酸量ガ馬尿酸ニ相當スル安息香酸量ニシテ此レヲ以テ馬尿酸量ヲ現ハスモノトセリ。全安息香酸定量法ハ主トシテ Folin, Flanders 氏法ノ Kingsburg, Swanson 氏變法ヲ用ヒ、遊離安息香酸定量ハ主ニ Raiziss, Dubin 氏法ニヨリ、且ツ岩城氏ノ改良法ヲ併用セリ。

甲狀腺粉末ハ本教室ニテ製セル牛甲狀腺粉末ヲ用ヒ、家兎體重毎疋〇・〇五瓦宛經口のニ投與セリ。

第三章 甲狀腺粉末投與ノ馬尿酸形成ニ及ボス影響

家兎ニ毎日一定量（二二〇瓦）ノ豆腐粕ヲ與ヘテ馬尿酸排泄ノ略々一定スルヲ待チ、牛甲狀腺粉末ヲ家兎體重毎疋

馬尿酸形成ニ及ボス甲狀腺ノ影響……（小屋迫）

第一表 (第九號家兔 體重 2,010 斤)

日 時	尿量(蚝)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	備 考
八月十二日	一四五	一〇一三	〇・〇一七九	〇・〇五三七〇	〇・〇四一九一	
八月十三日	一五八	一〇一二	〇・〇二八五	〇・〇五〇一一	〇・〇三七二六	
八月十四日	一八六	一〇一〇	〇・〇一五一二	〇・〇五五五三	〇・〇四〇四一	
八月十五日	一六〇	一〇一二	〇・〇一三〇一	〇・〇六〇五一	〇・〇四七五〇	投與開始
八月十六日	一六三	一〇一二	〇・〇一三五五	〇・〇六九五八	〇・〇五六三三	
八月十八日	一八二	一〇一〇	〇・〇一七七六	〇・〇六六六一	〇・〇四八五五	
八月十九日	一四七	一〇二〇	〇・〇一四三四	〇・〇一四〇一	〇・〇八九六七	
八月二十日	一四七	一〇一八	〇・〇一六七三	〇・〇八二四九	〇・〇六五七六	投與中止
八月二十一日	一五〇	一〇一五	〇・〇一四六四	〇・〇九二五二	〇・〇七七七八	
八月二十三日	一二〇	一〇三〇	〇・〇一四六四	〇・〇六二二五	〇・〇四七六一	
八月二十五日	一一〇	一〇三〇	〇・〇一四六四	〇・〇六二二二	〇・〇四七五八	

第二表 (第十號家兔 體重 2,000 斤)

日 時	尿量(蚝)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	備 考
八月十二日	一二八	一〇三四	〇・〇一二二六	〇・〇四三七二	〇・〇三一四六	
八月十三日	一四六	一〇三〇	〇・〇一八七	〇・〇四九八七	〇・〇三八〇〇	
八月十四日	一四九	一〇三一	〇・〇一四五四	〇・〇四三六二	〇・〇二九〇八	
八月十五日	一五〇	一〇二八	〇・〇一四六四	〇・〇五六七三	〇・〇四二〇九	投與開始
八月十六日	一二四	一〇三五	〇・〇一二一〇	〇・〇四一六〇	〇・〇三九五〇	
八月十八日	一一八	一〇三五	〇・〇一二四七	〇・〇六〇四七	〇・〇四八〇〇	
八月十九日	一五〇	一〇三〇	〇・〇一二二〇	〇・〇六〇一〇	〇・〇四七九〇	
八月二十一日	一三七	一〇三四	〇・〇一三五六	〇・〇五〇八七	〇・〇三六三一	投與中止
八月二十三日	一〇八	一〇三五	〇・〇一四六四	〇・〇五一二四	〇・〇三六六〇	
八月二十五日	一五〇	一〇二八	〇・〇一四六四	〇・〇四三九二	〇・〇二九二八	

(容積ハ蚝, 重量ハ瓦ナ單)
(位トス。以下之ニ準ズ。)

第四表 (第十二號家兔 體重 2.025 斤)

第三表 (第十一號家兔 體重 1.900 斤)

日 時	尿量 (耗)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	備 考
八月十二日	一四二	一〇三二	〇〇一三八五	〇〇四〇一九	〇〇二六三四	投與開始
八月十三日	一六〇	一〇二一	〇〇一三〇一	〇〇三九〇四	〇〇二六〇三	
八月十四日	一六五	一〇二〇	〇〇一三四二	〇〇三六二三	〇〇二二八一	投與開始
八月十五日	一七〇	一〇二〇	〇〇一三八二	〇〇四五六二	〇〇三一八〇	
八月十六日	一七六	一〇二一	〇〇一二八八	〇〇六四四一	〇〇五一五三	投與中止
八月十八日	一四〇	一〇三〇	〇〇一二四四	〇〇六八六一	〇〇五四一七	
八月十九日	一五三	一〇二八	〇〇一二四四	〇〇五五九六	〇〇四三五五	投與中止
八月二十日	一四二	一〇三一	〇〇一一五五	〇〇四八五〇	〇〇三六九五	
八月二十一日	一四二	一〇三一	〇〇一四六四	〇〇四三九二	〇〇二九二八	投與中止
八月二十三日	一二七	一〇三〇	〇〇一七〇八	〇〇四〇二六	〇〇二三一八	
日 時	尿量 (耗)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	備 考
八月十二日	一四五	一〇三二	〇〇一三七九	〇〇四二四五	〇〇三〇六六	投與開始
八月十三日	一七一	一〇一八	〇〇一二五一	〇〇四一七二	〇〇二九二一	
八月十四日	一六一	一〇一九	〇〇一三〇九	〇〇四〇三九	〇〇二七三〇	投與開始
八月十五日	一五六	一〇三〇	〇〇一二四一	〇〇四一八七	〇〇三〇四六	
八月十六日	一五九	一〇二六	〇〇一二九三	〇〇五〇四三	〇〇三七五〇	投與中止
八月十八日	一三六	一〇三二	〇〇一三九四	〇〇五三〇九	〇〇三九一五	
八月十九日	一二〇	一〇三二	〇〇一〇九八	〇〇五八五九	〇〇四七六一	投與中止
八月二十日	一六二	一〇二五	〇〇一二二〇	〇〇四七四三	〇〇三四二四	
八月二十一日	一三〇	一〇三〇	〇〇一三五六	〇〇五八五六	〇〇四六三六	投與中止
八月二十三日	一三九	一〇三〇	〇〇一三五六	〇〇四七四八	〇〇三三九二	
八月二十五日	一二六	一〇三三	〇〇一五八六	〇〇四三九二	〇〇二八〇六	

馬尿酸形成ニ及ボス甲状腺ノ影響……(小屋迫)

第五表 (第十五號家兔 體重 2,150 尨)

日 時	尿量(耗)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	備 考
九月一日	一九六	一〇一八	〇・〇一九一八	〇・〇五二六六	〇・〇三二四八	投與開始
九月二日	一九五	一〇一五	〇・〇一九〇三	〇・〇五二三三	〇・〇三三三〇	
九月三日	一六〇	一〇二〇	〇・〇一三〇一	〇・〇四六八四	〇・〇三三八三	
九月四日	一六五	一〇一八	〇・〇一四七六	〇・〇五六三三	〇・〇四一六〇	
九月五日	一五七	一〇三〇	〇・〇一二四四	〇・〇五三九二	〇・〇四〇四八	
九月六日	一七〇	一〇二五	〇・〇一一〇六	〇・〇五一二七	〇・〇四〇二一	投與中止
九月七日	一六七	一〇二八	〇・〇一三八九	〇・〇五三九二	〇・〇四〇〇三	
九月十一日	一九九	一〇一八	〇・〇一六一八	〇・〇六三一二	〇・〇四六九四	
九月十二日	一五六	一〇二三	〇・〇一三九五	〇・〇四九四七	〇・〇三五五二	
九月十三日	一六〇	一〇二五	〇・〇一三〇一	〇・〇五〇七五	〇・〇三七七四	

○・〇五瓦宛經口のニ投與シテ馬尿酸排泄ノ状態ヲ觀察セリ。成績ハ第一、第二、第三、第四及ビ第五表ニ示ス如シ。

第一表(第九號)家兔ニ就テ觀ルニ甲状腺粉末ヲ投與セザル前ニ於テハ結合安息香酸量ハ○・〇三七二六乃至○・〇四一九一瓦ナレドモ、甲状腺末投與後ハ増量シ、八月十九日ノ如キハ○・〇八九六七瓦ニシテ約二倍ニ増加セリ。

其他、第二表、第三表、第四表、第五表ヲ觀テモ略々同様ノ變化ヲ示シ、即チ甲状腺末投與後ハ投與前ヨリ馬尿酸(結合安息香酸)排泄ハ増加シ、甲状腺ノ投與ヲ中止スレバ漸次正常ニ恢復スルヲ見ル。

第四章 甲状腺剔除ノ馬尿酸形成ニ及ボス影響

第六表 (第十三號家兔)

日 時		尿量(蚝)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	合 成 率	備 考
後 出 剔	九月二十四日	一五〇	一〇三一	〇・〇一二二〇	〇・〇五四九〇	〇・〇四二七〇	六一・九七%	體重二・〇六〇蚝、安息香酸曹達液一〇・二蚝注射
	九月二十五日	一八六	一〇二六	〇・〇一二一二	〇・〇五四四六	〇・〇四二三四		
	九月二十六日	一九三	一〇二五	〇・〇二〇一一	〇・〇二五八九〇	〇・〇二三八七九		
	九月二十七日	一八〇	一〇二六	〇・〇一七五六	〇・〇七〇二七	〇・〇五二七一		
前 出 剔	九月二十四日	一九八	一〇二二	〇・〇一二八八	〇・〇四七五〇	〇・〇三六四二	五七・〇五%	(甲状腺剔出九月二十九日) 體重二・二四〇蚝、安息香酸曹達液一〇・二蚝注射
	九月二十五日	一七九	一〇二四	〇・〇一一六四	〇・〇四八〇四	〇・〇三六四〇		
	九月二十六日	一九九	一〇二七	〇・〇二三二六	〇・〇四四五三	〇・〇二七二七		
	九月二十七日	一九八	一〇二三	〇・〇一四四九	〇・〇四五八九	〇・〇三一四〇		

第七表 (第十四號家兔)

日 時		尿量(蚝)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	合 成 率	備 考
後 出 剔	九月二十四日	一七二	一〇二七	〇・〇一三九八	〇・〇五四五四	〇・〇四〇四六	五四・九九%	體重二・二五〇蚝、安息香酸曹達液一一・二蚝
	九月二十五日	二二二	一〇二三	〇・〇一〇八三	〇・〇四三三三	〇・〇三二五〇		
	九月二十六日	一八三	一〇二八	〇・〇二六七九	〇・〇二五四一	〇・〇二七七二		
	九月二十七日	二〇二	一〇二四	〇・〇一四四八	〇・〇五九一四	〇・〇四四三六		
前 出 剔	九月二十四日	一八〇	一〇二六	〇・〇一二四〇	〇・〇五四五二	〇・〇四二一二	四四・二一%	(甲状腺剔出九月二十九日) 體重二・二四〇蚝、安息香酸曹達液一一・二蚝
	九月二十五日	二〇〇	一〇二三	〇・〇一一三八	〇・〇五三六八	〇・〇四二三〇		
	九月二十六日	一七二	一〇二八	〇・〇二六七八	〇・〇二三六〇七	〇・〇二〇九二九		
	九月二十七日	二〇九	一〇二四	〇・〇一三五九	〇・〇五〇九七	〇・〇三三四〇		

馬尿酸形成ニ及ボス甲状腺ノ影響……(小屋迫)

第八表
(第十六號家兔)

後 出 剔	前 出 剔	剔 出 前	日 時	尿 量 (匁)	比 重	遊 離 安 息 香 酸	全 安 息 香 酸	結 合 安 息 香 酸	合 成 率	備 考
十月十一日	十月八日	九月二十四日	二三五	一〇二二	〇・〇一三三七	〇・〇六五九四	〇・〇五二二三	〇・〇四〇二六		
十月十日	十月九日	九月二十五日	一九五	一〇三〇	〇・〇二六七五	〇・二四六九三	〇・〇六〇九〇	〇・〇四九〇六	五四・九四%	體重二・一〇匁、安息香酸曹達液一・〇四匁注射
十月十日	十月九日	九月二十六日	一八五	一〇二五	〇・〇二二五七	〇・二五二七八	〇・二五二七八	〇・二三〇二一		體重二・一〇匁、安息香酸曹達液一・〇四匁注射
十月十一日	十月八日	九月二十七日	二〇一	一〇二四	〇・〇一三〇七	〇・〇五三九四	〇・〇五三九四	〇・〇三九八七		(甲)狀腺剔出九月二十九日

第九表
(第十七號家兔)

剔出後		剔出前		日 時	尿量(蚝)	比 重	遊離安息香酸	全安息香酸	結合安息香酸	合 成 率	備 考
十月八日	十月九日	十月十日	十月十一日	九月二十四日	九月二十五日	九月二十六日	九月二十七日				
二四五	一四〇	二二五	二六四	九三	二五〇	一七六	二一五				
一〇二〇	一〇三六	一〇二二	一〇二〇	一〇六〇	一〇二三	一〇二九	一〇二五				
〇・〇一三九四	〇・〇一一〇九八	〇・〇二一九九	〇・〇一五〇三	〇・〇一一〇九八	〇・〇一一二一〇	〇・〇二二九〇	〇・〇一五七三				
〇・〇五二八〇	〇・〇五一二四	〇・〇二〇三三	〇・〇六四四一	〇・〇三六六〇	〇・〇四一七二	〇・〇二二三三二	〇・〇五二四六				
〇・〇三八八六	〇・〇四〇二六	〇・一八二一四	〇・〇四九三八	〇・〇二五六二	〇・〇二九六二	〇・〇二〇四二	〇・〇三六七三				
(甲狀腺剔出九月二十九日)						五三・八八%					
體重二・一七〇疋、安息香酸曹達液一〇・六蚝注射						體重二・〇三〇疋、安息香酸曹達液一〇蚝注射					

本實驗ニ於テハ甲狀腺剔出ノ馬尿酸合成作用ニ及ボス影響ヲ知ラント欲シ、先ヅ甲狀腺剔出前三五・七%安息香酸曹達液ヲ家兎體重毎疋五耗ヲ午前十時及ビ午後三時ノ二回ニ分チテ皮下ニ投與シテ馬尿酸排泄狀況ヲ確メテ後、甲狀腺ノ剔出ヲ行ヒ剔出後約十日目位ニ同様ノ安息香酸附加試驗ヲ行ヒ、甲狀腺剔出前後ニ於ケル馬尿酸排泄狀態ヲ比較觀察セリ。

成績ハ第六、七、八及ビ九表ニ示ス如シ。先ヅ第十三號家兎(第六表)ニ就テ觀ルニ、甲狀腺剔出前ニ於ケル馬尿酸合成率ハ六一・九七%ナルモ、甲狀腺剔出後ハ五七・〇五%ニシテ馬尿酸合成率ハ稍々減少ヲ示ス。更ニ第十四號家兎(第七表)ニ於テハ剔出前ノ馬尿酸合成率ハ五四・九九%ニシテ、甲狀腺剔出後ハ四四・二一%ヲ示シ、明カニ甲狀腺剔分後ハ合成率ハ低下セリ。第十七號家兎(第九表)ニ於テモ前ノ二例ト同様甲狀腺剔出後合成率減少セリ。只第十六號家兎(第八表)ニ於テハ甲狀腺剔出前ノ合成率五四・九四%、剔出後五五・一二%ニシテ兩者ニ大差ヲ認ムルヲ得ザリキ。

以上ノ如ク余ノ甲狀腺剔出ノ馬尿酸合成ニ及ボス影響ヲ檢シタル安息香酸附加試驗ニ於テハ、四例中一例ニ於テハ變化ヲ認メ得ザリシモ、他ノ三例ニ於テハ甲狀腺剔出ハ馬尿酸ノ合成率ヲ低下セシメルコトヲ示セリ。

第五章 總括並ニ結論

叙上余ハ家兎ニ就テ甲狀腺粉末投與及ビ甲狀腺剔出ガ馬尿酸合成ニ及ボス影響ヲ檢シテ、家兎ニ甲狀腺粉末ヲ投與スレバ馬尿酸合成ハ多クナリ、甲狀腺ヲ剔出スレバ馬尿酸合成率ノ減退スルコトヲ認メタリ。

馬尿酸形成ニ及ボス甲狀腺ノ影響……(小屋迫)

既ニ緒論ニ述ベシ所ノ如ク、中毒性物質タル安息香酸ガ體內ニ移入セラレテ、グリココルト結合シテ無害ナル馬尿酸トナリテ尿中ニ排泄セラル、コトハ、生體ノ一種ノ防衛作用ト認メ得ラル。抑モ甲狀腺ハ組織細胞ニ作用シテ一般新陳代謝ヲ高メルモノナレバ、甲狀腺ヲ投與セル際生體ノ解毒作用ガ旺盛トナリ、反對ニ甲狀腺ヲ剔出セル際本解毒作用ガ減退スルコトハ容易ニ理解シ得ラルコトナルベシ。

以上述ベシ所ヨリ次ノ如ク結論ス。

- 一、家兎ニ甲狀腺粉末ヲ投與スレバ馬尿酸ノ合成ハ増加ス。
- 二、家兎ノ甲狀腺ヲ剔出スレバ馬尿酸ノ合成ハ減退ス。

終ニ臨ミ、本研究ヲ命ゼラレ終始御懇篤ナル御指導ヲ賜ハリタル恩師辻教授ニ謹ミテ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

出 要 文 献

- 1) Baumann: Zeitschr. f. Physiol. Chemie. Bd. 10, 131.
- 2) Folin u. Flanders: Journ. of biol. chem. Vol. 11, 1912.
- 3) Friedmann u. Tachau: Biochem. Zeitschr., Bl. 55, 1911.
- 4) 岩城: 北越醫學會雜誌, 第40年, 892頁.
- 5) Jaarsveld u. Stokvis: Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol., Bd. 19, 1878.
- 6) Kingsbury u. Swanson: J. of biol. chem., Vol. 46, 1921. Journ. of biol. chem. Vol. 48, 1921.
- 7) Lackner u. Levinson u. Morse: Biochem. Journ., Bd. 12, 1918.
- 8) Meissner u. Shepard: Zit nach Lehrbuch d. physiol. Chem. von Hammarsten, 1922.
- 9) Raiziss u. Dubin: J. of biol. chem., Vol. 20, 1915.
- 10) Salkowski: Z. n. Lehrbuch d. physiol. Chem. von Hammarsten, 1922.
- 11) Schmiedeberg u. Bunge: Arch. f. exp. pathol. u. Pharmacol., Bd. 6, 1877.
- 12) Salomon u. Salkowski: Zeitschr., f. Physiol. chem., Bd. 3, 1879.
- 13) 佐方: 大阪醫學會雜誌, 第28卷, 189頁.
- 14) Von de Volde and Stok vis: Arch. f. exp. Patholog u Pharmacol., Bd. 17, 1883.

b) Die Gesamt-N- und die Gesamt-S-ausscheidung im Harn waren vermindert und die letztere etwas stärker als die erstere, wodurch der Quotient N/S Zunahme zeigte.

c) Die Aetherschweifelsäure war relativ am deutlichsten vermindert, nächst stark der neutrale Schwefel und am wenigsten die anorganische Schwefelsäure.

2. Einfluss des Ovarialparenchyms.

a) Das Körpergewicht neigte bei den dauernd mit Ovarialparenchym gefütterten Tieren zur Verminderung, während die Harnmenge keine Veränderung aufwies.

b) Die Gesamt-N- und die Gesamt-S-ausscheidung im Harn hatten leichtgradig zugenommen, und zwar die letztere etwas stärker als die erstere.

c) Nach der Unterbrechung der Fütterung mit Ovarialparenchym nahm die Gesamt-S-ausscheidung schneller als die Gesamt-N-ausscheidung ab.

d) Der neutrale Schwefel war relativ am stärksten vermehrt, nächst stark die Aetherschweifelsäure und am wenigsten die anorganische Schwefelsäure. (Autoreferat)

Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Hippursäuresynthese.

Von

Dr. T. Koyasako.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universitaet zu Kyoto, Japan
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji)

Um den Einfluss der Schilddrüse auf die Hippursäuresynthese festzustellen, hat der Verfasser Versuche an Kaninchen angestellt.

Die Hippursäurebestimmung wurde nach Folin-Flanders, Kingsbury-Swanson u. Raiziss-Dubin ausgeführt.

Die Resultate waren die folgenden:—

1) Bei der Darreichung von Schilddrüsenpulver nimmt die

Ausscheidung der Hippursäure im Harn zu.

2) Bei der Exstirpation der Schilddrüse nimmt die Ausscheidung der Hippursäure im Harn ab. (Autoreferat)

Ueber den Einfluss von Insulin und Adrenalin auf die Hippursäuresynthese.

Von

Dr. T. Koyasako.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universitaet zu Kyoto, Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Um den Einfluss von Insulin und Adrenalin auf die Hippursäuresynthese festzustellen, hat der Verfasser Versuche an Kaninchen angestellt.

Die Hippursäurebestimmung wurde nach Folin-Flanders, Kingsbury-Swanson u. Raiziss-Dubin ausgeführt.

Die Resultate waren die folgenden:—

1) Die Einspritzung von Insulin entfaltet keine Wirkung auf die Ausscheidung der Hippursäure.

2) Sowohl die Injektion von Glukose allein als auch die gleichzeitige Injektion von Insulin und Glukose steigert die Ausscheidung der Hippursäure, und zwar ist die Ausscheidung der Hippursäure bei der Injektion von Insulin und Glukose stärker als bei der Injektion von Glukose allein.

3) Bei der Benzoessäureinjektion wirkt das Insulin auf die Hippursäuresynthese fördernd.

4) Bei der Benzoessäureinjektion wirkt das Adrenalin auf die Hippursäuresynthese hemmend. (Autoreferat)

Druckfehlerberichtigung:

Band VI, Heft X. (1931), Seite 78, Zeile 16 von oben muss es statt „Vagusendigung“ „Sympathicusendigung“ und Zeile 17 statt „Sympathicusendigung“ „Vagusendigung“ heissen.