諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ

第二篇 卵巢剔除、全卵巢、黃體並ビニ間質試食ノ影響

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 水 口 半 吉

目 次

第一章 緒 言	第三節 卵巢黃體試食家兎ノ血色素抵抗
第二章 實驗方法	第四節 卵巢間質試食家兎ノ血色素抵抗
第三章 實驗成績	第四章 總 括
第一節 卵巢剔除家兎ノ血色素抵抗	第五章 結 論
第二節 全卵巢試食家兎ノ血色素抵抗	

第一章 緒 言

余ハ前篇ニ於テ甲狀腺並ビニ脾臓ノ血色素抵抗ニ對スル影響ニ就テ實驗的研究ヲ報告セルヲ以テ、今回更ニ生殖腺ノ血色素抵抗ニ對スル影響ニ就テ同様ノ實驗ヲナシ、茲ニ其ノ結果ヲ報告セントス。血液像乃至造血臟器ト生殖腺殊ニ卵巢トノ關係ニ就キテハ諸家ノ業績甚ダ多ク枚舉ニ遑アラザルモ生殖腺ト血色素抵抗トノ關係ニ就キテハ余ノ寡聞ナル殆ンド之レヲ見ズ、僅ニ Gr. Braunn u. H. Bischoff ノ業績アルノミ、而カモ兩氏ハ單ニ男性白鼠ノ去勢時ニ於ケ

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

ル血色素抵抗ヲ檢索セルノミナレバ甚ダ寥々タルノ感アリ、茲ニ於テ余ハ卵巢ト血色素抵抗ニ就キ次ノ實驗ヲ試ミタリ。

卵巢ト新陳代謝トノ關係ニ就テハ諸種ノ方面ヨリ檢索セラレタリ即チ蛋白、脂肪、含水炭素、無機鹽類、瓦斯代謝等ニ就テハ既ニ幾多先進諸家ニヨリ實驗業績發表セラレタルニ拘ラズ卵巢ノ内分泌機能ノ本態ニ關シテハ猶種々ノ疑問殘サレタリ。

從來ノ業績ヲ綜合考察スルニ、卵巢ニハ黃體及ビ黃體ヲ除去シタル他ノ部分トニ大別シテ二種ノホルモン作用存在シ、此ノ兩者ハ互ニ相異ナレル作用ヲ有スルコトヲ窺知シ得ベク即チ一般新陳代謝並ビニ酸化機轉ノ消長ニ關シテ此ノ兩者ニ就キ比較研究シタル業績ノ多クハ卵巢黃體ト黃體ヲ除去シタル他ノ部分即チ卵巢間質及ビ濾胞水トノ諸種物質代謝ニ及ボス影響ガ互ニ相拮抗的ニ作用スルコトニ一致セルヲ見ル。依ツテ余ハ黃體並ビニ間質ノ投與ヲ行ヒ更ニ完壁ヲ期センガ爲卵巢剔出或ハ全卵巢物質試食ヲ行ヒ血色素抵抗ヲ測定セリ。

第二章 實驗 方法

實驗動物。體重二疋内外ノ成熟セル妊娠セザル雌性家兔ヲ用ヒタリ。

試食物質。教室製牛全卵巢粉末、パークデビス製乾燥黃體並ビ同製無黃體間質物質ヲ用ヒタリ。

家兔ヲ一定ノ食餌ヲ以テ養ヒ兩側卵巢ヲ剔出シ、或ハ全卵巢物質ヲ一日量體重一疋ニ付〇・三瓦ヲ、バ社製黃體並ビニ間質ハ一日量體重一疋ニ付〇・〇六五瓦ヲ經口的ニ投與シ、略一週毎ニ血色素抵抗ヲ測定セリ。血色素抵抗ノ測

定ニハ von Krüger ノ方法ヲ用ヒタリ。

第三章 實驗 成績

第一節 卵巢剔出家兎ノ血色素抵抗

第一表 卵巢剔出家兎ノ血色素抵抗

家兎 番號	月日	室温	體 重 (瓦)	血色 素量	1/10 定規苛 性曹達液	1/10 定規 醋酸液	備 考
I	24/V	20°	1950	85	14'37"	8'27"	} 前試驗
	3/VI	22°	1970	76	14'41"	8'07"	
			平 均		14'39"	8'17"	
	5/VI		本日卵巢剔出				剔出後
	12/VI	23°	1950	85	13'32"	7'29"	7日目
	19/VI	23°	2020	85	13'51"	7'55"	14日目
	26/VI	23°	2030	92	14'05"	8'17"	21日目
	3/VII	25°	2070	85	14'21"	7'53"	28日目
	10/VII	25°	2050	86	14'07"	8'09"	35日目
II	7/VI	23°	1780	82	14'12"	7'18"	} 前試驗
	15/VI	23°	1710	78	13'24"	7'33"	
			平 均		13'48"	7'25"	
	15/VI		本日卵巢剔出				剔出後
	21/VI	23°	1770	68	12'39"	6'37"	6日目
	28/VI	23°	1800	73	13'47"	7'48"	13日目
	4/VII	23°	1850	75	14'52"	6'19"	19日目
	10/VII	25°	1830	75	14'02"	7'52"	25日目
	17/VII	25°	1850	75	14'08"	7'37"	32日目
III	20/V	18°	1790	85	15'31"	8'07"	} 前試驗
	3/VI	22°	1750	90	15'43"	7'51"	
			平 均		15'37"	7'59"	
	5/VI	23°	本日卵巢剔出				
	12/VI	23°	1730	78	14'21"	7'23"	7日目
	19/VI	23°	1800	85	14'28"	7'33"	14日目
	26/VI	23°	1810	84	11'01"	7'21"	21日目
	3/VII	24°	1800	85	12'52"	7'19"	28日目
	10/VII	24°	1820	85	13'32"	8'20"	35日目
	17/VII	23°	1800	85	14'51"	8'43"	42日目
IV	5/VI	24°	1820	90	14'48"	8'18"	} 前試驗
	12/VI	23°	1800	82	14'08"	7'51"	
			平 均		14'26"	8'05"	
	15/VI		本日卵巢剔出				
	21/VI	23°	1850	80	13'38"	7'23"	6日目
	28/VI	23°	1820	80	12'28"	8'29"	13日目
	4/VII	24°	1820	88	14'01"	8'27"	20日目

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影影ニ就テ……(水口)

家兔 番號	月日	室温	體 重 (瓦)	血色素 量	規定性 曹達液	規定性 醋酸液	備 考
	10/VII	24°	1850	81	13'27"	8'20"	26日目
	17/VII	24°	1850	84	13'56"	8'17"	33日目
V	6/VI	23°	2070	85	14'42"	8'12"	} 前試驗
	5/VI	23°	2050	83	14'30"	8'51"	
	15/VI		平均 本日卵巢剔出				
	21/VI	23°	2000	78	14'31"	7'42"	6日目
	28/VI	23°	2070	75	14'22"	8'08"	13日目
	4/VI	24°	2160	87	14'11"	8'33"	20日目
	10/VI	24°	2100	85	14'28"	8'29"	26日目
	17/VI	24°	2130	85	14'37"	8'07"	33日目

兩側卵巢剔出後四週間乃至七週間ヲ經過セル家兔ニ就キテ見ルニ一般ニ體重ノ増加ヲ見ル、之レニ就キテハ King u. John ハ去勢ニヨリテ精神活動減退シ筋運動緩慢トナレル爲ナリトセルモ、彼ノ月經閉止期ノ婦人又ハ卵巢切除セル婦人ニアリテハ屢々著明ナル肥滿ヲ來シ且ツ一般新陳代謝ノ低下ヲ見又動物實驗ニ於テモ去勢ニヨリ體重増加シ新陳代謝ノ低下ヲ來スコトハ Korenchewsky, W. Arlt, I. Vignes, Masui u. Tamura 等ノ文献ニヨルモ又當教室青木、千野等ノ成績ニヨルモ明ニコノ體重増加ハ新陳代謝ノ低減ニ歸スルヲ至當トスベシ。

血色素抵抗ハ五例ノ中一例ノミハ殆ンド變化ヲ見ザルモ他ノ四例ニ於テハ六日―七日目ヨリ既ニ著明ナル減少ヲ示シ第三週ノ終ニ於テ次第ニ正常値ニ復歸セントスル傾向ヲ見ルモ第三例ノ如キハ第四週ノ終ニ於テモ尙抵抗ノ減弱ヲ示ス。

第二節 全卵巢物質試食家兔ノ血色素抵抗

新鮮ナル牛乾燥全卵巢ヲ家兔體重一疋ニ就キ〇・三瓦ヲ一日一回經口的ニ投與シ其血色素抵抗ヲ測定セルニ第二表ニ示セルガ如シ。

第二表 全卵巢試食家兎ニ於ケル血色素抵抗

家兎 番號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色素 量	規定荷 重達液	規定 醋酸液	備 考
I	24/V	20°	1830	87	14'33"	8'29"	} 前試験
	3/VI	22°	1800	86	14'50"	8'36"	
			平 均		14'41"	8'33"	
	4/VI		本日ヨリ全卵巢試食				試食後
	11/VI	23°	1800	85	14'39"	8'41"	7日目
	18/VI	23°	1820	88	14'57"	8'32"	14日目
	25/VI	23°	1790	87	14'21"	8'43"	21日目
	25/VII		本日ヨリ試食中止				中止後
	2/VII	24°	1800	85	14'30"	8'37"	7日目
	9/VII	25°	1810	85	14'50"	8'42"	14日目
II	24/V	20°	1950	78	15'32"	7'33"	} 前試験
	3/VI	22°	1900	80	14'48"	7'26"	
			平 均		14'40"	7'29"	
	4/VI		本日ヨリ全卵巢試食				試食後
	11/VI	23°	1900	77	14'51"	7'51"	7日目
	18/VI	23°	1830	77	15'27"	7'47"	14日目
	25/VI	33°	1940	79	15'35"	7'53"	21日目
	25/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	2/VII	24°	1900	77	15'08"	7'07"	7日目
	9/VII	15°	1930	78	14'42"	7'35"	14日目
III	24/V	20°	1750	80	13'19"	8'00"	} 前試験
	3/VI	22°	1730	82	13'40"	8'27"	
			平 均		13'30"	8'13"	
	4/VI		本日ヨリ全卵巢試食				試食後
	11/VI	23°	1770	80	13'59"	8'23"	7日目
	18/VI	23°	1750	81	13'52"	8'36"	14日目
	25/VI	23°	1750	80	14'48"	8'40"	21日目
	25/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	2/VI	24°	1770	83	14'08"	8'42"	7日目
	9/VI	25°	1760	80	14'21"	8'41"	14日目
IV	23/V	20°	1900	87	13'27"	8'05"	} 前試験
	1/VI	21°	1920	80	13'56"	8'13"	
			平 均		13'42"	8'09"	
	1/VI		本日ヨリ全卵巢試食				試食後
	8/VI	22°	1910	82	14'30"	8'17"	7日目

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

家 番 號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色素量	規定性 苛達液	規定性 醋酸液	備 考
	15/VI	22°	1950	82	14'57"	8'06"	14日目
	22/VI	33°	1930	85	14'42"	8'25"	21日目
	22/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	29/VI	23°	1900	83	14'39"	8'19"	7日目
	6/VII	24°	1950	82	14'46"	8'22"	14日目
V	23/V	20°	2050	81	14'01"	8'27"	前試験
	1/VI	21°	2080	85	14'37"	8'39"	
			平均		14'19"	8'33"	
	1/VI		本日ヨリ全卵巣試食				試食後
	8/VI	22°	2100	87	14'51"	8'21"	7日目
	15/VI	22°	2070	85	15'33"	8'45"	14日目
	22/VI	23°	2070	86	15'01"	8'51"	21日目
	22/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	39/VI	23°	2080	85	15'03"	8'49"	7日目
	6/VII	24°	2080	89	15'08"	8'28"	14日目

體重ノ増減ハ著變ヲ認メズ、血色素量ハ僅ニ増加セルガ如キモ誤差範圍内ニ入ルベキ程度ニ過ギズ。血色素抵抗ハ一般ニ稍々増強セルモ其度輕度ニシテ第一例ノ如キハ著變ナシ。第二例乃至第五例ハ増加ノ傾向ヲ示ス。

第三節 卵巢黃體試食家兎ノ血色素抵抗

パークデビス製卵巢黃體ヲ體重一疋ニ就キ一日一回〇・〇六五瓦ヲ投與シ經過ヲ追ヒテ二十一日乃至三十五日ニ至ル血色素抵抗ニ就キ觀察セルニ第三表ニ示セルガ如シ。體重並ビニ血色素量ハ著變ヲ認メズ。血色素抵抗ハ卵巢剔出ノ場合ニ見ル如ク減弱ヲ示スモ此レト異ナリ試食日數ノ増加ト共ニ次第ニ其ノ減弱ノ度ヲ増ス如キ傾向ヲ認ム本傾向ハ酸ニ對シテ又アルカリニ對シテモ同様ニ表ハル。試食中止後モ尙直チニ舊態ニ復歸セザルモ次第ニ正常ニ近カラントスルヲ認ム。

第三表 卵巣黃體試食家兔ノ血色素抵抗

家兔 番號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色素 量	規定 性書達液	規定 醋酸液	備 考
I	15/V	18°	1700	88	16'12"	8'11"	} 前試驗
	22/V	21°	1710	82	15'49"	8'18"	
			平 均		16'01"	8'15"	
	22/V		本日ヨリ黃體試食				試食後
	29/V	20°	1800	85	15'22"	8'12"	7日目
	5/VI	23°	1820	92	13'12"	7'18"	14日目
	12/VI	23°	1830	78	15'33"	8'17"	21日目
	19/VI	23°	1700	78	14'30"	8'03"	28日目
	26/VI	23°	1670	74	14'02"	8'04"	35日目
	26/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	4/VII	23°	1720	75	15'41"	8'13"	8日目
	11/VII	23°	1770	73	15'08"	8'08"	15日目
II	20/V	18°	1760	88	15'21"	8'32"	} 前試驗
	3/VI	22°	1730	72	15'08"	8'25"	
			平 均		15'15"	8'28"	
	3/VI		本日ヨリ黃體試食				試食後
	10/VI	24°	1730	75	13'22"	7'10"	7日目
	17/VI	23°	1720	78	14'41"	6'03"	14日目
	24/VI	23°	1700	68	13'20"	7'03"	21日目
	3/VII	24°	1730	78	13'05"	6'48"	30日目
	3/VII		本日ヨリ試食中止				中止後
	10/VII	24°	1700	72	13'59"	7'41"	7日目
	17/VII	24°	1700	75	14'24"	8'09"	14日目
III	20/V	18°	1750	70	10'48"	8'39"	} 前試驗
	3/VI	22°	1570	75	11'21"	8'03"	
			平 均		11'14"	8'21"	
	3/VI	24°	本日ヨリ黃體試食				試食後
	10/VI	23°	1660	70	8'59"	6'59"	7日目
	17/VI	23°	1690	78	8'21"	6'02"	14日目
	24/VI	24°	1720	74	8'02"	6'00"	21日目
	24/VI		本日ヨリ黃體中止				中止後
	3/VII	24°	1650	85	9'47"	7'51"	7日目
	10/VII	24°	1700	74	9'53"	8'07"	14日目
	20/V	18°	1800	78	15'42"	8'41"	} 前試驗
	3/VI	22°	1750	73	14'28"	7'48"	

如シ。

家兔 番號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色 素量	規定規 性曹達液	規定規 醋酸液	備 考
IV			平 均		15'05"	8'15"	
	3/VI		本日ヨリ黃體試食				試食後
	10/VI	24°	1740	72	14'00"	7'31"	7日目
	17/VI	23°	1780	78	12'23"	7'02"	14日目
	24/VI	23°	1770	78	13'00"	7'00"	21日目
	24/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	3/VII	23°	1730	75	13'51"	7'05"	9日目
	10/VII	24°	1760	77	14'45"	7'43"	16日目
V	20/V	18°	1780	68	13'33"	8'17"	} 前試驗
	3/VI	22°	1700	68	13'51"	8'09"	
			平 均		13'42"	8'13"	
	3/VI		本日ヨリ黃體試食				試食後
	10/VI	24°	1720	71	12'20"	7'43"	7日目
	17/VI	23°	1630	75	11'47"	7'32"	14日目
	24/VI	23°	1670	71	11'30"	7'17"	21日目
	24/VI		本日ヨリ試食中止				中止後
	3/VII	23°	1630	72	12'48"	7'31"	9日目
	10/VII	24°	1670	71	13'07"	7'51"	16日目

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

第四節 卵巢間質試食家兔ノ

血色素抵抗

卵巢黃體ヲ除去セル他ノ卵巢實質(間質)製劑ナル
 バークデビス製乾燥卵巢間質ヲ一日一回體重一匁
 ニ就キ○・〇六五瓦ノ劑ニ試食セシメ、血色素抵抗ヲ
 觀察セルニ第四表ニ示セルガ如シ。體重ニ就キテハ
 増加セルモノ三例、減少セルモノ二例ニテ一定セル
 傾向ヲ認めザリキ。血色素量モ亦増加減少略相半バ
 スルヲ以テ之レガ増減ヲ推斷スルヲ許サズ。血色素
 抵抗ニ於テハ第四例ノ如ク僅ニ減弱セルモノアルモ
 一般ニ増強シ特ニ第三例ノ如キハ顯著ナル増強ヲ示
 ス。酸並ビニアルカリニ對スル抵抗ノ傾向ハアルカ
 リニ於ケルモノハ酸ニオケルヨリモ稍々著明ナルガ

第四表 卵巢間質試食家兎ノ血色素抵抗

家兎 番號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色素量	↓定規苛 性曹達液	↓定規 醋酸液	備 考
I	8/XI	18°	1900	75	15'48"	8'35"	} 前試驗
	29/XI	20°	1890	70	16'13"	8'33"	
			平 均		16'01"	8'34"	
	29/XI		本日ヨリ間質試食				試食後
	6/XII	19°	1930	75	16'27"	8'51"	7日目
	13/XII	21°	1920	78	16'35"	9'32"	14日目
	20/XII	21°	1950	67	17'09"	10'07"	21日目
	20/XII		本日ヨリ試食中止				中止後
	27/XII	21°	1830	72	16'21"	9'23"	7日目
	8/I	21°	1850	75	16'10"	8'17"	10日目
II	13/XI	17°	1870	75	15'58"	7'25"	} 前試驗
	27/XI	19°	1820	78	15'49"	7'48"	
			平 均		15'53"	7'37"	
	27/XI		本日ヨリ間質試食				試食後
	4/XII	20°	1850	81	16'07"	7'35"	7日目
	11/XII	20°	1860	83	16'53"	7'50"	14日目
	18/XII	19°	1870	82	18'11"	8'46"	21日目
	24/XII	20°	1890	83	17'53"	8'33"	27日目
	24/XII		本日ヨリ試食中止				中止後
	30/XII	21°	1930	77	17'08"	7'51"	6日目
	13/I	21°	1950	85	16'33"	7'37"	20日目
III	18/XI	18°	1960	73	17'24"	8'57"	} 前試驗
	27/XI	19°	1780	63	16'34"	8'26"	
			平 均		16'59"		
	27/XI		本日ヨリ間質試食				試食後
	4/XI	20°	1680	65	18'48"	8'59"	7日目
	11/XII	20°	1670	68	19'39"	9'43"	14日目
	18/XII	19°	1630	65	19'47"	11'30"	21日目
	18/XII		本日ヨリ試食中止				中止後
	24/XII	20°	1690	67	17'20"	9'21"	6日目
	31/XII	20°	1650	67	17'38"	8'07"	13日目
	8/XI	18°	2130	77	14'21"	8'32"	} 前試驗
	29/XI	20°	2050	79	14'01"	8'10"	
	29/XI		平 均 本日ヨリ間質試食		14'11"	8'21"	試食後

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

第四章 總括

余ハ雌性家兎ヲ用ヒ卵巢ト血色素抵抗トノ關係ヲ知ラントシテ先ヅ兩側全卵巢ノ剔出ヲ行ヒ、次ニ全卵巢粉末ノ試食、黃體ノ試食、間質ノ試食等ヲ行ヒ經過ヲ追ヒテ其ノ血色素抵抗ヲ測定セル所ヲ概括センニ全卵巢剔出セル場合ハ血色素抵抗ハ一般ニ減弱ヲ示シ全卵巢試食ヲ行ヘル場合ハ概シテ輕度ニ血色素抵抗ノ增強ヲ認メ黃體試食ノ場合ハ卵巢剔出ニ於ケルガ如ク血色素抵抗ハ減弱ヲ示スモ其ノ度稍々強く、間質試食ノ場合ニ於テハ全卵巢試食ニ於ケル如ク增強ヲ示ス、其ノ程度ノ差ハ甚ダ少ナキモ間質試食ノ場合ハ全卵巢試食ノ場合ヨリモ稍強キガ如シ。

卵巢機能ノ研究ニ就キテハ汗牛充棟モ尙足ラザルガ如キ幾多ノ業績發表セラレタルモ今尙疑問トシテ殘サレタル所

甚ダ多ク我教室ニ於テモ夙ニ辻教授ノ命ニヨリ幾多諸先輩ノ研究業績發表セラレ斯界ニ貢獻シツ、アリ。今卵巢ト血色素抵抗トノ關係ニ就キテ考察スルニ當リ先ヅ卵巢ト一般新陳代謝ニ就キ、次ニ卵巢ト甲狀腺トノ關係ニ就キ從來ノ

家兎番號	月 日	室温	體 重 (瓦)	血色素量	規定性曹達液	規定性醋酸液	備 考
IV	6/XII	19°	2100	75	14'53"	8'46"	7日目
	13/XII	21°	2030	79	14'07"	8'52"	14日目
	20/XII	21°	2120	79	13'42"	8'42"	21日目
	20/XII		本日ヨリ試食中止				中止後
	27/XII	21°	1980	78	14'41"	8'31"	7日目
	8/I	21°	2070	79	14'37"	8'40"	19日目
V	18/XI	17°	1750	82	15'23"	8'13"	} 前試験
	27/XI	19°	1730	79	14'40"	8'41"	
			平均		15'02"	8'27"	
	27/XI		本日ヨリ間質試食				試食後
	4/XII	20°	1750	81	15'39"	8'18"	7日目
	11/XII	20°	1780	80	16'20"	9'25"	14日目
	18/XII	19°	1760	80	17'37"	9'09"	21日目
	18/XII		本日ヨリ試食中止				中止後
	24/XII	20°	1770	81	15'22"	8'40"	6日目
	31/XII	20°	1770	78	15'45"	8'37"	13日目

文献ヲ温ネンニ Löwy u. Richter, Löwy u. Kammer, Pachter, Rapiel, Heymans, Tsubura, Liebesny, Kochmann u. Wagner, Heyer, Laquer, Hart u. de Jongh, Vignes, Zunn, Lipschütz 等ハ動物或ハ人間ニ於テ去勢後又ハ卵巢機能障礙時ニ瓦斯新陳代謝ノ低下ヲ證明シ、睾丸物質又ハ卵巢物質投與ニヨリ瓦斯新陳代謝ハ上昇スルコトヲ認め、反之 Lüthje, Bugbee u. Simond 等ハ瓦斯新陳代謝ハ正常ト大差ナシト報告セリ。

Korenschewsky ハ犬及ビ家兎ヲ用ヒ去勢後ノ窒素新陳代謝ヲ研究セルニ窒素新陳代謝ハ著明ニ低下シ此レニ卵巢又ハ睾丸エムルジオンヲ注射スレバ再び上昇ス、黃體ヲ正常犬又ハ去勢後ノ犬ニ投與スレバ窒素新陳代謝ヲ低下セシメ黃體ヲ除ケル他ノ卵巢實質ヲ投與スレバ窒素新陳代謝ノ亢進ヲ認ムト Loria モ亦之レニ贊シ當教室青木モ犬ニルテオグランドールヲ注射シ尿中窒素排泄ノ減少ヲ同小川ハ牝犬ニ卵巢黃體、卵巢實質ノ粉末試食及ビ之レガ食塩水エキスを注射シ重ネテ有黃體卵巢粉末ヲモ試食セシメ、尿中窒素代謝ノ消長ヲ檢セルニ、黃體エキスを注射ニテハ著變ナカリシモ粉末試食ニヨリテハ尿中窒素量ヲ減退セシメ、實質試食並ビニ食塩水エキスを注射共ニ尿中窒素量ノ増加ヲ來サシムルコトヲ知レリ。安田ハ去勢或ハ黃體物質投與ニヨリ臟器オキシダーゼ減少シ卵巢又ハ睾丸物質投與ニヨリ臟器オキシダーゼガ増加スルコトヲ知レリ。Bellow ハ無黃體卵巢物質ハ酸素消費量ヲ高メ、且ツ尿中窒素排泄ヲモ亢進セシメ、黃體ハ反對ニ之レヲ低下セシム。即チ基礎新陳代謝ハ黃體ノ存否ニヨリテ其ノ方向ヲ決定シ、黃體ナキモノハ之レヲ上昇セシメ黃體ノ存在ハ之レヲ下降セシムト。Abderhalden u. Brammeritz ハ蝌蚪ニテ實驗セルニ黃體物質ハ酸素消費量ヲ増加シ、間質細胞ハ何ラノ影響ヲモ有セザルコトヲ認メタリ。

Kylin ハ雌性家兎ニ濾胞水エキスを注射シテ血糖ヲ上昇セシメ黃體エキスをハ之レヲ下降セシムト、田谷ハ黃體ホル

諸種内分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

モンハアドレナリン過血糖ヲ催進シ、黃體ヲ除去セル他ノ卵巢物質ハアドレナリン過血糖ヲ抑制スト、織田ハ家兎ヲ用ヒインスリン、アドレナリンノ血糖作用ニ及ボス間質エキス及ビ黃體エキスノ作用ニ就キ檢セルニ間質エキスハアドレナリン過血糖ヲ増強セシメインスリン寡血糖ヲ抑制セシムルニ反シ、黃體エキスハアドレナリン過血糖ヲ抑制シインスリン寡血糖ヲ増強セシムルコトヲ知り明ニ田谷ノ説ト反對ノ結論ニ到達セリ。美間ハ黃體末試食ハヴァイタミンB缺乏犬ノ生存日數ヲ延長シ、體重、食慾、血糖ノ變化ヲ輕減セシメヴァイタミン缺乏症ニ對シ良好ノ影響ヲ與フルコトヲ知り黃體末試食ヴァイタミンB缺乏犬ニ於ケルインスリン血糖降下ハ症狀ノ進行ト共ニ増加シアドレナリン血糖上昇ハ反對ニ次第ニ減弱ス。間質試食ハ黃體末試食ニ反シ潛伏期、生存日數ノ短縮、體重、食慾ノ強度ノ減退ヲ來シ、血糖上昇度大トナル等病症ノ經過ニ惡影響ヲ與フルモノアリ、全卵巢試食ニ於テハ一定セル成績ヲ得ザリキ。千野、村尾ハ臟器糖原量ニ關シテ生殖腺ト他内分泌腺トノ種々ナル組合セニヨル變化ニ就キテ研究セルニ黃體並ビニ間質ハ拮抗的ニ作用スルコトヲ知レリ。

伊藤、和田、河野ハ去勢ニヨリ血中脂肪、類脂肪體量ノ増加スルヲ認メ、河野ハ更ニ卵巢實質投與ニヨリテ血中脂肪及ビ類脂肪ノ減少ヲ來シ黃體投與ニヨリテ増加ヲ來スコトヲ知り、大村ハヴァイタミンB缺乏食飼食動物ニテ卵巢又ハ睾丸剝出ハアウタミノーゼニヨリ臟器脂肪量ノ減少ヲ抑制シ睾丸末又ハ卵巢間質末投與ハ之レヲ促進シ、黃體末投與ハ之レヲ抑制スルコトヲ認メ、小出ハラノリン試食家兎ノ實驗的動脈硬變症ニ於テ睾丸末又ハ卵巢間質粉末ハ動脈硬變症ヲ抑制シ黃體末投與ハ之レヲ促進セシムルコトヲ確メタリ。田坂ハ黃體末ヲ健常犬ニ投與セルニ尿中總窒素量並ニ總硫黃量ノ排泄ニ向ツテ抑制的ニ作用シ、卵巢間質粉末投與ハソノ排泄ヲ亢進セシムルコトヲ認メ、小屋迫ハ馬

尿酸形成ニ及ボス生殖腺ノ影響ヲ檢シ、生殖腺剔出ニヨリテ馬尿酸形成ハ減退シ、睾丸末又ハ卵巢間質試食ニヨリテ増進シ黃體試食ニヨリテ減退スルコトヲ知り、龜井、佐々木ハ臟器還元グルタチオン量ヲ檢シ、卵巢剔出ニヨリテ肝腎、心、顎下腺皮膚等ニテ増加シ、卵巢間質試食ニヨリテ肝、腎ニハ減少シ黃體試食ニヨリテハ肝腎脾ニ於テ増加セリト。

其他、飯塚、佐々木ハ血液酸素解離曲線ニ就テ、龜井、前田ハ臟器組織呼吸ニ就テ田中ハ血中肝臟及ビ筋肉ラクトアチドゲンニ就テ西村、伊藤ハ血中カルチウム及ビカリウムニ就キ、村尾ハ血小板ニ就キ夫々生殖腺トノ關係ニ就キ檢索セル所ヲ總括考察センニ生殖腺物質並ビニ間質投與スレバ一般ニ新陳代謝ハ亢進シ去勢又ハ黃體物質投與ハ之レヲ低下セシムルガ如シ。

次ニ生殖腺ト甲状腺トノ關係ニ就キテハ Karentschewsky, Tandler u. Gross, Kund, Sand, Demel 等ハ去勢後甲状腺ノ萎縮又ハ重量ノ減少ヲ見 Ingelhorn, Kanewskaya, Furuya, Tsubura 中村、増井、大野等ハ却ツテ肥大、重量ノ増加ヲ見、Okutschitz ハ幼弱及ビ成熟家兎ニ於テ去勢スルト甲状腺ノコロイド蓄積ヲ招來シ、之レニ黃體エキスを注射スルモ何等ノ變化ナキニ反シ間質エキスを、全卵巢エキスを注射ハ去勢前即チ正常ノ甲状腺像ニ復歸セシムルヲ得タリ、Soll, 畑井、中田等ハ去勢ニヨリ甲状腺ノ重量ハ或ハ増加シ或ハ減少シテ一定ノ變化ヲミトメザリキ。井岡ハ家兎ニ黃體エキスを注射セルニ甲状腺ハ機能低下ノ像ヲ呈シ、卵巢エキスを注射セルニ甲状腺ハ機能亢進ノ像ヲ呈セリ、氏ハ黃體ハ甲状腺ニ作用シテ其ノ機能ヲ低下セシメ、間質ハ之レヲ促進セシムルモノニシテ兩者ハ甲状腺ニ對シテ互ヒニ相反スル作用ヲ有スト言ヘリ。岡林、井倉モ又之レニ賛セリ。安田ハ白鼠ニ就キ去勢セルニ甲状腺ハ一時代償的ニ

機能亢進ノ像ヲ呈スルモ時日ノ經過ト共ニ漸次機能低下ニ陥ルモノナリト。前田ハ去勢家兎ニ就キ酸素消費量ヲ檢セルニ去勢後二―三ヶ月ニシテ甲状腺ノ酸素消費量ハ増加スルヲ認メ Benazzi, Mario ハマウスノ卵巢ヲ剔出シ甲状腺ヲ組織學的ニ檢セルニ去勢後二―一八日ニテ著變ヲ示シ濾胞ハ大トナリコロイドハ増加シ上皮細胞ハ扁平トナリ、膠様甲状腺腫ノ像ヲ示スモ二五日ニ至レバ變化ハ顯著ナラズト。齋藤ハ生殖腺ノ甲状腺沃度含有量ニ及ボス影響ヲ險セルニ辜丸並ニ卵巢物質投與ハ甲状腺ノ重量及ビ沃度量ヲ減少セシメ、黃體物質試食ハ其ノ重量及ビ沃度量ヲ増加ス。鈴木ハ家兎ニ牛卵巢黃體粉未ヲ連日試食セシムルトキハ沃度代謝ハ一般ニ緩慢トナリ、投與沃度ハ尿中排泄ハ著明ニ遲延セラレ、其ノ排泄量ノ減少ヲミトムルモ甲状腺剔出家兎ニアリテハ黃體試食ノ影響ハ著明ナラズ、沃度排泄ノ狀態ハ正常時ト殆ンド變ルトコロナキヲ認メ、コレハ黃體ガ先ヅ甲状腺ニ働キテ之レガ機能低下ヲ招來シ延イテハ一般沃度代謝ニ抑制的ニ影響スルナラント思考セリ。上記ノ如ク去勢時ニ於ケル甲状腺ノ變化ニ就キテハ種々ノ說アリテ一定セザルモ此ハ恐ラク動物ノ種類、實驗時日ノ長短、季節個性差等ノ相違ニヨルモノナラン。

生殖腺ノ一般新陳代謝ニ及ボス影響ハ生殖腺ノ直接影響ニヨルモノナルカ將又生殖腺ト密接ナル關係ニアル甲状腺腦下垂體、胸腺等ノ變化ヨリ來ル第二次の作用ニヨルモスナルカニ就キテハ種々ノ議論アルモ上述ノ如ク Okinschitz 井岡、岡林、井倉、齋藤、鈴木等ノ實驗ニヨリ甲状腺機能ニ異常ヲ來スコトハ確實ナリ。

Korenschewsky 一派ハ生殖腺ト甲状腺トハ互ヒニ協同作用存シ去勢ニヨル酸化機能ノ低下ハ生殖腺剔出ニヨリテ惹起セラレタル甲状腺機能低下ノ間接影響ナリトシ、其ノ直接影響ヲ否定セントス。

翻ツテ余ノ本實驗ヲ考察センニ、黃體試食並ビニ卵巢剔出ニ於テハ、血色素抵抗ノ減弱ヲ示シ、間質並ビニ全卵巢

試食ニヨリテ增強セリ、此レ恐ラクハ甲狀腺ニ作用シ、甲狀腺ノ機能亢進或ハ低下ト相俟チテ血色素抵抗ニ増減ヲ見シモノナランカ、サキニ余ハ第一篇ニ於テ甲狀腺並ビニ脾臟ニ就キ、血色素抵抗ニ對スル影響ヲ觀察セルトコロト諸種文獻ニヨル黃體試食並ビニ卵巢剔出ハ酸化機轉ヲ減弱セシメ、間質並ビニ全卵巢試食ハ之レヲ增強セシメ、黃體試食卵巢剔出ハ甲狀腺機能ヲ低下セシメ、間質並ビニ全卵巢投與ハ之レヲ亢進セシムル事ト合セ考フレバ正ニ首肯シ得ルトコロナリ。

第五章 結 論

余ハ家兎ヲ用ヒ卵巢ト血色素抵抗トニ就キ檢索セルニ次ノ結論ニ到達セリ。

- 一、卵巢剔出ニヨリ血色素抵抗ノ減弱ヲ來ス。
- 二、全卵巢粉末試食ニヨリ血色素抵抗ノ増減ヲ來ス。
- 三、卵巢黃體試食ニヨリ血色素抵抗ノ減弱ヲ示ス。
- 四、卵巢間質試食ニヨリ血色素抵抗ノ增強ヲ示ス。
- 五、血色素抵抗ニ關シ黃體並ビニ間質ハ互ヒニ拮抗的關係ニ立ツ。

摺筆ニ臨ミ御懇篤ナル御指導ト御校閱ノ勞ヲ賜リタル恩師辻教授並ニ滿大松岡教授ニ深甚ノ謝意ヲ表ス。
附記、本實驗ノ大要ハ第四回日本內分泌學會席上ニテ發表セリ。

諸種內分泌腺ノ血色素抵抗ニ及ボス影響ニ就テ……(水口)

出 版 次 献

- 1) 水口：日本内分泌學會雜誌，第7卷，第8號，1148頁。 2) King u. John：Zit. nach Berichte u. d. ges. Physiol u. exp. Pharm. Bd. 39, 1927. 3) Korenchewsky：Zit. nach Berichte über ges. Physiol. u. exp. Pharm. Bd. 31, 33, 1925. 4) Korenchewsky：Biochem. Journ. Vol. XIX, 1925. 5) Korenchewsky：Zeits. f. exp. Path. u. Therap. Bd. 16, 1914. 6) Orita：Arch. f. Gynak. Bd. 123, 1924. 7) G. Brann u. H. Bischoff：Zeits. f. Immunitäts-Forschung und exp. Therapie, Bd. 49, Heft 112, S. 50, 1927. 8) Krüger u. Gerlach：Zeits. f. d. Ges. exp. Med. Bd. 53, S. 233, 1926. 9) 千野：日本内分泌學會雜誌，第5卷，第11號，2043頁。 10) Masui u. Tamura：Brit. Journ. of exp. Biol. Bd. 3, 1926. 11) 青木：日本内分泌學會雜誌，第3卷，第6號，1591頁。 12) Löwy u. Richter：Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 174, 1399. 13) Tsubura：Biochem. Zeits. Bd. 143, S. 248, 1923. 14) Löwy u. Kammerer：Berl. kl. Wochens. Jg. 41, 1916. 15) Liebesny：Biochem. Zeits. 144, S. 308, 1924. 16) 小川：日本内分泌學會雜誌，第5卷，第12號，2122頁。 17) 安田：日本内分泌學會雜誌，第3卷，第6號，1454頁。 18) 井倉：日本内分泌學會雜誌，第3卷，第6號，1243頁。

gehaltenes verstärkt.

(Autoreferat)

Der Einfluss von innersekretorischen Drüsen auf die Haemoglobinresistenz.

II. Mitt. Ueber den Einfluss des Ovariums auf die Haemoglobinresistenz.

Von

Dr. H. Minakuchi.

(Aus der I. med. Klinik d. Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Um den Einfluss des Ovariums auf die Haemoglobinresistenz festzustellen, hat der Verfasser Untersuchungen an erwachsenen weiblichen Kaninchen angestellt, indem er die Ovarien exstirpierte, die Tiere mit Gesamtovariumpulver, mit Corpus luteum (P. D.) und mit Ovarianresidue (P. D.) fütterte. Darauf untersuchte er die Resistenz des Haemoglobins.

Die Resultate sind die folgenden:

- 1) Bei der Exstirpation des Ovariums nimmt die Haemoglobinresistenz ab.
- 2) Bei der Darreichung von Ovarium (Gesamtovariumpulver des Rindes) nimmt die Haemoglobinresistenz zu.
- 3) Bei der Darreichung von Corpus luteum nimmt die Haemoglobinresistenz ab.
- 4) Bei der Darreichung von Ovarianresidue nimmt die Haemoglobinresistenz zu.
- 5) Aus den obigen Ergebnissen darf man schliessen, dass in bezug auf die Haemoglobinresistenz zwischen dem Corpus luteum und dem Zwischengewebe ein gewisser Antagonismus besteht.

(Autoreferat)