臨床及實驗

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究(第三報告)

異種蛋白ノ氣道粘膜透過並ニ抗體產生ト上皮小體

京城帝國大學醫學部小川外科教室(小川教授)

李

丙

勳

目次

第一章	緒言	馬血清ノ氣道粘膜透過ニ及ボス影響
第二章	實驗方法	
第三章	上皮小體摘出ガ經氣道の滴入卵白ノ氣道粘膜透過ニ及ボス影響	
C B A	對照實驗	
總括	上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗	
第四章	經氣道の滴入卵白ニ對スル抗體產生並ニ上皮小體摘出ガ之レニ及ボス影響	
C B A	對照實驗	
總括	上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗	
第五章	上皮小體摘出ガ經氣道の滴入健康	
C B A	對照實驗	
總括	上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗	
第六章	經氣道の滴入健康馬血清ニ對スル抗體產生並ニ上皮小體摘出ガ之レニ及ボス影響	
C B A	對照實驗	
總括	上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗	
第七章	全章ノ總括並ニ結論	
引用書目		

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

第一章 緒 言

古ク Peiper (1884) ⁽¹⁾ ハ犬ノ氣道内ニ蒸溜水ヲ三時間ニ二五〇cc、家兎ニ於テ三十分間ニ六〇ccヲ注入シ、硝酸ストリヒニーネノ中毒症狀ハ氣道内注入ニ際シ皮下注射ノ際ヨリ却テ著明ニ發現シ、犬ノ氣道内ニ卵白ヲ注入シタルニ四十五分ノ後尿中ニ證明シ得タルヲ報ズ、Laqueur ⁽²⁾ ハ肺臟ノ吸收ハ著明迅速ニシテ、皮下及ビ消化管ノ夫レニ優ルモノニシテ恐ラク殆ド血液内直接注入ニ等シカルベシト說キタリ。Bastika ⁽³⁾ (1920) ハ家兎及ビ海狸ノ氣道ハ多量ノ血清ヲ容易ニ吸收スルモノニシテ吸收速度ハ腹腔内又ハ靜脈内注射ニ劣ル所ナク且ツ動物ニ對シテ無害ナルモノニシテ血清療法ノ見地ヨリスルモ價值アルモノニシテ、人體ニ於ケル血清療法ニ應用シ得ベキモノナルヲ說キタリ。Preninger ⁽⁴⁾ (1921) ハ氣道内、靜脈内及ビ腹腔内注射法ニヨル抗體產生ニ就キテ比較考察シ抗體產生ニ對シ氣道内滴入ノ優レタルモノナルヲ明カニセリ。D. Annoy ⁽⁵⁾ (1922) ハ抗體產生ニ對シ經氣道の注入ノ優レルヲ說キタリ。鈴木 ⁽⁶⁾ ハ家兎氣道内ニ抗原ヲ接種スル時ハ夫レニ相當スル抗體ヲ血中ニ證明シ得ルヲ明カニセリ。坂内 ⁽⁷⁾ ハチフス菌、コレラ菌、赤痢菌ヲ經氣道のニ注入シタルニ、菌有形成分ヲ以テアスル凝集素產生ハ血管内ヨリスルモノニ比シ一般ニ遅レ且ツ其ノ價低シト雖モ、溶解成分ヲ以テスル際ニ於テハ兩者ノ間ニ於テ殆ド差異ナキモノニシテ異種血清ニ依ル沈降素發生ハ血管内注射時ト大差ナキヲ報ズ。河田 ⁽⁸⁾ ハ家兎氣道粘膜ハ異種蛋白(卵白、綿羊血清)ヲ以テ容易ニ吸收シ血行ニ移行セシメ此ニ對シ抗體ヲ產生セシメ且ツ沈降價亦高價ニシテ、他ノ免疫法ニ劣ルコトナキヲ報ジタリ。

上述ノ如ク健康動物氣管粘膜ハ異種蛋白質ヲ吸收シ血行ニ移行セシメ之レニ對シテ著明ナル抗體ノ產生ヲ見ルハ確

定セル事實ナリ。而シテ Spadolini (1927)⁽⁹⁾ ハ上皮小體ヲ摘出スル時ハ何等テタニ一症狀ヲ發現セザル場合ニ於テモ、消化管粘膜、鼻腔、氣管、子宮腔、尿道等ノ粘膜上皮ガ障礙セラル、ヲ説キ、腸管ハ細菌並ニ平常吸收セラレザル腸管内毒素ヲ透過セシメ肝臓ハ夫レニヨリ障礙セラルト説キタリ。

余ハ第一回報告ニ於テ上皮小體摘出動物ニ於テ腸管内ニ注入セラレタル異種蛋白ノ透過亢進ガ存在スルモ夫レニ對スル抗體產生ハ正常對照家兔ニ比シ遙カニ劣ルコトヲ明カニセリ。本實驗ニ於テ氣管内ニ注入セラレタル異種蛋白吸收狀態ヲ檢シ併セテ抗體產生狀態ヲ觀察セント欲ス。

第二章 實驗ノ方法

A 實驗動物、上皮小體ヲ摘出セル雄性家兔體重二疋前後ノモノヲ使用シタリ。

B 異種蛋白、氣管滴入異種蛋白トシア卵白及ビ馬血清ヲ使用シ卵白ハ徐々ニ濾過シタリ、而シテ兩者トモ生理的食鹽水ヲ以テ二倍ニ稀釋使用シタリ。

C 氣道内滴入ノ方法、家兔ヲ背位ニ固定シ頸部正中線ニ於テ縱切開ヲ加ヘ氣管ヲ曝露シ、注射器ニ一定量ノ卵白及ビ馬血清ヲ盛り家兔固定臺ヲ四十五度ノ傾斜ヲ以テ頸部ヲ高クシ氣管ニ注射針ヲ以テ徐々ニ滴入シタリ。

滴入ノ速度ハ一cc 滴入ニ對シ約十五分ヲ要スルコト、セリ。

D 血液内移行異種蛋白證明法、卵白及ビ馬血清ヲ家兔ニ注射シ其ノ免疫血清ヲ作り置き、家兔氣道内卵白及ビ馬血清滴入後種々ナル時間ニ於テ耳靜脈ヨリ採血シ、前記夫々ノ免疫血清ヲ使用シ沈降反應ニヨリテ卵白及ビ馬血清ノ

存否ヲ檢シタリ。

家兎免疫ノ方法及ビ免疫血清ノ保存法並ニ沈降反應ノ強弱ノ決定法ハ第一回報告ニ記述シタレバ參照セラレン事ヲ乞フ。

E 抗體產生ノ檢査、經氣道滴入ノ卵白及ビ馬血清ニ對スル抗體產生ノ如何ハ沈降反應ニヨリ決定セリ。

F 上皮小體摘出後實驗實施ニ至ル時間及ビ對照試驗、上皮小體摘出後二十四時、三日、六日、三週間ヲ經過セル後ニ卵白及ビ馬血清一定量ノ氣道内滴入ヲ試ミ之レガ血行移行ノ狀ヲ檢シ、血行内移行卵白及ビ馬血清ニ對スル抗體產生ハ、上皮小體摘出三日及ビ六日後ニ氣道内ニ卵白及ビ馬血清ヲ滴入シタルモノニ就テ實驗セリ。

對照實驗ハ健康家兎ニ於テ前記上皮小體摘出家兎ニ試ミタルト全ク等シキ實驗ヲ試ミ其ノ結果ヲ上皮小體摘出家兎ニ於ケル場合ト對比考察スルコト、セリ。

第三章 上皮小體摘出ガ經氣道の滴入卵白ノ氣道粘膜

透過ニ及ボス影響

A 對照實驗(正常家兎ニ於ケル實驗)

正常家兎ニ卵白生理的食鹽水二倍稀釋液ヲ第一群家兎(Nr. 1, Nr. 2)ニ於テ1cc第二群家兎(Nr. 3, Nr. 4)ニハ2cc第三群家兎(Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8)ニ於テハ5ccノ割合ニ前記ノ操作ニヨリテ滴入シ種々ナル時間ニ於テ採血シ卵白ノ血行内移行ノ狀態ヲ檢シタリ。

其ノ結果第一―第三表ノ如シ。

第 一 表

第一群家兎 卵白二倍稀釋液滴入量 1 cc.
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經 過 時 間	Nr. 1 2.1 kg					Nr. 2 1.9 kg				
	家兎血清稀釋度					家兎血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 //	±	—	—	—	—	±	—	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 二 表

第二群家兎 卵白二倍稀釋液滴入量 2 cc.
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經 過 時 間	Nr. 3 2.15 kg					Nr. 4 2 kg				
	家兎血清稀釋度					家兎血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 //	+	—	—	—	—	+	+	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

上掲各表ヲ通覽スルニ第一群家兎滴入量 1 cc ノ場合ニハ實驗開始後八時間後ニ至ル迄全ク血液内移行ヲ認メズ、其レヨリ二十四時後ニ採血検査シタル場合(ニ士)ノ結果ヲ得タリ。

第二群家兎滴入量 2 cc ニ増加シタル場合モ大約第一群ノ場合ニ等シキモ、二十四時間後検査ニ際シ明カナル血液内卵白移行ヲ證シ得タリ、四十八時間後ハ第一群、第二群家兎何レモ血液内ニ卵白ヲ證明シ得ズ。

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

證明セラルルノミナリ。

第 三 表
第三群家兔 卵白二倍稀釋液滴入量 5 cc.
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經 過 時 間	Nr. 5 2.2 kg							Nr. 6 2.3 kg						
	家兔血清稀釋度							家兔血清稀釋度						
	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—
2 //	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	卅	+	+	—
4 //	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	卅	+	+	—
6 //	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	卅	+	+	—
8 //	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	+	+	—	—
24 //	±	±	—	—	—	—	—	+	±	—	—	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

滴入後 經 過 時 間	Nr. 7 1.9 kg							Nr. 8 1.95 kg						
	家兔血清稀釋度							家兔血清稀釋度						
	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K
30 分	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	+	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—
2 //	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	+	—	—	—
4 //	卅	卅	卅	卅	+	—	—	卅	卅	卅	+	+	—	—
6 //	卅	卅	卅	卅	+	—	—	卅	卅	卅	+	+	—	—
8 //	卅	卅	卅	卅	+	—	—	卅	+	+	+	+	—	—
24 //	+	+	—	—	—	—	—	±	—	—	—	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

三六〇

第三群家兔ニ於テ
五 ccヲ氣道内ニ滴入
セル場合ニハ第七號
家兔ニ於テ滴入後三
十分ニシテ卵白ノ血
行内移行ヲ認メ得タ
ルモ、他ノ凡テノ例
ニ於テハ滴入後一時
間ニシテ初メテ血中
ニ證明セラレ、二時
間、四時間、六時間
八時間後ニハ著明ニ
證明セラル、二十四
時間後ニハ(±)ヲ示シ
又ハ少量ニ血液内ニ

第 四 表

第一群上皮小體摘出家兔 卵白二倍稀釋液 1 cc. 滴入
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經 過 時 間	Nr. 9 1.9 kg 上皮小體摘出後 3 日					Nr. 10 2.2 kg 上皮小體摘出後 3 日					Nr. 11 1.9 kg 上皮小體摘出後 6 日				
	家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—	+	+	—	—	—
2 //	++	+	—	—	—	+	+	—	—	—	+	+	—	—	—
4 //	++	+	+	—	—	++	++	+	+	—	++	++	+	—	—
6 //	++	—	+	—	—	++	++	+	+	—	++	++	+	—	—
8 //	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—	++	++	+	—	—
24 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	++	+	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
滴入後 經 過 時 間	Nr. 12 1.85 kg 上皮小體摘出後 6 日					Nr. 13 2.5 kg 上皮小體摘出 3 週間					Nr. 14 2.2 kg 上皮小體摘出 3 週間				
	家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	14	2	4	8	16	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
2 //	+	+	+	—	—	+	+	+	—	—	+	—	—	—	—
4 //	++	++	+	—	—	+	+	+	—	—	+	+	+	—	—
6 //	++	++	+	—	—	+	+	+	—	—	+	+	+	—	—
8 //	++	++	+	—	—	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—
24 //	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—	+	+	—	—	—
48 //	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

三六一

滴入後四十八時間、五十二時間後ニ檢査シタル場合何レニ於テモ血液内ニ卵白移行ヲ證明シ能ハザリキ。

B 上皮小體摘出家兔ニ於ケル實驗

第一群家兔 (Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14) ニ於テハ上皮小體摘出後三日、六日、三週間ニ於テ卵白二倍稀釋液 1 cc 第二群家兔 (Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18,

第 五 表

第二群上皮小體摘出家兔 卵白二倍稀釋液 2 cc. 滴入
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經 過 時 間	Nr. 15 1.8 kg 上皮小體摘出後 3 日						Nr. 16 1.95 kg 上皮小體摘出後 3 日						Nr. 17 1.65 kg 上皮小體摘出後 6 日					
	家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度					
	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K
30 分	—	—	—	—	—	—	±	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	+	—	—	—	—	+++	++	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—
2 "	+	+	+	+	—	—	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+	+	+	—
4 "	+	+	+	+	—	—	+++	++	++	+	+	—	+++	+++	+	+	+	—
6 "	+	+	+	+	—	—	+++	++	++	+	+	—	+++	+++	+	+	+	—
8 "	+	+	+	—	—	—	+++	++	++	+	+	—	+++	+++	+	+	—	—
24 "	+	+	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—
48 "	±	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—	—	—	—
72 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

滴入後 經 過 時 間	Nr. 18 18 kg 上皮小體摘出後 6 日						Nr. 19 1.9 kg 上皮小體摘出後 3 週間						Nr. 20 1.85 kg 上皮小體摘出後 3 週間					
	家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度					
	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
2 "	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+	±	+	—	—	+++	+	—	—	—	—
4 "	+++	+++	+++	+	+	—	+++	++	+	—	—	—	+++	+	+	+	—	—
6 "	+++	+++	+++	+	+	—	+++	++	+	—	—	—	+++	+	+	+	—	—
8 "	+++	+++	+++	+	+	—	+++	±	—	—	—	—	+++	+	+	—	—	—
24 "	+	+	+	—	—	—	±	±	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
48 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr. 19, No. 20)
ニ於テハ上皮小
體摘出後三日、
六日三週間ニシ
テ卵白二倍稀釋
液 2 cc. 第三群
家兔 (Nr. 21,
Nr. 22, Nr. 23,
Nr. 24, Nr. 25,
Nr. 26, Nr. 27,
Nr. 28) ニ於テ
ハ上皮小體摘出
後二十四間、三
日、六日、三週
間ニシテ卵白二
倍稀釋溶液ヲ夫

第 六 表

第三群上皮小體摘出家兔 卵白二倍稀釋液滴入量 5 cc
(免疫血清沈降價 1:30.000)

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

三六三

滴入後 經 過 時 間	Nr. 21 1.9 kg 上皮小體摘出後 24 時間								Nr. 22 1.8 kg 上皮小體摘出後 24 時間								Nr. 23 2 kg 上皮小體摘出後 3 日										
	家兔血清稀釋度								家兔血清稀釋度								家兔血清稀釋度										
	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K						
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 〃	+	+	+	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—
2 〃	++	++	+	+	—	—	—	++	++	+	+	—	—	—	++	++	++	+	+	—	—	++	++	++	+	+	—
4 〃	+++	+++	+++	+	—	—	—	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+	+
6 〃	+++	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+	+
8 〃	+++	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	—	+++	+++	+++	+	+
24 〃	±	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
48 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

滴入後 經 過 時 間	Nr. 24 1.85 kg 上皮小體摘出後 3 日								Nr. 25 2 kg 上皮小體摘出後 6 日								Nr. 26 2.1 kg 上皮小體摘出後 6 日										
	家兔血清稀釋度								家兔血清稀釋度								家兔血清稀釋度										
	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K	2	4	8	16	32	64	K						
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	+	+	+	—	—	
2 〃	++	++	+	+	—	—	—	++	++	++	+	+	—	—	++	++	++	+	+	—	—	++	++	++	+	+	
4 〃	+++	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	
6 〃	+++	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	
8 〃	+++	+++	+++	+++	+	—	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	+	—	+++	+++	+++	+++	+	
24 〃	+	+	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	++	++	++	—	—	—	—	++	++	++	—	—	
48 〃	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—	—	—	—	—	++	++	++	—	—	—	—	++	++	++	—	—	
72 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

々五 cc ズツ氣道
内ニ滴入シ、夫
レガ血行移行ヲ
免疫血清ヲ用ヒ
沈降反應ニヨリ
檢セリ、其ノ結
果ハ第四表―第
七表ノ如シ。
第一群上皮小
體摘出家兔卵白
溶液氣道内一 cc
滴入ノ場合ニ就
テ見ルニ、健康
對照動物ノ同量
卵白溶液滴入ノ
場合ニ比シ著シ

第七表

第三群上皮小體摘出家兔 卵白二倍稀釋液滴入量 5 cc.
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經過 時間	Nr. 27 1.9 kg 上皮小體摘出後 3 週間						Nr. 28 1.8 kg 上皮小體摘出後 3 週間					
	家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度					
	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 時	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
4 時	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
6 時	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
8 時	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
24 時	+	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
48 時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ク透過性ノ亢進セルヲ認ム、尙滴入後一時間ニシテ血液内移行ヲ認メ、四時間、六時間、八時間後ニ卵白ノ血行内移行最モ著明ナルヲ見タリ。

而シテ血行移行中最モ著名ナル上皮小體摘出後六日ヲ經過シタル場合ニハ、滴入後四十八時間ヲ經過シ尙血中ニ卵白ヲ證シ得タリ。

上皮小體摘出後三週間ヲ經過セル場合ニハ、多少透過性減退スト雖モ、尙健康對照家兔ニ比シテ透過著シキヲ證明シ得タリ。

第二群上皮小體摘出家兔卵白溶液氣道内ニ 2 cc 滴入ノ場合ニ就テ見ルニ、同量滴入ニ於ケル健康對照家兔ハ滴入後二十四時間ニシテ僅カニ透過ヲ見ルニ對シ、本群ニ於テハ血行内移行甚シク亢進シ一時間後ヨリ認メ、滴入後四時間、

六時間、八時間ニ於テ移行最モ著明ニシテ二十四時間、四十八時間後ニモ尙證明セラルルヲ見タリ。

而シテ上皮小體摘出後六日ノモノ最モ移行著明ニシテ、三日之レニ次ギ、三週間ヲ經過シタルモノハ移行遙カニ弱シ、サレド對照家兔ニ比セバ亢進著明ナルハ明カナリ。

第三群家兎卵白溶液五cc滴入シタ場合ニ就テ見ルニ、何レモ卵白溶液ノ血中移行ノ亢進ヲ見ルナリ。

全般的ニ卵白滴入後一時間ニシテ血行内移行ヲ認メ、四時間、六時間、八時間後ニ於テ移行最モ著明ニシテ二十四時間後尙證明セラレ、時ニハ四十八時間ニモ尙證明セラレタルモノアルヲ見タリ。

而シテ透過最モ強キハ上皮小體摘出後六日ニシテ三日之レニ次ギ、二十四時間ヲ經過シタルモ己ニ透過亢進ヲ認メ得タリ。

三週間ヲ經過シタル場合ノ透過力ハ健康對照家兎ノ例ト大差ヲ示サザリキ。

C 總 括

(一) 上皮小體摘出家兎ニ於テハ、氣道内ニ滴入シタル卵白ガ血行ニ移行スル事健康對照家兎ニ比シ著明ナリ、殊ニ微量滴入ノ際ニ此ノ現象ハ著明ニシテ卵白生理的食鹽水二倍稀釋溶液一・〇cc滴入ニ際シテハ健康家兎ニ於テハ血中卵白移行殆ンド無キモ上皮小體摘出家兎ニ於テハ卵白ノ血中移行著明ナリ。

五・〇cc滴入ニ際シテハ兩者トモ血中移行著明ナルモ上皮小體摘出ノ場合一層著明ナリ。

(二) 氣道内滴入卵白ノ血中移行ハ多クノ場合滴入後一時間ニ始マリ四時、六時、八時間後最モ著明ナリ。

而シテ健康家兎ニ於テハ滴入後二十四時間ニシテ不鮮明ニ證明セラレ四十八時間後ニハ全ク證明セラレザルヲ例トスレド上皮小體摘出家兎ニ於テハ卵白ノ血中滯留一般ニ稍長時間ニシテ滴入後四十八時間ニシテ尙消失セザルコトアリ

(三) 上皮小體摘出後卵白ノ氣道粘膜透過ハ摘出後二十四時間後既ニ證明セラル(卵白生理的食鹽水稀釋液五・〇cc

滴入ノ場合家兎 Nr. 21, Nr. 22) 而シテ一般ニ上皮小體摘出後六日頃透過最モ著明ナルガ如ク、摘出三週間後モ尙透過亢進ヲ認メ得。

第四章 經氣道の滴入卵白ニ對スル抗體產生並ニ

上皮小體摘出方之ニ及ボス影響

A 對照實驗(健康家兎ニ於ケル實驗)

第一ノ場合 前掲第一表家兎 Nr. 1, Nr. 2 ニ於テハ卵白ニ倍稀釋溶液一cc 經氣道の滴入ヲ行ヒタリ。

此ノ滴入量ニ於テハ滴入後三十分、一時間、二時間、四時間、六時間、八時間ニ於テハ何等血液内卵白移行ヲ認メ得ズシテ、二十四時間ニシテ輕度ナル血行移行ヲ證明シ得タルナリ。

第二ノ場合 前掲第三表家兎 Nr. 7, Nr. 8 ニ於テハ卵白ニ倍稀釋溶液五ccヲ滴入シタルニ、之ノ滴入量ニテハ多量ノ卵白血中移行ヲ證シ得タリ。

之等第一、第二ノ場合ニ於ケル家兎ノ抗體產生ヲ觀察シタリ、其ノ結果次表ノ如シ。(第八表、第九表)

B 上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗

上皮小體摘出後三日ヲ經過セル家兎(第六表 Nr. 23, Nr. 24) 及ビ上皮小體摘出後六日ヲ經過セル家兎(第六表 Nr. 25, Nr. 26) ニ於テ卵白滴入後抗體產生ニツキ觀察セリ、之等家兎ニ於テハ何レモ氣道内滴入卵白ノ著明ナル血

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

第八表 正常家兔抗體產生試驗

家兔番號 第一表 Nr. 1

家兔番號 第一表 Nr. 2

第九表 正常家兔抗體產生試驗

家兔番號 第三表 Nr. 7

家兔番號 第三表 Nr. 8

第十表 上皮小體摘出家兔抗體產生試驗

家兔番號 第六表 Nr. 23

家兔番號 第六表 Nr. 24

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

第十一表 上皮小體摘出家兔抗體產生試驗

家兔番號 第六表 Nr. 25

家兔番號 第六表 Nr. 26

行移行ヲ證シ得タルモノナリ。(第十一表、第十二表)

C 總 括

前表ニヨリテ明カナルガ如ク健康家兎ニ於テハ經氣道のニ少量ノ卵白即チ卵白生理的食鹽水二倍稀釋液ヲ一・〇cc滴入シタル際ニ於テモ明カニ沈降素ノ產生ヲ示シ最高沈降價二〇〇〇〇倍(家兎 *Nr. 1*)及ビ一五〇〇〇倍(家兎 *Nr. 2*)ヲ示シタリ。

增量シテ卵白生理的食鹽水二倍稀釋液五・〇cc滴入ニ際シテハ最高沈降價二五〇〇〇—三〇〇〇〇倍(家兎 *3*)及ビ一五〇〇〇倍(家兎 *Nr. 1*)ヲ示シタリ。

然ルニ上皮小體ヲ摘出シタル家兎(何レモ慢性テタニノ狀態ニ移行シ死ヲ免ガレ得タルモノナリ)ニ於テハ健康對照家兎ト全ク等シキ操作ニヨリテ經氣道のニ卵白二倍稀釋液ヲ五・〇ccヅ、滴入シタル場合ニ於テ其ノ最高沈降價ハ一〇〇〇〇〇倍(家兎 *Nr. 23*)上皮小體摘出後三日滴入)五〇〇〇〇倍(家兎 *Nr. 24*)上皮小體摘出後三日滴入)五〇〇〇倍(家兎 *Nr. 25* 上皮小體摘出後六日滴入)五〇〇〇倍(家兎 *Nr. 26* 上皮小體摘出後六日滴入)ニシテ沈降素ノ形成障礙セラレ居ルヲ見ル。

上皮小體摘出家兎ニ於テハ、氣道内ニ滴入シタル卵白ガ血行移行スル事健康對照家兎ニ比シ著明ナルニ拘ハラズ何故ニ沈降素ノ形成障礙セラル、モノナランカ。

元來抗體ノ生産地ハ肝臟、淋巴腺、骨髓等尙決定のニ云ヘバ上記臟器ニ於ケル網狀織内被細胞系統ガ抗體產生ノ根

源地ヲナスモノナリ。

上皮小體摘出家兎ニ於テハ肝臟ニ於テ實質細胞ノミナラズ網狀織内被細胞系ガ障礙セラル、モノナルハ余ガ第二回報告ニ於テ明カニセル所ナリ。

即チ上皮小體摘出家兎ニ於テ、氣道内ニ滴入シタル卵白ガ著明ニ血行ニ移行スルニ拘ハラズ抗體產生ノ障礙ヲ見ルニ至ル一因子トシテ、上記上皮小體摘出家兎ニ於ケル肝臟ノ網狀織内被細胞系障礙ガ重要ノ役目ヲ演ズルモノナルハ明カナルベシ。

以上ノ結果ヨリ次ギノ如ク結論セラル。

(一) 上皮小體摘出家兎ニ於テハ經氣道の滴入卵白ノ血行移行對照家兎ニ比シテ著明ナルモ、夫レニ對スル抗體ノ產生弱シ。

(二) 上皮小體摘出家兎ニ於ケル經氣道の滴入卵白ニ對スル抗體產生弱キハ少ナクトモ上皮小體摘出家兎ニ於ケル肝臟星芒細胞機能減退ガ之レニ對シテ密接ナル關係ヲ有スベシ。(上皮小體摘出後ノ肝障礙ハ第二回報告ニ明ナリ)

第五章 上皮小體摘出ガ經氣道の滴入健康馬血清ノ

氣道粘膜透過ニ及ボス影響

A 對照實驗(正常家兎ニ於ケル實驗)

健康馬血清生理的食鹽水ニ倍稀釋液ヲ第一群家兎(家兎 Nr. 50, Nr. 51)ニ1cc第二群家兎(Nr. 52, Nr. 53)ニ

第 十 二 表

健康家兔健康馬血清二倍稀釋液滴入量 1 cc. (免疫血清沈降價 1:30.000)											健康家兔健康馬血清二倍稀釋液滴入量 2 cc. (免疫血清沈降價 1:30.000)										
滴入後 經 過 時 間	家兔 Nr. 50 1.9kg					家兔 Nr. 51 2kg					家兔 Nr. 52 1.95kg					家兔 Nr. 53 1.9kg					
	家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	
	+																				
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	±	—	—	—	+	+	—	—	—	
48 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 十 三 表

健康家兎健康馬血清二倍稀釋液滴入量 5 cc. (免疫血清沈降價 1:30.000)

滴 入 後 經 過 時 間	家兎 Nr. 54 2.3 kg					家兎 Nr. 55 2 kg				
	家兎血清稀釋度					家兎血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K
30 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 時	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 //	++	++	++	+	—	++	++	—	—	—
4 //	+++	+++	++	+	—	+++	++	+	—	—
6 //	+++	+++	++	+	—	+++	+++	+	—	—
8 //	+++	+++	++	+	—	+++	+++	+	—	—
24 //	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48 //	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ハニ cc 第三群家
兎 (Nr. 54, Nr.
55) ニハ五 cc ノ
割合ニ式ノ如ク
氣道内ニ滴入シ
血行移行狀態ヲ
檢スルコト卵白
滴入ノ場合ノ如
クス。
實驗ノ結果ハ
次表第十二、第
十三表ノ如シ。

第十四表

上皮小體摘出家兔健康馬血清二倍稀釋液滴入量 1 cc. (免疫血清沈降價 1:30,000)													上皮小體摘出家兔健康馬血清二倍稀釋液滴入量 2 cc. (免疫血清沈降價 1:30,000)												
滴入後 經過 時間	家兔 Nr. 56 2 kg 上皮小體 摘出後 6 日					家兔 Nr. 57 2.1 kg 上皮小體 摘出後 6 日					家兔 Nr. 58 1.9 kg 上皮小體 摘出後 6 日					家兔 Nr. 59 1.9 kg 上皮小體 摘出後 6 日					家兔血清稀釋度				
	家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度					家兔血清稀釋度				
	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K	2	4	8	16	K
30 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 時	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 時	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
4 時	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	++	+	+	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-
6 //	+	+	-	-	-	+	±	-	-	-	++	+	+	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-
8 //	+	+	-	-	-	+	±	-	-	-	++	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
24 //	+	-	-	-	-	±	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究…(李)

第十五表

上皮小體摘出家兔健康馬血清二倍稀釋液 5 cc. 滴入
(免疫血清沈降價 1:30,000)

滴入後 經過時間	家兔 Nr. 60 1.9 kg 上皮小體摘出後 6 日						家兔 Mr. 61 2.1 kg 上皮小體摘出後 6 日					
	家兔血清稀釋度						家兔血清稀釋度					
	2	4	8	16	32	K	2	4	8	16	32	K
30 分	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 時	++	+	+	-	-	-	++	++	+	-	-	-
2 //	++	++	+	+	+	-	++	++	++	+	+	-
4 //	++	++	++	+	+	-	++	++	++	+	+	-
6 //	++	++	++	+	+	-	++	++	++	+	+	-
8 //	++	++	++	+	+	-	++	++	++	+	-	-
24 //	+	+	-	-	-	-	++	+	+	-	-	-
48 //	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
72 //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B 上皮小體摘出家兎ニ於ケル實驗

何レモ上皮小體摘出後六日ノ家兎ニ就キテ實驗ヲ行ヒタリ。即チ對照實驗ニ於ケルガ如ク第一群家兎(Nr. 56, Nr. 57) 1 cc 第二群家兎(Nr. 58, Nr. 59) 1 cc 第三群家兎(Nr. 60, Nr. 61) ニ於テハ5 ccノ割合ニ氣道内ニ二倍ニ稀釋セル馬血清ヲ滴入シ之ガ血行移行狀態ヲ檢スルニハ對照實驗ニ等シ。

實驗ノ結果ハ第十四―第十五表ノ如シ。

C 總括

異種蛋白トシテ氣道内滴入健康馬血清ノ血液移行狀態並ニ上皮小體摘出ガ滴入健康馬血清ノ血行移行ニ及ボス影響ハ全ク前述ノ卵白滴入ノ場合ト全ク等シ、故ニ茲ニ改メテ記述セズ。

第六章 經氣道の滴入健康馬血清ニ對スル抗體產出ト

上皮小體ノ夫レニ及ボス影響

A 對照實驗(正常家兎ニ於ケル實驗)

家兎(Nr. 52, Nr. 53) ハ二倍稀釋馬血清1 ccヲ經氣道のニ滴入シ著明ナル血行移行ヲ認メタルモノナリ、之ノ際ニ血行移行馬血清ニ對スル抗體產生ノ狀態ヲ檢シ對照試驗トナシタリ。(第十二表參照)(第十六表)

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

第十六表 正常家兔健康馬血清滴入後抗體產生試驗

家兔番號 第十三表 Nr. 54

家兔番號 第十三表 Nr. 55

上皮小體機能ニ關スル實驗的研究……(李)

第十七表 上皮小體摘出家兔健康馬血清滴入後抗體產生試驗

家兔番號 第十五表 Nr. 60

家兔番號 第十五表 Nr. 61

三七四

B 上皮小體摘

出家兔ニ於

ケル場合

上皮小體ヲ摘出セ

ル家兔 (Nr. 58, Nr.

59) ニ於テ二倍稀釋

馬血清滴入後血行移

行ノ馬血清ニ對スル

抗體產生ヲ觀察セル

其ノ結果ハ第十七表

ノ如シ。

C 總括

以上經氣道のニ滴

入セル馬血清ノ血行

ヘノ移行狀態並ニ之

レニ對スル抗體ノ產生ノ狀態及ビ上皮小體摘出ガ馬血清ノ血行移行及ビ血行移行ノ馬血清ニ對シテ抗體產生ノ狀態ハ前掲卵白ノ場合ニ等シ、故ニ茲ニ再ビ記サザルコト、セリ。

第七章 全章ノ總結結論

一、家兎ニ於テ經氣道のニ滴入セラレタル異種蛋白ハ氣道粘膜ヲ透過シ血中ニ移行ス。

二、上皮小體摘出家兎ニ於テハ經氣道の滴入異種蛋白ノ氣道粘膜透過ハ亢進ス。而シテ摘出後二十四時間ニシテ既ニ透過亢進ヲ認メ三週間ヲ經過スルモ尙此現象ハ證明セラル、斯ノ如ク上皮小體摘出家兎ニ於ケル異種蛋白氣道粘膜透過亢進ハ上皮小體摘出ニヨリ氣道粘膜細胞ニ或種ノ變化ヲ招來シタル結果ナルベク余ハ第一回報告ニ於テ腸管粘膜細胞ニ於テ上皮小體摘出後或ル種ノ變化ヲ來シ異種蛋白ノ透過亢進ヲ來スヲ報セリ。之レニ相當セル變化ガ氣道粘膜細胞ニモ上皮小體摘出ニヨリ招來セラル、モノナルベシ、Spadlini⁽⁹⁾等ハ上皮小體ヲ摘出スル時テタニ一症狀ヲ發現セザルニ先キ立チテ、數時間後既ニ消化管粘膜ニ萎縮ヲ來シ更ニ進ンデハ粘膜ノ壞死ヲ來スヲ報ジ、氏ハ上皮小體ホルモント上皮ノ抵抗力トハ密接ナル關係アルモノニシテ、上皮小體ホルモンガ缺如スル時ハ上皮ノ抵抗力ハ減退シ遂ニ上述ノ如キ變化ガ招來セラルト説ク。又氏ハ斯ノ如キ上皮ノ變化ハ鼻腔、氣管、子宮腔、尿道等ノ上皮ニ於テモ證明セラルト説キタリ。此等ノ説ク所ト余ノ實驗トヲ對比スル時其間興味深キ關係ノ存スルヲ知ルベシ。

三、正常家兎及ビ上皮小體ノ摘出家兎ニ於ケル經氣道の滴入異種蛋白ニ對シ抗體ノ產生ヲ見ル、而シテ上皮小體摘出

家兎ニ於テハ抗體產生弱シ。之ノ事實ニ對シ少クトモ上皮小體摘出家兎ニ於ケル肝臟星芒細胞機能減弱ガ密接ナル關係ヲ有ス。(第二回報告參照)

摺筆スルニ際シ恩師小川教授ノ終始懇篤ナル御指導御校閲ニ對シ茲ニ謝意ヲ表ス。

引用書目

- 1) Peiper, E.: Zeitsch. f. kl. Med. Bd. 8, 1884.
- 2) Laqueur, E.: Münch. Med. Wochsch. Nr. 43, S. 1221, 1919.
- 3) Besredka, A.: Ann. de l. Inst. Pasteur. No. 6, P. 361, 1920.
- Ann. de l. Inst. Pasteur. No. 1, P. 51, 1920.
- 4) Pfenniger, W.: Ann. de l. Inst. Pasteur. No. 4, P. 237, 1921.
- 5) D. Aunoy: Journ. of infect. Dis. Vol. 30, P. 347, 1922.
- 6) 鈴木: 衛生學傳染病學雜誌, 第18卷, 大正11年.
- 7) 坂内: 慶應醫學, 第2卷, 大正11年.
- 8) 河田: 東京醫學會雜誌, 第42卷, 8號, 昭和3年.
- 9) Spadolini, Iginoe, Giorgini, Castelli: Ref. Bonas Berichte. Bd. 43, H. 3/4, S. 259, 1928.
- Ref. Bonas Berichte. Bd. 45, H. 1/2 S. 92, 1928.
- 10) 李丙勳: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 7號, 昭和4年.
- 11) 李丙勳: 日本內分泌學會雜誌, 第6卷, 11號, 昭和5年.

**Experimentelle Untersuchung über die Funktion
des Epithelkörperchens. III. Mitteilung:
Epithelkörperchen und Permeabilität
der Trachealschleimhaut für
heterogene Eiweissstoffe.**

Von

Dr. Piung-Hun Ri

(Aus der chirur. Klinik d. kaiserl. Universität zu Keijo.
Vorstand: Prof. Dr. Shigeshi Ogawa.)

Wenn dem gesunden Kaninchen heterogene Eiweissstoffe (Eier-eiweiss, Pferdserum) in die Trachea eingespritzt werden, sieht man, dass diese durch die Schleimhaut des Respirationstraktus ins Blut resorbiert werden. Bei parathyreoidektomierten Kaninchen ist die Resorption stärker als bei gesunden.

Die vom Respirationstraktus aus in den Körper gelangten heterogenen Eiweissstoffe (Eiereiweiss, Pferdserum) wirken als Antigen und führen bei gesunden Kaninchen zu starker Immunisierung. Aber bei parathyreoidektomierten Kaninchen ist trotz der gesteigerten Resorption der Eiweissstoffe die Antikörperbildung schwächer als bei gesunden.

Die Störung der Antikörperbildung steht zur Funktionsstörung der Sternzellen der Leber des parathyreoidektomierten Kaninchens in inniger Beziehung. (Autoreferat)

**Ueber den Einfluss verschiedener Genussmittel
auf die Schilddrüsenfunktion.**

Von

Dr. T. Suematsu.