ビタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態、殊ニ之ト 甲狀腺トノ關係ニ就テ

京都帝國大學醫學部辻内科教室

醫學士 小 川

醫學士 大 西 康

夫 篁

目 次

第一 緒 言	症白鼠ノ骨發育ニ及ボス甲狀腺飼食ノ影響
第二 甲狀腺剔除ガビタミンB 缺乏症白鼠ノ骨發育ニ及ボス影響	第一章 實驗方法
第一章 實驗方法	第二章 實驗成績
第二章 實驗成績	第一節 一般成長ニ就テ
第一節 一般成長ニ就テ	第二節 骨成長ニ就テ
第二節 骨成長ニ就テ	第一項 肉眼の所見
第一項 肉眼の所見	第二項 組織學的所見
第二項 組織學的所見	第四 總結及ビ考按
第三 甲狀腺剔除ガビタミンB 缺乏	第五 結 論
	附 参考文献及ビ附圖説明

第一 緒 言

ビタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲狀腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

曩ニ我敎室西村・新田兩氏ハ幼若ナル白鼠ニヴァイタミンB 缺乏症ヲ惹起セシムル時、ソノ全身發育ノ障礙ヲ起ス外ニ、骨發育モ著明ニ障礙サル、ヲ見、此際微量ノ甲状腺ヲ飼食セシムル時ハ、尙強ク骨發育障礙ノ發現ヲ認メ、之ト共存スル甲状腺ノ變化ヨリ觀テ、カ、ル骨發育障礙ハ一部甲状腺ノ變化ノ二次的影響ニ依ルモノナラント推定セリ。果シテ然ラバ甲状腺剔出ハヴァイタミンB 缺乏症ノ骨發育障礙ニ如何ナル作用アリヤ。更ニ之ニ甲状腺飼食ヲ行フ時ハ如何ニ影響サル、ヤ。此ノ間ノ消息ヲ闡明セントシテ本實驗ヲ企テタリ。

第二 甲状腺剔出ガジいたまんB 缺乏症白鼠ノ骨發育ニ及ボス影響

第一章 實驗方法

試驗動物トシテハ我研究室ニテ生レタル生後約三〇―四〇日ノ幼若白鼠(體重五二―七七瓦)ヲ用ヒ、同腹ニシテ體重略等シキモノヲ選ビテ對照トナシ、供試白鼠ハ甲状腺剔出ノ翌日ヨリ一匹宛、一方金網ヲ張レル木箱ニ收容シ、供試及ビ對照何レモ、西村、新田兩氏ト同様ノヴァイタミンB 缺乏食(日本内分泌學會雜誌第四卷第十號ノ兩氏論文參照)ヲ給與シ、毎三日ニ體重ヲ測定シ一五日―二四日ニ及ンデ、之ヲエーテル麻醉ノ下ニ殺害剖檢シ、ソノ體重、身長(全身長及ビ軀幹長)右側ノ管狀骨(上膊骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨)ノ長經、左側ノ上膊骨ノ新鮮重量ヲ測定シタル後、直チニソノ右側脛骨ノ上半ヲ採リ一〇%フォルマリン液ニ固定シ次イデ五%硝酸フォルマリン液中ニテ脱灰シ、適當ノ硬度ニ達スルニ及ビテ水洗シ、硬化脱水後、チエロイチン包埋、ヘマトキシリン、エオジン複染色法ニテ骨端線ノ狀ヲ組織學的ニ檢セリ。

第二章 實驗成績

第一節 一般成長ニ就テ

第一圖 甲状腺剔除ビタミンB缺乏症白鼠ノ體重曲線

ビタミンB缺乏症白鼠ト甲状腺剔除ビタミンB缺乏症白鼠トノ體重變化ヲ比較スルニ甲状腺剔除白鼠ニ於テハ多クハ剔除後一時的ニ體重ノ減少ヲ來シ、二―三日ニシテ復舊スルヤ徐々ニ體重ヲ増加シ行クモ、ソノ増加率ハ對照白鼠ニ比シ小ニシテ、且ツ二―三日ニシテ體重増加ハ停止シ、是ヨリ體重ハ變化ナキカ、又ハ下降シ始ム。
 軀幹長及ビ全身長モ、屠殺時ノ測定ニヨルニ甲状腺剔除白鼠ノ方ガ對照ニ比シテ劣レルヲ見ル。

第二節 骨成長ニ就テ

第一項 肉眼的所見

甲状腺ヲ剔除シタルビタミンB缺乏症白鼠ノ

ビタミンB缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

第一表 ヴイタミンB缺乏症白鼠ノ甲状腺剔出及ビ之ニ甲
 狀腺飼食ヲナセル時ノ體重變化（單位瓦）

動物 番號	處 置	性	試 驗 開 始 後 ノ 日 數											
			前	1	3	6	9	12	15	18	21	24		
1	剔 出	♂	65	58	75	68	70	80	80					
2	剔出飼食	♂	60	53	65	62	61	61	60					
3	對 照	♀	52	57	65	67	72	82	84					
5	剔 出	♂	77	67	90	75	70	74	75	72	75			
6	剔出飼食	♀	77	69	80	67	81	76	73	73	75			
4	對 照	♂	77	77	98	104	112	116	116	112	117			
9	剔 出	♀	53	50	57	57	58	54	60	57	55			
10	剔 出	♂	57	53	68	66	63	62	66	66	65			
7	剔出飼食	♀	53	47	57	50	54	53	50	45	42			
8	剔出飼食	♀	52	48	61	55	53	52	53	49	45			
11	對 照	♂	57	58	68	75	83	92	97	97	94			
21	剔 出	♀	53	48	62	50	51	55	57	51	49	50		
19	剔出飼食	♀	64	58	70	65	58	59	55	52	46	40		
20	對 照	♀	60	59	69	75	83	92	97	93	89	80		

ヴイタミンB缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……（小川、大西）

四三四

管狀骨長經重量及ビ水分含有量測定ノ結果ハ第二表及ビ第三表ニ示セルガ如ク、ソノ對照タルヴイタミンB缺乏症白鼠ノ夫レニ比シテ、長經短ク重量モ、新鮮乾燥共ニ輕ク、水分含有量モ小ナリ。形態ニハ特別ノ變化ヲ認メ得ズ。

第二項 組織學的所見

管狀骨發育ノ狀ヲ更ニ精査スル爲メ、是ガ組織學的檢索ヲ施行セリ。而シテ該檢索ニハ最も便ナル脛骨上端ヲ使用セリ。

第一號白鼠 ♂ 體重、前六五瓦、後八〇瓦、試

驗日數一五、

脛骨上端 細胞群層増減ナク、細胞柱層一五ミクロン減。細胞數一四（對照二〇）胞狀細胞層三〇ミクロン減、細胞數七（對照八）全幅トシテ四五ミクロン減。柱狀細胞、及ビ胞狀細胞共ニ

第二表 ヴイタミン B 缺乏症白鼠ノ甲状腺剔出及ビ飼
食時ノ管狀骨重量及ビ含水量測定(單位瓦)

動物 番號	處 置	試驗日數	上 搏 骨		
			新鮮重量	乾燥重量	含水量分量
1	剔 出	15	0.139	0.068	0.061
2	剔出飼食	15	0.123	0.066	0.057
3	對 照	15	0.145	0.079	0.066
5	剔 出	21	0.166	0.090	0.076
6	剔出飼食	21	0.160	0.087	0.073
4	對 照	21	0.212	0.115	0.097
9	剔 出	21	0.132	0.072	0.060
10	剔 出	21	0.143	0.079	0.064
7	剔出飼食	21	0.127	0.064	0.063
8	剔出飼食	21	0.121	0.061	0.060
11	對 照	21	0.202	0.105	0.097
21	剔 出	24	0.138	0.071	0.067
19	剔出飼食	24	0.131	0.068	0.053
20	對 照	24	0.192	0.104	0.088

ヴイタミン B 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

四三五

脛骨上端 細胞群層増減ナク、細胞柱層九〇ミク

日數二一。

第九號白鼠 ♀ 體重前五三瓦、後五五瓦、試驗

ニ比シ透明度少シ。

槍ノ出ル事、對照ニ比シテ少ク稍々短縮ス、細胞柱層、胞狀細胞層、ノ細胞排列稍々亂レ對照

ニ比シ透明度少シ。(對照六) 骨端線全幅一三五ミクロン減、基質

槍ノ出ル事、對照ニ比シテ少ク稍々短縮ス、細胞柱層五五ミク

日數二一。

第五號白鼠 ♂ 體重前七七瓦、後七五瓦、試驗

著シク疎ニシテ、處々ニ斷續スルヲ見ルノミ。

短縮セリ。續生海綿骨層ノ骨梁、對照ニ比シテ

小ナルモ排列比較的正シク、基質増加セズ、基質

槍ノ出ル事稍疎ニシテ短ク、原生海綿骨層モ亦

甲状腺剔除ビタミンB缺乏症白鼠ノ脛骨上端ノ骨端線各層
ノ檢鏡的測定（單位ミクロン、括弧内ハ平均細胞數ヲ示ス）

動物番號	1 (試験) 3 (對照)	5 (試験) 4 (對照)	9 (試験) 10 (試験) 11 (對照)	21 (試験) 20 (對照)
骨端線全幅	300 345	115 250	117 137 282	114 225
細胞群層	15 15	15 15	12 12 12	9 15
細胞柱層	135 (14) 150 (20)	60 (8) 115 (14)	60 (7) 50 (6) 150 (15)	60 (10) 120 (14)
胞狀細胞層	150 (7) 180 (8)	40 (3) 120 (6)	45 (3) 75 (4) 120 (6)	45 (4) 90 (6)
原生 海綿骨層	150 300	120 150	180 96 300	115 120

ビタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……（小川、大西）

四三六

ロン減、細胞數七（對照一二）胞狀細胞層七五ミクロン減、細胞數三（對照六）

基質槍ノ出ル事稀少ニシテ、原生海綿骨層モ對照ニ比シ著シク短縮セリ。

第一〇號白鼠 ↑ 體重、前五七瓦、後六五瓦、試験日數二一。

脛骨上端 細胞群層増減ナク、細胞柱層六〇ミクロン減、細胞數六（對照一二）胞狀細胞層四五ミクロン減、細胞數四（對照一六）基質槍ノ出ル事少ク、從ツテ原生海綿骨層短縮セリ。

第二一號白鼠 ♀ 體重、前五三瓦、後五〇瓦、試験日數二四。

脛骨上端 細胞群層六ミクロン減、細胞柱層六〇ミクロン減、即對照ニ比シ半減シ細胞數一〇（對照一四）胞狀細胞層四五

ミクロン減、細胞數四（對照六）基質槍纖細ニシテ短ク、原生海綿骨層短縮ス。

以上列舉セルガ如ク甲狀腺剔出ヴァイタミンB缺乏症白鼠ハ何レノ例ニアリテモ脛骨上端ノ骨端線ハ幅員著シク小トナリ、殊ニ細胞柱層及ビ胞狀細胞層ガ甚シク狹小ニシテ、細胞數モ對照ニ比シテ少シ。且ツ基質槍ハ疎ニシテ短ク骨端軟骨内化骨現象ガ著明ニ障礙ヲ被レルヲ認メ得。

即チ肉眼的ニ甲狀腺剔出ヴァイタミンB缺乏症白鼠ノ諸管狀骨ノ短小ナルヲ認メシガ、組織學的ニモ、其ノ發育ノ障礙セラレタルヲ確知スルヲ得タリ。

第三 甲狀腺剔出ヴァイタミンB缺乏症白鼠ノ骨發育ニ

及ボス甲狀腺飼食ノ影響

第一章 實驗方法

前述ノ甲狀腺剔出試驗ト同様ナル幼若白鼠ヲ用ヒ甲狀腺剔出ノ翌日ヨリヴァイタミンB缺乏食餌ヲ與ヘ毎日〇・〇〇一瓦ノ牛乾燥甲狀腺粉末ヲ飼食セシメ、毎三日ニ體重ヲ測定シ一五―二四日目ニエーテル麻醉ノ下ニ殺シ、體重、身長、管狀骨長等ヲ前述ノ如ク測定シ、脛骨上端ヲチエロイジン包埋、ヘマトキシリン、エオジン複染色ニヨリテ、ソノ組織像ヲ檢セリ。

第二章 實驗成績

第一節 一般成長ニ就テ

ヴァイタミンB缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲狀腺トノ關係ニ就テ……（小川、大西）

甲状腺剔除ビタミンB 缺乏症白鼠ニ
甲状腺飼食ヲナセル時ノ重量曲線

ビタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

四三八

對照タルビタミンB 缺乏症白鼠ト甲状腺ヲ飼食セシメタル甲状腺剔除ビタミンB 缺乏症白鼠トノ體重變化ヲ比較スルニ試験例ハ多クハ剔除後一時體重減少ヲ來シ、二・三日ニシテ體重復舊スルヤ、更ニ少シジ、増加シ行クモ、間モナク、増加ハ停止シ、次ニ減少シ始ム。而モ、ソノ減少ノ度ハビタミンB 缺乏症白鼠及ビ單ニ甲状腺ヲ剔除シタルビタミンB 缺乏症白鼠ヨリモ尙高度ナルヲ見ル。

第二節 骨成長ニ就テ

第一項 肉眼的所見

甲状腺ヲ飼食セシメタル、甲状腺剔除ビタミンB 缺乏症白鼠ノ諸種管狀骨ノ長徑、新鮮重量、乾燥重量、水分含有量等ヲ測定シ、之ヲ對照タルビタミンB 缺乏症白鼠ノソレト比較スルニ試験

第三表 ヴイタミンB 缺乏症白鼠ノ甲状腺剔出及ビ
飼食時ノ管狀骨長徑測定(單位瓦、糧、)

番動 號物	處 置	性	日試 數驗	體 重		死 殺	軀 幹 長	全 身 長	上骨 搏長	橈骨 長	尺骨 長	大骨 腿長	脛骨 長
				前	後								
1	剔 出	♂	15	65	80	死	10.2	21.5	1.90	2.20	1.70	2.20	2.70
2	剔出及飼食	♂	15	60	60	殺	11.1	22.0	1.60	2.10	1.80	2.20	2.60
3	對 照	♀	15	52	84	殺	13.1	25.7	1.70	2.20	1.80	2.30	2.80
			差						+ 0.20		- 0.10	- 0.10	- 0.10
			差						- 0.10	- 0.10		- 0.10	- 0.20
5	剔 出	♂	21	77	75	殺	13.8	26.4	2.00	2.40	1.80	2.40	2.90
6	剔出飼食	♀	21	77	75	殺	14.5	27.3	2.00	2.30	1.80	2.40	2.90
4	對 照	♂	21	77	117	殺	17.0	30.4	2.20	2.50	2.00	2.70	3.10
			差						- 0.20	- 0.10	- 0.20	- 0.30	- 0.20
			差						- 0.20	- 0.20	- 0.20	- 0.30	- 0.20
9	剔 出	♀	21	53	55	殺	11.5	22.3	1.70	2.01	1.60	2.10	2.64
10	剔 出	♂	21	57	65	殺	13.3	23.9	1.80	2.10	1.70	2.24	2.65
7	剔出飼食	♀	21	53	42	殺	11.5	21.6	1.80	2.10	1.60	2.10	2.54
8	剔出飼食	♀	21	52	45	殺	11.9	22.2	1.70	1.99	1.60	2.10	2.59
11	對 照	♂	21	57	94	殺	15.8	27.5	1.82	2.40	1.90	2.60	2.90
			差						- 0.12	- 0.39	- 0.30	0.50	0.26
			差						- 0.02	- 0.30	- 0.20	- 0.36	- 0.25
			差						- 0.02	- 0.30	- 0.30	- 0.50	- 0.36
			差						- 0.06	- 0.41	- 0.30	- 0.50	- 0.31
21	剔 出	♀	24	53	50	殺	11.5	22.5	1.75	2.15	1.70	2.20	2.60
19	剔出飼食	♀	24	64	40	死	12.3	23.0	1.63	2.10	1.68	2.25	2.61
20	對 照	♀	24	60	80	殺	13.2	26.1	2.05	2.40	1.17	2.40	3.15
			差						- 0.30	- 0.25	- 0.08	- 0.20	- 0.55
			差						- 0.42	- 0.30	- 0.14	- 0.15	- 0.45

ヴイタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

甲状腺剔除ビタミンB 缺乏症白鼠ニ甲状腺飼食ヲ
ナセル時ノ脛骨上端ノ骨端線各層ノ鏡的測定
(單位ミクロン、括弧内ハ平均細胞數ヲ示ス)

動物番號	2 (試験)	6 (試験)	7 (試験)	19 (試験)
	3 (對照)	4 (對照)	8 (試験)	20 (對照)
			11 (對照)	
骨端線全幅	150	134	114	84
	345	250	129 282	225
細胞群層	15	9	9	9
	15	15	9 12	15
細胞柱層	75 (6)	70 (8)	60 (8)	45 (6)
	150 (20)	115 (14)	75 (8) 150 (15)	120 (14)
胞狀細胞層	60 (4)	55 (3)	45 (3)	30 (2)
	180 (8)	120 (6)	45 (3) 120 (6)	90 (6)
原生海綿骨層	135	150	60	60
	300	150	75 300	120

ビタミンB 缺乏症ノ骨發育狀態殊ニ之ト甲状腺トノ關係ニ就テ……(小川、大西)

四四〇

例ニテハ諸種管狀骨ノ長徑ハ短ク新鮮重量
乾燥重量共ニ輕ク、水分含有量モ少ナルヲ
見ル、而シテ前出ノ單ニ甲状腺剔除ヲ施セ
ル**ビタミンB 缺乏症**白鼠ノ諸管狀骨ト本
實驗例ノソレトヲ比較スレバ長徑ニ於テハ
著シキ差ナキモ、新鮮重量、乾燥重量ハ共
ニ本實驗例ノ方が稍輕ク水分含有量モ少ナ
キ傾向ヲ示セリ。

第二項 組織學的所見

第二號白鼠 ↑ 體重、前六〇瓦、後六〇
瓦、試験日數一五。

脛骨上端 細胞群層増減ナク、細胞柱層七五
ミクロン減、即チ對照ノ半分ニシテ細胞數
六、(對照二〇) 胞狀細胞層一二〇ミクロ
ン減、細胞數四(對照八) 原生海綿骨層

一三五ミクロンニシテ、對照ニ比シ半分以下ニ短縮ス。

細胞柱層及ビ胞狀細胞層ニテハ細胞扁平ニシテ、小ナルモ細胞ノ排列ハ比較的ニ整ヘリ。

第六號白鼠 體重前七七瓦、後七五瓦、試驗日數二一。

脛骨上端 細胞群層増減無ク、細胞柱層五五ミクロン減。細胞數八（對照一四）胞狀細胞層八四ミクロン減、細胞數

三（對照六）對照ニ比シテ基質槍ノ出ル事著シク稀少ニシテ、且ツ短ク、續生海綿骨層ノ骨梁モ對照ニ比シ細ニシテ遠クマデ達セザレド略長軸ニ平行ス。

第七號白鼠 ♀ 體重前五三瓦、後四二瓦、試驗日數二一。

脛骨上端 細胞群層三ミクロン減、細胞柱層九〇ミクロン減、細胞數八（對照一二）胞狀細胞層七五ミクロン減、細

胞數二（對照六）基質槍ハ纖細ニシテ短ク、原生海綿骨層從ツテ短縮ス。

第八號白鼠 ♀ 體重前五二瓦、後四五瓦、試驗日數二一。

脛骨上端 細胞群層三ミクロン減、細胞柱層七五ミクロン減、細胞數八（對照一二）胞狀細胞層七五ミクロン減。細

胞數三（對照六）基質槍ノ出ル事少ク、且ツ短ク、原生海綿骨層モ短縮ヒリ。

第一九號白鼠 ♀ 體重、前六四瓦、後四〇瓦、試驗日數二四。

脛骨上端 細胞群層六ミクロン減、細胞柱層七五ミクロン減、細胞數六（對照一四）胞狀細胞層六〇ミクロン減、細

胞數二（對照六）細胞柱層及ビ胞狀細胞層ノ細胞小ニシテ、基質槍ノ出ル事甚ダ少ク、且ツ短ク、原生海綿骨層短縮著シ。

以上述べタル各例ニ就キテ骨端線ノ組織像ヲ通覽スルニ、何レモソノ骨端軟骨内化骨現象ガ著明ニ障碍セラレタルヲ認メ得。而シテ其ノ障碍ノ度ハ單ニ甲状腺ヲ剔出セル、ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ノ場合ニ比シ大多數ノ例ニ於テ少シク高度ナルノ感アリ、即チ細胞柱層及ビ胞狀細胞層ノヨリ短縮セルヲ見ル。

第四 總括及ビ考按

予等ハヴァイタミンB 缺乏症ヲ惹起セシメタル幼若白鼠ノ甲状腺ヲ剔出シテ、全發育及ビ骨發育ノ狀ヲ檢シタルニ、體重ハ一時増加スルモ、間モナク増加ヲ停止シ、遂ニ減少シ行クヲ見、諸管狀骨ハ對照ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ニ比シ長徑短ク、新鮮重量、乾燥重量共ニ輕ク、水分含有量モ少ニシテ管狀骨ノ一ナル脛骨上端ノ骨端軟骨ヲ組織學的ニ檢シ、骨成長ノ著シク障碍サル、ヲ見タリ。

又甲状腺剔出ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ニ甲状腺ヲ飼食セシメタルニ、甲状腺剔出ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ニ似テ、體重増加モ早期ニ停止シ、且ツ減少ノ度ハ、ヨリ高度ナルヲ認メ、諸管狀骨ハ對照タルヴァイタミンB 缺乏症白鼠ニ比シ長徑短ク、新鮮重量、乾燥重量、水分含有量ハ甲状腺剔出ヴァイタミンB 缺乏症ノ場合ヨリモ、尙小ナルヲ認メ、且ツ骨端軟骨ノ組織學的檢索ニ於テモヨリ高度ノ骨成長障碍ヲ證シ得タリ。

曩ニ我敎室西村、新田兩氏ハヴァイタミンB 缺乏症ヲ惹起セシメタル幼若白鼠ノ骨發育ハ著シク障碍セラル、ヲ見、又兩氏ハ此等ニ微量ノ甲状腺ヲ飼食セシムル時ハ、ソノ骨發育ハ更ニ高度ノ障碍ヲ被ムルヲ認メタリ。然ラバ此際反對ニ甲状腺剔出ヲ行ハバ骨發育ノ障碍ノ比較的輕度ニ保持サルルニアラザルカトノ考ヘモ當然起ル所ナリ。予等ガ行

ヘル**ビタミンB**缺乏症白鼠ノ甲状腺剥出實驗ニ就キテ見ルニ、甲状腺剥出ヲ行ヘルモノハ、單ニ**ビタミンB**缺乏症ヲ起セルモノヨリモ、骨發育ノ障碍高度ナルヲ認メ、前ノ考ニ反スル結果ヲ得タリ。

翻テ、甲状腺ガ骨發育ニ及ボス影響ニ關シテ行ハレタル幾多ノ實驗ニ就キテ見ルニ、Wagner, Hofmeister, Hagenbach, 淺田、西村等ハ何レモ甲状腺剥出ニヨリテ管狀骨ノ發育著明ニ障碍サル、ヲ報告セリ。是等ノ業績ヨリ予等ノ前述ノ實驗成績ヲ觀ル時ハ、**ビタミンB**缺乏症ニヨル障碍ト、甲状腺剥出ニヨル障碍ノ相加重セル結果トモ考フル事ヲ得ベシ。

甲状腺機能ノ低下、又ハ脱落ハ甲状腺物質ノ給與ニヨリテ補足シ得ル事アルハ粘液水腫ノ臟器療法等臨床の事實ノ教フル所ナリ。然ラバ**ビタミンB**缺乏症白鼠ニ甲状腺剥出ヲ行ヘルモノニ、更ニ甲状腺物質ヲ投與スル時ハ、甲状腺剥出ノ影響ヲ緩和シ得ルニアラザルカ。

サテ予等ガ施行セル後半ノ實驗、即チ甲状腺剥出**ビタミンB**缺乏症白鼠ニ甲状腺ヲ飼食セシメタル場合ニ於テハ骨發育障碍ノ度ハ毫モ緩和ノ趾ヲ見ザルノミナラズ、新鮮重量、乾燥重量、水分含有量ニ於テハ、却テ前實驗ノ時ヨリモ劣レルノミナラズ、骨端線ノ組織像ニ於テモ亦、ヨリ高度ニ障碍セラレタルヲ認ム。即チ甲状腺剥出ニヨル影響ヲ緩和シ得ザルノミナラズ、却テ障碍のニ作用セルヲ見ル。殊ニソノ體重ガ速カニ増加ヲ停止シ、且ツ急速ニ減少シ行ク點ヨリ見テ、甲状腺ノ中毒ヲ思ハシムルモノアリ。サレバ此際ノ甲状腺物質ノ飼食ハ其ノ補填作用ヲ表ハサズシテ却テ Birchler 及び我教室西村等ガ甲状腺飼食ニヨリテ骨發育ノ障碍ヲ認メタルト同様ノ意義ニ作用シタルモノト考フベキモノナラン。

第五 結 論

以上予等ハ幼若白鼠ナ用ヒテ甲状腺ヲ剔出シテ、之ニヴァイタミンB 缺乏症ヲ起サシメ、更ニ之ニ甲状腺物質ヲ飼食セシメテ、其ノ際ノ一般成長、及び、骨成長ノ狀ヲ檢シ左ノ結論ヲ下サント欲ス。

一、甲状腺剔出白鼠ノヴァイタミンB 缺乏症ニ於テハ對照タル、正常白鼠ヴァイタミンB 缺乏症ニ比シ、一般或長及び骨發育ノ障碍一層強度ナリ、即チ諸管狀骨ノ長徑短ク、新鮮重量、及び乾燥重量、共ニ輕ク、水分含有量モ少シ、組織學的ニハ骨端軟骨ハ、細胞柱層、胞狀細胞層、共ニ短縮シ、基質槍及び海綿骨層ハ著シク短縮セリ。

二、甲状腺剔出ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ニ甲状腺ヲ飼食セシムル時ハ、骨成長ノ障碍ノ度ハ、單ナルヴァイタミンB 缺乏症ノ時ヨリモ甚シク、諸管狀骨ノ新鮮重量乾燥重量、水分含有量ハ甲状腺剔出ヴァイタミンB 缺乏症白鼠ノ時ヨリモ小ナリ。

筆ヲ擱クニ當リ恩師辻教授ノ御指導ノ勞ヲ謝シ、尙長友西村、新田兩博士ノ御助言ニ對シ感謝ノ意ヲ表ス。

出 典 文 献

- 1) 西村俊一、新田一衛：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第10號。
S. 771. u. Nr. 30, S. 931, 1984. 3) F. Hofmeister: Beiträge zur kl. chir. Bd. 11, S. 441, 1894. 4) E. Hagenbach: mit. a. d. Grenzgeb. d. med. u. chir. Bd. 18, S. 239, 1907. 5) E. Hagenbach: Med. Kl. S. 422, 1928. 6) 淺田爲藏：日本外科 25 回 2 號(大正 13 年) 7) 西村俊一：内分泌學雜誌，第2卷，第6號(昭和 3 年 2 月)

小川、大西論文附圖

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III.

附圖説明

- 第一圖 甲状腺剔出ビタミンB缺乏症白鼠ノ脛骨上端骨端線 (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)
第二圖 甲状腺剔出ビタミンB缺乏症白鼠ニ甲状腺ヲ飼食セシメタル時ノ脛骨上端骨端線 (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)
第三圖 ビタミンB缺乏症白鼠ノ脛骨上端骨端線 (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)

Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Die Epiphysenlinie des oberen Endes der Tibia einer thyreoidektomierten Ratte, die mit B. vitaminfreier Nahrung gefüttert worden war. (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)
Fig. 2. Dieselbe Linie des oberen Endes der Tibia einer thyreoidektomierten, mit B-vitaminfreier Nahrung gefütterten Ratte, der man Schilddrüsensubstanz zu fressen gegeben hatte. (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)
Fig. 3. Dieselbe Linie des oberen Endes der Tibia einer mit B-vitaminfreier Nahrung gefütterten Ratte (Leitz: Okul. 4, Obj. 3.)

geringe Vermehrung.

2) An den normalen und den kastrierten Hunden vermehrten sich das Körpergewicht und der Gesamtstickstoff im Harn. Der Harnsäure- und Allantoinstickstoff im Harn zeigten Vermehrung sowohl in der absoluten Menge als auch im Prozentsatz zum Gesamtstickstoff. Diese Tatsache war deutlicher beim kastrierten Hund als beim normalen.

3) Der Kreatininstickstoff vermehrte sich in der absoluten Menge, und der Prozentsatz zum Gesamtstickstoff liess Neigung zur Vermehrung erkennen. Die Menge des Kreatininstickstoffes war sehr gering bei der Ernährung mit halbgereinigtem Reis, Laktogen und Sojasauce, schien aber bei der Injektion von Hodenextrakt zuzunehmen.

II. Bei der Hodenexstirpation (6 oder 7 Wochen nach der Operation). Der Gesamt-, Kreatinin- und Harnsäurestickstoff hatten in der absoluten Menge abgenommen. Aber der Prozentsatz zum Gesamtstickstoff zeigte im Vergleich mit dem normalen Werte keine deutliche Veränderung. Der Allantoinstickstoff liess sowohl in der absoluten Menge als auch im Prozentsatz Abnahme erkennen.

Nach dem obigen darf man schliessen, dass der Hodenextrakt keinen deutlichen Einfluss auf den Stickstoffwechsel, besonders nicht auf den Purinstoffwechsel der Hündin ausübt, aber beim normalen und beim kastrierten Hunde den Stickstoffwechsel und den Purinstoffwechsel beschleunigt. Die Hodenexstirpation hemmt besonders den letzteren.

(Autoreferat)

Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf das Knochenwachstum bei B-avitaminose.

Von

Dr. T. Ogawa und Dr. Y. Ohnishi.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto, Japan.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Wir untersuchten den Einfluss der Schilddrüse auf das Wachstum, besonders auf das der Knochen von mit B-vitaminfreier Nahrung gefütterten jungen weissen Ratten.

1) Von den mit B-vitaminfreier Nahrung gefütterten Tieren zeigten die thyreoidektomierten im Vergleich mit den nichtthyreoidektomierten stärkere Störung des Wachstums, besonders der Knochen. Es fand sich nämlich bei allen Röhrenknochen makroskopisch Abnahme der Länge und des Wassergehalts, und das Gewicht dieser Knochen war leichter sowohl im frischen als auch im getrockneten Zustande. An den Epiphysenfugen war histologisch die normale Zellwucherung merklich gestört und die Epiphysenlinie schmal, besonders an der Stelle der Knorpelsäulen und in der hypertrophischen Zone. Die Zellen der Zone waren meistens verkleinert und getrübt und zeitweise die Kerne völlig verschwunden. Die Zellanzordnung war auffallend unregelmässig. Die primäre Spongiosa hatte abgenommen, und die mitten im Mark vorhandenen Knochenbälkchen waren dünner und kürzer.

2) Bei den thyreoidektomierten mit B-vitaminfreier Nahrung gefütterten Tieren hatte die Darreichung einer geringen Menge Schilddrüsensubstanz zu stärkerer Störung des Knochenwachstums als bei den Kontrolltieren geführt. Der Wassergehalt und das Gewicht der Röhrenknochen waren geringer als bei der Kontrolle. Die histologische Untersuchung ergab auch ein dem makroskopischen Bild entsprechendes Resultat. (Autoreferat)

Ueber die histologischen Veränderungen der innersekretorischen Organe nach Altuberkulininjektion.

Von

Dr. S. Yoshino

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserlichen Universität zu Kyoto, Japan.

Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)