臟器硫黃含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響

(第二回報告) 副腎ノ影響

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 久保 昇 準

目次

第一章 緒言	第三節 インテレニン注射
第二章 實驗材料及ビ方法	第四節 アドレナリン注射
第三章 實驗成績	第四章 總括及ビ考按
第一節 對照試驗	第五章 結論
第二節 副腎皮質粉末試食	主要文献

第一章 緒言

曩ニ余ハ臟器硫黃含有量ニ及ボス硫黃、インスリン及ビ甲狀腺ノ影響ニ就キテ報告スル所アリシガ、更ニ今回ハ之レニ及ボス副腎ノ影響ニ就キテ述ベントス。

副腎ガ動物ノ生命保持ニ對シテ甚ダ緊要ナル臟器ナルハ既ニ論ナキ所ニシテ、副腎ヲ剔出スル時ハ動物ハ食欲減退、羸瘦、不活潑、筋脱力、新陳代謝ノ減退、體溫下降、血糖ノ減少等重篤ナル症狀ヲ招來シ、屢々死ニ到ルヲ以テ見ル

モ明カナリ。而シテ副腎ノ皮質ト髓質ハ高等動物ニアリテハ一見一個ノ臟器ノ如クナレドモ、形態學的ニモ、胎生學的發展ノ方面ヨリ見ルモ全ク別個ノ臟器ニシテ、其ノ機能モ亦異リ、皮質ハ副交感神經系統ヲ緊張セシメ、髓質ハ交感神經系統ヲ緊張セシメ、其作用互ニ相反スルモノ、如ク、一般新陳代謝ニ對スル作用ニ關シテモ近來多數ノ業績アリテ多クハ兩者ノ作用相反セルヲ説ケリ。

最近 Loeper 一派ハ硫黃新陳代謝ニ對シテ副腎ハ特ニ重要ナル意義ヲ有スルコトヲ唱へ、余モ前回報告ニ於テ硫黃投與及ビインスリン注射ノ際ニ於ケル臟器硫黃含有量ヲ檢シ、副腎ニ於テ特ニ硫黃量ノ増加著明ナルコトヲ知り、副腎ガ硫黃代謝ニ就キテ甚ダ密接ナル關係ニアルコトヲ述ベタリ。サレバ今諸種ノ内分泌ガ臟器硫黃量ニ及ボス影響ヲ檢スルニ當リ、副腎ガ之レニ及ボス影響ハ吾人ノ特ニ興味ヲ以テ知ラントスル所ナリ。即チ余ハ副腎皮質粉末試食、皮質物質製劑タルインテレニン注射及ビ髓質ホルモンタルアドレナリン注射ニヨリテ之レガ影響ヲ檢索セリ。

第二章 實驗材料及ビ方法

實驗動物ハ成熟家兎ヲ用ヒ、オカラヲ以テ飼養シ、之ノ副腎、甲狀腺、耳下腺、脾臟、肝臟、肝臟、睾丸、骨骼筋、皮膚ニ就キテ臟器硫黃量ヲ測定セリ。測定方法ハ第一回報告ニ於テ述ベタルト同様ニシテ、總硫黃ハ硝石曹達酸化法、酸化硫黃ハ Hansson 氏法ニヨリ、總硫黃ノ値ヨリ酸化硫黃ノ値ヲ減ジタル差ヲ以テ中性硫黃ノ値トセリ。内分泌物質トシテハ、副腎皮質粉末（新鮮ナル牛副腎ヨリ副腎皮質ヲトリ、乾燥粉末トセルモノ）、インテレニン（武田）千倍鹽化アドレナリン（三共）ヲ用ヒタリ。

臟器硫黃含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……（久保）

第三章 實驗成績

第一節 對照試驗

次ニ述ブル實驗ハスベテ第一回報告ノ實驗ト殆ド時期ヲ同ジクシテ行ヘルヲ以テ、第一回報告ノ對照試驗ヲ茲ニ引用スベシ。即チ其ノ平均値ヲ示セバ第一表ノ如シ。

第一表 對照試驗

臟器	總硫黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
副腎	0.475	0.048	0.427
甲狀腺	0.396	0.039	0.357
耳下腺	0.437	0.041	0.396
脾臟	0.612	0.065	0.547
肝臟	0.484	0.044	0.439
睪丸	0.401	0.036	0.365
骨格	0.472	0.042	0.430
皮膚	0.556	0.057	0.499

第二節 副腎皮質粉末試食

副腎皮質粉末末家兎體重毎珎〇・三瓦試食一四日ニ及ビタルモノナリ。其成績第二表ニ示ス如シ。總硫黃ニ就キテ見ルニ、副腎一五・一六%、甲狀腺五・〇五%、耳下腺三・六六%、肝臟七・〇二%、睪丸七・七三%、骨格筋〇・八五%、皮膚四・八六%ノ増加率ヲ示シ、脾臟ノミハ三・二七%ノ減少ヲ來セリ、酸化硫黃ハ副腎六・二五%、耳下腺一九・五一%、肝臟九・〇九%、骨格筋一六・六七%増加シ、甲狀腺五・一三%、脾臟七・六九%、睪丸二・七八%減少シ、皮膚ハ變化ナシ。中性硫黃ハ副腎一六・一六%、甲狀腺六・一六%、耳下腺二・〇二%、肝臟七・〇六%、睪丸八・七七%、皮膚五・四一%増加シ、脾臟二・五六%、骨格筋〇・四六%減少セリ。即チ副腎皮質粉末投與ニヨリテ、總硫黃ハ脾臟ヲ除ク外ハスベテノ臟器ニ於テ増加シ、特ニ副腎著明ニ増加セリ。酸化硫黃ハ副腎、耳下腺、肝臟、骨格筋ニ

第二表 副腎皮質粉末試食

臓器	動物番號	新鮮臓器重量 (瓦)	乾燥臓器重量 (瓦)	總 硫 黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
副 腎	1	0.20	0.0846	0.569	0.056	0.513
	2	0.27	0.0998	0.505	0.040	0.465
	3	0.48	0.2024	0.521	0.051	0.470
	4	0.25	0.0950	0.593	0.058	0.535
	平 均			0.547	0.051	0.496
	増減率			+15.16%	+ 6.25%	+16.16%
甲 狀 腺	1	0.15	0.0426	0.433	0.042	0.391
	2	0.35	0.0808	0.433	0.042	0.391
	3	0.22	0.0536	0.398	0.032	0.366
	4	0.20	0.0544	0.398	0.032	0.366
	平 均			0.416	0.037	0.379
	増減率			+ 5.05%	- 5.13%	+ 6.16%
耳 下 腺	1	1.25	0.2205	0.457	0.046	0.411
	2	1.30	0.3092	0.481	0.046	0.435
	3	1.53	0.3613	0.451	0.055	0.396
	4	1.25	0.2380	0.424	0.050	0.374
	平 均			0.453	0.049	0.404
	増減率			+ 3.66%	+19.51%	+ 2.02%
脾 臓	1	1.10	0.2428	0.549	0.066	0.483
	2	1.30	0.3076	0.639	0.063	0.576
	3	0.60	0.1356	0.629	0.055	0.574
	4	0.85	0.2013	0.551	0.054	0.497
	平 均			0.592	0.060	0.533
	増減率			- 3.27%	- 7.69%	- 2.56%
肝 臓	1	52.55	10.8898	0.578	0.054	0.524
	2	46.50	9.9253	0.559	0.042	0.517
	3	50.00	10.0832	0.465	0.041	0.424
	4	49.00	9.9924	0.468	0.054	0.414
	平 均			0.518	0.048	0.470
	増減率			+ 7.02%	+ 9.09%	+ 7.06%
辜 丸	1	3.85	0.7103	0.430	0.038	0.392
	2	1.83	0.3926	0.430	0.038	0.392
	3	2.90	0.5305	0.434	0.032	0.402
	4	3.25	0.5716	0.434	0.032	0.402
	平 均			0.432	0.035	0.397
	増減率			+ 7.73%	- 2.78%	+ 8.77%

臓器硫黃含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……(久保)

臟器	動物番號	新鮮臟器重量 (瓦)	乾燥臟器重量 (瓦)	總 硫 黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
骨 骼 筋	1	11.60	2.7368	0.520	0.059	0.461
	2	11.00	2.6556	0.449	0.043	0.406
	3	14.60	3.7128	0.440	0.049	0.391
	4	10.45	2.4464	0.496	0.044	0.452
	平 均			0.476	0.049	0.428
	増減率			+ 0.85 %	+16.67 %	- 0.46 %
皮 膚	1	6.00	1.8173	0.661	0.069	0.592
	2	5.10	1.6956	0.606	0.058	0.548
	3	4.90	1.6142	0.636	0.053	0.483
	4	5.17	1.6426	0.430	0.048	0.382
	平 均			0.583	0.057	0.526
	増減率			+ 4.86 %	0	+ 5.41 %
體 重	番 號	試驗日數	初 體 重 (疋)	終 體 重 (疋)		
	1	14	1.950	2.060		
	2	14	1.980	2.100		
	3	14	1.820	1.970		
	4	14	2.020	2.140		

於テ増加シ、中性硫黃ハ脾臟及ビ骨骼筋ニ於テ僅カニ減少スレドモ、他ノ臟器ニ於テハスベテ著明ニ増加シ副腎ニ於テ増加率最モ顯著ナリ。

第三節 いんてれにん注射

インテレニン家兎體重毎疋〇・五珉連續皮下注射シテ一五日ニ及ビタリ。其ノ成績第三表ニ示ス如シ。總硫黃ニ就キテ見ルニ副腎一三・二六%、耳下腺一・八三%、肝臟五・五八%、睪丸五・四九%、骨骼筋七八%ノ増加ヲ示シ、甲狀腺七・〇七%、脾臟一・四七%、皮膚〇・一八%減少セリ。酸化硫黃ハ副腎一八・七五%、耳下腺二・四四%、脾臟一・五四%、骨骼筋一九・〇五%増加シ、甲狀腺一七・九四%、肝臟四・五五%、睪丸五・五六%、皮膚八・七七%減少セリ。中性硫黃ハ副腎一二・六四%、耳下腺一・五二%、肝臟六・八三%、睪丸六・五九%、骨骼筋六・七四%、皮膚〇・

第三表 インテレニン注射

臓器	動物番號	新鮮臓器重量 (瓦)	乾燥臓器重量 (瓦)	總 硫 黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
副 腎	1	0.47	0.1605	0.533	0.050	0.483
	2	0.33	0.1201	0.591	0.065	0.526
	3	0.27	0.1001	0.509	0.048	0.461
	4	0.30	0.1361	0.552	0.062	0.490
	5	0.18	0.0700	0.503	0.060	0.443
	平 均			0.538	0.057	0.481
	増減率			+13.26%	+18.75%	+12.64%
甲 狀 腺	1	0.15	0.0487	0.391	0.035	0.356
	2	0.18	0.0379	0.391	0.035	0.356
	3	0.20	0.0546	0.352	0.030	0.322
	4	0.18	0.0496	0.352	0.030	0.322
	5	0.22	0.0472	0.352	0.030	0.322
	平 均			0.368	0.032	0.336
	増減率			- 7.07%	-17.94%	- 5.88%
耳 下 腺	1	1.00	0.1807	0.375	0.046	0.329
	2	1.40	0.3217	0.411	0.039	0.372
	3	1.15	0.2647	0.485	0.042	0.443
	4	1.35	0.4831	0.402	0.033	0.364
	5	1.15	0.2262	0.551	0.047	0.504
	平 均			0.445	0.042	0.402
	増減率			+ 1.83%	+ 2.44%	+ 1.52%
脾 臟	1	0.82	0.1732	0.513	0.059	0.454
	2	1.00	0.2326	0.633	0.061	0.572
	3	0.77	0.1869	0.671	0.078	0.593
	4	1.05	0.2538	0.635	0.068	0.567
	5	0.95	0.2188	0.563	0.063	0.500
	平 均			0.603	0.066	0.537
	増減率			- 1.47%	+ 1.54%	- 1.86%
肝 臟	1	43.80	12.3697	0.561	0.047	0.514
	2	53.37	16.2832	0.502	0.039	0.463
	3	40.62	12.4425	0.547	0.042	0.505
	4	50.47	15.8106	0.458	0.043	0.415
	5	42.20	13.0374	0.487	0.038	0.449
	平 均			0.511	0.042	0.469
	増減率			+ 5.58%	- 4.55%	+ 6.83%

臓器硫黃含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……(久保)

臟器	動物番號	新鮮臟器重量 (瓦)	乾燥臟器重量 (瓦)	總硫黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
腺	1	3.00	0.4106	0.405	0.035	0.370
	2	2.00	0.3214	0.353	0.025	0.328
	3	1.72	0.3116	0.426	0.036	0.390
	4	2.22	0.4896	0.377	0.028	0.349
	5	1.30	0.2583	0.554	0.045	0.509
	平均 増減率			0.423 + 5.49%	0.034 - 5.56%	0.389 + 6.59%
骨 格 筋	1	9.35	2.1254	0.539	0.049	0.490
	2	12.32	2.7952	0.468	0.043	0.425
	3	12.20	2.8319	0.436	0.042	0.394
	4	10.77	2.6880	0.517	0.058	0.459
	5	10.55	2.4410	0.585	0.060	0.525
	平均 増減率			0.509 + 7.84%	0.050 + 19.05%	0.459 + 6.74%
皮 膚	1	5.40	2.0942	0.509	0.055	0.454
	2	5.37	1.7817	0.434	0.043	0.391
	3	3.60	1.2266	0.664	0.059	0.605
	4	4.97	1.7178	0.503	0.045	0.458
	5	3.20	1.0090	0.663	0.059	0.604
	平均 増減率			0.555 - 0.18%	0.052 - 8.77%	0.502 + 0.60%
	番 號	試験日數	初 體 重 (瓦)	終 體 重 (瓦)		
體 重	1	15	1.800	1.820		
	2	15	1.960	1.950		
	3	15	1.900	1.850		
	4	15	1.980	2.000		
	5	15	1.730	1.830		

六〇%増加シ、甲状腺
五・八八%、脾臓一・八
六%、ノ減少ヲ示セリ
即チインテレン注射
ニヨリテ總硫黃ハ多ク
ノ臟器(副腎、耳下腺、
肝臓、睾丸、骨骼筋ニ
於テ増加シ、特ニ副腎
ニ於テ著明ニ増加セリ
酸化硫黃ハ副腎、耳下
腺、脾臓、骨骼筋ニ於
テ増加セリ。中性硫黃
ハ甲状腺及ビ脾臓ニ於
テ僅カニ減少スレドモ
他ノ臟器ニ於テハスベ

第四表 アドレナリン注射

臓器	動物番號	新鮮臓器重量 (g)	乾燥臓器重量 (g)	總硫黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
副 腎	1	0.20	0.0734	0.429	0.059	0.370
	2	0.20	0.0834	0.490	0.059	0.431
	3	0.25	0.0960	0.482	0.038	0.444
	4	0.42	0.1662	0.446	0.038	0.408
	5	0.37	0.1435	0.444	0.045	0.399
	平 均			0.458	0.048	0.410
	増減率			- 3.58%	0	- 3.98%
甲 狀 腺	1	0.17	0.0276	0.406	0.047	0.359
	2	0.32	0.0854	0.406	0.047	0.359
	3	0.28	0.0682	0.387	0.040	0.347
	4	0.15	0.0467	0.387	0.040	0.347
	5	0.20	0.0578	0.387	0.040	0.347
	平 均			0.395	0.043	0.352
	増減率			- 0.25%	+10.26%	- 1.40%
耳 下 腺	1	1.02	0.2356	0.382	0.047	0.335
	2	1.30	0.3201	0.481	0.052	0.429
	3	1.05	0.2780	0.440	0.040	0.400
	4	0.82	0.1747	0.481	0.052	0.429
	5	1.43	0.4500	0.440	0.040	0.400
	平 均			0.445	0.046	0.399
	増減率			+ 1.83%	+12.20%	+ 0.76%
脾 臓	1	0.65	0.1528	0.694	0.067	0.627
	2	1.00	0.2318	0.571	0.056	0.515
	3	0.64	0.1586	0.551	0.055	0.496
	4	0.65	0.1592	0.601	0.067	0.534
	5	1.00	0.2320	0.562	0.056	0.506
	平 均			0.596	0.060	0.536
	増減率			- 2.61%	- 7.69%	- 2.01%
肝 臓	1	48.95	14.8665	0.520	0.051	0.469
	2	49.20	15.9957	0.432	0.037	0.395
	3	44.75	14.5531	0.478	0.047	0.431
	4	44.50	13.1400	0.520	0.057	0.463
	5	49.75	15.3216	0.414	0.049	0.365
	平 均			0.473	0.048	0.425
	増減率			- 2.27%	+ 9.09%	- 3.19%

臓器硫黃含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……(久保)

臟器	動物番號	新鮮臟器重量 (瓦)	乾燥臟器重量 (瓦)	總硫黃 (%)	酸化硫黃 (%)	中性硫黃 (%)
辜丸	1	3.00	0.4778	0.530	0.051	0.479
	2	1.72	0.2770	0.353	0.040	0.313
	3	1.85	0.3615	0.420	0.049	0.371
	4	2.70	0.4756	0.404	0.029	0.375
	5	2.95	0.5566	0.339	0.032	0.307
	平均			0.409	0.040	0.369
	増減率			+ 1.97%	+11.11%	+ 1.09%
骨骼筋	1	16.35	4.0446	0.502	0.049	0.453
	2	11.87	2.9454	0.409	0.035	0.374
	3	13.45	3.2770	0.412	0.035	0.377
	4	12.70	3.2804	0.507	0.046	0.461
	5	15.20	3.8594	0.376	0.041	0.335
	平均			0.441	0.041	0.400
	増減率			- 6.78%	- 2.38%	- 7.00%
皮膚	1	4.75	1.7283	0.576	0.063	0.513
	2	4.20	1.2606	0.493	0.041	0.452
	3	5.55	1.7781	0.560	0.054	0.506
	4	5.60	2.1454	0.591	0.064	0.525
	5	6.60	2.2586	0.547	0.044	0.503
	平均			0.554	0.053	0.500
	増減率			- 0.36%	- 7.02%	- 0.20%
	番 號	試験日數	初 體 重 (瓦)	終 體 重 (瓦)		
體重	1	14	1.760	1.740		
	2	14	1.650	1.670		
	3	14	1.780	1.770		
	4	14	1.750	1.710		
	5	14	1.900	1.900		

テ増加シ、副腎ノ増加率特ニ著明ナリ。

第四節 あどれな

リン注射

千倍鹽化アドレナリ

ン家兎體重毎瓦〇・一

蚝皮下ニ連續注射シ一

四日ニ及ビタリ。其ノ

成績第四表ニ示ス如シ

總硫黃ハ副腎三・五八

%、甲狀腺〇・二五%

脾臟二・六一%、肝臟

二・二七% 骨骼筋六・

七八%、皮膚〇・三六

%減少ヲ來シ、耳下腺

一・八三%、辜丸一・九七%、増加セリ。酸化硫黄ハ副腎變化ナク、甲状腺一〇・二六%、耳下腺一二・二〇%、肝臓九・〇九%、辜丸一一・一一%増加シ、脾臓七・六九%、骨骼筋二・三八%、皮膚七・〇二%減少セリ。中性硫黄ハ副腎三・九八%、甲状腺一・四〇%、脾臓二・〇一%、肝臓三・一九%、骨骼筋七・〇〇%、皮膚〇・二〇%減少シ、耳下腺〇・七六%、辜丸一・〇九%増加セリ。即チアドレナリン注射ニヨリテ總硫黄及ビ中性硫黄ハ耳下腺、辜丸ニ於テ稍々増加スレドモ、他ノ臓器ニ於テハスベテ減少ノ傾向ヲ示ス。之レニ反シ、酸化硫黄ハ甲状腺、耳下腺、肝臓、辜丸ニ於テ著明ナル増加ヲ來セリ。

第四章 總括及ビ考按

余ハ家兎ニ於テ副腎皮質粉末ヲ試食セシメテ、其ノ諸臓器（副腎、甲状腺、耳下腺、脾臓、肝臓、辜丸、骨骼筋、皮膚）硫黄含有量ヲ測定セルニ、總硫黄及ビ中性硫黄ハ殆ドスベテノ臓器ニ於テ増加シ、副腎特ニ著シク増加セリ。酸化硫黄ハ副腎、耳下腺、肝臓、骨骼筋ニ於テ増加セリ。

インテレニンヲ注射セル場合モ、大體ニ於テ之ト傾向ヲ同ジクシ、總硫黄及ビ中性硫黄ハ多クノ臓器ニ於テ増加シ特ニ副腎ニ於テ増加率顯著ナリ。酸化硫黄モ副腎、耳下腺、脾臓、骨骼筋ニ於テ増加セリ。

アドレナリンヲ注射セル場合ハ、總硫黄及ビ中性硫黄ハ、其ノ度餘リ著明ナラザレドモ多クノ臓器ニ於テ減少ノ傾向アリ。酸化硫黄ハ、之レニ反シ甲状腺、耳下腺、肝臓、辜丸ニ於テ著明ナル増加ヲ示セリ。

抑モ副腎皮質ト髓質トハ全ク別個ノ臓器ニシテ、從テ其ノ作用モ亦異レルハ今日一般ニ認メラル、所ニシテ、之レ

臓器硫黄含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……（久保）

ニ關シテハ我教室ニテモ既ニ多數ノ業績ノ發表セラレタルアリ。今一般新陳代謝ニ及ボス之等兩者ノ作用ニ就キテ文献ヲ按ズルニ、脂肪新陳代謝ニ關シテ、河野ハ副腎皮質物質投與ニヨリテ血液及ビ副腎内ノ脂肪及ビ類脂肪體量ハ減少シ髓質エキスニヨリテハ却テ増加スト云ヒ、大村ハ白鼠ニ於テ副腎皮質粉末ノ適當量試食ハ臟器(心臟、肝臟、腎臟、骨骼筋)脂肪量ノ増加ヲ來シ、又マウスニ於テ副腎皮質製劑ナルインテレニンヲ適當量注射スル時ハ體重並ニ全身脂肪量ノ増加ヲ來スヲ認メ、新田ハ甲狀腺物質試食ニヨリ、實驗的ニ甲狀腺機能亢進ヲ起サシメタル白鼠及ビマウスニ副腎皮質物質ヲ投與スル時ハ、其ノ甲狀腺機能亢進ノタメニ起ル臟器及ビ全身脂肪量ノ減少ハ抑制サレ、マウスニ於テハ却テ全身脂肪量増加スルヲ認メ、又ウイタミン^B缺乏食飼養白鼠ニ副腎皮質物質ヲ試食セシムル時ハ、アウイタミノーゼニヨル體重ノ減少ハ阻止サレ、運動麻痺發現マデノ潛伏日數ハ延長サレ、且ツ臟器脂肪量ノ減退ハ抑制サル。之レニ反シアドレナリンヲ連續注射スル時ハ、アウイタミノーゼニヨル體重ノ減少ハ助長サレ、運動麻痺發現ノ時期ハ早メラレ、且ツ臟器脂肪量ノ減退ハ促進サルト云ヘリ。

含水炭素新陳代謝ニ關シテハ、織田ハ副腎皮質エキスを家兎ニ注射シ、之レガ血糖降下作用アルヲ認メ、且ツアドレナリン過血糖ヲ抑制シ、インスリン寡血糖ヲ助長セシムル作用ノ存スルコトヲ證セリ。小屋迫モ家兎ニ於テ副腎皮質エキスを皮下及ビ腹腔内注射ニヨリテ寡血糖ヲ招來スト云ヘリ。村尾ハ家兎ニ於テ副腎皮質物質投與ニヨリテ肝臟及ビ筋肉糖原質ハ増加ヲ來シ、アドレナリン注射ニヨリテ之等ノ減少ヲ來スコトヲ報ゼリ。

蛋白代謝ニ關シテハ辻教授、青木、溝上、小川、田坂ハイヰレモアドレナリン注射ハ窒素新陳代謝ヲ亢進セシムルコトヲ報ジ、小川、田坂ハ副腎皮質物質投與ハ之レニ反シ窒素新陳代謝ニ對シ抑制的ニ作用スルコトヲ述べタリ。

又辻教授ハ糖尿病患者ニ於テインスリント副腎皮質トノ併用ニヨリテ、基礎新陳代謝ノ下降ト共ニ呼吸係數ノ上昇ヲ來シ、好結果ヲ得タルコトヲ述ベラレタリ。原ハ甲狀腺機能亢進症患者ニ副腎粉末ヲ經口的ニ投與シテ基礎新陳代謝ノ下降セルヲ認メタリ。Lyman, Nichols a. Mc. Cann, Weis a. Reiss 等ハ基礎新陳代謝ノ測定ヲナシ、アドレナリン注射ハ酸素消費ヲ増加シ、呼吸商ヲ上昇セシムト云フ。Martin a. Armistead ハアドレナリンハ組織呼吸ヲ増加セシムト云ヘリ。

空地ハ甲狀腺機能亢進症患者ニ副腎粉末ヲ試食セシメテ沃度新陳代謝ヲ檢シ、尿中排出沃度量ノ減少ヲ見、鈴木ハ家兎ニ沃度加里水溶液ヲ注射シテ、其ノ尿中排泄狀態ニ及ボス副腎皮質ノ影響ヲ檢シタルニ、正常家兎ニ副腎皮質ヲ試食セシムル時ハ、甲狀腺機能低下ノ場合ノ如ク、尿中沃度排泄ハ遲延シ、排泄沃度量ハ減少セリ。齋藤ハ副腎皮質粉末投與ニヨリテ諸臟器ノ沃度含有量ヲ檢セルニ、副腎皮質投與ハ沃度含有量ヲ増加セシメ、アドレナリン注射ハ之レヲ減少セシムト云ヘリ。

之等ノ業績ヲ綜合シテ考フル時ハ副腎皮質ト髓質ハ其作用相反シ、大體ニ於テ皮質物質ハ新陳代謝ヲ緩慢ナラシメアドレナリンハ之レニ反シテ新陳代謝ヲ亢進セシムルコトヲ見得ベシ。特ニ硫黃新陳代謝ニ關シテモ田坂ハ犬ニ於テ副腎皮質粉末試食ニヨリ尿中排出ノ總硫黃、エーテル硫酸、中性硫黃スベテ減少シ、アドレナリン注射ニヨリテ之等ノ増加ヲ來ス、即チ副腎皮質粉末投與ニヨリテ硫黃新陳代謝ハ抑制サレ、アドレナリン注射ニヨリテ亢進サル、コトヲ認メタリ。即チ余ガ實驗成績ニ於テ副腎皮質粉末試食及ビインテレン注射ニヨリテ多クノ臟器ニ於テ硫黃量増加シ、アドレナリン注射ニヨリテ減少ヲ來セルハ、皮質物質投與ニヨリテ硫黃代謝ハ緩慢トナリテ硫黃排泄ハ抑制サレ

臟器ニ含有セラル、硫黃ノ増加ヲ來シ、アドレナリン注射ニヨリテハ硫黃代謝亢進サレ、硫黃排泄ハ増加シ、臟器硫黃含有量ノ減少ヲ來セルモノナルベシ。又アドレナリン注射ニ際シ、臟器中ノ酸化硫黃ノ含有量比較的大ナルハアドレナリンニヨル、組織ノ酸化機能亢進ヲ示スモノナルベシ。

副腎特ニ副腎皮質ト硫黃トノ密接ナル關係ニ就キテハ既ニ第一回報告ニ於テ述べタル所ニシテ、Loeper, Decourt, Oliver 等ハアヂソン氏病患者ノ血液及ビ尿中ノ硫黃量増加シ、又犬ニ於テ副腎ヲ剔出スル時ハ血液中ノ硫黃量増加スト云ハ、Laurie ハ硫黃投與ニヨリテ諸臟器中特ニ副腎ニ於テ硫黃量増加スルヲ認メ、Loeper, Garcin, Lesne 等ハ硫黃投與ニヨリテ副腎皮質ノ硫黃量最モ著明ニ増加スト云ヒ、余ノ本實驗ニ於テモ副腎皮質物質投與ニヨリテ諸臟器中副腎ニ於テ、増加率最モ顯著ナリ。又三島ハ硫黃投與白鼠ニ於テ組織學的ニ副腎皮質ノ肥厚増殖セルヲ認メタリ。斯クノ如ク副腎ト硫黃トノ間ニハ特別ナル關係ノ存スルハ明カナレドモ、副腎ハ單ニ硫黃ヲ貯藏シ必要ニ應ジテ血液中ニ輸送スルモノナリヤ、將又硫黃ハ副腎ノ内分泌機能ト何等カノ關係ヲ有スルモノナリヤ、之等ノ關係ニ就キテハナホ將來ノ研究ニ俟タザルベカラズ。

第五章 結 論

余ハ家兔ニ於テ諸臟器(副腎、甲狀腺、耳下腺、脾臟、肝臟、睪丸、骨骼筋、皮膚)ノ硫黃含有量ニ及ボス副腎ノ影響ヲ檢シ次ノ如キ結論ニ到達セリ。

一、副腎皮質粉末試食ニヨリテ、總硫黃及ビ中性硫黃ハ多クノ臟器(副腎、甲狀腺、耳下腺、肝臟、睪丸、皮膚)ニ

於テ増加シ、特ニ副腎ニ於テ著明ニ増加ス。酸化硫黄ハ副腎、耳下腺、肝臓、骨骼筋ニ於テ増加セリ。

二、インテレン注射ニヨリテ、總硫黄及ビ中性硫黄ハ多クノ臓器(副腎、耳下腺、肝臓、睪丸、骨骼筋)ニ於テ増加シ、副腎ニ於テ特ニ著明ニ増加ス。酸化硫黄ハ副腎、耳下腺、脾臓、骨骼筋ニ於テ増加ス。

三、アドレナリン注射ニヨリテ、總硫黄及ビ中性硫黄ハ多クノ臓器(副腎、甲狀腺、脾臓、肝臓、骨骼筋、皮膚)ニ於テ減少シ、酸化硫黄ハ甲狀腺、耳下腺、肝臓、睪丸ニ於テ増加ス。

拙筆ニ際シ、恩師辻教授、滿洲醫科大學松岡教授ノ御指導ト御校閲ノ對シ流弊ノ謝意ヲ表ス。
本論文ノ要旨ハ昭和六年三月第五回日本内分泌學會總會ニ於テ發表セリ。

出 要 文 献

- 1) 青木：日本内分泌學會雜誌，第3卷，第2號，317頁，昭和2年。
- 3) 原：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第3號，401頁，昭和3年。
- 6年。
- 5) 河野：日本内分泌學會雜誌，第3卷，第1號，46頁，昭和2年。
- 第11號，1903頁，昭和4年。
- 6) 小屋迫：日本内分泌學會雜誌，第6卷，第3號，477頁，昭和5年。
- Garcin, Lesure: Cpt. rend. des Séances de la soc. de biol. Bd. 96, Nr. 14, S. 1107, 1927.
- Oliver: Prog. Med. Jg. 54, Nr. 10, 1926. (Z. n. Rom's Berichte Bd. 41, S. 378, 1927).
- Bd. 12, Nr. 1, S. 84, 1928.
- 10) Lymann, Nicholls, Mc. Cunn: Jour. pharm. a. exp. therapeut. Vol. 21, P. 348, 1928.
- 11) 三島：日本内分泌學會雜誌，第5卷，第11號，1955頁，昭和5年。
- 第6卷，第4號，522頁，第6號，840頁，853頁，第8號，1130頁，昭和5年。
- Jour. of physiol. Vol. 66, P. 448, 1922.
- 14) 溝上：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第1號，1頁，昭和3年。
- 15) 新田：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第9號，1623頁，昭和3年。
- 16) 新田：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第1號，1頁，昭和3年。
- 17) 大村：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第12號，2146頁，昭和4年。
- 5卷，第12號，2170頁，昭和5年。
- 19) 總田：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第6號，1068頁，第7號，1197頁，昭和3年。
- 20) 小川：日本内分泌學會雜誌，第7卷，第2號，179頁，188頁，昭和6年。
- 10號，1882頁，昭和5年。
- 22) 空堀：辻内科甲狀腺論文集，第1卷。
- 23) 齋藤：日本内分泌學會雜誌，第5卷，第4號，689頁，昭和4年。
- 24) 辻：Bioch. Jour. Vol. 9, P. 449, 1915.
- 25) 辻：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第3號，381頁，昭和3年。
- 26) 田坂：日本内分泌學會雜誌，第6卷，第9號，1171頁，昭和5年。
- 27) Weiss, Reiss: Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 38, S. 428, 1923.

臟器硫黄含有量ニ及ボス諸種内分泌ノ影響……(久保)

**Ueber den Einfluss der innersekretorischen
Drüsen auf den Schwefelgehalt in den
verschiedenen Organen.**

II. Mitt. Ueber den Einfluss der Nebenniere.

Von

Dr. S. Kubo.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser bestimmte den Schwefelgehalt in verschiedenen Organen von Kaninchen (Nebenniere, Schilddrüse, Parotis, Milz, Leber, Hoden, Muskel und Haut) nach Einverleibung von Nebennierenrindensubstanz und Adrenalin.

Die Resultate waren die folgenden:

1) Die Fütterung mit Nebennierenrindenpulver bewirkte in den meisten Organen, wie Nebenniere, Schilddrüse, Parotis, Leber, Hoden und Haut, Zunahme des Gesamt- und Neutralschwefelgehalts, besonders stark in der Nebenniere, und auch Vermehrung des Sulfatschwefelgehalts in Nebenniere, Parotis, Leber und Muskel.

2) Bei der Injektion von Interenin (Nebennierenrindenpräparat) neigte der Gesamt- und Neutralschwefelgehalt in den meisten Organen (Nebenniere, Parotis, Leber, Hoden und Muskel), besonders stark in der Nebenniere, zur Vermehrung und ebenso der Sulfatschwefelgehalt in Nebenniere, Parotis, Milz und Muskel.

3) Bei der Adrenalininjektion kam es in den meisten Organen (Nebenniere, Schilddrüse, Milz, Leber, Muskel und Haut) zur Verminderung des Gesamt- und Neutralschwefelgehalts, dagegen zur Vermehrung des Sulfatschwefelgehalts in Schilddrüse, Parotis, Leber und Hoden.

(Autoreferat)