FOLIA ENDOCRINOLOGICA JAPONICA

Band VIII

Januar

Heft 10

Eine neue Theorie der Entstehung des Bronchialasthmas. (Untersuchungen über das tierische und menschliche Asthma.) III. Mitteilung.

Von

Prof. Dr. Kwanji Tsuji.

(Aus der Ersten Medizinischen Klinik der Kaiserlichen
Universität zu Kioto, Japan)

In meinen vorherigen zwei Mitteilungen ^{1, 2)} habe ich fast restlos nachgewiesen, dass der Atemtypus des Asthmas, des menschlichen und des experimentellen, in erster Linie durch plötzliche Dilatation und Exsudation der allgemeinen Lungenkapillaren und sekundär durch einen sich daranschliessenden reflektorischen Alveolenerweiterungsmechanismus, nämlich durch expiratorischen Bronchiolarkrampf und gleichzeitige starke Anstrengung der expiratorischen Atemhilfsmuskeln, entsteht. Als Ergänzung des Beweises dieser neuen Theorie wurden weiter folgende Tierexperimente und klinische, pathologisch-anatomische Untersuchungen ausgeführt.

I. EXPERIMENTELLES ASTHMA.

Toxisches Asthma.

Schon in der früheren Mitteilung habe ich berichtet, dass die Hauptursache der durch Histamininjektion hervorgerufenen As-

thmadyspnoe in der Dilatation und der Transsudation der allgemeinen Lungenkapillaren besteht und bei der Atemkurve dieser Dyspnoe anfangs die Amplitude kurze Zeit abnimmt und darauf allmählich wieder zunimmt, wobei es zur Abnahme durch Verengung der Alveolarlumen und zur Zunahme durch die expiratorische Erhöhung des alveolären Innendrucks kommt. Aber Histamin ist ein heftiges Kapillargift und zugleich auch ein auf die glatten Muskeln bzw. Bronchialmuskeln mehr oder weniger kontrahierend wirkendes Mittel. Deshalb untersuchte Wada^{3,4)} von meinem Institute den Einfluss von verschiedenen Kapillargiften auf die Atembewegung des Kaninchens, die nicht auf die glatten Muskeln der Bronchien, sondern nur auf die Blutgefäßkapillaren permeabilitätserhöhend wirken, wie Senföl, Cantharidin, Crotonöl und Cobragift. Dabei ergab sich, dass durch die intravenöse Injektion dieser Kapillargifte die gleichen Atemkurven wie die bei der Histamindyspnoe zustande kommen und auch diese Dyspnoen durch eine kleine Menge Adrenalin vollständig behoben werden können, durch selbst eine grosse Dose Atropin aber nicht, wobei die Dyspnoehemmung des Adrenalins auf seine direkte Kapillarwirkung bzw. Kapillarkontraktion zurückzuführen ist. Daraus geht hervor, dass die durch diese verschiedenen Kapillargifte erzeugte Atemnot einfach eine Folgeerscheinung des durch Dilatation und Exsudation der Lungenkapillaren hervorgerufenen reflektorischen Alveolenerweiterungsmechanismus ist.

Fig. 1. a.

Fig. 1. b.

Fig. 2.

Fig. 3.

Wird eine grosse Dose Pilokarpin (2.0—4.0mg) intravenös injiziert, so stellt sich eine Atemnot ein, deren Respirationsskurve kürzer und dichter ist. Diese Atemnot kommt durch die durch Pilokarpininjektion bewirkte Kapillardilatation zustande, und so findet man nach der Atropininjektion die normale Respirationsskurve wieder. Grossmann⁵⁾ meint, dass eine akute Blutstauung in der Lunge, z. B. die durch Vagusreizung erzeugte, die Asthmadyspnoe hervorrufen dürfe. Nach unserem Experiment führt also eine einfache Vagusreizung bzw. einfache Dilatation der Lungenkapillaren zu keiner echten Asthmadyspnoe. Da die Kapillardilatation durch Pilokarpininjektion aber das Auftreten von Exsudation der Lungenkapillaren begünstigen kann, muss Vagusreizung bei der Entstehung der Asthmadyspnoe als ein Hilfsmoment eine grosse Rolle spielen.

Fig. 4. a.

Fig. 4. b.

Weiter kann Pituitrin wie das Adrenalin die Histamindyspnoe hemmen, wovon die Ursache in der kontrahierenden Wirkung des Pituitrins auf die Lungenkapillaren zu suchen ist. Beim Pituitrin ist aber vor der Hemmung eine kurzdauernde Förderung der Histamindyspnoe bemerkbar, welche vielleicht durch dem Pituitrin beigemishtes Histamin verursacht wird. Die Tatsache, dass sich beim Meerschweinchen durch Pituitrininjektion leicht Asthmadyspnoe erzeugen lässt, zeigt uns, dass das Meerschweinchen viel empfindlicher gegen Histamin als das Kaninchen ist und so die kapillarkontrahierende Wirkung des Pituitrins beim ersteren Tiere völlig verborgen bleibt. Also wirkt das Pitressin, der gefäss kontrahierende Bestandteil des Pituitrins, sofort nach Einverleibung stärker dyspnoehemmend.

Fig. 5.

Fig. 6.

Um die Exsudation der Lungenkapillaren zu bekämpfen, verwendete Wada⁹⁾ 10 ccm 8% ige Gummi arabicumlösung und 1 ccm 10% ige Chlorkalziumlösung. Bei den mit Gummi arabicum und Chlorkalzium vorbehandelten Kaninchen wird die durch die obigen verschiedenen Kapillargifte hervorgerufene Atemnot deutlich gehemmt. Besonders ist diese hemmende Wirkung 5—10

Minuten nach der Behandlung deutlich bemerkbar. Sie hält 30—60 Minuten lang an und nimmt nachher allmählich ab, und anderthalb Stunden später konstatiert man wieder die eigentliche Atemnot.

Fig. 7.

Fig. 8.

Miyake⁷⁾ in meinem Institut stellte an isolierten Kaninchungen Durchströmungsversuche an. Der vorsichtig präparierte Lungenlappen wird in einer Atmungsapparatur (modellierter Brustkorb) befestigt, wo er unter künstlicher Atmung mit körperwarmer Lockescher Lösung, der kleine Mengen Histamin, Adrenalin oder Pilokarpin zugesetzt werden, durchströmt wird.

Histamininjektion in die Zuflusskanüle ruft starke Verminderung der Durchflussmenge und deutliche Verkleinerung der Am-

plitude der Atemkurve hervor. Das Lungenpräparat nimmt durch die Histamindurchströmung merklich an Gewicht zu, indem Histamin die Entstehung des Lungenödems fördert.

Fig. 9.

Adrenalininjektion bewirkt Verringerung der Durchflussmenge, wobei aber keine Veränderung der Atemkurve und des Gewichts des Lungenpräparates nachzuweisen ist. Die durch Histamininjektion bewirkte Gewichtszunahme lässt sich durch Adrenalinzugabe hemmen.

Der Einfluss des Pilokarpins auf die Durchflussmenge ist nicht auffallend. Dasselbe gilt vom Atropin. Pilokarpin führt zur Verkleinerung der Atemkurvenamplitude, welche aber durch Atropinzusatz vollständig beseitigt wird.

Fig. 10.

Hierbei ist die Wirkung von Histamin, Adrenalin und Pilocarpin je auf Lungenarterien, Lungenkapillaren und Lungenvenen zu berücksichtigen.

Es steht ausser allem Zweifel, dass Histamin zu Dilatation und Exsudation der Gefässkapillaren führt. Miyake⁸⁾ untersuchte die Gefässwirkung von Histamin auf isolierte Blutgefässpräparate, wobei sich stets Gefässkontraktion zeigte, und zwar wiesen dabei die Lungenvenen die stärkste Kontraktion und die allgemeinen peripheren Arterien die nächststärkste auf. Wenn auch experimentell nachweisbar, ist die Kontraktion der Lungenarterien und der allgemeinen peripheren Venen doch auffallend schwach. Die starke Verminderung der Durchflussmenge nach Histaminzusatz ist daher hauptsächlich auf die starke Kontraktion der Lungenvenen zurückzuführen. Diese elektiv starke Kontraktion der Lungenvenen durch Histaminzugabe dürfte am meisten verständlich machen, warum die eigentliche kapillarschädigende Wirkung des Histamins an der Lunge weit stärker als an anderen Organen in Erscheinung tritt. Infolge hochgradigen Lungenödems durch Histaminzugabe kommt es zur obenangegebenen Gewichtszunahme des Lungenlappens

und zur Verkleinerung der Atemkurvenamplitude. Da beim denervierten Lungenpräparat der reflektorisch auftretende Alveolenerweiterungsmechanismus fehlt, zeigt dieses nicht die dementsprechende Vergrößerung der Atemkurvenamplitude, zu der es beim normalen Lungenpräparat durch die intravenöse Injektion verschiedener Kapillargifte an den Atemkurven stets kommt.

Weil Adrenalin die Lungenarterien stärker als die Lungenvenen kontrahiert (Miyake) und sich auch die Kapillaren dabei an der Kontraktion mitbeteiligen, stellt sich auf Adrenalinzusatz Abnahme der Durchflussmenge ein, aber keine wesentliche Veränderung von Alveolarlumen und Dehnbarkeit der Alveolenwand. In bezug auf Alveolarlumen und Dehnbarkeit zeigt die Atemkurve bei Adrenalinzusatz fast normale Form. Andererseits führt Adrenalin durch seine Kapillarkontraktion zur Herabsetzung der Kapillardurchlässigkeit, wodurch Adrenalin nicht nur keine Gewichtszunahme am Lungenpräparate hervorruft, sondern auch die durch Histaminzusatz zustandekommende Gewichtszunahme zu hemmen vermag.

Pilokarpin bewirkt keine wesentliche Veränderung der Durchflussmenge, weil es keine Kontraktion der Lungenarterien oder Lungenvenen (Miyake), sondern nur Dilatation der Lungenkapillaren erzeugt. Die hier beobachtete Verkürzung der Atemkurvenamplitude ist als die Folge der Verengerung des Alveolarlumens und der Steifung der Alveolenwände aufzufassen.

Anaphylaktisches Asthma.

Die Atemnot bei Serumanaphylaxie ist von der ganz gleichen Art wie die durch Kapillargifteinverleibung erzeugte Dyspnoe, und auch die pathologisch-anatomischen und histologischen Befunde stimmen bei beiden fast völlig überein. Als einziger Unterschied zwischen beiden ist hervorzuheben, dass die erstere immer von Vagotonie begleitet ist, die letztere dagegen nicht. Infolgedessen wird bei der serumanaphylaktischen Dyspnoe die Veränderung der Kapillaren bzw. die Kapillardilatation und die Kapillarexsudation stets durch Vagotonie begünstigt.

Als diese kapillarenangreifenden Gifte kommen in erster Linie die im Körpergewebe abgebauten Spaltprodukte fremden Eiweisses in Betracht. Darunter stehen an erster Stelle Pepton und Histamin. Unter verschiedenen anderen Eiweisspaltprodukten dürften sich Imidoverbindungen und vielleicht auch einige unbekannte Kapillargifte finden. Doch sind zur Sicherstellung der Richtigkeit dieser Vermutung noch weitere feinere Untersuchungen nötig.

Wada⁹⁾ von meinem Institut führte folgende Experimente aus: Man tötet ein Kaninchen, bei dem durch Pferdseruminjektion Anaphylaxie erzeugt worden, sofort im anaphylaktischen Zustand und stellt aus den verschiedenen Organen dieses Tiers, nämlich Lunge, Leber, Milz, Niere und Dünndarm, je einen Wasserextrakt her, dessen Wirkung auf die Atemkurve untersucht wird, indem man ihn in die Halsvenen eines normalen Kaninchens bringt. Die Atemkurve zeigte, dass der Wasserextrakt der Lunge den grössten Gehalt an die anaphylaktische Dyspnoe bewirkender Substanz enthält, die beim Enteiweissen durch Kochen vollständig ins enteieissste Filtrat übergeht. Miyake¹⁰⁾ von meinem Institut fand, dass frische Lunge, Muskeln, Leber und Dünndarm von Kaninchen, wenn sie in fein zerkleinerter Form in physiologischer Kochsalzlösung unter Histaminzusatz (1 mg Histamin auf je 1 g des Gewebes) der Autolyse überlassen werden, die physiologische Tätigkeit des Histamins vernichten, und zwar tut dies am schnellsten und stärksten das Lungengewebe. Nach den obigen Experimenten scheint die bei der Serumanaphylaxie gebildete dyspnoeerzeugende Substanz in der Lunge zu akkumulieren und dort abgebaut zu werden. Ausserdem kontrahierten nach Miyake¹¹⁾ von verschiedenen gefässkontrahierenden Substanzen fast alle die Lungenarterien stärker als die Lungenvenen, und nur ausnahmsweise war die durch Histamin und Pepton bedingte Kontraktion an den Lungenvenen stärker als an den Lungenarterien. Insbesondere wirkt Pepton fast nicht auf die Lungenarterien, während es die Lungenvenen kontrahiert. Aus diesen Experimenten kann der Schluss gezogen werden, dass Histamin, Pepton und wahr-

scheinlich andere Schockgifte, wenn sie durch die Blutzirkulation in die Lungenkapillaren transportiert werden, einen reflektorischen Krampf der Lungenvenen bewirken, wodurch sie in den Lungenkapillaren zurückgehalten werden. Nach den feineren histologischen Untersuchungen der Lungengefäße von Amano und Takino¹²⁾ finden sich an den Lungenvenen reichlicher glatte Ringmuskeln und Nervenfasern als an den Lungenarterien vor, besonders bei den Herbivoren. Auch weist die Hilusgegend einige an den Lungenarterien nicht vorhandene Ganglienzellenhaufen auf. Diese neuen Ergebnisse scheinen dafür zu sprechen, dass die Lungenvenen, wie die Bronchien und die Bronchiolen, einen reflektorischen Mechanismus besitzen.

Über den Entstehungsort der Antigen-Antikörperreaktion bei der Serumanaphylaxie herrschen zwei Theorien, eine humorale (Friedberger) und eine zelluläre (Doerr). Bei der Begründung ihrer Theorie stützen sich Friedberger¹³⁾ u. a. auf ihre Versuchsergebnisse in vitro, wobei es ihnen gelang, aus spezifischen Präzipitaten durch Digerieren mit Meerschweinchenkomplement genügend Anaphylatoxine zu gewinnen, die Meerschweinchen zu töten vermochten. Als Beweis dafür, dass die anaphylaktische Reaktion an die Gewebszellen gebunden ist, gibt Doerr¹⁴⁾ die Tatsache an, dass bei der passiven Sensibilisierung des Meerschweinchens durch Injektion antikörperhaltigen Serums eine Latenzzeit besteht, bevor das Tier sensibilisiert ist, und dass es sich bei diesem Intervall um den Zeitraum handelt, der zur Bindung der passiv einverleibten Antikörper an die fixen Gewebselemente, Kapillarendothelien oder Gewebszellen nötig ist. Ein anderer Beweis für die nichthumorale Natur der Anaphylaxie ist die zuerst von Fenyvessy und Freund¹⁵⁾ gemachte Beobachtung, dass die Überempfindlichkeit auch dann noch unverändert weiter besteht, wenn die anaphylaktischen Antikörper bereits so gut wie völlig aus dem Kreislauf verschwunden sind.

Überblickt man das Riesenmaterial, das sich durch die experimentellen und klinischen Untersuchungen von verschiedenen Autoren angesammelt hat, so bekommt man eine Vorstellung von der enormen Vielseitigkeit der anaphylaktischen Veränderungen. Weiter hat man längst erkannt, dass bei der Anaphylaxie humorale Veränderung und zelluläre Reaktion ineinander übergehen. Jedenfalls entsteht der anaphylaktische Schock durch die Permeabilitätserhöhung der Kapillarendothelien, die durch anaphylaktische Gifte bewirkt wird. Es handelt sich bei den anaphylaktischen Giften um Abbauprodukte des reinjizierten Proteins von verschiedenen Stufen, wie Pepton, Histamin, Imidoverbindung u. a., welche auf die allgemeinen Gefäßskapillaren stark permeabilitätserhöhend wirken.

Aus unseren obigen Experimenten geht hervor, dass sich die in die Zirkulation gelangten anaphylaktischen Gifte durch die reflektorische Kontraktion der Lungenvenen in den Lungenkapillaren akkumulieren und vom Lungengewebe inaktiviert werden, und dass dabei besonders infolge der starken Schädigung der Lungenkapillaren durch diese Giftstauung die Schockdyspnoe entsteht. Wenn also ein Antigen dem sensibilisierten Organismus einverleibt wird und seine in den verschiedenen Organzellen erzeugten Abbauprodukte durch die Blutzirkulation in die Lungenkapillaren gelangen, kommt es dadurch chemisch-biologisch zu einem reflektorischen Krampf der Lungenvenen, wodurch diese Abbauprodukte in den Lungenkapillaren zurückgehalten werden. Diese in den Lungenkapillaren zurückgehaltenen Eiweisspaltprodukte werden intravaskulär durch fermentative Einwirkung weiter zerstört, wodurch das Blut davon gereinigt wird. Dies kann man als eine Teilerscheinung der in der Lunge sich abspielenden Filtrations- und Verdauungsvorgänge gegen körperfremde organische Substanzen auffassen. Über diese Vorgänge haben bereits besonders Aschoff und seine Schüler⁽¹⁶⁾ eingehend untersucht.

Schon seit längerer Zeit ist es hauptsächlich histologisch bekannt,

dass verschiedene in Blut oder Lymphe eingetretene zelluläre oder organische korpuskuläre Elemente, wie Placentariesenzellen (Schmorl¹⁹⁾), gespeicherte Histiozyten und Monozyten (Aschoff,¹⁸⁾ Kiyono¹⁷⁾), Geschwulstzellen (Schmidt²⁰⁾), Knochenmarksriesenkerne (Aschoff,²¹⁾ Ogata²²⁾), Fettsubstanzen (Verne²³⁾) u. a., in die Lungenkapillaren abgeschoben und dort intravaskulär verdaut werden. Über den spezifischen Filtrationsmechanismus der Lungenkapillaren weiss man noch nichts Sicheres. Nur soviel ist sicher, dass es sich dabei nicht um einfache mechanische Embolisierung handelt, sondern um andere biologische Erscheinungen noch unbekannter Natur. Ob aber hier die adsorptiven Eigenschaften der Lungenkapillarwandungen, oder die Viskositätszunahme des Lungenblutes infolge energischer Verdunstung, oder die geringe Blutstromgeschwindigkeit bzw. der niedrige Blutdruck in den Lungenkapillaren die Hauptrolle spielen, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Der obengenannte reflektorische Krampf der Lungenvenen durch Schockgifte muss als eine chemisch-biologische Erscheinung für den Filtrationsvorgang von besonderer Bedeutung sein.

Viele Forscher haben beim anaphylaktischen Schock ihr Hauptaugenmerk auf das Verhalten der Leber und der Lunge, besonders auf das der ersteren, gerichtet. Mautner und Pick²⁴⁾ fanden beim Schockzustand des Hundes starke Blutüberfüllung und Anschwellung der Leber und erklärten die Blutdrucksenkung als eine Folge der mangelhaften Herzfüllung, indem das Blut durch einen Krampf der Venenabflusswege in der Leber zurückgehalten wird. In der Tat sind neuerdings von Arey und Simmonds²⁵⁾ kräftige glatte Muskelringe an den Venae hepaticae beim Hunde, nicht aber beim Kaninchen und Meerschweinchen festgestellt worden. Mautner und Pick wurden durch weitere Durchströmungsversuche an der isolierten überlebenden Leber darin bestärkt, dass die Schockgifte bei jenen Karnivoren, bei denen sie im Leben einen Blutdrucksturz bewirken, an der überlebenden Leber zum Verschluss der Venae hepaticae mit darauffolgender mächtiger Stauung und

Erweiterung der Leberkapillaren führen, dagegen bei jenen Herbivoren, bei welchen die Schockgifte keinen Blutdrucksturz veranlassen, an der isolierten Leber keine Sperrung der Lebervenen und keine Leberstauung verursachen. Andererseits fanden Mautner und Pick ²⁶⁾ schon in der Lunge in Übereinstimmung mit dem Versuchsergebnisse von Schulz und Arils sowohl beim lebenden Tier als auch bei überlebenden durchströmten Organen, dass die intravenöse Zufuhr von Pepton eine intensive Verengung der Endäste der Pulmonalarterien herbeiführt, als deren weitere Folge es zu erheblichem Druckanstieg im Hauptstamme der Arteria pulmonalis und zu plötzlichem Druckabfall im linken Vorhof, Ventrikel und grossen Kreislauf kommt. Dieselben Verhältnisse wurden von Dale und Laidlaw ²⁷⁾ beim Histamin gefunden und durch Pick und Mautner bestätigt. Auch unsere nach verschiedenen Richtungen hin angestellten Experimente haben fraglos bewiesen, dass das im Leberversuch von Mautner und Pick Gefundene auch in der Lunge stattfindet, dass nämlich die Lungenvenen mit kräftiger glatter Muskulatur ausgestattet sind und Pepton, Histamin und andere Schockgifte nicht die Arterienäste, wie von verschiedenen obigen Autoren behauptet worden, sondern stark die Venenäste in der Lunge kontrahieren, wodurch das Blut in der Lunge zurückgehalten wird. Aber nach Mautner und Pick findet sich die Sperrvorrichtung der Lebervenen durch Schockgifte nur bei Karnivoren, während wir im Gegenteil stärkere Sperrung der Lungenvenen bei den Herbivoren fanden. Dementsprechend fanden wir die Ringmuskelverdickung an den Lungenvenen nur bei Herbivoren, aber nicht bei Karnivoren. Diese Resultate stimmen mit der Tatsache überein, dass beim experimentellen anaphylaktischen Schock die Asthmadyspnoe immer stärker bei Herbivoren als bei Karnivoren erzeugbar ist, dagegen die anderen allgemeinen Schockerscheinungen deutlicher bei diesen als bei jenen auftreten.

In meinen früheren Mitteilungen habe ich die histologische Veränderung der Lunge bei Serumanaphylaxie genau geschrieben, wo hauptsächlich im Lungenparenchym abwechselnd atelektatische

Teile mit Kapillardilatation und -exsudation und emphysematöse Teile mit ausgedehnten oder zerrissenen Alveolarwänden entstehen.

Um festzustellen, wie das Antigen zugrundegeht und welche reaktiven Vorgänge sich dabei in den Lungenkapillaren abspielen, immunisierte Minouchi^{28, 29)} von meinem Institut Kaninchen aktiv mit einem korpuskulären komplizierten Eiweisskörper, indem er Hühnererythrozyten intravenös injizierte. Dabei lagern sich die einverleibten Hühnererythrozyten zuerst reichlich in der Leber und Milz ab, während sie in den Lungenkapillaren noch nicht nachweisbar sind. Erst 1 bis 2 Stunden nach der Injektion finden sich vereinzelt und nur ganz spärlich von Wanderphagozyten gespeicherte Hühnererythrozytenfragmente in den Lungenkapillaren vor. Diese Histiozyten stammen vielleicht aus der Leber oder der Milz. Dagegen lassen sich bei der Reinjektion der Hühnererythrozyten in die Ohrvenen des vorher mit Hühnererythrozyten aktiv immunisierten Kaninchens, wenn es bei diesem auch zu keiner Asthmadyspnoe gekommen ist, 3 bis 5 Minuten nach der Injektion in den Lungenkapillaren reichliche Hühnererythrozytenfragmente und auch reichliche phagocytierende Histiozyten und Leukozyten nachweisen. Zu diesen hochgradigen intravaskulären Leukozytosen der Lungensepten treten mit der Zeit deutliche Vergrösserung und Verlagerung der phagocytierenden Alveolarepithelien und weiter eosinophile Zellen in den Alveolarsepten hinzu. Und endlich etwa eine Stunde nach der Injektion, haben sich in den Lungenkapillaren und den kleinsten Lungenvenen reichliche Blöcke aus zerfallenen Hühnererythrozyten, Histiozyten, Leukozyten, eosinophilen Zellen usw. gebildet. Im Gegensatz zu den Angaben von Oeller,^{30, 31)} Domagk,³²⁾ Jakob³³⁾ u. a. wurde im anaphylaktischen Zustande im Lungengewebe keine hyperplastische endotheliale Reaktion bemerkt. Die kleineren Arterien und Arteriolen sind deutlich erweitert und hyperämisch prall gefüllt. Darauf nehmen die Fremdkörper und die Zellanhäufung im Lungengewebe allmählich ab, und etwa 2—3 Stunden später kann man gut gereinigtes Lungengewebe beobachten. Die Lungenkapillaren zeigen dabei nur leichtgradige Dilatation, aber keine deutliche Auf-

blähung der Lungenalveolen (Taf. I, Fig. 1).

Nach den obigen Ergebnissen ist anzunehmen, dass ein einverleibter körperfremder Eiweisskörper leicht durch die Lungenkapillaren passiert und danach in die Leber und Milz gelangt, wo er durch den Immunitätsvorgang beeinflusst wird. Die aus Leber und Milz stammenden speichernden Histiozyten und die phagocytierenden Leukozyten werden leicht in den Lungenkapillaren abfiltriert und bleiben darin stecken. Diese phagocytierenden Histiozyten und Leukozyten enthalten in sich selbst auch den Antikörper gegen diesen Eiweisskörper und produzieren so Eiweissabbauprodukte. Weil, wie die obigen Experimente zeigen, die Eiweissabbauprodukte den reflektorischen Krampf der Lungenvenen herbeiführen, muss eine spezifische Beziehung zwischen diesem mit Immunkörper beladenen Eiweisskörper und dem Filtrationsvermögen der Lunge im biologischen Sinne bestehen.

Dass es dabei nicht zur Asthmadyspnoe kommt, rührt von der langsamen Produktion der Eiweissabbauprodukte her, für die dabei bestehenden ganz leichtgradigen Veränderungen der Lungenkapillaren sprechen. Jedenfalls ist das Steckenbleiben der mit Eiweisskörper beladenen Histiozyten und Leukozyten in den Lungenkapillaren nur ein mechanischer Vorgang, für die Entstehung der Asthmadyspnoe ist aber stets ein schneller Abbau des reinjizierten Eiweisskörpers notwendig.

Bei langsamem Eintritt der Eiweissabbauprodukte in die Lungenkapillaren werden diese Produkte nacheinander zerstört und entgiftet, wodurch es zu keiner deutlichen Veränderung der Lunge kommt. Wenn aber grosse Mengen Abbauprodukte auf einmal in die Lungenkapillaren eintreten und darin steckenbleiben, wirken sie giftig auf diese und führen vor ihrem Abbau und ihrer Entgiftung zu Asthmadyspnoe. In Hinsicht auf diesen Mechanismus ist es für die Erzeugung der experimentellen anaphylaktischen Dyspnoe wichtig, als Antigen

immer einen Eiweisskörper zu verwenden, der wie Blutserum unter der Wirkung der Antikörper sofort nach seiner Einverleibung abgebaut werden kann und weiter, dass ein solcher Eiweisskörper dem sensibilisierten Organismus auf einmal, wie z. B. durch intravenöse Injektion, einverleibt wird.

Um aus den histologischen Befunden die Abweichung klar zu machen, dass die mit Schilddrübensubstanz gefütterten oder vor der Immunisierung thyreoidektomierten Kaninchen bei Serumanaphylaxie keine Asthmadyspnoe zeigen (Pistocchi,³⁴⁾ Kepinow und Lanzenberg,³⁵⁾ Savini,³⁶⁾ Koba,³⁷⁾ Mayeda³⁸⁾ u. a.), hat Minouchi die Experimente der Immunisierung mit Hühnererythrozyten unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Schilddrüse weiter fortgesetzt.

Beim mit Schilddrüse gefütterten Kaninchen treten alle oben genannten Erscheinungen, d. i. Eintreten und Anhäufung von Hühnererythrozytengerüsten und Phagozyten (Histiozyten und Leukozyten) in den Lungenkapillaren, Bildung von Blöcken aus Erythrozytenfragmenten und Phagozyten in den Kapillaren oder feinsten Lungenvenen, Erweiterung und Blutüberfüllung der Kapillaren und Arteriolen, frühzeitiger als bei den Kontrolltieren auf, und schon 1 Stunde nach der Injektion ist die Lunge wieder gereinigt. Auch die Dilatation der Lungenkapillaren ist dabei leichtgradiger als bei den Kontrollen.

Beim nach der Thyreoidektomie immunisierten Kaninchen finden sich massenhafte Anhäufung von Fremdkörperfragmenten, Leukozyten und Histiozyten nicht nur in den Lungenkapillaren und -venen, sondern auch in den Lungenarteriolen, ja sogar stellenweise in denselben Thrombusbildung aus den zellulären und korpuskulären Massen. Die im Lungenparenchym zerstreut vorhandenen kleinen oder mittelgrossen Venen enthalten äusserst wenige oder überhaupt keine Erythrozyten, und ihr Lumen ist nur mit homogenen Massen ausgefüllt. Die Zellanhäufung in den Alveolarsepten erscheint langsamer und ist erst 2 Stunden nach der Injektion nachweisbar. Im

Fig. 1. Die Lunge eines 30 Minuten nach Reinjektion der Hühnererythrozyten getöteten Kaninchens. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss C. C. E., Obj. 10, Ocular H. I, Distanz 40 cm. Mit phagozytierenden Histiocyten und Leukozyten besetzte Kapillaren (K) und Venchen (V), sowie 3 hochgradig erweiterte Arteriolen (A) mit Blutstauung.

Fig. 2. Die Lunge eines 15 Minuten nach Reinjektion der Hühnererythrozyten getöteten thyreoidektomierten Kaninchens. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss C. C. E., Obj. 10, Ocular H. I, Distanz 40 cm. Mit massenhaft phagozytierenden Histiocyten und Leukozyten besetzte Kapillaren (K) und Arteriolen (A) und 2 kleinste Venen (V), deren Lumen keine Erythrozyten, sondern nur eine homogene Masse enthält.

allgemeinen ist dabei die Kapillardilatation nicht weiter auffallend (Taf. I, Fig. 2).

Diese Versuchsergebnisse weisen darauf hin, dass die Schilddrüse das Verdauungsvermögen der Lunge fördert, wodurch der körperfremde Eiweisskörper ausserhalb und in den ihn speichernden Zellen abgebaut wird. Hiernach ist anzunehmen, dass die schon früher berichtete hemmende Wirkung der Schilddrüse auf die serumanaphylaktische Dyspnoe eine Folge der durch diese Drüse zustandekommenden Förderung der Zersetzungskraft für die verschiedenen Eiweissabbauprodukte in der Lunge ist. Obgleich die Schilddrüsenexstirpation die Fähigkeit der Lunge herabsetzt, in den Lungenkapillaren nicht nur verschiedene zelluläre und korpuskuläre Elemente, sondern auch produzierte Eiweissabbauprodukte abzubauen, tritt bei der Thyreoidektomie doch keine serumanaphylaktische Dyspnoe auf. Diese sich widersprechenden Versuchsergebnisse lassen sich nur so erklären, dass es beim thyreoidektomierten Tiere trotz der herabgesetzten Fähigkeit, die Eiweissabbauprodukte zu spalten, zu keiner serumanaphylaktischen Dyspnoe kommt, weil gleichzeitig die Immunkörperbildung in den allgemeinen Körperorganen herabgesetzt ist und weniger Eiweissabbaustoffe als beim nichtthyreoidektomierten Tiere produziert werden, und dass weiter die in den Lungenkapillaren zurückgehaltenen fremden Eiweisskörper und Phagozyten dabei nur mechanische Hindernisse bilden und in keinerlei Beziehung zur Entstehung der Asthmadyspnoe stehen.

Die Frage, warum die anaphylaktische Dyspnoe sowohl durch Schilddrüsenfütterung als auch durch Schilddrüsenentfernung unterdrückt wird, wurde weiter durch ein biologisch-chemisches Experiment von Wada³⁹⁾ in meinem Institut beantwortet. Während die Asthmadyspnoe durch die intravenöse Injektion von Lungenextrakt serumanaphylaktischer Kaninchen leicht erzeugt wird,

enthalten die Lungen der mit Schilddrüse gefütterten oder der nach Schilddrüsenentfernung mit Serum behandelten Kaninchen gar keine dyspnoe-erzeugende Substanzen. Aber der Lungenextrakt der vor der Thyreoidektomie immunisierten Kaninchen enthält dieselbe Menge derartiger Substanzen wie der des gewöhnlichen serumanaphylaktischen Kaninchens. Dementsprechend kommt es bei dem vor der Thyreoidektomie immunisierten Kaninchen, bzw. bei dem nach der Immunkörperbildung thyreoidektomierten, zur serumanaphylaktischen Dyspnoe ganz gleich wie beim normalen Tiere.

Was die Bekämpfungsmittel des bei der Serumanaphylaxie auftretenden Asthmaatemptypus anbetrifft, so handelt es sich hier um dieselben, die schon oben bei der Bekämpfung des durch Kapillargifte hervorgerufenen Asthmaatemptypus beschrieben worden sind. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Atemtypen ist nur der, dass Atropin auf den letzteren Typus keine, aber auf den ersteren eine mässige Hemmung ausübt, was von der die Serumanaphylaxie immer begleitenden Vagotonie herrührt.

II. MENSCHLICHES ASTHMA

Die Symptome, die pathologisch-anatomischen und die histologischen Befunde beim Bronchialasthma des Menschen stimmen ganz mit den bei den obigen Tierexperimenten beobachteten überein. Wie früher bereits erwähnt, herrschen beim Bronchialasthma die Fälle vor, die mit der von Vagotonie begleiteten serumanaphylaktischen Asthmadyspnoe identisch sind (allergische), während die, die mit der durch Kapillargifte hervorgerufenen Asthmadyspnoe übereinstimmen (nichtallergische), in der Minderzahl vorhanden sind.

Wir wollen nun einiges Neue über den Bronchialasthmatiker, das uns seit meinen früheren Mitteilungen zugekommen ist, berichten und mit dem Früheren genau vergleichen.

Pathologische Anatomie des Bronchialasthmas.

Bevor ich auf die Zusammenfassung und Beurteilung der pathologisch anatomischen Befunde von den bisher von verschiedenen Autoren berichteten 35 Fällen und meinen früher mitgeteilten 2 Fällen eingehe, möchte ich zuerst meinen III. Fall kurz vorführen, der klinisch und pathologisch-anatomisch das typische Bild des Bronchialasthmas zeigte.

Fall III: 42 jähriger Mann. Seit seinem 4. Lebensjahr klagte er über anfallsweise auftretende Atemnot. Die einzelnen Anfälle sind allmählich heftiger und häufiger und mit den Jahren länger geworden. Seit etwa einigen Jahren findet sich selbst in den anfallfreien Intervallen leichtgradige Atemnot, besonders bei leichter Körperbewegung. Seit 7 Jahren in der Klinik.

Stat. präsens: Mitteltgross, kräftig, mittelmässig entwickelte Muskulatur. Gesicht sieht gedunsen aus. Leichte Cyanose der Mundlippen und der beiden Hände. Thorax fassförmig, epigastrischer Winkel weit. Der Stand beider Schultern immer abnorm hoch, Atemexkursion sehr vermindert, leichte Dyspnoe, Axillaratmung, starke Lungenaufblähung, Pfeifen und Giemen besonders bei Expiration. Im zäh-schleimigen Sputum zahlreiche Hämosiderinzellen, Alveolarepithelien, Leukozyten, Russzellen und Spiralen, aber keine eosinophile Zellen und Kristalle. Herzspitzenstoss und Herzdämpfung nicht nachweisbar, Herztöne leise. Blutleukozyten fast normal und 4% eosinophile Leukozyten. Harn o. B. Körpertemperatur normal. Bei der Röntgenuntersuchung Zwerchfellstand abnorm niedrig. Zeitweise wird der Patient von Anfällen heftiger Atemnot heimgesucht. Die Expiration wird dabei deutlich langsamer, also deutliche expiratorische Dyspnoe. Bei der Expiration sind die Bauchdeckenmuskeln bretthart gespannt. Dabei tritt stets eine Nabelhernie zutage. Das Bronchialgeräusch und das ausgehustete Sputum nehmen zu, aber die Beschaffenheit des letzteren ist immer wie vorher. Die

Dyspnoe wird stets durch Adrenalin- oder Asthmolysininjektion günstig beeinflusst. Der Dyspnoeanfall dauert etwa einige Tage bis 1 Woche. Auf dem Röntgenbild sieht man stets einen niedrigeren Zwerchfellstand. Eine anfallartige Atemnot lässt sich nach Belieben auch in der anfallfreien Zeit durch Druck auf die beiden Augenbulbi hervorrufen. Während der 3 Wochen vor dem Tode litt der Kranke an Gallensteinen und starb durch eine Komplikation von Cholangitis und Cholezystitis. Während dieser Komplikation kam es zu keinem heftigen Dyspnoeanfall.

Autoptischer Befund: Makroskopisch sind beide Lungen stark emphysematös aufgebläht. Bei der Eröffnung des Thorax kollabieren sie nicht, ihre vorderen Ränder berühren sich miteinander und verdecken vollständig den Herzbeutel. Im allgemeinen besteht jeder Lungenflügel aus 2 Teilen, nämlich aus einem blassgrauen, elastisch-weichen Teile und aus einem dunkelrötlichen, harten Teile, und zwar ist jener am stärksten in dem Oberlappen und den vorderen Rändern und dieser am deutlichsten in den an der hinteren und unteren Lungenfläche liegenden Lungenteilen. Auf der Schnittfläche ist das Gewebe des ersteren Teiles blassgrau und zart, das Gewebe des letzteren dagegen purpurrot und dicht. Bei den groben Schnittpräparaten der verschiedenen Lungenbezirke sind schon makroskopisch emphysematöse und atelektatische Teile abwechselnd nachweisbar.

Die mikroskopische Untersuchung ergab folgendes: Im emphysematösen Bezirke sind die Alveolen im allgemeinen stark erweitert; vielerorts sind die Infundibula, Ductuli alveolares und der Bronchiolus respiratorius zu einer einzigen Blase zusammengeschmolzen. Die Alveolarwände sind fast überall sehr dünn und häufig finden sich zwischen benachbarten Alveolen zerrissene Septa. In einem Teile dieser Blasenwand gewahrt man einen Streifen hypertrophierter Muskulatur, welche wahrscheinlich vom Bronchiolus respiratorius oder von der Wand des feinsten Gefässes her stammt. Die spezifische Färbung lässt an der elastischen Substanz des Septums Atrophie erkennen. Die Substanz zeigt Aufsplitterung und Frag-

mentation. Ganz vereinzelt findet man verdickte Alveolarsepten, teils infolge der erweiterten Kapillaren und der extravaskulären Erythrozyten, teils infolge von Rundzelleninfiltration.

Im atelektatischen Bezirke sind die Alveolen verengt, wie zusammengeschoben, stellenweise mit zahlreiche Erythrozyten, Hämosiderinzellen, Alveolarepithelien und Leukozyten enthaltender Oedemflüssigkeit ausgefüllt. Die Alveolarwände sind stark verdickt, teils infolge der erweiterten, mit Blut überfüllten Kapillaren und der extravaskulären Erythrozyten, teils infolge des Bindegewebs mit Rundzelleninfiltration. Die interlobulären Septen sind auch, und zwar durch die erweiterten, geschlängelten Arteriolen und verschiedene Zellarten, nämlich Rundzellen und Bindegewebszellen, stark verdickt. In den alveolären und interlobulären Septen sind zahlreiche Hämosiderinzellen, aber keine eosinophilen Zellen sichtbar. Stellenweise findet sich hochgradige Blutung sogar in den alveolären Septen und in den Alveolarlumen. Die elastischen Fasern zeigen nirgends abnormes Verhalten. Dagegen sind die glatten Muskelfasern in den alveolären und lobulären Septen bestimmt vermehrt, und diese Muskelfasern scheinen der genauen histologischen Untersuchung nach aus den Wänden der verdickten oder obliterierten feinsten Venen zu stammen (Taf. III, Fig. 5 u. Taf. IV, Fig. 7—8).

Herz und Lungengefäße: Bei meinem zweiten Falle wurden bereits Hypertrophie der rechten Kammer und spezifische Veränderung der feinsten Gefäße gefunden. Fast der ganze Teil des Lungenparenchyms ist mit den erheblich erweiterten und mit Blut überfüllten Kapillaren und Arteriolen besetzt, und dazwischen zerstreut finden sich die kleinsten Gefäße, welche ausgesprochene Verdickung der Wandung im Sinne von Zunahme der Intima zeigen und deren Lumen stark verengt und mit wenig Blut ausgefüllt sind. Das Resultat unserer obigen Tierexperimente, nämlich die reflektorische Lungenvenenkontraktion durch Schockgifte,

macht uns leicht verständlich, dass die kleinsten Gefässe mit verdickter Wandung nicht Arteriolen, sondern Venchen sind und die Kontraktion dieser Venen die Erweiterung und Blutüberfüllung der Kapillaren und Arteriolen verursacht (Taf. II, Fig. 3—4). Bei diesem III. Falle fand sich fast die gleiche Herz- und Gefässveränderung wie beim II. Falle. Nur war sie hochgradiger. Die rechte Kammer war stark verdickt (Wanddicke 5 bis 6 mm). Die in den lobulären Septen verlaufenden kleinsten Venchen zeigen in allen Lungenbezirken durchwegs ausgesprochene Verdickung ihrer Wandung, insbesondere erhebliche Intimaverdickung mit Vermehrung der elastischen Fasern. Die Lumen dieser verdickten Venchen sind stark verengt und enthalten nur wenig Erythrozyten; an mehreren Stellen sind diese Venchen durch hochgradige Intimaverdickung ganz verschlossen. Die kleineren Venen zeigen in allen Schichten leichtgradige Wanddickenzunahme. Dagegen lassen die mittelgrossen und kleinen Venen mikroskopisch keine Besonderheiten erkennen. Die Wandung der in den lobulären Septen verlaufenden kleinsten Arterien, insbesondere die der präkapillären Arteriolen, sind nicht nur verdickt, sondern auch stark ausgedehnt, indem sie auffallend erweitert, geschlängelt und mit Erythrozyten prall ausgefüllt sind. Die mittelgrossen und kleinen Arterien zeigen leichtgradige diffuse Wandverdickung (Taf. III, Fig. 5 u. Taf. IV, Fig. 7—8).

Bronchien: Ausgesprochene Veränderungen finden sich an den kleineren Bronchien und Bronchiolen, dagegen fast keine merklichen Abweichungen von der Norm bei den grossen und mittelgrossen Bronchien. Die Lumen der erstgenannten Bronchienabschnitte sind hochgradig verengt oder sogar verschlossen entweder durch Sekretmasse oder infolge von Faltenbildung der Schleimhaut. Das Lumen der kleinsten und kleineren Bronchien ist mit von zahlreichen verschiedenen zelligen Elementen durchsetzten, homogenen Sekretmassen gefüllt. Bei diesen Zellarten handelt es sich um Hämosiderin-

Fig. 3. Die Lunge des II. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss E. S. A., Obj. 40, Ocular 5. 3 Venchen mit verdickter Wandung im Sinne der Intimavermehrung und erweiterte Kapillaren oder praekapillare Arteriolen.

Fig. 4. Die Lunge des II. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss F. S. A., Obj. 90, Ocular 5, Ölimmersion. Ein klares Bild der erheblichen Intimavermehrung in der Wandung eines Venchens und der hochgradig erweiterten Kapillaren und Arteriolen.

Fig. 5. Die Lunge des III. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss E. S. A., Obj. 40, Ocular 5. Erhebliche Verdickung der Alveolar- oder Lobularsepten, teils infolge der erweiterten Kapillaren und Arteriolen, sowie der wandverdickten Venchen und teils infolge verschiedener Zellen, der extravaskulären Erythrozyten, Hämosiderinzellen, Rundzellen, Bindegewebszellen usw.

Fig. 6. Bronchiolus des III. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss E. S. A., Obj. 40, Ocular 5. Die Wandverdickung hauptsächlich im Sinne von Muskelhypertrophie. Zahlreiche Hämosiderinzellen im Peribronchialgewebe, unveränderte Schleimhautepithelien und verschiedene Elemente im homogenen Bronchialinhalt, und zwar schrumpfende oder zerfallende Erythrozyten, Hämosiderinzellen, Alveolarepithelien, polynukleäre Leukozyten, Curschmannsche Spiralen usw.

Fig. 7. Die Lunge des III. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss C. E., Obj. 10, Ocular K. 4, Distanz 25 cm. Verdickte Alveolar- oder Lobularsepten mit geschlängelten Arteriolen (A).

Fig. 8. Die Lunge des III. Sektionsfalls. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiss C. E., Obj. 20, Ocular H. I, Distanz 20 cm. Hochgradig erweiterte, geschlängelte Kapillaren (K) und praekapillare Arteriolen (A).

zellen, Alveolarepithelien, vereinzelte polymorphkernige Leukozyten und zahllose Erythrozyten. Diese Erythrozyten finden sich besonders reichlich in den kleinsten Bronchialästen und von diesen Bronchialteilen aufwärts nach den kleinen Bronchien mehr und mehr geschrumpfte oder zerfallene Erythrozyten, die in den mittelgrossen Bronchien nur noch spurweise oder überhaupt nicht mehr bemerkbar sind. Desquamierte Epithelzellen sind in den kleinen Bronchien nirgends nachweisbar. Bei einigen Schnitten sieht man in der homogenen Sekretmasse des Lumeninhaltes gruppierte Bruchstücke gut ausgebildeter Spiralen und Zentralfäden. Der innere Faden ist scharf begrenzt, von dunkelblauer Farbe, und stellenweise gewahrt man an seinen äusseren Rändern eine wirbelartige Anordnung feiner Fädchen. Das Epithel der Schleimhaut ist gut erhalten, einschichtig, zylindrisch. Umwandlung der Flimmerepithelien in Schleimzellen ist nicht nachweisbar. Die Muskelschicht erscheint sehr breit, die Faserschicht auch verbreitert und von zelliger Infiltration begleitet. Die Gefässe der Submucosa sind etwas erweitert. Eosinophile Zellen sind nirgends, weder in den Alveolar- noch in den Bronchiallumen, noch im Lungenparenchym nachzuweisen (Taf. III, Fig. 6).

Vergleicht man nun den Lungenbefund dieses chronischen III. Falls mit dem des früher berichteten relativ frischen II. Falls, so kann man in Uebereinstimmung mit diesem hervorheben, dass makroskopisch sich abwechselnd blass-graue, emphysematöse Teile und purpurrote, atelektatische Teile vorfinden, und dass die letzteren mikroskopisch hochgradige Kapillarerweiterung und Kapillarexsudation und -blutung im Alveolarlumen, sklerotische Veränderung der kleinsten Venen, Erweiterung der kleinen Arterien, besonders der Arteriolen, und Verdickung der Bronchialwandung zeigen. Aber anderseits ist zwischen beiden Fällen ein auffallender Unterschied bemerkbar. Während es zur Dickenzunahme der Alveolarsepten beim II. Falle

fast nur durch enorme Erweiterung der Kapillaren gekommen ist, ist sie beim III. Falle ausser durch diese Erweiterung durch Bindegewebszunahme, Zellinfiltration (Rundzellen, Hämosiderinzellen u. a.) und Muskelhypertrophie entstanden. Die Venensklerose, Arteriolenenerweiterung, Bronchialwandverdickung und die Hypertrophie der rechten Kammer sind beim III. Falle alle hochgradiger als beim II. In den Alveolarsepten und im Alveolar- und Bronchialinhalt finden sich beim II. Falle reichlich eosinophile Zellen, aber keine Hämosiderinzellen, beim III. Falle dagegen reichlich Hämosiderinzellen und keine eosinophile Zellen.

Direkter Tod durch einfache Asthmadyspnoe ist äusserst selten, und die Asthmatiker sterben meistens durch andere Krankheiten in der anfallfreien Periode oder in der Anfallszeit. Danach zeigt die Lunge bei der Autopsie verschiedenartige bzw. keine bestimmten Veränderungen, die völlig vom Krankheitszustand direkt vor dem Tode abhängig sind. So zeigt z. B. beim Tode in der Anfallsperiode (unser Fall II) die Lunge bei der Autopsie natürlich deutliche bestimmte Veränderungen, beim Tode in der anfallfreien Periode dagegen je nach dem Krankheitsverlauf bis zum Tode sehr verschiedene. So findet man bei der Autopsie des frischen Asthmatikers, der seit dem letzten Asthmaanfall lange Zeit (z. B. monatelang) ohne Beschwerden war, fast unnachweisbare, beim Patienten dagegen, dessen Asthma wie bei unserem III. Fall einen äusserst chronischen Verlauf aufwies und der selbst in der Zwischenzeit des typischen Anfalls von leichter oder heftiger Atemnot heimgesucht wurde, bestimmte hochgradige Lungenveränderungen.

Eine Übersicht über die pathologisch-anatomischen Befunde des Bronchialasthmas, die von zahlreichen Autoren bisher genau berichtet worden sind, konnte uns keineswegs Klarheit über die Pathogenese dieses Leidens bringen, was in erster Linie durch die grosse Seltenheit der in der Anfallszeit gestorbenen und zur Sektion ge-

brachten Fälle bedingt ist. Wegen dieser Seltenheit des Todes im Anfälle bzw. des Fehlens eines entsprechenden pathologisch-anatomischen Befundes wurde das Bronchialasthma lange als Neurose aufgefasst. Morawitz ⁴⁰⁾ hebt hervor „Die pathologische Anatomie spielt in der Lehre vom Asthma einstweilen eine recht bescheidene Rolle.“ Zur restlosen Erklärung dieser vielgestaltigen Erkrankung sind jedenfalls vor allem viele genaue pathologisch-anatomische Untersuchungen nötig.

Ich will nun die wichtigsten Lungenbefunde meines jetzigen und meiner früheren zwei Fälle mit den 35 in der Literatur vorhandenen Fällen vergleichen, um ein klares Urteil darüber zu gewinnen.

Makroskopisch findet sich bei allen früheren 35 ⁴¹⁾ und unseren 3 Fällen ein starkes Lungenemphysem. Besonders wurde hochgradige Lungenaufblähung im Oberlappen und in den Lungenrändern bei 8 Fällen gefunden (Fränkel, Marchand I, II u. III, Huber und Koessler VI, Dehner I und bei uns Fall II u. III), Kompaktheit bzw. Blutreichtum der Unterlappen (oder des Mittellappens) bei 8 Fällen (Fränkel, Jezierski I, Marchand II u. III, Faschingbauer, Harkavy I und bei uns Fall II u. III), Blutreichtum im allgemeinen Lungenparenchym bei 5 Fällen (Jezierski II, Mönkeberg, Huber u. Koessler VI, Dehner I u. Bergstrand II). Jedenfalls wurden bei allen diesen Fällen innerhalb des emphysematösen Lungenparenchyms verschieden ausgedehnte blutreiche atelektatische Bezirke angetroffen.

Der mikroskopische Befund: Überblickt man nun die Befunde der Lungenkapillaren in der früheren Literatur des Bronchialasthmas, so fällt die hochgradige Buntheit der Veränderungen auf. Unter 35 Fällen ist bei 20 die Veränderung der Lungenkapillaren beschrieben. Darunter zeigen 13 Fälle fast die gleiche hochgradige Kapillarveränderung wie unsere 3 Fälle, bzw. Kapillarerweiterung und Kapillarexsudation oder -blutung in den

Alveolarlumen (nämlich Mönkeberg, Marchand I, II u. III, Huber u. Koessler II u. III, Faschingbauer, Dehner I u. II, Bergstrand I u. II, Harkavy I u. II). Bei anderen 7 Fällen finden sich einfache Kapillarstauung oder -exsudation oder beide kombiniert kurz angegeben (Bamburger, Lyden, Berkart Fränkel I, Ellis, Kamchorn u. Ellis, Steinberg u. Figley). Im allgemeinen findet sich die hochgradige Kapillarveränderung besonders bei den Fällen, welche während des akuten Anfalls starben oder chronisch verliefen. Der bei den Sektionsfällen des Asthmas angegebene Kapillarbefund ist zwar bei den meisten seiner Art nach derselbe, aber je nach dem Krankheitszustand zu Lebzeiten von verschiedenem Grade.

Unter den 35 Sektionsfällen der Asthmatiker sind die pathologischen Befunde der Lungenarterien und -venen bei 10 Fällen nur kurz beschrieben, und zwar finden sich Intimaverdickung der Arterien bei 6 Fällen (Faschingbauer, Dehner II, Kounts u. Alexander, Steinberg u. Figley, Bergstrand II, Harkavy I), insbesondere Zunahme der Elastica bei 2 Fällen (Dehner II u. Bergstrand II), Sklerose der Arterien und diffuse Wandverdickung der Venen bei 2 Fällen (Mönkeberg u. Bergstrand I), Intimaverdickung der Arterien und Venen beim Falle Dehner I, Bindegewebiszunahme der Arterien und Venen beim Falle Huber und Kössler VI. Weiter wurden bei 2 von unseren Fällen wie bei den Fällen von Mönkeberg und Bergstrand I Sklerose der kleinen Arterien und diffuse Wandverdickung der Venen angetroffen. Bei unseren 2 Fällen wurden ausserdem besonders hochgradige Wandverdickung der feinsten Venchen im Sinne der Intimaverdickung und erhebliche Erweiterung und Schlängelung der kleinsten Arterienäste festgestellt.

Was das rechte Herz anbetrifft, so ist bei 10 Fällen Dilatation oder Hypertrophie angegeben, und zwar Dilatation des rechten Ventrikels bei 4 Fällen (Ellis, Mönkeberg, Bergstrand II, Harkavy I), Hypertrophie des rechten Ventrikels bei 7 Fällen (Heizer, Marchand I, Huber u. Kössler

IV u. V, Dehner I u. II, Kounts u. Alexander I), Kombination von Dilatation und Hypertrophie bei 2 Fällen (Marchand III, Kamchorn u. Ellis). Bei unseren 2 Fällen wurde nur Hypertrophie des rechten Ventrikels beobachtet.

Im Lungenparenchym fanden sich, wie schon makroskopisch gefunden, abwechselnd emphysematöse und atelektatische Bezirke. Im allgemeinen handelt es sich bei der Atelektase des Lungenparenchyms um hochgradig erweiterte Kapillaren und Arteriolen, und noch mehr um Kapillarexsudation oder -blutung in den Alveolarlumen oder -septen. Aber bei den chronisch verlaufenen Fällen (Mönkeberg, Faschingbauer, Fränkel I, Huber u. Kössler IV u. unserem III) waren diese Gefäßveränderungen von Verdickung der Alveolar- und Lobularsepten mit Rundzelleninfiltration und Vermehrung der glatten Muskelfasern begleitet.

Der Bronchialbefund ist von allen Autoren am genauesten beschrieben worden. In fast allen Protokollen ist in erster Linie die Wandverdickung der kleinen Bronchien und dann die Veränderung der Bronchialschleimhaut hervorgehoben. Die erstere rührt hauptsächlich von Muskelhypertrophie her. Aber in einigen Berichten findet sich, dass an der Verdickung mehr oder weniger alle Wandschichten teilnehmen. Die Verdickung am Epithel der Schleimhaut sind verschieden, z. B. Desquamation oder Verlagerung der Epithelien, Vermehrung der Becherzellen usw.. Auch sind Erweiterung und Blutüberfüllung der Gefäße in der Submucosa angegeben. Der Inhalt der Bronchien schwankt bei den einzelnen Fällen quantitativ und qualitativ, indem die Mengen der Sekretmassen und die Arten der zelligen Elemente verschieden sind, d. i. die ersteren sind bald sehr reichlich, bald spärlich vorhanden oder fehlen bald ganz (Faschingbauer), und von den letzteren finden sich Alveolarepithelien, Zylinderepithelien, Leukozyten, eosinophile Zellen und Mastzellen usw.. Bei einigen Fällen wurden Spiralen oder Charcot-Leyden'sche Kristalle beobachtet, die erstere auch bei unserem III. Falle. Aber weiter wurden bei unserem III. Falle ausser den Spiralen zahlreiche von den Alveolen herstammenden Elemente,

und zwar Hämosiderinzellen und Erythrozyten im Bronchialinhalt gefunden. Die Hämosiderinzellen stellte auch Mönkeberg im Lumeninhalte bei einem Falle fest. Das histologische Bild dieser Erythrozyten lässt uns klar erkennen, dass diese in den Bronchiallumen aufwärts von peripheren kleinen Bronchialästen verschoben und allmählich darin zerstört und resorbiert werden. Dementsprechend sind die zahlreichen Hämosiderinzellen auch im Peribronchialgewebe bemerkbar.

Bei der Beurteilung der Lungenbefunde, besonders in bezug auf die Krankheitsentstehung, muss man als charakteristisch für das Bronchialasthma in erster Linie auf die Veränderungen der Lungengefäße achten, unter denen die hochgradige Kapillarerweiterung und die Kapillarexsudation oder -blutung, welche bei den meisten Sektionsfällen beobachtet werden, von besonderer Wichtigkeit für die Entstehung der Asthmadyspnoe sind. Die Kapillarstauung wird durch die sklerotische Veränderung der Venen befördert, welche vielleicht durch die funktionelle übermässige Inanspruchnahme dieser Gefäße entsteht. Dafür spricht das obige Experiment, bei dem die kleinen Lungenvenen durch die in die Lungenzirkulation gelangten Schockgifte reflektorisch kontrahiert wurden. Nach Mautner⁴²⁾ ist die Entstehung der Urtikariaquaddeln vom gleichen Mechanismus. Er meint, dass das urtikarielle Exanthem durch eine Kontraktion der Venen verursacht wird, die zu lokaler Stauung, Flüssigkeitsaustritt und umschriebenem Oedem führt. Diese Vorstellung entspricht der Anschauung von Unna⁴³⁾ welcher als Ursache der Urtikariaquaddeln eine Diskrepanz im Querschnitt der Arterie und Vene zuungunsten der letzteren annimmt. Indem das Lungenemphysem beim Asthmaanfall als eine Folge der expiratorischen Erhöhung des alveolären Innendrucks (d. i. als eine Folge des Alveolenerweiterungsmechanismus für die allgemeine Lungenatelektase) auftritt, werden die

Alveolen mit ihren minderwiderständigen Wandungen wohl zuerst und am stärksten aufgebläht. In den Oberlappen und den vorderen Rändern, welche in der ganzen Lunge innerhalb des Brustkorbs den geringsten Widerstand zu leisten vermögen, wird bei der Sektion stets das stärkste Emphysem gefunden. Dagegen in den hinteren und unteren Lungenteilen, wo sich den ersteren die gewaltige Brustwand und den letzteren die kräftige Bauchpresse mittelst des Zwerchfells beim Aufblähungsmechanismus entgegensetzen, findet man bei der Sektion das unveränderte primäre Bild bzw. die Atelektase mit Kapillarveränderung. Die bisher von den meisten Autoren als wichtigster Befund bezeichnete Wandverdickung der kleinen Bronchien im Sinne von Muskelhypertrophie ist gar nicht charakteristisch für Asthma und findet sich auch häufig beim Emphysematiker mit chronischer Bronchitis (Orth,⁴⁴ Fischer,⁴⁵ Aschoff,⁴⁶ Fukushi⁴⁷). Daher lassen sich derartige Befunde als eine Arbeitshypertrophie der Muskulatur erklären, zu der es durch die starke Betätigung bei der expiratorischen Bronchialkontraktion im Asthmaanfall oder auch beim Husten oder beim Expektorationsakte der Bronchitis kommt. Dementsprechend ist diese Muskelhypertrophie um so stärker, je chronischer der Krankheitsverlauf ist, und das Gleiche gilt für die Verdickung und Muskelhypertrophie der Alveolarsepten, welche wahrscheinlich durch die dauernde übermässige Spannung der Alveolarwand infolge der expiratorischen Erhöhung des alveolären Innendrucks beim Asthmaanfall entstehen. Anderseits besitzen andere unbestimmte Veränderungen der Bronchialschleimhaut, wie ein leichter Schleimhautkatarrh als Komplikation oder Schleimhautanschwellung und -exsudation als Teilerscheinungen der allgemeinen allergischen Schleimhautveränderung, keine spezifische pathogenetische Bedeutung für das Bronchialasthma. Die in den Bronchiallumen enthaltenen, von den Alveolen herstammenden zahlreichen zelligen Elemente, wie Alveo-

larepithelien, Hämosiderinzellen und Erythrozyten usw., sind wichtig für die Feststellung des Entstehungsortes der Krankheit. Obgleich diese Zellen gewöhnlich im Sputum gefunden werden, stösst man auf die Erythrozyten nur selten oder überhaupt nicht, weil diese in den Bronchiallumen allmählich zerstört und resorbiert werden.

Wenn man den Lungenbefund, und zwar den Gefäss- und Bronchialbefund und das Emphysem, in Zusammenhang mit den vorher erwähnten Tierexperimenten und zugleich mit den folgenden klinischen Erscheinungen während des Asthmaanfalls bringt, so erkennt man leicht, dass die durch asthmogene Substanzen hervorgerufenen Veränderungen der allgemeinen Lungenkapillaren bzw. die als Folge davon auftretende allgemeine Lungenatelektase bei der Entstehung des Asthmaanfalls die Hauptrolle spielen. Das Lungenemphysem tritt zerstreut in den mit minderwiderstandsfähiger Alveolarwand versehenen Lungenteilen wegen des immer mehr sich erhöhenden expiratorischen Alveolarinnendrucks auf, den der Alveolenerweiterungsmechanismus zur Beseitigung der diffusen Lungenatelektase ausübt. Die Veränderung der Bronchien ist nichts anderes als eine einfache Arbeitshypertrophie der Muskulatur infolge der expiratorischen Bronchialkontraktion, die auch als ein Akt des Alveolenerweiterungsmechanismus von grosser Bedeutung ist. Indem nach dem Abklingen des akuten Asthmaanfalls die Kapillarveränderung, wie bei Urtikaria, völlig spurlos verschwinden dürfte, sind so dabei in den Lungen Abnormitäten weder klinisch noch pathologisch-anatomisch nachzuweisen. Dagegen konstatiert man bei der Sektion von chronischen Asthmatikern, selbst bei in der anfallfreien Periode gestorbenen, pathologisch-anatomisch stets bestimmte Lungenbefunde, nämlich makroskopisch abwechselnd emphysematöse und atelektatische Bezirke, mikroskopisch Dickenzunahme der Alveolarsepten im Sinne von Kapillardilatation und Zellwucherung, Wandverdickung der kleinen Bronchien im Sinne von Muskelhypertrophie, und dementsprechend zeigen sich zu Lebzeiten jederzeit, selbst in der anfallfreien

Periode, leichtgradige asthmatische Erscheinungen, wie leichte Atemnot (meistens expiratorische), expiratorisches Bronchialrasseln, Emphysem usw.

Die klinische Erscheinungen des Bronchialasthmas

Symptomatologie des Bronchialasthmas

In Hinsicht auf die oben erwähnten pathologisch-anatomischen Befunde und die Tierexperimente wird es uns leicht klar, dass alle klinischen Erscheinungen beim Bronchialasthma ihre Ursache haben in der im Krankheitsbeginn plötzlich auftretenden Reduktion der Atmungsfläche durch die wie bei Urtikaria plötzlich zustandekommende Dilatation und Exsudation der allgemeinen Lungenkapillaren und in dem sich daranschliessenden reflektorischen Alveolenerweiterungsmechanismus, d. i. in der expiratorischen Bronchialkontraktion mit gleichzeitiger expiratorischer Atemmuskelanstrengung. Der Atemtypus in der Anfangsperiode des plötzlich eintretenden Asthmaanfalls zeigt einen durch einfache Reduktion der Atmungsfläche hervorgerufenen Dyspnoezustand, nämlich seichte und frequente, bzw. stark beschleunigte flache Atmung. Dieser Zustand ist aber von sehr kurzer Dauer. Daher zeigt der Asthmatiker bei der ärztlichen Untersuchung meistens den diesem Atemtypus folgenden Zustand, bei dem der Arzt durch expiratorischen Bronchospasmus bewirkten expiratorischen Stridor und Verlängerung der Expiration, Spannung der expiratorischen Hilfsmuskeln, die die Lunge vom äusseren Brustkorb und Zwerchfell her zu komprimieren strebt, und durch die Erhöhung des Alveolarinnendruckes herbeigeführtes Emphysem beobachten kann. Unter den expiratorischen Hilfsmuskeln sind von besonderer Bedeutung die Bauchwandmuskeln. Bei der Röntgenuntersuchung zeigt jedenfalls das Zwerchfell beim Asthmaanfall einen deutlichen Tiefstand bzw. Inspirationsstand und platte Oberfläche. Da ein

Teil der unter Anstrengung eingeatmeten Luft bei jeder Respiration in den Lungenalveolen zurückgehalten wird, befindet sich die Lunge beim Asthmaanfall dauernd im Inspirationsstand. Zeitweise zeigt das tiefständige Zwerchfell eine unregelmässig zickzackförmige Oberfläche, was auf Pleuraladhäsion oder kleine Emphysemläschen zurückzuführen ist. Daher zählen die expiratorische Bauchdeckenmuskelspannung und der Tiefstand des Zwerchfells zu den Hauptsymptomen des Bronchialasthmas und sind so besonders bei der Differentialdiagnose gegen andere asthmaähnliche Atemnot heranzuziehen.

Nach der allmählichen Rückkehr der veränderten Lungenkapillaren in den normalen Zustand verschwinden die obigen Symptome nach und nach, wobei es sich bei dem gleichzeitig ausgehusteten Sputum hauptsächlich teils um Alveolarinhalt und teils um Bronchialschleimhaut handelt. Die im Sputum sehr häufig aufgefundenen Blutspuren und Hämosiderinzellen, welche letzteren bei chronischen Asthmatikern bemerkbar sind, sind besonders bedeutungsvoll für den Entstehungsort und die Entstehungsweise der Krankheit. Die obigen pathologisch-anatomischen Befunde zeigen, dass die Blutspuren und die Hämosiderinzellen vom Lumeninhalte der Alveolen, bzw. vom Blutaustritte der Kapillaren, herrühren dürften. Schon im Jahre 1892 sind die Hämosiderinzellen von v. Noorden⁴⁵⁾ nicht regelmässig, aber doch ziemlich oft im Sputum bei seinen 7 Asthmafällen gefunden worden. Für die Quelle des aufgefundenen Hämosiderinpigments hält Noorden den in den Tiefen der Lunge stattfindenden Blutaustritt, zu dem es wahrscheinlich im Anfall durch die mechanische Dehnung einzelner Infundibulargebiete kommt. Mit der allmählichen Resorption des zurückbleibenden Exsudates und der Luft durch das Lungengewebe ist die Lunge in ihren normalen Zustand zurückgekehrt. Aber beim chronischen Asthmatischer besteht, entsprechend den pathologisch-anatomischen Befunden des Lungenparenchyms, eine leichtgradige chronische

Asthmadyspnoe auch in der anfallfreien Periode fort.

Als seltene Komplikation beobachtet man beim heftigen Asthmaanfall subkutanes Emphysem und Pneumothorax. Über das subkutane Emphysem habe ich schon einen Fall berichtet. In der Literatur sind einige solche Fälle bekannt, z. B. je ein Fall von Morawitz,⁴⁹⁾ Yoshida,⁵⁰⁾ Takeya⁵¹⁾ und andere. Das subkutane Emphysem tritt stets am Hals auf, und nach dem Ablauf des Anfalls verschwindet es allmählich, u. z. gewöhnlich spurlos in 1 bis 2 Wochen. Dieses Emphysem ist so zu erklären, dass die von mir betonte starke expiratorische Erhöhung des Alveolarinnendrucks durch den Erweiterungsmechanismus der Alveolen zuerst zu hochgradigstem Lungenemphysem und dann die Zerreissung einer oder mehrerer Alveolen zum subkutanen Emphysem und seltener zu einem Pneumothorax führen. Über den Entstehungsmechanismus des subkutanen Emphysems nimmt man im allgemeinen an, dass die durch Ruptur der Alveolen entwichene Luft das Mediastinum entlang zur Halsgegend aufsteigt, wo sie in das subkutane Gewebe gelangt. Ich habe schon einmal über einen Fall berichtet, bei dem es direkt nach der Bildung von Pleuraadhaesionen oder Lungenhernien an der Lungenspitze zum subkutanen Emphysem kam. Diese Erscheinung hat Yoshida auch operativ nachgewiesen. Über den anfallbegleitenden Pneumothorax berichtete Fraentzel⁵²⁾ einen Fall. Der Pneumothorax soll auf dieselbe Weise wie das Hautemphysem entstehen.

Therapie des Bronchialasthmas

Bei allen die Asthmaanfälle am wirksamsten beeinflussenden Medikamenten handelt es sich in erster Linie um Mittel, die die Dilatation und Exsudation der Lungenkapillaren komplett hemmen, und dann um Mittel, die die in den Lungenkapillaren akkumulierten asthmogenen Substanzen zu inaktivieren oder zu beseitigen vermögen, womit die Versuchsergebnisse beim experimentellen Asthma völlig übereinstimmen.

Die Wirkung des Adrenalins auf das Asthma entfaltet sich am stärksten in der Anfangsperiode des Asthmaanfalls, wo die Veränderung der Lungenkapillaren noch nicht weit vorgeschritten ist. Daher genügt in der Anfangsperiode des Anfalls zu dessen Bekämpfung schon eine kleine Menge Adrenalin.

Ephedrin (oder Ephetonin) ist oft empfohlen worden, weil es sich nicht so leicht wie Adrenalin zersetzt und seine Wirkung lange anhält. Aber es wirkt weit schwächer als Adrenalin.

Pituitrin verschlimmert zuweilen den Anfall, was dem im käuflichen Pituitrin enthaltenen Histamin zuzuschreiben ist. Bei Einverleibung der optimalen Dose hemmt es den Anfall. Pitressin, raffiniertes Pituitrin, das immer kapillarkontrahierend wirkt, entfaltet eine stärkere Wirkung als Pituitrin.

Calciumpräparate, die zwar die Exsudation hemmen, aber die Kapillaren nicht kontrahieren, bekämpfen den Asthmaanfall nicht deutlich, wirken aber prophylaktisch gut.

Atropin hemmt je nach der Schwere der das Bronchialasthma begleitenden Vagotonie zuweilen leicht, manchmal aber ist es völlig wirkungslos.

Nitritpräparate, wie Amylnitrit, Asthmapapier, Asthmazigaretten usw., üben oft auf den Asthmaanfall eine Hemmung aus. Doch hat man noch keine Erklärung der Ursache und des Hemmungsmechanismus. Baehr und Pick⁵³⁾ nehmen an, dass Nitrit den kontrahierten Bronchus dilatiert. Aber die Hauptwirkung aller Nitritpräparate besteht in Gefässdilatation. Nach der experimentellen Untersuchung von Miyake⁵⁴⁾ lassen sich durch Histamin in Kontraktion versetzte Lungenvenen durch Amylnitrit leicht erweitern. Dies legt die Erklärung nahe, dass die durch Histamin oder Pepton und andere Schockgifte in Kramp fzustand versetzten Lungenvenen durch Nitritpräparate dilatiert werden und dadurch der Abfluss der obengenannten giftigen, in den Lungenkapillaren zurückgehaltenen Substanzen nach dem Herzen durch die dilatierten Lungenvenen begünstigt wird. In gleicher Weise wie die Nitritverbindungen

entfaltet das von Pal⁵⁵⁾ zum Gefäßkrampflösenden Mittel erhobene Papaverin häufig eine gute Wirkung. Unter anderen vasodilatatorischen Mitteln ist dem Diuretin ein gelegentlicher Erfolg nicht abzusprechen.

Bei dieser Sachlage kann eine kombinierte Anwendung von einigen dieser Mittel, deren Angriffspunkte verschieden sind, z. B. Adrenalin und Atropin oder Adrenalin und Papaverin usw. manchmal eine wunderbare Wirkung entfalten.

Statistisch ist ein leichtgradiger, manchmal nur vorübergehender günstiger Einfluss der Kümellschen^{56, 57, 58)} Operation (Sympathektomie) auf das Asthma festgestellt. Wie dies zustandekommt, ist jedoch noch nicht ganz klar. Kümmell selbst nimmt an, dass die Ursache der Hemmung in der Resektion der dem Sympathicus beigemischten Vagusfasern zu suchen ist. Andere Forscher sind wie Glaser^{59, 60, 61)} der Meinung, dass es sich bei der Hemmung um die Unterbrechung der zentripetal reizleitenden Sympathicusfasern handele, deren Reizung auf dem Wege über das Vaguszentrum zum Bronchialmuskelkrampf führe. Ich glaube, dass die Resektion des Sympathicus eine, aber bald vorübergehende Hemmung auf den reflektorischen Lungenvenenkrampf ausübt und dadurch ein gewisser Erfolg gezeitigt wird. Dies stimmt mit dem Wirkungsmechanismus der obenerwähnten gefäßdilatierenden Mittel völlig überein.

Theoretisch besser als die Sympathektomie begründet, wurde die Durchschneidung des rechten Vagus unterhalb des Recurrensabganges zuerst von Kappis⁶²⁾ ausgeführt, den dann darin Fründ,⁶³⁾ Erkes,⁶⁴⁾ Brüning⁶⁵⁾ u. a. folgten. Was aber den Einfluss der Vagotomie auf das Asthma anbetrifft, so lässt auch dieser zu wünschen übrig, indem er entweder ganz ausbleibt oder schnell vorübergeht. Brüning berichtete einen Fall, bei welchem die Vago- und Sympathektomie ein und derselben Seite zu keinem Erfolge führte. Braeucker^{66, 67, 68)} bezeichnet als die einzige theoretisch gut begründete Operationsmethode die vollständige Isolierung beider Bronchien von allen nervösen Verbindungen,

welcher Eingriff aber doch Bedenken erregen dürfte. Angesichts des geringen Einflusses von der Unterbrechung der sympathischen und parasympathischen Bahnen und des Atropins auf das Asthma muss man sagen, dass die vegetativen Nerven ursächlich keine so wichtige Rolle bei dieser Krankheit spielen, wie man bisher im allgemeinen angenommen hat, wobei natürlich keineswegs gesagt sein soll, dass der Vagus im Erregungszustande die Entstehung des Asthmas nicht begünstige.

Die günstige Wirkung der Schilddrüsenmedikation auf die Asthmadyspnoe ist wohl sehr vielseitiger Natur. Ein Faktor dieser Wirkung dürfte darin zu suchen sein, dass das Schilddrüsenhormon die fermentative Wirkung der allgemeinen Gewebszellen, besonders der Lungengewebszellen, in die Lungenkapillaren eingebrachte asthmogene Eiweisspaltprodukte zu zersetzen fördert.

Über den guten Erfolg der Röntgenbestrahlung des Asthmikers ist seit der Schillingschen⁶⁹⁾ Mitteilung im Jahre 1909 bereits eine grosse Menge Literatur mitgeteilt worden. Bestrahlt wurden hauptsächlich Milz und Lunge. Dabei spielen die Zerfallprodukte aus diesen durch Röntgenbestrahlung geschädigten Organzellen die Rolle von arteigenen, aber organfremden Eiweisskörpern bzw. die Rolle von Antigen, wodurch es zu einer Art unspezifischer Desensibilisierung kommt. Für diese Auffassung sprechen die Untersuchungen von Hayashi⁷⁰⁾ und Hirasawa,⁷¹⁾ welche die Uebereinstimmung der Lungenbefunde bei Röntgenkater mit denen bei Serumanaphylaxie nachgewiesen haben. Danach führt die Röntgentherapie zu einer Art Desensibilisierung, die der durch Injektion von Pepton, Milch und Tuberkulin analog ist.

Zusammenfassung

Der Atemtypus des Asthmas, des experimentellen und des menschlichen, zeigt anfangs kurze Zeit eine flache Atmung, welche infolge der durch plötzliche Kapillardilatation und -exsudation hervorgerufenen allgemeinen Atelektasie zustandekommt,

und dann eigentliche Atemnot (sogenannte expiratorische Dyspnoe) als Folgeerscheinung des sich anschliessenden reflektorischen Alveolenerweiterungsmechanismus, wo durch expiratorischen Bronchialkrampf und gleichzeitige starke Anstrengung der expiratorischen Atemhilfsmuskeln der Alveolarinnendruck immer mehr erhöht wird.

Die Asthmadyspnoe kommt durch verschiedene Kapillargifte (Histamin, Senföl, Cantharidin, Crotonöl und Cobragift) bzw. einfach durch die von diesen bewirkte Permeabilitätserhöhung der Lungenkapillaren ganz unabhängig vom Verhalten des vegetativen Nervensystems zustande. Histamin, das unter den verschiedenen Arterien oder Venen die Lungenvenen am stärksten kontrahiert, entfaltet seine eigentliche kapillarschädigende Wirkung besonders hochgradig an der Lunge. Eine einfache Kapillardilatation, wie sie durch Vagusreizung bewirkt wird, vermag keine Asthmadyspnoe hervorzurufen. Aber weil Kapillardilatation das Auftreten von Kapillarexsudation begünstigt, fördert die Vagusreizung nur in dieser Hinsicht das Auftreten der Asthmadyspnoe, die durch verschiedene Kapillargifte bereits eingeleitet ist.

Zur anaphylaktischen Asthmadyspnoe kommt es durch die in die Lungenkapillaren gelangten Abbauprodukte des reinjizierten Proteins verschiedener Stufen, wie Pepton, Histamin, Imidoverbindungen u. a., welche auf die Lungenkapillaren permeabilitätserhöhend wirken, wobei stets gleichzeitig Vagotonie besteht. Wenn die durch die Antigen-Antikörperreaktion in den Gewebszellen produzierten Kapillargifte in die Blutzirkulation gelangen, werden sie durch die reflektorische Kontraktion der Lungenvenen, die sie bewirken, in den Lungenkapillaren akkumuliert, wo sie das Lungengewebe inaktiviert. Dies kann man als eine Teilerscheinung der in der Lunge sich abspielenden Filtrations- und Verdauungsvorgänge gegen körperfremde organische Substanzen auffassen. Für die Entstehung der anaphyla-

ktischen Dyspnoe ist es absolut nötig, dass eine genügend grosse Menge Abbauprodukte des reinjizierten Proteins auf einmal in die Lungenkapillaren gelangt, damit diese Substanzen vor ihrer intravaskulären Zersetzung die Lungenkapillaren schädigen. Daher ist zur Erzeugung der experimentellen anaphylaktischen Dyspnoe stets ein löslicher, immunologisch-fermentativ leicht verdaulicher Eiweisskörper bzw. Serumeiweiss als Antigen auszuwählen und bei der Reinjektion auf einmal intravenös einzuverleiben. Durch einen anderen korpuskulären, unlöslichen Eiweisskörper lässt sich niemals Asthmadyspnoe erzeugen, weil bei einem solchen die allmählich produzierten Eiweissabbauprodukte intravaskulär in den Lungenkapillaren nacheinander ohne für die Dyspnoeentstehung genügende Kapillarschädigung zersetzt werden. Indem Schilddrüsenfütterung die Zersetzungsfähigkeit der Eiweissabbaustoffe in der Lunge fördert und Schilddrüsenentfernung die Immunkörperbildung bzw. die Produktion der Eiweissabbaustoffe in den Körpergeweben hemmt, zeigen bei der Serumanaphylaxie die schilddrüsengefütterten und thyreoidektomierten Kaninchen keine asthmaartige Dyspnoe. Dementsprechend sind bei diesen beiden anaphylaktischen Kaninchen keine dyspnoeerzeugenden Substanzen in der Lunge nachgewiesen worden, während die Lungenextrakte der gewöhnlichen serumanaphylaktischen Kaninchen reichlich derartige Substanzen enthalten.

Die Mittel, welche die Kapillaren zu kontrahieren und deren Wand zu verdichten vermögen, wie z. B. Adrenalin, Ephedrin (Ephetonin), Pituitrin usw., können die experimentelle Asthmadyspnoe hemmen. Ein Mittel, das einfach die Kapillarexsudation bekämpft, wie Gummi arabicum oder Chlorkalzium, wirkt besonders prophylaktisch gut. Alles bei der durch Kapillargiftinverleibung bewirkten Asthmadyspnoe Geltende gilt auch für die anaphylaktische, nur mit dem Unterschiede, dass Atropin infolge der immer die anaphylaktische Dyspnoe begleitenden Vagotonie diese Dyspnoe mehr oder weniger hemmt, die andere dagegen nicht.

Das menschliche Asthma ist von dem ganz gleichen Entstehungsmechanismus wie das experimentelle, und so stimmen bei beiden die pathologisch-anatomischen und histologischen Befunde und die klinischen Erscheinungen fast völlig überein.

Die Lunge der Asthmatiker zeigt bei Autopsie verschiedenartige Befunde, die völlig vom Krankheitszustand direkt vor dem Tode abhängig sind. Indem nach dem Abklingen des akuten Asthmaanfalls die Kapillarveränderung, wie bei Urtikaria, völlig spurlos verschwinden dürfte, sind so dabei in den Lungen Abnormitäten weder klinisch noch pathologisch-anatomisch nachzuweisen. Dagegen finden sich beim Tode in der Anfallsperiode stets bestimmte Veränderungen: Makroskopisch sind die Oberlappen und die vorderen Ränder der beiden Lungen stark emphysematös aufgebläht, während die an den hinteren und unteren Lungenflächen liegenden Lungenteile dicht und blutreich sind, und so zeigen grobe Übersichtsschnitte der verschiedenen Lungenbezirke blass-graue, lufthaltige Teile, die mit purpurroten, dichten unregelmässig abwechseln. Mikroskopisch weisen die letzteren hochgradige Kapillarerweiterung und Kapillarexsudation und -blutung im Alveolarlumen auf, und es finden sich in den feinsten Bronchialästen Erythrozyten, die aber mehr und mehr geschrumpft oder zerfallen sind, je weiter man in den Bronchialästen aufsteigt, bis man sie endlich in den mittelgrossen Bronchien nur noch spurweise antrifft. Zu diesem Lungenbefunde tritt beim relativ chronischen Falle Wandverdickung der Venen im Sinne von Intimavermehrung, welche vielleicht durch die funktionelle übermässige Inanspruchnahme dieser Gefässe entsteht, weiter starke Erweiterung der praekapillaren Arteriolen und Hypertrophie der rechten Herzkammer, welche beide infolge der durch die Venenverengung bewirkten Blutstauung zustandekommen. Dazu ist beim äusserst chronischen Falle die Dickenzunahme der Alveolar- oder Lobularsepten ausser durch diese Gefässveränderungen durch Bindegewebzunahme

und Zellinfiltration (Rundzellen, Hämosiderinzellen u. a.) verstärkt, und überdies sind Bronchialveränderungen, nämlich Wandverdickung im Sinne der Muskelhypertrophie, und Erythrozyten, Hämosiderinzellen, Alveolarepithelien u. a. im Lumeninhalt bemerkbar. Die letztgenannten Lungenbefunde finden sich stets bei den chronischen Asthmatikern, selbst bei in anfallfreier Periode gestorbenen, und dementsprechend zeigen sich zu Lebzeiten jederzeit, selbst in der anfallfreien Periode, leichtgradige asthmatische Erscheinungen, wie leichte Atemnot, expiratorisches Bronchialrasseln, Emphysem usw.

Die meisten Bronchialasthmafälle gehören zum allergischen (anaphylaktischen) Typus, aber daneben gibt es eine Minderzahl von Fällen von der dem Kapillargiftschock analogen Form. Beim ersteren Typus begünstigt stets die begleitende Vagotonie das Auftreten der Asthmadyspnoe. Die Hauptursache der Entstehung des Bronchialasthmas ist die plötzliche Schädigung der allgemeinen Lungenkapillaren durch asthmogene Substanzen, bei denen vielleicht hauptsächlich verschiedene Eiweissabbauprodukte in Frage kommen, die mittelst der Blutzirkulation in die Lungenkapillaren gelangen und durch reflektorischen Lungenvenenkrampf in denselben akkumuliert werden. Alle klinischen Erscheinungen beim Bronchialasthma können als der Folgezustand der durch plötzliche Kapillardilatation und -exsudation hervorgerufenen allgemeinen Lungenatelektase und des sich daranschliessenden reflektorisch auftretenden Alveolenerweiterungsmechanismus, d. i. des expiratorischen Bronchospasmus mit expiratorischer Atemmuskelspannung, erklärt werden. Bei den klinischen Erscheinungen handelt es sich, kurz zusammengefasst, anfangs um eine kurz dauernde Erstickungsdyspnoe und gleich darauf um verschiedene Atembeschwerden, wie Verlängerung der Expiration und expiratorisches Bronchialrasseln, starke Kontraktion der expiratorischen Hilfsmuskeln, insbesondere als klinisch wichtiges Zeichen um expiratorische Kontraktion der Bauchdeckenmuskeln, um den Inspirationszustand des Brustkorbs, besonders des Zwerchfells, das Auftreten von Lungenemphysem, seltener um Hautemphysem und Pneumothorax, die Folgeerscheinun-

gen der expiratorischen Erhöhung des Alveolarinnendrucks sind. Die im Sputum oft aufgefundenen Blutspuren und Hämosiderinzellen sind besonders bedeutungsvoll für den Entstehungsort und die Entstehungsweise der Krankheit.

Die wirksamsten Mittel gegen den Asthmaanfall sind Adrenalin, Pituitrin (besser Pitressin), Ephedrin usw., die, wie das Tierexperiment zeigt, die Lungenkapillaren zu kontrahieren und die Kapillarwand zu verdichten vermögen. Atropin ist mehr oder weniger in geringem Grade wirksam, wenn das Asthma von Vagotonie begleitet ist. Die anfallhemmende Wirkung der Nitritpräparate, des Diuretins, des Papaverins und der Sympathektomie kommt dadurch zustande, dass durch diese Behandlungen der reflektorische Krampf der Lungenvenen gemildert und dadurch die in den Lungenkapillaren zurückgehaltenen asthmogenen Substanzen nach dem linken Herz durchgelassen werden. Der fehlende oder minimale Erfolg der Vagotomie und des Atropins weist darauf hin, dass die bisher als Hauptursache angenommene Vagotonie zum mindesten keine ursächliche Rolle spielt, wenn auch anzunehmen ist, dass sie als dyspnoebeförderndes Moment in inniger Beziehung zum Asthma steht. Die Schilddrüsenpräparate befördern die fermentative Funktion der Gewebszellen, zumal die der Lungengewebszellen, die asthmogenen Substanzen zu inaktivieren. Die Röntgentherapie des Asthmaticus besteht einfach in einer unspezifischen Desensibilisierung, wodurch es zu arteigener organspezifischer Immunität kommt.

LITERATURVERZEICHNIS.

- 1) *Tsuji*, Acta Scholae Medicinalis Universitatis Imperialis in Kioto, Vol. XII, Fasc. I, S. 119, 1929; Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 5, Heft 4, S. 41, 1929.
- 2) *Tsuji*, Acta Scholae Medicinalis Universitatis Imperialis in Kioto, Vol. XIII, Fasc. III, S. 319, 1931; Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft II, S. 87, 1931.
- 3) *Wada*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 7, Heft 5, S. 795 (S. 54), 1931.
- 4) *Wada*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 7, Heft 7, S. 1061 (S. 71), 1931.

- 5) *Grossmann*, Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 12 (1887), Bd. 16 (1889), Bd. 20 (1892), u. Bd. 62 (1907).
- 6) *Wada*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 7, Heft 12, S. 1467 (S. 193), 1932.
- 7) *Miyake*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft 6, S. 868 (S. 49), 1930.
- 8) *Miyake*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft 4, S. 602 (S. 29), 1930.
- 9) *Wada*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 8, Heft 3, S. 231 (S. 9), 1932.
- 10) *Miyake*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 7, Heft 4, S. 602 (S. 45), 1931.
- 11) *Miyake*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft 5, S. 735 (S. 38), 1930.
- 12) *Anano and Takino*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 8, H. 1, S. 68, 1932.
- 13) *Friedberger*, Handbuch von Kraus-Brugsch, Bd. 2, 1919.
- 14) *Doerr*, Weichardts Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie usw., Bd. 5, 1922.
- 15) *Fenzyvessy und Freund*, Biochem. Zeitschr., Bd. 96, 1919.
- 16) *Aschoff und Kiyono*, Fol. haemat., Bd. 15, S. 383, 1913.
- 17) *Kiyono*, Die vitale Karminspeicherung, Jena, 1914.
- 18) *Aschoff*, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med., Bd. 50, S. 52, 1926.
- 19) *Schmorl*, Pathologisch-anatomische Untersuchungen über Puerperaleklampsie, Leipzig, Vogel, 1893.
- 20) *Schmidt*, Verhandl. der Vers. deutsch. Naturforscher u. Aerzte, Braunschweig, 1898.
- 21) *Aschoff*, Virchows Arch., Bd. 134, S. II, 1893.
- 22) *Ogata*, Zieglers Beitr., Bd. 53, S. 120, 1912.
- 23) *Verne*, C. R. Ass. Anat., Bd. 19, S. 259, 1924.
- 24) *Mautner und Pick*, Bioch. Zeitschr., Bd. 127, S. 72, 1922.
- 25) *Arey und Simmonds*, Anat. Record, Vol. 18, P. 219, 1920.
- 26) *Mautner und Pick*, Münch. med. Wochenschr., Nr. 34, S. 1141, 1915.
- 27) *Dale und Laidlaw*, Journ. of physiol., Vol. 52, P. 355, 1919.
- 28) *Minouchi*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft 5, S. 750 (S. 39), 1930.
- 29) *Minouchi*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 8, Heft 1, S. 89, 1932.
- 30) *Oeller*, Deutsch. med. Wochenschr., Nr. 41, S. 1287, 1923.
- 31) *Oeller*, Deutsch. med. Wochenschr., Nr. 11, S. 357, 1924.
- 32) *Domagk*, Virchows Arch., Bd. 253, S. 544, 1924.
- 33) *Jakob*, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med., Bd. 47, S. 652, 1925.
- 34) *Pistocchi*, Arch. per le scienze med., Bd. 44, Heft 3/4, 1921.
- 35) *Kepinow und Lanzenberg*, Cpt. rend. des seances de la soc. de biol., Bd. 88, Nr. 3, 1923.
- 36) *Savini*, Cpt. rend. des seances de la soc. de biol., Bd. 89, Nr. 3, 1923.
- 37) *Koba*, Gesammelte Werke der Schilddrüse, aus Tsujis Universitätsklinik, S. 62, 1919.—1924; Nihon Naika Gakkai Zasshi, Bd. 2, S. 993, 1923.
- 38) *Mayeda*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 5, Heft 9, S. 1631 (S. 93), 1929.
- 39) *Wada*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 8, Heft 5, S. 565 (S. 27), 1932.
- 40) *Morawitz*, Kraus u. Brugsch, spez. Pathol. u. Therapie, Bd. 3, Teil 2, S. 53, Berlin, Urban u. Schwarzenberg, 1924.
- 41) *Literatur der 35 Sektionsfälle des Asthmikers*, 1. Bamberger, Würzburger med. Zeitschr., Bd. 6, S. 109, 1865.—2. Fraentzel, Charité-Annalen, Bd. 4, S. 294, 1877.—3. Lyden, Deutsch. militärärztl. Zeitschr., Bd. 15, S. 51, 1886.—4. Berkart, on bronchial asthma etc., Ed. 2, London, J. and A. Churchill, 1889.—5. Schmidt, Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 20, S. 476, 1892.—6. Fraenkel, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 35, S. 559, 1898.—7. Fraenkel, D. M. W., Nr. 17, S.

- 269, 1900. — 8. Jezierski (2 Fälle), D. Arch. f. klin. Med., Bd. 85, S. 342, 1906. — 9. Ellis, Am. Journ. of the med. science, Vol. 136, P. 407, 1908. — 10. Mönkeberg, Verhandl. d. Deutsch. pathol. Gesellsch., 13. Tagung, Jg. 1909, S. 173. — 11. Heizer, Dissertation, München, 1911; zit. nach Huber und Koessler. — 12. Tichmeneff, Bronchial asthma with death, Prakt. Vratsh. St. Petersburg., Vol. 12, P. 562, 1913; zit. nach Huber und Koessler. — 13. Marchand (2 Fälle), Zieglers Beiträge, Bd. 61, S. 251, 1916. — 14. Marchand, Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. 127, S. 184, 1918. — 15. Kamchorn und Ellis, Am. Journ. of the med. science, Vol. 161, P. 525, 1921. — 16. Huber und Koessler (6 Fälle), Arch. of intern. med., Vol. 30, No. 6, P. 689, 1922. — 17. Faschingbauer, Wien. Arch. f. innere Med., Bd. 4, S. 349, 1922. — 18. Dehner (2 Fälle), klin. Wochenschr., Bd. 6, S. 1412, 1927. — 19. Kountz und Alexander (3 Fälle), Arch. of pathol., Vol. 5, P. 1003, 1928. — 20. Steinberg und Figley (2 Fälle), Journ. of lab. and clin. med., Vol. 13, S. 921, 1928. — 21. Bergstrand (2 Fälle), Acta pathol. et microbiol. Scandinav., Bd. 5, S. 251, 1928. — 22. Harkavy, (2 Fälle) Journ. of allergy, Vol. 1, P. 136, 1930.
- 42) *Mautner*, klin. Wochenschr., Nr. 46, S. 2284, 1922.
 - 43) *Unna*, Berl. klin. Wochenschr., Heft 24, 25, 26, 27, 29 u. 30. 1916.
 - 44) *Orth*, Lehrbuch d. spez. pathol. Anat., Bd. 1, 1887.
 - 45) *Fischer*, Zieglers Beiträge, Bd. 5, S. 453, 1889.
 - 46) *Aschoff*, Lehrbuch d. pathol. Anat., Bd. 2, S. 288, 3. Aufl., 1913.
 - 47) *Fukushi*, Virchows Arch., Bd. 217, S. 16, 1914.
 - 48) *V. Noorden*, Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 20, S. 28, 1892.
 - 49) *Morawitz*, Kraus u. Brugsch, spez. Pathol. u. Therapie, Bd. 3, Teil 2, S. 54, Berlin, Urban u. Schwarzenberg, 1924.
 - 50) *Yoshida*, Tokio Iji Shinshi, Nr. 2687, S. 1786, 1930.
 - 51) *Takeya*, Kiudai Iho, Bd. 4, Heft 6, S. 307, 1930.
 - 52) *Fraentzel*, Charité-Annalen, Bd. 4, S. 294, 1877.
 - 53) *Baer u. Pick*, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm., Bd. 74, S. 41, 1913.
 - 54) *Miyake*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 6, Heft. 5, S. 735, 1930.
 - 55) *Pal*, Deutsch. med. Wochenschr., Nr. 4, 1914.
 - 56) *Kümmel*, klin. Wochenschr., S. 1480, 1923.
 - 57) *Kümmel*, klin. Wochenschr., S. 1825, 1923.
 - 58) *Kümmel*, Arch. f. klin. Chir., Bd. 127, S. 716, 1923.
 - 59) *Glaser*, Ther. d. Gegenwart, S. 297, 1923.
 - 60) *Glaser*, Ther. d. Gegenwart, S. 202, 1924.
 - 61) *Glaser*, Med. Klin., S. 477, 1924.
 - 62) *Kappis*, Med. Klin., S. 1347, 1924.
 - 63) *Fründ*, Bruns Beiträge, Bd. 136, S. 581, 1926.
 - 64) *Erkes*, Zentralbl. f. Chir., Bd. 53, S. 718, 1926.
 - 65) *Brüning*, Brüning u. Stahl; Die Chirurgie d. vegetat. Nervensystems, Berlin, S. 86, 1924.
 - 66) *Braeucker*, Arch. f. klin. Chir., Bd. 137, S. 463, 1925.
 - 67) *Braeucker*, Arch. f. klin. Chir., Bd. 139, S. 1, 1926.
 - 68) *Braeucker*, Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. inn. Med., 38. kongr., Wiesbaden, 1926, S. 134.
 - 69) *Schilling*, Deutsch. med. Wochenschr., 1909.
 - 70) *Maruyama u. Hayashi*, Jikken Igaku Zasshi, Bd. 13, Nr. 9, 1929.
 - 71) *Hirasawa*, Folia Endocrinologica Japonica, Bd. 8, Heft. 1, S. 42, 1932.