青酸加里中毒ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響、特ニ之ト内分泌トノ關係ニ就テ……(水谷) 七二二

青酸加里中毒ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響

特ニ之ト内分泌トノ關係ニ就テ

第二篇 生殖腺ノ影響

京都帝國大學醫學部辻内科教室

大學院學生 醫學士 水谷 健

三

目次

第一章 緒言	注射ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響
第二章 實驗材料及ビ實驗方法	青酸加里及ビ卵巢黃體エキス連續注射ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響
第三章 實驗成績	第四章 總括及ビ考按
第一節 青酸加里及ビ辜丸エキス連續注射ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響	第五章 結論
第二節 青酸加里及ビ卵巢間質エキス連續	主要文獻

第一章 緒言

生殖腺内分泌ガ生體新陳代謝ト密接ナル關係ヲ有スルコトハ既ニ明カナル所ニシテ、一般ニ辜丸又ハ卵巢物質給與ハ新陳代謝ヲ亢進セシメ、去勢又ハ其機能減退ハ之ガ下降ヲ招來スルコトハ多數諸家ノ業績ノ示ス所ナリ。又卵巢ガ濾胞ヲ含メル間質及ビ黃體ノ各内分泌機能全ク相異リ新陳代謝上多ク場合互ニ相拮抗的ニ作用スルモノヨリナルコ

トハ殊ニ我教室諸氏ノ多數業績ノ之ヲ示ス所ニシテ、諸家ノ業績ヲ綜合スルニ、恐ラクハ黃體物質ハ新陳代謝ヲ低下セシメ、間質物質ハ之ヲ上昇セシムル作用アルモノ、如シ。一方青酸加里中毒ニ際シテ一般臟器組織ノ酸化機轉ガ著明ナル障礙ヲ蒙ルコトハ前篇ニ於テ報告セル所ナリ。茲ニ於テ、斯ノ如キ新陳代謝ト重大ナル關係ヲ有スル生殖腺ガ青酸加里中毒ニ對シテ如何ナル影響ヲ及ボスヤヲ檢スルハ甚ダ意義深キコトナルモ之ヲ文献ニ見出ス能ハズ、加之此方面ニ於ケル研究モ亦極メテ寥々タルモノニシテ、當教室織田ガ血液内糖及ビ乳酸量ノ方面ヨリ黃體ノ影響ニ就キ、又久保ガ血液脂肪及ビ類脂肪ノ方面ヨリ生殖腺ノ影響ニ關シ詳細ナル研究ヲ行ヘルアルノミナリ。茲ニ余ハ組織呼吸ノ方面ヨリ斯ル中毒狀態ニ於テ睾丸、卵巢間質及ビ卵巢黃體物質ガ如何ナル影響ヲ之ニ及ボスベキヤニ就キ實驗ヲ行ヘリ。

第二章 實驗材料及ビ實驗方法

供試動物ハ健康白鼠ヲ用ヒ、睾丸物質投與ニハ雄性、卵巢物質投與ニハ雌性白鼠ヲ使用セリ。生殖腺物質トシテハ牛ノ睾丸、卵巢間質（濾胞液ヲ含有ス）及ビ卵巢黃體物質ノ夫々一〇%食鹽水エキスを調製シ、之ヲ皮下注射ニ供セリ。組織呼吸測定ニハ Warburg ニ從ヒ Barcroft ノ Manometer ヲ使用セリ。其他詳細ハ第一篇ニ述べタルガ如シ。

第三章 實驗成績

第一節 青酸加里及ビ睾丸えきす連續注射ノ 臟器組織呼吸ニ及ボス影響

青酸加里中毒ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響、特ニ之ト内分泌トノ關係ニ就テ……（水谷） 七二三

一・〇%ノ青酸加里溶液白鼠體重每一〇〇瓦〇・八珽即チ青酸加里トシテ〇・八珽宛、同時ニ一〇%羣丸食鹽水エキス體重每一〇〇瓦〇・二珽宛十日間連續皮下注射セリ。別ニ對照トシテ同量ノ羣丸エキスヲ皮下注射シ、其ノ影響ヲモ明カニセントセリ。各臟器酸素消費量ヲ對照健康白鼠平均值(第一篇第一表)ニ比シ其ノ差ノ百分率ヲ求メタリ。其ノ成績第一表ニ表ス如シ。肝臟ハ一例ニ少シク増加セルモ、他ノ六例ニ著シク減少シ、平均二二・九%ノ減少率ヲ示セリ。腎臟ハ全例ニ減少シ、平均值一六・七%ノ減少ヲ示セリ。心筋ハ三例ニ増加シ、四例ニ著シク減少シ、平均

第一表

番 號 (性)	月 日	體重(瓦)		注 射 日 數	肝 臟		腎 臟		心 筋		骨 骼 筋		中 狀 腺		脾 臟	
		前	後		O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)	O_2 消費量 cmm 對平均値 之增減率(%)				
青酸加里 + 羣丸エキス注射白鼠																
1 ♂	27/IV	136	137	10	5.66	-30.1	19.00	-16.7	1.18	-50.8	1.38	-35.5	3.62	-48.4	8.82	-28.6
2 ♂	27/IV	130	130	10	5.48	-32.3	21.04	-7.8	1.58	-34.1	1.44	-32.7	4.36	-37.9	9.68	-21.7
3 ♂	28/IV	121	142	10	6.42	-20.7	20.66	-9.4	1.52	-36.6	1.22	-43.0	5.12	-27.0	10.68	-13.6
4 ♂	29/IV	138	139	10	6.64	-18.0	18.36	-19.5	2.90	+20.8	1.38	-35.5	6.16	-12.2	11.06	-10.5
5 ♂	1/V	130	130	11	8.68	+7.1	17.82	-21.9	3.40	+41.7	1.76	-17.7	4.36	-37.9	12.66	+2.4
6 ♂	2/V	128	125	10	5.12	-36.8	19.94	-12.6	2.74	+14.1	1.00	-53.3	4.04	-42.5	11.22	-9.2
7 ♂	4/V	157	141	10	5.74	-29.1	16.30	-28.5	1.42	-40.8	1.24	-42.0	2.12	-69.8	9.68	-21.7
平 均		134	134	10	6.24	-22.9	19.00	-16.7	2.10	-12.5	1.42	-33.6	4.24	-39.6	10.54	-14.7

1 ♀	38/1Ⅴ	114	132	10	6.02	-25.7	23.40	+2.5	2.28	-5.0	2.38	+11.2	4.16	-40.7	11.96	-3.2
2 ♀	29/1Ⅴ	119	131	10	8.04	-0.7	21.88	-4.1	3.60	+50.0	2.18	+1.8	7.82	+11.4	11.02	-10.8
3 ♀	30/1Ⅴ	125	131	11	7.66	-6.6	21.04	-7.8	2.66	+10.8	1.94	-9.3	6.34	-9.6	12.54	+1.4
4 ♀	1/Ⅴ	123	137	10	9.80	+21.0	20.58	-9.8	1.48	-38.3	3.02	+41.1	8.64	+23.0	12.10	-2.1
5 ♀	2/Ⅴ	119	128	10	7.84	-3.2	21.38	-6.3	1.88	-21.6	1.72	-19.6	7.22	+2.8	11.62	-5.9
平均		120	121	10	7.84	-3.2	21.64	-5.1	2.38	-0.8	2.22	+3.7	6.82	-2.8	11.84	-4.2
青酸加里十羧丸エキス注射白鼠ト羧丸エキス注射白鼠トノ増減率比較																
						-19.7		-11.6		-11.7		-37.3		-36.8		-10.5
青酸加里十羧丸エキス注射白鼠ト青酸加里注射白鼠トノ増減率比較																
						-140		-1.3		-266		-24.3		-23.4		-2.1

値ニ於テ、一二・五%ノ減少率ヲ示セリ。甲狀腺及ヒ骨骼筋ハ共ニ全例ニ著明ニ減少シ、平均値ハ夫々三九・六%及ビ三三・六%ノ減少ヲ示セリ。脾臓ハ一例ニ著變ナキモ、他ノ六例ニ減少シ、平均一四・七%ノ減少ヲ認メタリ。體重ヲ見ルニ一例ニ増加シ、一例ニ減少セルモ他ノ五例ニ著變ナク平均値ニ於テ變化ヲ認メズ。

以上ノ成績ヲ通覽スルニ、各臟器組織呼吸ハ一般ニ可ナリ著シク減少シ、之ヲ青酸加里單獨注射ノ其レニ比較スルニ（第一表及ビ第二篇第二表）、心筋ハ其差二六・六％減少シ、肝臟ハ一四・〇％、腎臟ハ一・三％、骨骼筋ハ二四・三％甲狀腺ハ二三・四％及ビ脾臟ハ二・一％ノ減少率ノ強度ヲ示ス。即チ一般臟器ニ於テ青酸加里ニヨル組織呼吸障碍ハ峯丸エキスニヨリテ一層助長セラレタリ。

更ニ青酸加里及ビ寧丸エキス同時注射白鼠ノ組織呼吸ヲ寧丸エキス注射白鼠ノ其レニ比較スルニ（第一表）、其ノ差

肝臟ハ一九・七%、腎臟ハ一一・六%、心筋ハ一一・七%、骨骼筋ハ三七・三%、甲狀腺ハ三六・八%、脾臟ハ一〇・五%ノ減少率ヲ示セリ。

第二節 青酸加里及ヒ卵巢間質エキスを連續注射ノ臟器組織呼吸ニボス影響

一・〇%青酸加里溶液體重每一〇〇瓦〇・八耗、同時ニ一〇%卵巢間質食塩水エキスを體重每一〇〇瓦〇・二耗宛連續十日間皮下注射セリ。別ニ對照トシテ同量ノ間質エキスをミテ注射シ、其ノ影響ヲ明カニセリ。各臟器酸素消費量ヲ

第二表

番 號 (性)	月 日	體重(瓦)		注 射 日 數	肝 臟		腎 臟		心 筋		骨 骼 筋		甲 狀 腺		脾 臟	
		前	後		O ₂ 消費量 cmm pro std.	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm pro std.	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm pro std.	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm pro std.	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm pro std.	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)		
青酸加里十卵巢間質エキスを注射白鼠																
I ♀	23/V	127	125	10	6.08	-24.9	21.80	-4.4	1.68	-30.0	1.34	-37.4	5.54	-21.0	11.12	-10.0
II ♀	25/V	111	121	10	6.00	-25.9	20.08	-12.0	2.44	+1.6	1.54	-28.0	6.06	-13.6	11.48	-7.1
III ♀	26/V	105	104	10	5.28	-34.8	18.66	-18.2	1.80	-25.0	1.52	-28.9	5.82	-17.1	10.26	-17.0
IV ♀	27/V	123	133	10	7.22	-10.8	19.02	-16.6	2.84	+18.3	1.64	-23.3	5.84	-16.8	12.26	-0.8
V ♀	28/V	130	140	10	6.86	-15.3	20.06	-12.1	1.54	-35.8	1.50	-29.9	3.30	-53.0	11.18	-9.5
平 均		119	124	10	6.28	-22.4	19.92	-12.7	2.06	-14.1	1.50	-29.9	5.30	-24.5	11.26	-8.9

卵巣間質ホルモン注射白鼠

卵巣間質ホルモン注射白鼠																					
I ♀	23/V	102	115	10	5.98	-26.1	23.64	+ 3.5	2.06	-14.1	2.62	+22.4	8.16	+16.2	11.32	- 8.4					
II ♀	25/V	101	115	10	5.90	-27.1	21.74	- 4.7	1.56	-35.0	2.12	- 0.9	5.44	-22.5	11.76	- 4.8					
III ♀	26/V	114	141	10	4.68	-42.3	22.34	- 2.1	2.48	+ 3.3	1.96	- 3.7	6.72	- 4.2	11.00	-11.0					
IV ♀	27/V	110	114	10	14.86	+83.4	21.86	- 4.2	2.06	-14.1	2.18	+ 1.8	7.92	+12.8	12.96	+ 4.8					
V ♀	28/V	143	150	11	10.34	+27.6	21.82	- 4.3	2.58	+ 7.5	2.14	± 0	5.74	-18.2	13.02	+ 5.3					
VI ♀	30/V	137	150	10	5.08	-37.3	19.74	-13.5	3.20	+33.3	1.82	-14.9	6.92	- 1.4	10.70	-13.4					
平均		117	130	10	7.80	- 3.7	21.86	- 4.2	2.32	- 3.3	2.14	± 0	6.80	- 3.1	11.78	- 4.6					
青酸加里十間質ホルモン注射白鼠ト間質ホルモン注射白鼠ト増減率比較																-18.7	- 8.5	-10.8	-29.9	-21.4	- 4.3
青酸加里十間質ホルモン注射白鼠ト青酸加里注射白鼠ト増減率比較																-13.5	+ 2.7	-28.2	-20.6	- 8.3	+ 3.7

健康白鼠對照ノ其レ（第一篇第一表）ニ比シテ、其ノ百分率ヲ求メタリ。其ノ成績第二表ニ示ス如シ。肝臓、腎臓、骨骼筋、甲狀腺及ヒ脾臓ハ酸素消費量全例ニ減少シ、平均値ニ於テ夫々二・四％、一二・七％、二九・九％、二四・五％、及ビ八・九％ノ減少率ヲ示ス。心筋ハ一例ニ著變ナク、一例ニ増加シ、他ノ三例ニ可ナリ著シキ減少ヲ認メ、平均値ニ於テ一四・一％ノ減少率ヲ示ス。體重ハ二例ニ大差ナク、三例ニ増加シ、平均ニ於テハ少シク増加セルヲ認ム。

以上成績ヲ通覽スルニ、各臓器酸素消費量ハ一般ニ減少シ、殊ニ肝臓、骨骼筋及ヒ甲狀腺ニ著シク、之ヲ青酸加里單獨注射ノ其レニ比較スルニ（第二表及ビ第一篇第二表）肝臓ハ一三・五％、骨骼筋ハ二〇・六％、甲狀腺ハ八・三％ノ減少率ノ強度ヲ示シ、腎臓及ヒ脾臓ハ夫々二・七％及ビ三・七％ナル僅少ノ減少率ノ輕度ヲ示シ、心筋ハ其ノ差二八・二

%ノ減少ヲ示ス。即チ青酸加里單獨注射ノ其レニ比シ大差ヲ認メラザル腎臟及ビ脾臟ヲ除キテハ、一般ニ青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ卵巢間質ニヨリテ一層助長セラル、ガ如シ。

更ニ青酸加里及ビ間質エキス同時注射白鼠ノ組織呼吸ノ間質エキス注射白鼠ノ其レト比較スルニ(第二表)、其ノ差ハ肝臟、腎臟、心筋、骨骼筋、甲狀腺及ビ脾臟ノ順ニ夫々一八・七%、八・五%、一〇・八%、二九・九%、二一・四%及ビ四・三%ノ減少ヲ示ス。體重ノ變化モ前者ハ後者ニ比シ其增加率明カニ輕度ナルヲ認ム。

第三節 青酸加里及ビ卵巢黃體えきす連續注射ノ

臟器組織呼吸ニ及ボス影響

一・〇%青酸加里溶液體重每一〇〇瓦〇・八珎、同時ニ一〇%卵巢黃體食鹽水エキス體重每一〇〇瓦〇・二珎宛連續十日間皮下注射セリ。別ニ對照トシテ同量ノ黃體エキスノミヲ注射シ、其ノ影響ヲモ明カニセントセリ。各臟器酸素消費量ヲ健康白鼠對照(第一篇第一表)ニ比シ、其差ノ百分率ヲ求メタリ。其成績第三表ニ於ケルガ如シ。肝臟ハ一例ニ増加シ、二例ニ大差ナク、三例ニ減少シ、平均値ニ於テ六・九%ノ減少率ヲ示セリ。腎臟ハ全例ニ於テ少シク減少シ、平均一二・〇%ノ減少ヲ示セリ。心筋ハ二例ニ僅カニ増加シ、一例ニ著變ナク、三例ニ減少シ、平均値ニ於テ一・六%ノ減少率ヲ認ム。骨骼筋ハ四例ニ對照ト大差ナク、二例ニ減少シ平均ニ於テ六・五%ノ減少率ヲ示ス。甲狀腺ハ二例ニ少シク増加シ、四例ニ減少シ、平均値ハ九・四%ノ減少率ヲ示ス。次ニ脾臟ニ於テハ一例ニ對照ト大差ナク、他ノ五例ニ僅カノ減少ヲ示シ、平均値ニ於テ六・三%ノ減少率ヲ認メタリ。體重ハ注射ノ前後ヲ比較スルニ、全例ニ

以上成績ヲ通覽スルニ、各臓器酸素消費量ハ一般ニ比較の輕度ノ減少率ヲ示シ、之ヲ青酸加里單獨注射ノ其レニ比

第三表

青酸加里中毒ノ臟器組織呼吸ニ及ボス影響、特ニ之ト内分泌トノ關係ニ就テ……(水谷) 七二九

番 號 (性)	月		注 射 日 數	肝		腎		心		骨 格		甲 狀 腺		脾	
	體 重 (g)	日		O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)	O ₂ 消費量 cmm 對スル増 減率(%)	健康白鼠 平均値ニ 對スル増 減率(%)

卵巣黃體エキスを注射白鼠

I ♀	11/V	130	144	11	9.46	+16.8	23.12	+1.3	2.08	-13.3	2.28	+12.1	6.96	-0.8	13.42	+8.5
II ♀	12/V	142	142	10	11.38	+40.5	21.52	-5.7	2.92	+21.6	2.70	+26.1	9.22	+31.3	12.44	+0.6
III ♀	13/V	125	141	10	6.36	-21.4	22.04	-3.4	1.92	-20.0	1.98	-7.4	6.44	-8.2	14.16	+14.5
IV ♀	14/V	120	124	10	6.62	-18.2	20.40	-10.6	2.20	-8.3	1.70	-20.5	4.52	-35.6	12.82	+3.7
V ♀	16/V	100	94	10	8.86	+9.4	21.55	-5.7	2.58	+7.9	1.74	-18.7	8.70	+23.9	13.30	+7.6
VI ♀	16/V	152	151	10	6.78	-16.3	21.98	-3.6	1.48	-38.3	1.62	-24.3	4.92	-29.9	12.54	+1.4
平 均	128	132	10	8.24	+1.7	21.76	-4.6	2.18	-9.1	2.00	-6.5	6.78	-3.4	13.10	+5.9	-12.2
青酸加里十黃體エキスを注射白鼠ト黃體エキスを注射白鼠トノ増減率比較					-8.6		-7.4		-2.5		± 0		-6.0			
青酸加里十黃體エキスを注射白鼠ト青酸加里注射白鼠トノ増減率比較					+2.0		+3.4		-25.7		+2.8		+6.8		+6.3	

ラル、傾向アリ。

更ニ青酸加里及ビ黃體エキスを同時注射白鼠ノ組織呼吸ヲ黃體エキスを注射ノ其レニ比較スルニ(第三表)、其ノ差ハ肝臓、腎臓、心筋、骨骼筋、甲狀腺、及ビ脾臓ノ順ニ夫々八・六%、七・四%、二・五%、〇%、六・〇%及ビ二・二%ナル僅カノ減少ヲ認メタリ。

第四章 總括及ビ考按

余ハ前篇ニ於テ青酸加里溶液ヲ連續皮下注射セル白鼠ニ於テ諸臟器ノ組織呼吸ノ變化ハ心筋ニ增強シタルモ、他ノ凡テノ臟器組織ニ減弱ヲ證明セリ。今雄性白鼠ニ青酸加里ト同時ニ辜丸エキスを皮下注射セルニ、一般ノ臟器ニ於テ其ノ酸素消費量ハ著明ニ減少シ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ辜丸エキスをヨリテ一層助長セラル、ヲ認メタリ。次ニ雌性白鼠ニ青酸加里ト同時ニ卵巢間質エキスを注射セルニ、辜丸エキスの場合ニ於ケルガ如ク、青酸加里ニヨル作用ハ一層助長セラル、ヲ認メ、卵巢黃體エキスを同時ニ注射セル場合ハ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ一般臟器ニ於テ抑制セラル、傾向ヲ示セリ。

抑々辜丸ト一般新陳代謝トノ關係ニ就テハ、Loewy u. Richter, Popiel, Ande, Tsubura, Heymans, Loewy u. Kamier, Liebsny, Plaszek, 原、清成及ビ末松、水口等ハ動物或ハ人間ニ於テ去勢後又ハ辜丸機能障礙ノ時ニ瓦斯代謝ノ低下ヲ證明シ、之等ノ中ニ於テ、Loewy u. Richter, Ande, Plaszek, 原等ハ其低下セル瓦斯代謝ハ辜丸物質投與ニヨリテ上昇スルヲ認メタリ。篠部ハ健康白鼠ニ辜丸粉末ヲ連續的ニ試食セシムル時ハ、其酸素消費量ハ輕度ニ上昇ノ傾向ヲ示スヲ證シタリ。其他岡田、奥、河野ハ脂肪新陳代謝、飯塚ハ血液酸素解離曲線、安田ハ臟器オキシダーゼ、千野ハ肝臟糖原質、田中ハ血液、肝臟及ビ筋肉ラクトアチドゲン、Korotchevsky, 小川ハ窒素新陳代謝、小屋迫ハ馬尿酸形成、久保ハ臟器硫黃含有量ニ關シテ夫々各方面ヨリ檢索シ、辜丸物質ノ投與ハ一般ニ新陳代謝ヲ亢進セシムルヲ認メタリ。次ニ辜丸ト組織呼吸トノ關係ニ就テ見ルニ、試験管内實驗ニ於テハ、Kjopsstock, 塚本、龜井ハ辜丸エキスを組

織呼吸亢進作用ヲ認メタルモ、Vollmer ハ何等ノ影響ヲモ認メズト稱セリ。前田ハ辜丸剝出家兔ノ甲狀腺ハ酸素消費量増加シ、脾臟及ビ肝臟ハ著變ナク、副腎及ビ脾臟ハ減少セルヲ認メ、Piepenborn ハ去勢白鼠ノ筋肉ニ於テ瓦斯交換ノ減少ヲ證セリ。

即チ以上諸家ノ業績ヲ綜合シテ考察スルニ、辜丸物質ハ生體ノ新陳代謝ヲ亢進シ、組織ノ酸化機轉ヲ増強セシメルモノナルハ想像ニ難カラザル所ナリ。然ラバ余ノ實驗ニ於テ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ガ辜丸エキスニヨリテ一層助長セラレタル所以如何ト云フニ、青酸ハ細胞機能ヲ猛烈ニ破壊シ其ノ酸化機轉ヲ強ク侵害スルモノナルニ、之ニ辜丸物質ノ如ク 組織細胞ヲ刺戟シテ其ノ新陳代謝ヲ亢進セシムルガ如キ内分泌物質ヲ投與セバ、細胞機能ノ權衡ハ忽チニシテ破ラレ却テ辜丸物質ハカ、ル病的細胞ニ對シ中毒的作用ヲ發揮シ、其ノ酸化機能ガ更ニ激シク侵サル、ハ容易ニ首肯セラル、所ニシテ、前篇ニ於ケル甲狀腺エキス及ビアドレナリンノ場合ト同様ノ傾向ヲ示セルハ興味多キコトナリ。之久保ガ辜丸エキス大量注射ニヨリテ青酸加里ニヨルリペミーガ助長セラル、傾向アルヲ認メタルト其ノ趣ヲ一ニスル所ナリ。

次ニ卵巢黃體及ビ間質ノ新陳代謝ニ及ボス影響ニ關シテハ、Below ハ卵巢製劑ノ物質代謝ニ及ボス作用ハ黃體ノ存否ニヨリ異リ、無黃體卵巢物質ハ酸素消費量並ニ窒素排泄ヲ高メ、黃體物質ハ反對ニ之ヲ低下セシムト唱へ、Aldenhalden u. Brannertiz ハ蝌蚪ニ就キ黃體物質ハ其酸素消費量ヲ増加シ、間質物質ハ何等ノ影響ヲ及ボサズト云ヘリ。Korenschewsky, Saek, Orita, 青木、小川ハ窒素新陳代謝ニ關シ、大村ハ臟器脂肪量、河野ハ血液脂肪及ビ類脂肪、龜井 佐々木ハ臟器還元グルタチオン量、佐々木ハ血液酸素解離曲線、安田ハ諸臟器オキシダーゼ量、織田ハ血糖、

田中ハ臟器乳酸量、齋藤ハ甲狀腺沃度量、千野ハ肝糖原質量、田坂ハ尿中窒素及ビ硫黃排泄、小屋迫ハ馬尿酸形成、久保ハ臟器硫黃含有量ニ關シテ、夫々各方面ヨリ檢索シ、何レモ間質ト黃體トハ其作用互ニ拮抗シ、間質物質ハ新陳代謝ヲ亢進シ、黃體物質ハ之ヲ低下セシメルコトヲ證明セリ。次ニ組織呼吸ニ關シテハ文献甚ダ少ク、試験管内ニ於テ、Ellinger, Vollmer ハ Interooglandol 及ビ Oooglandol 共ニ、Klopstock ハ Oooglandol ニ組織呼吸ノ亢進ヲ認メ、龜井ハ肝臟及ビ腎臟ニ於テ卵巢間質、濾胞水及ビ黃體ノ亢進作用ヲ認メタリ。

以上文献ヲ綜合スルニ、卵巢間質物質投與ハ一般新陳代謝ノ亢進ヲ來シ、黃體物質投與ハ之ニ反シテ新陳代謝ノ低下ヲ來スモノ、如シ。然ラバ今青酸加里中毒ニ際シテ酸化機能ノ強ク障礙セラレタル組織細胞ガ、間質物質ノ如キ酸化作用ヲ亢進セシメントスル刺激ニ遭遇セバ茲ニ細胞ハ機能上無理ヲ來シ、從ツテ其酸化機轉ガ一層烈シク侵サル、ハ恰モ舉丸物質ノ際ト其機ヲ一ニスルモノニシテ、之余ノ間質エキ스가青酸加里ノ呼吸障礙ヲ更ニ助長シタル所以ニ外ナラズ。卵巢間質エキスの大量ハ青酸加里ニヨリペミ―ヲ助長スルガ如キ傾向アリト云フ久保ノ實驗成績ト其軌ヲ一ニスル所ナリ。次ニ黃體エキ스가青酸加里ノ作用ヲ抑制スル傾向ヲ示シタルハ、インスリンノ場合ト同様ニシテ即チ青酸加里中毒ニ際シテハ、間質エキスの如ク組織ノ酸化機轉ヲ增強セシメントシテ却ツテ之ヲ烈シク障礙スルガ如キコト更ニナク、新陳代謝ヲ緩慢ナラシムルガ如キ黃體エキスの病的細胞ニ對シ庇護的ニ作用シ、此ノ中毒時ニ於ケル呼吸障礙ニ對シテ好影響ヲ與ヘ、ヨク其ノ組織ノ酸化機能ヲ全カラシメント努力スルニ因ルニアラズヤ。之ニ組織内糖及ビ乳酸量ニ於ケル實驗ト同ジ傾向ヲ示スモノナリ。

第五章 結 論

一、雄性白鼠ニ於テ、睾丸エキスを青酸加里液ト同時ニ反復注射スル時ハ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ一般臟器ニ於テ助長サル。

二、雌性白鼠ニ於テ、卵巢間質エキスを青酸加里液ト同時ニ反復注射スル時ハ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ腎臟及ビ脾臟ニハ著變ヲ呈セザルモ、其他ノ臟器ニ於テハ一般ニ助長サル。

三、雌性白鼠ニ於テ、卵巢黃體エキスを青酸加里液ト同時ニ反復注射スル時ハ、青酸加里ニヨル組織呼吸障礙ハ一般臟器ニ於テ抑制セラル、傾向アリ。

摺筆スルニ際シ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリタル恩師辻教授ニ謹ンデ深謝ス。

本論文ノ要旨ハ第六回日本内分泌學會總會ニ於テ發表セリ。

出 典 文 献

- 1) 織田：日本内分泌學會雜誌，第5卷，第2號，393頁(昭和4年)。
- 2) 久保：日本内分泌學會雜誌，第7卷，第8號，1128頁(昭和6年)。
- 3) Loevy u. Richter: Berlin Klin. wochenschr. 1899, Nr. 50, S. 1095.
- 4) Aude: Rev. franc. d'endocrinol. 5, P. 81, 1927.
- 5) 原：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第8號，1401頁(昭和3年)。
- 6) Ptaszek: Cpt. rend. de la soc. de biol. 99, P. 929, 1929.
- 7) 清成, 末松：日本内分泌學會雜誌，第4卷，第6號，1013頁(昭和3年)。
- 8) 水口：日本内分泌學會雜誌，第6卷，第11號，1441頁(昭和6年)。
- 9) 岡田：甲狀腺論文集 第1卷。 10) 奥：日本内分泌學會雜誌，第1卷，第4號，566頁(大正14年)。
- 11) 河野：日本内分

- 泌學會雜誌, 第4卷, 第9號, 1885頁 (昭和3年). 12) 飯塚: 醫學中央雜誌, 第22卷, 第1號, 1頁 (大正13年)
- 13) 安田: 日本內分泌學會雜誌, 第3卷, 第6號, 1454頁 (昭和3年). 14) 千野: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第11號, 2043頁 (昭和5年). 15) 田中: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第4號, 839頁 (昭和4年). 16) Korenchevsky: Biochem. Journ. Vol. 22, No. 1, P. 382, 1928. 17) 小川: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 第3號, 412頁 (昭和6年). 18) 篠部: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 第5號, 674頁 (昭和6年). 19) 小屋迫: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 第2號, 219頁 (昭和6年). 20) 久保: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 第9號, 1236頁 (昭和6年). 21) Klopstock: Biochem. Zeit. Bd. 175, S. 202, 1926. 22) 亀井: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第2號, 271頁 (昭和4年). 23) Vollmer: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 96, S. 352, 1922. 24) 前田: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第10號, 1796頁 (昭和5年). 25) Piepenborn: Berichte üb. d. ges. Physiol. Bd. 63, S. 364, 1931. 26) Below: Zit. n. Biedl, Innersekretion, 1913. 27) Abderhalden u. Brammertz: Pflüg. Arch. Bd. 186, S. 265, 1921. 28) Korentschewsky: Brit. Journ. of exp. Path. Vol. 6, P. 158, 1925. 29) 青木: 日本內分泌學會雜誌, 第3卷, 第6號, 1591頁 (昭和3年). 30) 小川: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第12號, 2122頁 (昭和5年). 31) 亀井, 佐々木: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第7號, 1308頁 (昭和4年). 32) 佐々木: 日本內分泌學會雜誌, 第6卷, 第5號, 727頁 (昭和5年). 33) 安田: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第7號, 1165頁 (昭和4年). 34) 織田: 日本內分泌學會雜誌, 第4卷, 第7號, 1197頁 (昭和3年). 35) 田中: 日本內分泌學會雜誌, 第5卷, 第5號, 802頁 (昭和4年). 36) 齋藤: 日本內分泌學會雜誌, 第6卷, 第3號, 355頁 (昭和5年). 37) 田坂: 日本內分泌學會雜誌, 第6卷, 第11號, 1557頁 (昭和6年). 38) 小屋迫: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 第2號, 232頁 (昭和6年). 39) Ellinger: Hoppe-Seyler'scheischnr. f. physiol. Chem. Bd. 119, S. 11, 1922.

in Leber, Niere, Skelettmuskel, Schilddrüse und Milz.

2) Bei der gleichzeitigen Injektion von Cyankalilösung und Insulin wird die obenerwähnte durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in allen Organen gehemmt.

3) Bei der gleichzeitigen Injektion von Schilddrüsenextrakt und Cyankalilösung wird die durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in allen Organen mit Ausnahme der Leber verstärkt.

4) Durch gleichzeitige Injektion von Adrenalin und Cyankalilösung wird die obenerwähnte durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in allen Organen verstärkt.

(Autoreferat)

**Ueber den Einfluss der Cyankalivergiftung auf
die Gewebsatmung, insbesondere über
den Einfluss verschiedener Hormone
auf die Cyankaliwirkung.**

**II. Mitt. Ueber den Einfluss der
Geschlechtsdrüsen auf die
Cyankaliwirkung.**

Von

Dr. K. Mizutani.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Der Verfasser untersuchte den Einfluss der Hoden- und Ovariumsubstanz auf die Gewebsatmung von durch Cyankali vergifteten Ratten.

Die Resultate waren die folgenden:

1) Durch gleichzeitige Injektion von Hodenextrakt und Cyankalilösung wird bei männlichen Ratten die durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in allen Organen (Leber,

Niere, Herzmuskel, Skelettmuskel, Schilddrüse und Milz) verstärkt.

2) Bei der gleichzeitigen Injektion von Extrakt des interstitiellen Gewebes der Ovarien und Cyankalilösung wird bei weiblichen Ratten die oben erwähnte durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in der Niere und der Milz nicht beeinflusst und in den anderen Organen, wie Leber, Herzmuskel, Skelettmuskel und Schilddrüse verstärkt.

3) Bei der gleichzeitigen Injektion von Extrakt der Corpora lutea und Cyankalilösung wird bei weiblichen Ratten die oben erwähnte durch Cyankalivergiftung verursachte Störung der Gewebsatmung in allen Organen gehemmt. (Autoreferat)

Experimentelle Studien über die Veränderungen des Blutes durch temporäre Zirkulationsstörung.

II. Mitteilung. Ueber den Einfluss der Milzexstirpation auf die Veränderung des Blutbildes, insbesondere der Retikulozyten, durch temporäre Zirkulationsstörung.

Von

Dr. T. Wada.

(Aus der I. med. Klinik der Kaiserl. Universität zu Kyoto in Japan.
Direktor: Prof. Dr. K. Tsuji.)

Schon in der früheren Mitteilung hat der Verfasser berichtet, dass die künstlich erzeugte temporäre Zirkulationsstörung an den Tieren mittelst der Unterbindung des Oberschenkels hochgradige Anämie und deutliche Vermehrung der Retikulozyten verursacht.

Daher untersuchte der Verfasser weiter den Einfluss der tem-