総説

PPARs の生理・薬理機能

高橋 信之¹⁾, 河田 照雄²⁾

要約: ペルオキシソーム増殖薬応答性受容体 (peroxisome proliferator-activated receptors: PPARs) は、発見当初リガンドが不明ないわゆるオーファン受容体であった。しかし、そのリガンドが薬理的な作用、特にフィブレート系薬剤のごとく中性脂肪低下作用などの脂質代謝、さらにはチアゾリジン誘導体のごとくインスリン抵抗性の改善による糖質代謝にまで広範で顕著な効果を示すことが判明して以来、急速な研究の進展を見せた。その結果、生活習慣病発症と関連する内分泌・代謝さらには血管機能や炎症などの循環器系や発がんの調節機構にも関わる多機能で主導的役割を有する重要な受容体として位置づけられるようになってきた。ここでは PPARs の構造や生理機能、リガンドと薬理機能、さらにヒトゲノム解析と疾患などについて概説する。

1. PPAR の発見

PPAR は、S. Green と I. Issemann によって 1990 年に初めてクローニングされた(1)。彼らは、抗高脂血症薬(クロフィブラート)などのペルオキシソーム増殖薬が、標的細胞に速やかに作用して特定の遺伝子の発現を活性化することに着目した。そこでこの遺伝子発現誘導にはステロイドホルモンなどの脂溶性ホルモンと同様の核内受容体スーパーファミリーによる機構を想定して遺伝子のクローニングを行った。スーパーファミリー内で高度に保存されている DNA 結合ドメインの情報をもとにしてマウス肝臓の cDNA ライブラリーからスクリーニングした。その結果、

ペルオキシソーム増殖薬によって活性化されるタンパク質をコードするクローンを得ることに成功した。これが PPAR の α 型であった。

PPAR は、このように発見当初肝細胞のペルオキシソームを誘導する作用をもつ抗高脂血症薬などの化合物によって転写活性化能を示すが生理的なリガンドが未同定な、いわゆるオーファン受容体であった。発見当初の実験系では誘導薬が PPAR のリガンドとして直接結合する結果が得られなかったことから、PPAR という名称には“activated; 応答性”が付加されている。

2. PPARs のサブタイプと構造、遺伝子発現

α 型遺伝子がマウス肝臓からはじめて単離されて以来、活発な cDNA クローニングによって種々の動物種および臓器から複数の PPAR サブタイプ遺伝子が見いだされファミリー (PPARs) を形成していることが明らかとなった(図1)。哺乳動物においては、 α 、 γ 、および δ [ヒトでは NUC I、マウスでは FAAR (fatty acid-activated receptor)、カエルでは PPAR β と呼ばれている] の 3 種類のサブタイプ遺伝子が明らかとなっている。ヒトゲノムでは、PPAR α は第 22q12-q13.1 染色体に、 γ 型は第 3p25 染色体に、また δ 型は第 6p21.2-p21.1 染色体にコードされている。 α 型は主として肝臓、その他心筋や消化管に発現が認められる(2)。 δ 型は組織特異性がみられず普遍的に発現しているが大腸がん細胞での発現が顕著であり、発がんとの関係が注目されている(後述)。一方、 γ 型遺伝子はさらに $\gamma 1$ 型と $\gamma 2$ 型の 2 種類のアイソフォームが知られており、それらは PPAR γ 遺伝子のプロモーター選択によって 5' 末端の異なる mRNA から生成される(3)。 $\gamma 1$ 型は、脂肪組織や免疫系臓器、副腎、小腸で発現している。 $\gamma 2$ 型は脂肪細胞で特異的な発現がみられ、脂肪細胞の分化と深く関連していると考えられている(4)。さらにヒト脂肪組織や大腸では第 3 番目のアイソフォーム、 $\gamma 3$ 型の mRNA (翻訳産物は $\gamma 1$ 型と同じ)が存在し、後述するように ADD1 SREBP-1 による転写制御が明らかとなってきてお

キーワード: PPAR, 核内受容体, 生活習慣病, 糖・脂質代謝, 転写調節・共役因子異常症
¹⁾生物系特定産業技術研究推進機構 肥満・脂質代謝制御研究プロジェクト
 (〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリビル 10F)

²⁾京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻
 (〒606-8502 京都市左京区北白川追分町)
 e-mail: fat@kais.kyoto-u.ac.jp
 原稿受領日: 2001 年 1 月 16 日, 編集委員会依頼総説

Fig. 1 Structure and ligands of human PPAR subtype: α , δ , γ .

り興味深い(5).

3. PPARs の標的遺伝子と機能

どの PPAR も、レチノイン酸受容体 (RAR), 甲状腺ホルモン受容体 (TR), ビタミン D 受容体 (VDR) などの他の核内受容体と同様に、9-シスレチノイン酸をリガンドとするレチノイド X 受容体 (RXR) と安定なヘテロ二量体を形成して標的遺伝子の特異的な DNA 認識配列 (peroxisome proliferator response element (PPRE)) に結合する. PPRE も AGGTCA 様のコア配列が同方向に並んだダイレクトリピート型であり、その最適スペースは 1 塩基 (特に A 残基) である (AGGTCA-A-AGGTCA) (6). 表 1 に PPRE を有し実際に転写調節が機能する主な遺伝子をまとめたが、多くのものは脂質代謝に関連する遺伝子であることがわかる. 事実、 α 型は脂肪酸の異化代謝能力の高い肝臓などで強く発現し、脂肪酸酸化、ケトン体生成、アポリポタンパクの生成などに関与することが知られている. また、 γ 型は、脂肪細胞の分化誘導や脂肪合成に重要な役割を担っている(7). また、最近では動脈硬化や発ガンにも関与するなど PPAR 機能の多様性が明らかとなってきた. δ 型の機能は長年不明であったが、Wnt シグナルの標的遺伝子の一つとしてがん化に関与していることが

報告された(8). これは家族性大腸がんの原因遺伝子 (APC 遺伝子) の変異により PPAR δ の発現が抑制されず、その結果 δ 型の標的遺伝子の過剰な転写が惹起されることによるものと考えられている. 従来から疫学研究により高脂肪食摂取 (PPAR リガンドとしての長鎖脂肪酸を大量に生成) と大腸がん発症には高い相関関係があることが認められていたが、上記の結果はその発症機序を説明しうるものである. α および γ 型についてはそれぞれ欠損マウスが作製され前述の機能を裏付ける結果が得られている(9~11). 特に γ 型ホモ欠損マウスでは胎盤形成阻害による胎生致死となり、 γ 型の新たな機能が注目される(10, 11). 表 2 に PPAR が関与することが報告されている生理・薬理機能を要約した. これらの特性の制御を行うには PPAR 各サブタイプと標的遺伝子の転写活性化の選択性の発生機構など明らかにすべき課題も多い.

4. PPARs による標的遺伝子発現の転写調節

(1) PPAR のリガンド

ヒトゲノム中には現在までに 50 近い核内受容体遺伝子が同定されている. その中でも PPAR の生理・薬理機能の主な特徴のひとつは、図 1 に示されているように化学構造的に多様な化合物をリガンドとすることである. さらに、

Table 1 List of major PPAR-target genes

gene	functions
lipoprotein lipase (LPL) DC36 (fatty acid transporter; FAT)	fatty acids incorporation
acyl-CoA synthetase malic enzyme (ME) phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK)	fatty acid synthesis
intestinal liver fatty acid binding protein (FABP) aP2 adipose FABP microsomal triglyceride transfer protein (MTP) ApoAI, AII, CIII	lipids transport
acyl-CoA oxidase keto-acyl-CoA thiolase enoyl-CoA hydratase/3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase	beta-oxidation
mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthetase	ketone-body production
cytochrome P450CYP4A1, CYP4A6, CYP4A11	omega-oxidation
HMG-CoA synthase cholesterol 7 α -hydroxylase (CYP7A1)	cholesterol, bile acid metabolism
plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1)	plasminogen contorol
leptin (ob gene)	sataiety
uncoupling protein (UCP) 1, 2, 3	thermogenesis
Glut 2	glucose transport
resistin	insulin sensitivity

α , δ 型がクロフィブラート類や長鎖脂肪酸, また γ 型が長鎖脂肪酸やプロスタノイド, チアゾリジン誘導体などをリガンドとしているように PPAR 各サブタイプ間でリガンドの結合あるいは活性化特異性が認められる点が特徴的である. このことは図 1 に示したように各サブタイプ間のリガンド結合ドメインの相同性が低いことや, PPAR γ の X 線構造解析によりリガンド結合空間が他の核内受容体よりも広いことから支持される(12).

α 型は, 天然リガンドとしては長鎖脂肪酸を, また, 合成リガンドとしてはフィブラート系薬剤やインドメタシンなどにより活性化される. フィブラート系薬剤の脂質低下機序は肝臓での PPAR α の活性化を介した血清脂質改善遺伝子群の転写促進により説明可能となってきたが, 薬物によって in vitro と in vivo とでは相反する成績が得られる

など, 得られた成績の解釈には注意が必要である. また, 興味深いことにインドメタシンなどの非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) の抗炎症作用の一部は, PPAR α が関与している可能性がある. 事実, α リガンドがフィブリノーゲンの発現を抑制すること(13) や NF- κ B シグナルの抑制を介して単球の接着分子である VCAM-1 の発現を抑制すること(14) が報告されている.

γ 型リガンドとして知られている新規インスリン抵抗性改善薬であるチアゾリジン誘導体は, もともとは遺伝性肥満動物における血糖降下作用を指標に見い出された化合物であり, その作用機構は当初不明であった. その後研究が進むにつれて, チアゾリジン誘導体が血糖降下, 血中脂質低下作用だけでなく, 強力な脂肪細胞分化誘導作用を持つことが明らかとなった(15~18). チアゾリジン誘導体とブ

Table 2 Physiological and pharmacological function of PPARs

PPAR subtype	function
PPAR α	lipid homeostasis inflammatory atherosclerosis peroxisome proliferator epidermal keratinocyte differentiation adipocyte differentiation (partially)
PPAR γ	glucose metabolism insulin sensitivity lipid metabolism adipocyte differentiation monocyte/macrophage differentiation uptake of oxidized LDL atherosclerosis inflammatory placental development
PPAR δ	APC gene target in colorectal cancer adipocyte differentiation (partially)

ロスタグランジン代謝物の一種である 15-deoxy- $\Delta^{12,14}$ -prostaglandin J₂ (15d-PGJ₂) が、脂肪細胞分化に重要な PPAR γ ヘリガンドとして直接結合することによって脂肪細胞の分化が惹起されることが細胞系で示された(19, 20). ごく最近 15d-PGJ₂ が生体内で実際に生成し、脂肪細胞の穏やかな分化とインスリン感受性の増大に寄与することが、15d-PGJ₂ 前駆体の合成酵素である PGD 合成酵素のトランスジェニックマウスを用いて明らかにされた(投稿中). また、これらのプロスタグランジン合成系の律速酵素であるシクロオキシゲナーゼ (COX)2 遺伝子の発現が PPAR γ によりフィードバック制御されていることが報告され、PPAR とそのリガンド生成の巧妙な調節機構が明らかとなった(21). さらに、 γ 型の内因性リガンドとして酸化 LDL 由来のリノール酸酸化代謝物 (9-および 13-ヒドロキシオクタデカジエン酸) が同定され、泡沫細胞における遺伝子発現制御のキーレギュレーターとしても PPAR γ が注目されはじめている(22). 今後、循環器研究領域においても PPARs は重要な位置づけとなるであろう.

リノール酸、アラキドン酸やエイコサペンタエン酸などの食事から由来するポピュラーな長鎖脂肪酸が、程度の差はあるものの直接 PPAR 全てのサブタイプのリガンドになることが示されている(23, 24). また、長鎖脂肪酸は PPAR に対する結合能は弱いものの生体内にはかなり豊富 (ヒトでは 0.4-0.6 mEq/l) に存在し、天然リガンドと

して機能している可能性は高い. そして表 1 に示したように PPARs は広く脂質代謝系遺伝子の発現調節を行うことから、脂質代謝における長鎖脂肪酸をシグナル素子とした PPARs の分子センサーとしての新たな生理機能が注目される.

(2) PPARs とそのリガンドの生成を制御する転写因子: ADD1/SREBP1

1993 年に脂肪細胞から ADD1 (adipocyte determination and differentiation- dependent factor 1) と呼ばれる転写因子が見いだされた(25). この転写因子は、脂肪細胞分化時における PPAR γ リガンドの生成調節を介して脂肪細胞分化に影響することが推察された(26). ADD1 は、1993 年に時を同じくして Goldstain, Brown らグループによってクローニングされたコレステロールの代謝調節で重要な役割を果たしている転写因子, SREBP (sterol regulatory element binding protein) の 1c 型と同一であった. SREBP は、LDL レセプターのプロモーター領域中のステロールに反応する DNA 配列 (SER-1) に特異的に結合し転写調節を行う. 興味深いことに、SREBP1 の過剰発現トランスジェニックマウスは、肥満を呈し高度のインスリン抵抗性と脂肪代謝異常を発症することが報告されている(27, 28). さらに最近、PPAR γ 遺伝子のゲノム解析が進み、その ExonA1 および A2 上流に SREBP の特異的認識 DNA 配列を含む E-box が存在することが示され

ている(5)。また、PPAR γ がSREBPの発現を一部調節していることがPPAR γ ヘテロ欠損マウスにより示されている(11)。従って、ADD1/SREBP1およびPPARサブタイプおよびアイソフォームの発現調節やそのフィードバックコントロール機構は、肥満・栄養をベースとする生活習慣病の発症・改善を考える上で今後大いに注目される。

(3) PPARsと転写共役因子(コリプレッサー/コアクチベーター)

最近、核内受容体とタンパク質-タンパク質相互作用し、転写の活性化能を正あるいは負に制御するコアクチベーター(インテグレーター)やコリプレッサー(coactivator, corepressor: 共役転写制御因子)の性状が急速に明らかにされつつある。コアクチベーターは単独で核内受容体に結合するのではなく、1つのコアクチベーター複合体を形成して結合すると考えられてきている(29)。コアクチベーター複合体には、ヒストンアセチル化酵素(HAT)活性を有しヒストンをアセチル化することによりクロマチン構造を緩めて転写を促進するものと、HAT活性を持たず前者が作用した後に作用するものが知られている(29)。現在までにPPAR γ と相互作用して転写を促進する可能性のあるコアクチベーターとしては、CBP(30)、p300(31,32)、SRC-1(32)、TIF2(32)、PGC-1(33)、PGC-2(34)、AIB-1(32)、TRAP220 DRIP205(32)などが酵母two-hybrid法などにより明らかにされてきている。重要な点は、PPARのコアクチベーター候補は多数存在するが、各細胞でどのようなコアクチベーターがどの程度発現し複合体として実際に機能しているかである。つまり、生理的には特定のコアクチベーターの発現量やPPARへのリクルートの強度が情報カスケードの律速段階になり得る可能性がある。また、最近加藤らは、PPAR γ の転写活性過程において、15d-PGJ₂などのPPAR γ 天然リガンドは、p300、SRC-1、TIF2などのコアクチベーターをリクルートするが、その合成リガンドであるチアゾリジン誘導体(トログリタゾン)はコアクチベーターをリクルートしないことを報告した(32)。このことは、PPARの生理的・薬理的機能がリガンドによるコアクチベーターのリクルートの有無により制御されることを意味しており、今後の創薬研究に新しい視点をもたらすものでありきわめて興味深い。一方、コリプレッサーは、ヒストン脱アセチル化酵素と複合体を形成してクロマチンの構造を密にし、それによって転写開始を抑制していると考えられている(35)。PPAR γ に対するコリプレッサーとしてはSMRT(silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptors)が報告されている(36)。今後は、PPAR各サブタイプおよびアイソフォームに焦点を当てた転写共役因子の解析が急速に進展するものと思われる。

5. PPAR α 遺伝子の発現調節と活性調節

PPAR α 遺伝子の発現は、デキサメタゾンなどのグルココルチコイドによって誘導される(37)。その誘導は、グルココルチコイド受容体(GR)アンタゴニストにより阻害されることから、GRを介していることが明らかにされている。グルココルチコイドは抗炎症作用や脂質代謝促進作用を有していることが知られていることから、グルココルチコイドのこのような生理・薬理作用は、一部PPAR α の誘導を介して行われている可能性がある。このように、核内受容体間での干渉作用が転写レベルで認められ、コアクチベーター間での転写因子相互作用とも相まってPPAR機能の複雑性、多様性を物語る。 γ 型の発現に及ぼす栄養条件の検討がなされている。マウスの肥満度や高脂肪食摂取とPPAR γ mRNAの発現には関連性が認められないこと、絶食およびビタミンA、DはPPAR γ 2タンパク質の発現を減少させ脂肪細胞の分化を抑制すること、インスリンはPPAR γ 2mRNAの発現を増強すること、などが示されている(38,39)。また、最近 γ 型の遺伝子発現はGATA2, 3により制御されるとの報告もなされた(40)。PPAR δ は脂肪細胞分化のごく初期から γ 型に先立ち発現することが知られていたが、 δ 型が長鎖脂肪酸をリガンドとして γ 型の発現を誘導し、脂肪細胞の分化を促進することが報告(41)されたことから、PPARサブタイプ間での情報カスケードや“分業化”が推察される。

また、以前から脂肪細胞の分化は細胞増殖因子により抑制されることは良く知られていたが、最近、増殖因子刺激によって活性化されるMAPキナーゼ(mitogen-activated protein kinase)によってPPAR γ がリン酸化を受け不活性型となることが示された(42)。実際、後述するようにヒトPPAR γ のリン酸化部位の遺伝子変異がヒト肥満発症と深く関わっていることが報告されている(43)。これはリガンド依存的標的遺伝子の転写活性化を制御するフィードバック機構と考えられ、このようなリン酸化による制御で、摂食など日常的に高頻度でもたらされるエネルギー代謝状態の変化にすばやく対応可能になる。

6. PPARs遺伝子変異と疾患

PPARsの遺伝子変異に関してはヒト γ 型の解析が進んでいる。ヒトPPAR γ のリン酸化部位である114番目のセリンの隣接部位であるプロリンがミスセンス変異を起こしてグルタミンとなったPro115Gln変異が見いだされた。この変異はセリンのリン酸化が障害され、PPAR γ の活性化が引き起こされ、その結果ヒトの肥満発症を惹起しやすいことが示された(44)。また、Pro115Gln変異PPAR γ は実際に114番目のセリンのリン酸化を妨げ、その結果脂肪

Fig. 2 PPAR γ allelic variance and disease.

細胞への分化が促進されてしまうことが細胞レベルで実証された。つまり、正常な状態ではヒト PPAR γ は上記のリン酸化システムによってリン酸化を受けて不活性型となり脂肪細胞の分化を抑制しているものと推察される。さらに、Pro12Ala 変異が高 Body Mass Index (BMI: 肥満の判定基準の一つ) 発症と関連するとの報告もある(45)。161C-T 変異はアテローム性動脈硬化の発症と関連する(46)。また、 γ 型遺伝子は大腸に強く発現するが、その遺伝子変異 (Gln286Pro, Arg288His, Lys319Ter など) は大腸がんの発症を高める(47)。図2に示したようにヒト γ 型変異の多くは生活習慣病の発症(転写(調節)因子異常症)と強く関連しており、今後はコリプレッサー/コアクチベーターの遺伝子変異(転写共役因子異常症)(48,49)の解析も含めたゲノム情報をさらに集積することが必要であろう。

おわりに

PPAR は、その遺伝子が発見されて10年、また内因性リガンド候補が見いだされてまだ数年しか経っていない。にもかかわらず、高脂血症改善薬であるフィブラート系薬剤や新規インスリン抵抗性改善薬であるチアゾリジン誘導体など生活習慣病改善薬のターゲット分子として薬理学分野ではきわめて重要な位置を占めるようになってきた。また、PPARs は栄養素や栄養状態によって精妙な調節を受け、糖・脂質代謝や血管機能、炎症など生体のホメオスタ

シス全般においてきわめて重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。この総説では PPARs の構造、生理・薬理的機能について最近の知見を集約するとともに、PPAR 機能の多様性をリガンドや転写調節の面から述べてきた。今後はこのような PPARs の役割を十分にふまえ、PPARs をターゲット分子とし、その活性化と不活化をコントロールする新たなアゴニスト、アンタゴニストなどの薬剤やコアクチベーターのリクルート制御薬などの創薬の糸口が見い出される可能性が極めて高い。さらに、サイレントキラーとよばれる2型糖尿病や他の生活習慣病のように発症が潜在化し長年自覚できない疾患の場合などには、PPARs のゲノム情報は大いに役立つものと思われる。ゲノム情報は、疾患の適切な治療と予防を必要に応じて適切な時期に各個人へ行うテーラーメイド医療の基本となるからである。

文 献

- 1) Issemann I and Green S: Activation of a member of the steroid hormone receptor superfamily by peroxisome proliferator. *Nature* **347**, 645-650 (1990)
- 2) Braissant O, Fofelle F, Scotto C, Dauca M and Wahli W: Differential expression of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs): Tissue distribution of PPAR- α , - β , and - γ in the adult rat. *Endocrinology* **137**, 354-366 (1996)
- 3) Zhu Y, Qi C, Korenberg JR, Chen XN, Noya D,

- Rao MS and Reddy JK: Structural organization of mouse peroxisome proliferator-activated receptor γ (mPPAR γ) gene: alternative promoter use and different splicing yield two mPPAR γ isoforms. *Proc Natl Acad Sci USA* **92**, 7921-7925 (1995)
- 4) Tontonoz P, Hu E, Graves RA, Budavari AI and Spiegelman BM: mPPAR γ 2: tissue-specific regulator of an adipocyte enhancer. *Genes Dev* **8**, 1224-1234 (1994)
 - 5) Fajas L, Schoonjans K, Gelman L, Kim JB, Najib J, Martin G, Fruchart JC, Briggs M, Spiegelman BM and Auwerx J: Regulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma expression by adipocyte differentiation and determination factor 1 sterol regulatory element binding protein 1: implications for adipocyte differentiation and metabolism. *Mol Cell Biol* **19**, 5495-5503 (1999)
 - 6) Kliewer SA, Umesono K, Noonan DJ, Heyman RA and Evans RM: Convergence of 9-cis retinoic acid and peroxisome proliferator signaling pathways through heterodimer formation of their receptors. *Nature* **358**, 771-774 (1992)
 - 7) Kawada T, Takahashi N and Fushiki T: Biochemical and physiological characteristic of fat cell. *J Nutr Sci Vitaminol* **47**, 1-12 (2001)
 - 8) He T-C, Chan T, Vogelstein B and Kinzler KW: PPAR is an APC-regulated target of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Cell* **99**, 335-345 (1999)
 - 9) Gonzalez FJ: Recent update on the PPAR alpha-null mouse. *Biochimie* **79**, 139-144 (1997)
 - 10) Barak Y, Nelson MC, Ong ES, Jones YZ, Ruiz-Lozano P, Chien KR, Koder A and Evans RM: PPAR gamma is required for placental, cardiac, and adipose tissue development. *Mol Cell* **4**, 585-595 (1999)
 - 11) Kubota N, Terauchi Y, Miki H, Tamemoto H, Yamauchi T, Komeda K, Satoh S, Nakano R, Ishii C, Sugiyama T, et al: PPAR gamma mediates high-fat diet-induced adipocyte hypertrophy and insulin resistance. *Mol Cell* **4**, 597-609 (1999)
 - 12) Nolte RT, Wisely GB, Westin S, Cobb JE, Lambert MH, Kurokawa R, Rosenfeld MG, Willson TM, Glass CK and Milburn MV: Ligand binding and coactivator assembly of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma. *Nature* **395**, 137-143 (1998)
 - 13) Kockx M, Gervois P, Poulain P, Derudas B, Peters JM, Gonzalez FJ, Princen HM, Kooistra T and Staels B: Fibrates suppress fibrogen gene expression in rodents via activation of the peroxisome proliferator-activated receptor- α . *Blood* **93**, 2991-2998 (1999)
 - 14) Marx N, Sukhova K, Collins T, Libby P and Plutzky J: PPAR α activators inhibit cytokine-induced vascular cell adhesion molecule-1 expression in human endothelial cells. *Circulation* **99**, 3125-3131 (1999)
 - 15) Hiragun A, Sato M and Mitsui H: Preadipocyte differentiation in vitro: identification of a highly active adipogenic agent. *J Cell Physiol* **134**, 124-130 (1988)
 - 16) Sandouk T, Reda D and Hofmann C: Antidiabetic agent pioglitazone enhances adipocyte differentiation of 3T3-F442A cells. *Am J Physiol* **264**, C1600-C1608 (1993)
 - 17) Lehmann JM, Noore LB, Smith-Oliver TA, Wilkison WO, Willson TM and Kliewer SA: An antidiabetic thiazolidinedione is a high affinity ligand for peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR γ). *J Biol Chem* **270**, 12953-12956 (1995)
 - 18) Auwerx J, Schoonjans K, Fruchart JC and Staels B: Regulation of triglyceride metabolism by PPARs: fibrates and thiazolidinediones have distinct effects. *J Atheroscler Thromb* **3**, 81-89 (1996)
 - 19) Forman BM, Tontonoz P, Chen J, Brun RP, Spiegelman BM and Evans RM: 15-Deoxy-12,14-prostaglandin J2 is a ligand for the adipocyte determination factor PPAR γ . *Cell* **83**, 803-812 (1995)
 - 20) Kliewer SA, Lenhard JM, Willson TM, Patel I, Morris DC and Lehmann JM: A prostaglandin J2 metabolite binds peroxisome proliferator-activated receptor γ and promotes adipocyte differentiation. *Cell* **83**, 813-819 (1995)
 - 21) Inoue H, Tanabe T and Umesono K: Feedback control of cyclooxygenase-2 expression through PPAR γ . *J Biol Chem* **275**, 28028-28032 (2000)
 - 22) Nagy L, Tontonoz P, Alvarez JG, Chen H and Evans RM: Oxidized LDL regulates macrophage gene expression through ligand activation PPAR γ . *Cell* **93**, 229 (1998)
 - 23) Forman BM, Chen J and Evans RM: Hyperlipidemic drugs, polyunsaturated fatty acids, and eicosanoids are ligands for peroxisome proliferator-activated receptors α and δ . *Proc Natl Acad Sci USA* **94**, 4312-4317 (1997)
 - 24) Kliewer SA, Sundseth SS, Jones SA, Brown PJ, Wisely GB, Koble CS, Devchand P, Wahli W, Willson TM, Lenhard JM, et al: Fatty acids and eicosanoids regulate gene expression through direct interactions with peroxisome proliferator-activated receptors α and γ . *Proc Natl Acad Sci USA* **94**, 4318-4323 (1997)
 - 25) Tontonoz P, Kim JB, Graves RA and Spiegelman BM: ADD1: a novel helix-loop-helix transcription factor associated with adipocyte determination and differentiation. *Mol Cell Biol* **13**, 4753-4759 (1993)
 - 26) Kim JB, Wright HM, Wright M and Spiegelman BM: ADD1/SREBP1 activates PPARgamma through the production of endogenous ligand. *Proc Natl Acad Sci USA* **95**, 4333-4337 (1998)
 - 27) Shimomura I, Hammer RE, Richardson AJ, Ikemoto S, Bashmakov Y, Goldstein JL and Brown MS: Insulin resistance and diabetes mellitus in transgenic mice expressing nuclear SREBP-1c in adipose tissue: model for congenital generalized lipodystrophy. *Genes Dev* **12**, 3182-3194 (1998)
 - 28) Shimomura I, Hammer RE, Ikemoto S, Brown MS and Goldstein JL: Leptin reverses insulin resistance and diabetes mellitus in mice with congenital lipodystrophy. *Nature* **401**, 73-76 (1999)
 - 29) Freedman LP: Increasing the complexity of coactivation in nuclear receptor signaling. *Cell* **97**, 5-8 (1999)
 - 30) Mizukami J and Taniguchi T: The antidiabetic

- agent thiazolidinedione stimulates the interaction between PPAR γ and CBP. *Biochem Biophys Res Commun* **240**, 61-64 (1997)
- 31) Gelman L, Zhou G, Fajas L, Raspé E, Fruchart JC and Auwerx J: p300 Interacts with the N- and C-terminal Part of PPAR γ 2 in a ligand-independent and -dependent manner, respectively. *J Biol Chem* **274**, 7681-7688 (1999)
 - 32) Kodera Y, Takeyama K-I, Murayama A, Suzawa M, Masuhiro Y and Kato S: Ligand-type specific interaction peroxisome proliferator-activated receptor gamma with transcriptional activators. *J Biol Chem* **275**, 33201-33204 (2000)
 - 33) Puigserver P, Wu Z, Park CW, Graves R, Wright M and Spiegelman BM: A cold-inducible coactivator of nuclear receptors linked to adaptive thermogenesis. *Cell* **92**, 829-839 (1998)
 - 34) Castillo G, Brun RP, Rosenfield JK, Hauser S, Park CW, Troy AE, Wright ME and Spiegelman BM: An adipogenic cofactor bound by the differentiation domain of PPARgamma. *EMBO J* **18**, 3676-3687 (1999)
 - 35) Nagy L, Kao HY, Chakravarti D, Lin RJ, Hassig CA, Ayer DE, Schreiber SL and Evans RM: Nuclear receptor repression mediated by a complex containing SMRT, mSin3A, and histone deacetylase. *Cell* **89**, 373-380 (1997)
 - 36) Lavinsky RM, Jepsen K, Heinzel T, Torchia J, Mullen TM, Schiff R, Del-Rio AL, Ricote M, Ngo S, Gensch J, et al: Diverse signaling pathways modulate nuclear receptor recruitment of N-CoR and SMRT complexes. *Proc Natl Acad Sci USA* **95**, 2920-2925 (1998)
 - 37) Lemberger T, Staels B, Saladin R, Desvergne B, Auwerx J and Wahli W: Regulation of the peroxisome proliferator-activated receptor α gene by glucocorticoids. *J Biol Chem* **269**, 24527-24530 (1994)
 - 38) Vidal-Puig A, Jimenez-Linan M, Lowell BB, Hamann A, Hu E, Spiegelman B, Flier JS and Moller DE: Regulation of PPAR γ gene expression by nutrition and obesity in rodents. *J Clin Invest* **97**, 2553-2561 (1996)
 - 39) Hida Y, Kawada T, Kayahashi S, Ishihara T and Fushiki T: Counteraction of retinoic acid and 1, 25-dihydroxyvitamin D $_3$ on up-regulation of adipocyte differentiation with PPAR γ ligand, an antidiabetic thiazolidinedione, in 3T3-L1 cells, *Life Sci* **62**, 205-211 (1998)
 - 40) Tong Q, Mueller E and Smith WM: Function of GATA transcription factors in pre-adipocyte transition. *Science* **290**, 134-138 (2000)
 - 41) Bastie C, Holst D, Gaillard D, Jehl-Pietri C and Grimaldi PA: Expression of peroxisome proliferator-activated receptor PPARdelta promotes induction of PPARgamma and adipocyte differentiation in 3T3C2 fibroblasts. *J Biol Chem* **274**, 21920-21925 (1999)
 - 42) Hu E, Kim JB, Starraf P and Spiegelman BM: Inhibition of adipogenesis through MAP kinase-mediated phosphorylation of PPAR γ . *Science* **274**, 2100-2103 (1996)
 - 43) Adams M, Reginato MJ, Shao D, Lazar MA and Chatterjee VK: Transcriptional activation by peroxisome proliferator-activated receptor γ is inhibited by phosphorylation at a consensus mitogen-activated protein kinase site. *J Biol Chem* **272**, 5128-5132 (1997)
 - 44) Ristow M, Muller-Wieland D, Pfeiffer A, Krone W and Kahn CR: Obesity associated with a mutation in a genetic regulator of adipocyte differentiation. *N Engl J Med* **339**, 953-959 (1998)
 - 45) Beamer BA, Yen C-J, Anderson RE, Muller D, Elahi D, Cheskin LJ, Andres R, Roth J and Shuldiner AR: Association of the Pro12Ala variant in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 gene with obesity in two Caucasian populations. *Diabetes* **47**, 1806-1808 (1998)
 - 46) Wang XL, Oosterhof J and Duarte N: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma C161-T polymorphism and coronary artery disease. *Cardiovasc Res* **44**, 588-594 (1999)
 - 47) Sarraf P, Mueller E, Smith WM, Wright HM, Kum JB, Aaltonen LA, de la Chapelle A, Spiegelman BM and Eng C: Loss-of-function mutations in PPAR-gamma associated with human colon cancer. *Mol Cell* **3**, 799-804 (1999)
 - 48) Petrij F, Giles RH, Dauwerse HG, Saris JJ, Hennekam RC, Masuno M, Tommerup N, van Ommen GJ, Goodman RH, Peters DJ, et al: Rubinstein-Taybi syndrome caused by mutations in the transcriptional co-activator CBP. *Nature* **376**, 348-351 (1995)
 - 49) Adachi M, Takayanagi R, Tomura A, Imasaki K, Kato S, Goto K, Yanase T, Ikuyama S and Nawata H: Androgen-insensitivity syndrome as a possible coactivator disease. *N Engl J Med* **21**, 856-862 (2000)

Abstract – Physiological and pharmacological function of PPARs. Nubuyuki TAKAHASHI¹⁾ and Teruo KAWADA²⁾ (¹⁾Research Project for Obesity and Lipid Metabolism Regulation, Bio-oriented Research Advancement Institution (BRAIN), Tokyo 105-0001, Japan and ²⁾Department of Applied Life Sciences, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan).

Folia Pharmacol. Jpn. (Nippon Yakurigaku Zasshi) **117**, 319~327 (2001)

The finding of nuclear receptors has greatly enhanced our understanding of gene regulation by lipophilic hormones such as steroids, thyroxine, vitamin D and retinoids. These receptors comprise a superfamily of transcription factors containing highly related DNA-binding domains. In mammals, the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family of nuclear hormone receptors consists of three subtypes by separate genes: PPAR α , PPAR δ (also referred to as hNUC1 or PPAR β), and PPAR γ . PPARs have been associated with several distinct biological programs. PPARs function as a heterodimer with the retinoid X receptor. This complex binds to sequences termed direct repeat-1 response element in enhancer sites of regulated genes and activates transcription upon ligand and coactivator binding. Three different PPAR subtypes have specific roles in different organs. PPAR α , mainly expressed in liver, plays an important role in fatty acid metabolism. PPAR γ predominantly is expressed in adipose cells. PPAR δ displays a high level of expression in lipid-metabolizing organs such as small intestine, heart and adipose tissue. Naturally occurring and synthetic molecules (anti-hyperlipidemia and diabetic drugs) that are ligands for these nuclear receptors control transcriptional activity of PPARs. We believe that the pharmacological and genomic researches on PPAR will develop powerful tools for prevention and medical care against common diseases.

Keywords: PPAR; common disease; glucose- and lipid metabolism; transcriptional and co-activator diseases.

著者プロフィール

高橋 信之 (たかはし のぶゆき)

生物系特定産業技術研究推進機構 (生研機構)「肥満・脂質代謝制御研究プロジェクト」博士研究員, 医学博士.

◇京都大学大学院農学研究科修士課程食品工学専攻修了 ('95 年), 京都大学大学院医学研究科博士課程分子医学専攻 (月田承一郎教授) 修了 ('99 年), 通産省工業技術院産業技術融合領域研究所非常勤職員 ('99 年), '99 年より博士研究員として河田先生のもとで肥満・脂質代謝研究に従事.

◇研究テーマ: 脂質代謝に関与するあらゆる細胞の分子生物学的・細胞生物学的研究に取り組んでいる.

◇趣味: 野山を歩き回ること, おいしいお酒を飲むこと, 嫁さんの愚痴を聞くこと.

河田 照雄 (かわだ てるお)

京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻, 助教授, 農学博士.

◇京都大学大学院農学研究科博士課程食品工学専攻修了 ('83 年), 日本学術振興会奨励研究員 ('83-'84 年), 京都大学農学部助手 ('84 年), 文部省在外研究員 (フランス科学研究機構生化学研究所) ('91 年), 京都大学農学部食品工学科助教授 ('94 年), '96 年より現職.

◇研究テーマ: 肥満・エネルギー代謝不全と関連病態発症に関するマクロ, ミクロ解析ならびにその予防・改善の技術開発.

◇趣味: 味覚探訪, 旅行.