スフィンゴシン 1-リン酸定量法の確立とその応用

岡島 史和

要約：S1Pは細胞増殖、分化、接着、運動、アポトーシスのような様々な細胞機能に関与していることが知られてきた。このS1Pは当初、細胞内ターゲットを介して作用すると考えられていたが、Gタンパク質連関受容体を介し、細胞外シグナル伝達分子として機能する場合があることも判ってきた。S1Pの生理機能、病態生理における役割を知るためには、作用解析のみならず、S1Pの動態制御を知ることも重要である。我々は最近、S1Pの定量法として、S1P受容体の一つEdg-1を強発現した細胞上での標識S1Pと検体中S1Pの競合反応を利用したラジオレセプターアッセイ法を開発した。本稿では従来法との比較とその問題点、また、我々がこの測定法を用いどのような研究をおこなっているか、今後の展望などについて述べた。

1. はじめに

S1Pは当初、ある種のサイトカインで細胞内に蓄積し、セカンドメッセンジャーのように機能すると考えられた。実際、細胞内にS1Pをインジェクションすると細胞内カルシウム動員が観察される。しかし、未だ、S1Pの細胞内ターゲットは同定されていない。一方、このようなS1P細胞内シグナル説に対し、細胞外からS1Pを作用させた場合に、受容体アゴニストのようにその応答がGi機能を抑制する百日咳毒素で抑制される場合も観察され、Gタンパク質連関型の受容体を介して作用する場合も想定された(1,2)。現在、このようなS1Pに特異的なGタンパク質連関型受容体が複数(Edg-1, -3, -5, -6, -8)同定されている(1~5)。これらの受容体サブタイプを用いた発現実験などにより、受容体サブタイプ特異的なシグナル伝達系の解析などが可能になった(3~5)。一方、S1Pの生体機能、

病態における役割を知るにはこのような作用解析のみならず、S1Pの動態に関する情報も重要である。S1Pは脂質のためか、ラジオイムノアッセイ法等特異抗体を用いた定量法は確立されておらず、研究者間でその測定に工夫をこらしている。しかし、従来法は操作が煩雑などの理由で、ルーチンに多数の検体中のS1Pを測定することはそれほど容易なことではない。そこで、我々はS1P測定法としては新しいラジオレセプターアッセイ法を確立した(6)。本稿では、従来法との比較、本法を用い実際に得られた新知見、また、S1P測定に関する今後の展望等について述べる。

2. 新規 S1P 定量法の確立と従来法との比較

S1Pの定量に関しては矢富らの研究がバイオニアである(7)。彼らはアルカリ性の下でS1Pが水溶性であることを利用し、他の脂質からS1Pを分離精製した。その後、標識無水酢酸でアセチル化し、生成する標識セラミド1-リン酸を薄層クロマトグラフィー(TLC)で分離し、その放射活性からS1Pを定量している(Chemical method)。Spiegelのグループの方法(Enzymatic method)(8)では矢富らと同様にS1Pを他の脂質成分から精製後、S1Pをスフィンゴシンに一旦脱リン酸化する。その後、標識ATP存在下、スフィンゴシンキナーゼ処理し生成した標識S1PをTLCで分離後、その放射活性からS1Pを定量している(8)。Spiegelのグループの方法は最低測定限界は0.25 pmolで、矢富らの方法の100 pmolに比較し感度の点で優れている。また、スフィンゴシンキナーゼを用いているので、特異性の点でもEnzymatic methodの方が優れているかもしれない。この点が後述する組織中S1P含量の大きな違いに反映しているかもしれない。矢富らの方法では揮発性の標識無水酢酸を大量に用いることも大きな問題である。一方、Spiegelのグループの方法では活性の高い精製スフィンゴシンキナーゼを必要とするため、スフィンゴシンキナーゼの供給が一つの課題となる。また、いずれの方法も操作段階は多く、最後はTLC操作が必要であり検体数は限られてしまう。一方、高速液体クロマト

キーワード：スフィンゴシン 1-リン酸、
ラジオレセプターアッセイ法、
リポタンパク質

群馬大学生体調節研究所調節因子部門シグナル伝達分野
(〒371-8512 前橋市昭和町 3-39-15)

e-mail: fokajima@showa.gunma-u.ac.jp

原稿受領日：2001年9月19日、企画教育委員会依頼原稿

Fig. 1 Standard curve for quantitative measurement of S1P by the radio-receptor assay using the Edg-1-overexpressing CHO cells. The cells were incubated with 1 nM [3 H]S1P in the presence of the indicated concentrations of S1P. The total binding activity was plotted against the S1P concentrations. A typical displacement experiment was shown. In the inset, the SPC (○) effect was also examined in addition to S1P (●). Specific binding activity was calculated by subtracting the value obtained at 1 μ M S1P. Results are the mean $\pm$ S.E. of three separate experiments and data are expressed as percentages of the value obtained without addition of test agents. We also examined the effects of various lipids listed on the figure at 10 μ M, but could not detect significant effects on the binding.

グラフィーと蛍光反応(9,10)またはタンデム質量分析計(11)とを組み合わせた方法も用いられているが、高速液体クロマトグラフィー、質量分析計等の機器を必要とする点、また、技術上の修練、検体数等の点で問題がある。

我々はS1Pの生理機能、病態との関りに興味を持っている。そのためにはルーチンに多数の検体中のS1P測定が必要となる。しかし、従来法では上述したような制約があり、独自に簡便でかつ再現性のあるS1P定量法の開発を企てた。上述したように生理活性物質の定量に汎用されている特異抗体を用いた方法は確立されていないので、抗体の代りにS1P受容体を用いるレセプターアッセイ法の可能性を検討した。定量法は特異性、感度、簡便さ、再現性がクリアされるべき課題であるが、S1P受容体の特異性と感度に関しては、我々はS1P受容体サブタイプのシグナル伝達系の解析実験の一環として結合実験をおこなっていた経緯があり(3,4)十分クリアできると判断した。そこで、簡便さ、再現性のある定量法のための具体的な検討を開始した。測定のための具体的なプロトコルは文献(6)

を参照願いたいだが、大筋は以下の通りである。

矢富らの方法に準じ、S1Pがアルカリ性の下で水溶性であることを利用し、他の脂質から分離精製した。この方法では遠心操作を2度行い、最終的にクロロホルム層を遠心エバポレーションすればよい。その後、アルブミン存在下で可溶化したものを検体として用いる。結合担体である受容体としてはS1P受容体Edg-1を過剰発現したチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞を12穴のプレートに張り付けた状態でそのまま用いた。すなわち、氷上にプレートを置きウェル内の細胞と標識S1P、検体をインキュベートし、細胞への標識S1P結合活性から、標準S1Pを用いて得られる標準活性曲線を基にS1Pを定量する(6)。標準曲線を図1に記載した。S1P測定の感度は5 pmol前後である。予想されたことではあるが、S1P受容体Edg-1にはスフィンゴシルホスホリルコリン(SPC)も、S1Pに比較し親和性は2オーダー以上悪いが結合する。しかし、SPCはニーマンピック病のような先天性の脂質代謝異常症の組織中に蓄積することは知られているが、通常の血中

Table 1 S1P content in plasma, serum and various tissues

	Chemical method (19, 20)	Enzymatic method (8)	HPLC (9)		HPLC (10)	Radioreceptorassay (6, 13)	
References							
Samples	S1P content (nM)						
Human plasma	191 ± 79		473 ± 87	711 ± 11 ^{*1}		357 ± 116	
Human serum	484 ± 82		1130 ± 140	1760 ± 11 ^{*1}	982 ± 89	829 ± 59	892 ± 149 ^{*2}
Horse serum		~700			240 ± 48		
Bovine fetal serum		~350			125 ± 21	180 ± 28	162 ± 34 ^{*3}
Human platelets (pmol/10 ⁸ cells)	141 ± 4		5000~10000		84 ± 15		~100
Rat tissues	(nmol/g wet weight)						
liver	1.7	0.7					1.54
kidney	13.7	0.7					3.84
testis	99.2	0.5					1.61
brain	36.4	5.9					3.92
intestine	89.8	/					4.34
heart	8.6	0.6					3.02
muscle	3.5	/					1.06
lung	19.6	/					29.1
spleen	39.2	2.5					12.7

^{*1}: Plasma was prepared in the presence of EDTA/NaCl, but, for other plasma preparations, citrate/dextrose was used as the anticoagulant (9). ^{*2}: Serum was intensively dialyzed against PBS. ^{*3}: Serum was deactivated by heating at 56°C for 30 min.

にはわずかしかが存在しないと考えられる。実際、血漿中の SPC 濃度は 100 nM 前後と報告されている(12)。また、上述したようにアッセイの前に S1P の粗精製操作があり、この段階で 98% 以上の SPC が除かれることを確認している。SPC 以外では図中に示した脂質 10 μM 存在下でも有意な影響は観察できなかった。

我々のラジオレセプターアッセイ法を用いて得られた S1P の血中、組織中濃度を従来法と比較し記載した(表 1)。血漿、血清中 S1P 濃度に関しては測定方法の違いで大きな差はないようであるが、S1P が活性化血小板から放出されることを反映して、血清値のほうが血漿値より高い。血小板の活性の程度を反映してか、血漿を得るためにはクエン酸/デキストロースを用いたほうが EDTA を用いるよりも低値を示している(表 1)(10)。このように、血漿では 200~500 nM、血清では 500~1100 nM の値を示す。S1P 受容体の結合親和性(K_d)は 2~30 nM (3~5) であるのに対し、定常時の血漿中 S1P がこのように高値を示すことが意外と感じられるかもしれない。すなわち、S1P 受容体は細胞外液の S1P で飽和し、受容体が最大限に活性化されていることになるからである。これに関しては後

述するように、S1P は血中ではリポタンパク質中に濃縮しており、S1P の自由度が低下することが原因と考えられる(13)。いずれにしても、血中の S1P 量に関するかぎり、測定法の違いによる測定値の違いはそれほど大きくはない。一方、血小板、また組織中 S1P 量に関しては極端に異なった測定値の違いが見られる。たとえば、血小板、睾丸などにおける違いは数十倍にもなる(表 1)。我々の方法で得られた結果は Enzymatic method で得られる結果に近い。この原因は不明であるが、細胞が異なると脂質組成も大きく異なり、S1P と区別できない脂質成分を S1P として測定している疑いは否定できない。細胞、組織中の S1P を測定する際には注意が必要であろう。

3. 新規 S1P 定量法の S1P 研究への応用

以下、我々がこの定量法を用いて得られた知見の一部を紹介したい。

血管平滑筋細胞の機能変化は血管の病態生理と密接に関連している。すなわち、動脈硬化症での血管肥厚や経皮的冠動脈形成術後の再狭窄時には平滑筋細胞の形質転換、細胞遊走、増殖が伴う。S1P は 10 nM という低濃度で血管

Fig. 2 Dose-dependent effects of S1P (○) and sphingosine (△) on cell migration (A) and intracellular S1P change by sphingosine (B) in aortic smooth muscle cells. In (A), the lower well of the Boyden chamber was filled with the medium containing the indicated concentrations of S1P or sphingosine with or without PDGF (30 ng/ml). The migrated cell number was then determined. PDGF-induced cell migration is shown. Results are expressed as percentages of the PDGF-induced effects in the absence of these test agents. In (B), the cells were incubated with 10 μ M (▲) sphingosine for the indicated time to measure S1P content. Results are expressed as fold increase of the value in unstimulated cells. The cells were also incubated with 100 nM S1P, but no significant change was observed. See the manuscript for more details (14).

Fig. 3 S1P (A) and lysophosphatidylcholine (B) contents in plasma lipoproteins. Plasma lipoproteins were separated by the density gradient method. Oxidized LDL (ox-LDL) was prepared by treatment with 10 μ M CuSO₄ for 18 h. HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; ox-LDL, oxidized low-density lipoprotein; LPDP, lipoprotein-deficient plasma. See the manuscript for more details (15).

平滑筋細胞の遊走を著明に抑制する (図 2A) (14). この遊走抑制応答が, S1P が細胞内に入り引き起こされた応答なのか, それとも受容体を介した応答であるのかを検討するため, スフィンゴシンの効果を調べた. スフィンゴシンは細胞内に入り, スフィンゴシンキナーゼによって S1P に変換されるので, もし, S1P 作用が細胞内作用なら, スフィンゴシンで同様の現象が観察されるはずである.

S1Pが実際に細胞内に蓄積しているのを見たのが図2Bである。実に前置の200~300倍にも増加している。遊走の最大応答が観察される100 nM S1Pでは細胞内S1Pの有意な変化は観察されない。このように細胞内にS1Pが著明に蓄積しているにもかかわらず、スフィンゴシンでは全く遊走抑制は起こらなかった(図2A)。スフィンゴシンがプロテインキナーゼCの阻害など細胞内で作用したために、本来の細胞内S1P作用がスフィンゴシンで抑制された可能性もある。しかし、スフィンゴシン存在下でもS1P作用は全く影響を受けなかった。以上の結果より、S1Pの遊走抑制作用に関しては、S1Pが細胞内に入り作用した可能性は極めて少ないと結論した。血管平滑筋細胞ではEdg-5がメジャーなS1P受容体であり、また、薬理的な解析等からこのS1P応答はEdg-5を介していると推定している(14)。

S1Pが血液中に200~1100 nM存在することは上述した。そこで、S1Pの血中での分布を調べた。その結果、S1Pは単位タンパク質あたりに換算した場合、リポタンパク質を除いたアルブミン画分に比較してリポタンパク質に高濃度濃縮していることが判明した(図3A)(13)。リポタンパク質は血管の病態生理と密接に関連し、動脈硬化症に対し、低密度リポタンパク質(LDL)特に酸化LDL(ox-LDL)は“悪玉”として、高密度リポタンパク質(HDL)は“善玉”として機能することが認められている。そこで、LDLが酸化された場合にS1P量がどのように変化するかを調べた。LDLをCuSO₄酸化するとリゾホスファチジルコリン(LPC)が増加する(図3B)。このLPCは酸化LDLの少なくとも一部の作用をメディエートすることが知られている。一方、S1Pは酸化に伴いLPCとは正反対に減少することが判明した(図3A)(15)。我々はこのようリポタンパク質中の脂質バランスの変化が動脈硬化症に対して促進性か抑制性かを決定する一つの要因と考えている(15)。

4. 今後の展望

S1P受容体は現時点で5種のサブタイプが存在し、生体の様々な組織、細胞に分布している。それら受容体の機能分担、また、細胞内S1Pターゲットの同定とその機能解析など現在活発に研究が行われている。このような機能解析とならんでS1Pの動態制御の仕組みを知ることも重要である。受容体が生体に広く分布し細胞増殖、分化、アポトーシス、運動、形態、代謝、分泌など多種多様な作用を発揮していることから考え、S1Pとその受容体がある種の病態に関与していることが予想されるが、現時点で病態との関連はほとんど判っていない。S1P量の測定はこ

のような病態における関与を知る有効な一手段である。S1Pがリポタンパク質に濃縮し、また、S1Pが実際に血管平滑筋細胞、内皮細胞などの細胞機能の強力な制御因子であることを考えると(14~16)、上で紹介したような循環器疾患との関連で、血中S1P量のみならず血中リポタンパク質中のS1P濃度変化に興味をもたれる。また、増殖、分化、アポトーシス、運動といった細胞の基本的生命活動への関与を考えるとその状態の破綻としての癌との関りも十分考えられる(17)。炎症、免疫に関連した細胞機能にも深く関っており、炎症、アレルギー反応時にS1Pの動態が変化することも予想される(18)。このような観点から血液以外の体液、浸出液中の脂質変化の測定にも興味をもたれる。我々が開発したレセプターアッセイ法の感度は受容体の親和性に依存し、測定法としては決して問題が無いわけではない。今後も当然、抗体を用いたイムノアッセイなど抗体の特異性、結合感度を利用した方法の開発は必要である。しかし、それまでS1Pの動態研究を手を拱いて待っているわけにはいかない。その間の代役としては十分有効なS1P測定手段と考えている。

文 献

- 1) Moolenaar WH: Bioactive lysophospholipids and their G protein-coupled receptors. *Exp Cell Res* **253**, 230-238 (1999)
- 2) Pyne S and Pyne NJ: Sphingosine 1-phosphate signalling in mammalian cells. *Biochem J* **349**, 385-402 (2000)
- 3) Kon J, Sato K, Watanabe T, Tomura H, Kuwabara A, Kimura T, Tamama K, Ishizuka T, Murata N, Kanda T, et al: Comparison of intrinsic activities of the putative sphingosine 1-phosphate receptor subtypes to regulate several signaling pathways in their cDNA-transfected Chinese hamster ovary cells. *J Biol Chem* **274**, 23940-23947 (1999)
- 4) Yamazaki Y, Kon J, Sato K, Tomura H, Sato M, Yoneya T, Okazaki H, Okajima F and Ohta H: Edg-6 as a putative sphingosine 1-phosphate receptor coupling to Ca²⁺ signaling pathway. *Biochem Biophys Res Commun* **268**, 583-589 (2000)
- 5) Im DS, Heise CE, Ancellin N, O'Dowd BF, Shei G, Heavens RP, Rigby MR, Hla T, Mandala S, McAllister G, et al: Characterization of a novel sphingosine 1-phosphate receptor, edg-8. *J Biol Chem* **275**, 14281-14286 (2000)
- 6) Murata N, Sato K, Kon J, Tomura H and Okajima F: Quantitative measurement of sphingosine 1-phosphate by radioreceptor-binding assay. *Anal Biochem* **282**, 115-120 (2000)
- 7) Yatomi Y, Ruan F, Ohta J, Welch RJ, Hakomori S and Igarashi Y: Quantitative measurement of sphingosine 1-phosphate in biological samples by acylation with radioactive acetic anhydride. *Anal Biochem* **230**, 315-320 (1995)

- 8) Edsall LC and Spiegel S: Enzymatic measurement of sphingosine 1-phosphate. *Anal Biochem* **272**, 80-86 (1999)
- 9) Caligan TB, Peters K, Ou J, Wang E, Saba J and Merrill, Jr, AH: A high-performance liquid chromatographic method to measure sphingosine 1-phosphate and related compounds from sphingosine kinase assays and other biological samples. *Anal Biochem* **281**, 36-44 (2000)
- 10) Ruwisch L, Schafer-Korting M and Kleuser B: An improved high-performance liquid chromatographic method for the determination of sphingosine-1-phosphate in complex biological materials. *Naunyn Schmiedeberg Arch Pharmacol* **363**, 358-363 (2001)
- 11) Mano N, Oda Y, Yamada K, Asakawa N and Katayama K: Simultaneous quantitative determination method for sphingolipid metabolites by liquid chromatography/ion spray ionization tandem mass spectrometry. *Anal Biochem* **244**, 291-300 (1997)
- 12) Liliom K, Sun G, Bunemann M, Virag T, Nusser N, Baker DL, Wang D, Fabian M, Brandts B, Bender K, et al: Sphingosylphosphocholine is a naturally occurring lipid mediator in blood plasma: a possible role in regulating cardiac function via sphingolipid receptors. *Biochem J* **355**, 189-197 (2001)
- 13) Murata N, Sato K, Kon J, Tomura H, Yanagita M, Kuwabara A, Ui M and Okajima F: Interaction of sphingosine 1-phosphate with plasma components, including lipoproteins, regulates the lipid receptor-mediated actions. *Biochem J* **352**, 809-815 (2000)
- 14) Tamama K, Kon J, Sato K, Tomura H, Kuwabara A, Kimura T, Kanda T, Ohta H, Ui M, Kobayashi I, et al: Extracellular mechanism through the Edg family of receptors might be responsible for sphingosine-1-phosphate-induced regulation of DNA synthesis and migration of rat aortic smooth-muscle cells. *Biochem J* **353**, 139-146 (2001)
- 15) Kimura T, Sato K, Kuwabara A, Tomura H, Ishiwaru M, Kobayashi I, Ui M and Okajima F: Sphingosine 1-phosphate may be a major component of plasma lipoproteins responsible for the cytoprotective actions in human umbilical vein endothelial cells. *J Biol Chem* **276**, 31780-31785 (2001)
- 16) Kimura T, Watanabe T, Sato K, Kon J, Tomura H, Tamama K, Kuwabara A, Kanda T, Kobayashi I, Ohta H, et al: Sphingosine 1-phosphate stimulates proliferation and migration of human endothelial cells possibly through the lipid receptors, Edg-1 and Edg-3. *Biochem J* **348**, 71-76 (2000)
- 17) Hong G, Baudhuin LM and Xu Y: Sphingosine-1-phosphate modulates growth and adhesion of ovarian cancer cells. *FEBS Lett* **460**, 513-518 (1999)
- 18) Ammit AJ, Hastie AT, Edsall LC, Hoffman RK, Amrani Y, Krymskaya VP, Kane SA, Peters SP, Penn RB, Spiegel S, et al: Sphingosine 1-phosphate modulates human airway smooth muscle cell functions that promote inflammation and airway remodeling in asthma. *FASEB J* **15**, 1212-1214 (2001)
- 19) Yatomi Y, Igarashi Y, Yang L, Hisano N, Qi R, Asazuma N, Satoh K, Ozaki Y and Kume S: Sphingosine 1-phosphate, a bioactive sphingolipid abundantly stored in platelets, is a normal constituent of human plasma and serum. *J Biochem* **121**, 969-973 (1997)
- 20) Yatomi Y, Welch RJ and Igarashi Y: Distribution of sphingosine 1-phosphate, a bioactive sphingolipid, in rat tissues. *FEBS Lett* **404**, 173-174 (1997)

Abstract—Establishment of the method for the measurement of sphingosine-1-phosphate in biological samples and its application for S1P research. Fumikazu OKAJIMA (Laboratory of Signal Transduction, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, 3-39-15 Showa-machi, Maebashi 371-8512, Japan). *Folia Pharmacol. Jpn.* (Nippon Yakurigaku Zasshi) **118**, 383~388 (2001)

Sphingosine 1-phosphate (S1P), one of the sphingolipid metabolites, has been shown to participate in a variety of cellular responses including proliferation, differentiation, adhesion, motility, and apoptosis. These cellular responses elicited by S1P were first thought to be mediated through an intracellular target(s), but extracellular mechanisms through G-protein-coupled S1P receptors have also been suggested. In addition to the studies examining the functions of the lipid on the cells and tissues, the measurement of the lipid concentration is also important for understanding the physiological and pathophysiological roles of the lipid. We have recently developed a novel quantitative method for measurement of S1P, which was based on the competition of S1P in the samples with the labeled S1P on the S1P receptor Edg-1. Here, we compared our method with previously published ones in several points including specificity and simplicity. We further presented our recent results obtained by using this novel quantitative method and finally mentioned the prospects of the S1P measurement in lipid research, especially in relation to several disorders.

Keywords: sphingosine 1-phosphate; radio-receptor assay; lipoproteins.