下部尿路機能の分子薬理学的および電気生理学的解析 - 尿失禁症の病態治療に向けて -

寺本 憲功

要約: アデノシン三リン酸 (ATP) 感受性カリウム (K^+) チャネル (以下, K_{ATP} チャネルと略記) は膵臓細胞, 心筋, 平滑筋等の細胞に広汎に分布し細胞内代謝によりチャネル開口機構が制御され細胞の膜電位の維持に深く寄与している。平滑筋細胞において K_{ATP} チャネルは静止膜電位の維持や筋緊張の維持および弛緩機序に関与していると考えられている。また膀胱平滑筋の静止膜電位は, 他の平滑筋細胞に比し比較的浅くこのチャネルの開口を介して筋弛緩に直結する膜過分極反応が惹起すると考えられる。これまでに開発されてきた K_{ATP} チャネルを標的イオンチャネルとする K_{ATP} チャネル開口薬は, 膀胱平滑筋の弛緩により不安定膀胱の治療効果の有用性が認められているが, 主に心血管系の重篤な副作用により未だほとんど臨床応用には至っていない。現在, K_{ATP} チャネル開口薬の検索においてはその臓器選択性の有無が必要不可欠と考えられるようになってきた。近年の分子生物学的手法により K_{ATP} チャネルは少なくとも2種類の異なるタンパク質, すなわちチャネルポアを形成する内向き整流性 K^+ チャネル (inwardly rectifying K^+ channel: Kir) とスルフォニルウレア受容体 (sulphonylurea receptor: SUR) より構成されることが明らかとなった。Kir と SUR にはそれぞれ数種類のサブタイプが存在しそのサブタイプの組み合わせが臓器によって異なりそれぞれの臓器における K_{ATP} チャネルの薬理学的特性を決定していると考えられる。

1. はじめに

高齢化社会を迎えた21世紀の現在, 生命の維持のみな

キーワード: ATP 感受性カリウムチャネル (K_{ATP} チャネル), K_{ATP} チャネル開口薬, 臓器選択性, 不安定膀胱
九州大学大学院医学研究院生体情報薬理学
(〒812-8582 福岡市東区馬出3丁目1-1)
e-mail: noritera@linne.med.kyushu-u.ac.jp
原稿受領日: 2003年2月20日, 編集委員会依頼総説

らず生活の質の向上への貢献も医学および医療の重要な使命と考えられるようになってきた。これまで泌尿器科領域で尿失禁, 尿意切迫, 頻尿といった症状を呈する不安定膀胱という病態は, 生命予後に関係することが少なく, ときには軽視されがちであった。しかしこのような耐え難い症状を訴える患者は高齢者層を中心に多数存在し, 人口の高齢化が加速的に進む今日, 患者数はますます増加している。しかし現在, 臨床治療現場においては主に抗コリン作用を有するごく限られた薬剤による治療法しか存在せず, 十分な臨床治療が行われているとは考え難い。また一方で現在, 新たな薬物治療法に向けて有効な標的分子 (制御タンパクやイオンチャネル等) や標的実体 (酵素反応や細胞内伝達機構等) の検索・研究が進められている。

本稿では下部尿路平滑筋細胞に数多く存在するイオンチャネルの中から近年, 不安定膀胱治療に向けての新規薬剤の一つとして, その標的イオンチャネルとして脚光を浴びている K_{ATP} チャネルに焦点を絞りながら下部尿路平滑筋細胞の K_{ATP} チャネルにおける Kir および SUR タンパクのサブタイプについて検討を加え, 今後の不安定膀胱の治療へ向けての K_{ATP} チャネル開口薬の臨床的有用性・問題点について述べていきたい。

2. K_{ATP} チャネルの多様性

K_{ATP} チャネルが心筋細胞(1)で発見されて以来, 体内の様々な組織 (膵臓, 神経, 骨格筋および平滑筋等) において K_{ATP} チャネルは, 主に電気生理学的手法であるパッチクランプ法を用いてその存在が確認され, 報告されてきた。この K^+ チャネルは, 細胞内 ATP 濃度が, 急激に減少すると直ちに活性化され K^+ の透過性を促進するイオンチャネルで細胞内代謝経路と密接な関係があると考えられている。図1に示すように平滑筋細胞において K_{ATP} チャネルは静止膜電位の維持や筋緊張の維持および弛緩機序に関与していると考えられている。

近年, 分子生物学的実験手法を用いて K_{ATP} チャネルの

Fig. 1 Physiological roles of K_{ATP} channels in smooth muscle.

分子実体が次第に明らかになってきた。 K_{ATP} チャンネルは少なくとも2つの独立したタンパク、すなわち内向き整流性 K^+ チャンネル (Kir6.X) とスルフォニルウレア受容体 (SUR) から構成されていると考えられている(2)。これらの2つの独立したタンパクの組み合わせによりその臓器における K_{ATP} チャンネルの特異性を決定しているのではないかと考えられるようになってきた。例えば膵臓 細胞型 K_{ATP} チャンネルは Kir6.2/SUR1、心筋型 K_{ATP} チャンネルは Kir6.2/SUR2A のそれぞれの組み合わせで形成されていると考えられている。また血管平滑筋型 K_{ATP} チャンネル (別名 K_{NDP} チャンネル: ヌクレオチド二リン酸 (NDP) 感受性カリウムチャンネル) は Kir6.1/SUR2B の組み合わせではないかと考えられている(3)。薬理学的見地から考えるとこれらの様々な Kir6.X と SUR との組み合わせの分子実体に対して選択的に作用する薬物の開発そのものが、最終的に臨床応用可能な臓器特異性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬と密接に関連すると考えられる。

(1) Kir6.X に対する薬物選択性

近年その K_{ATP} チャンネルのチャンネルポア領域を形成する Kir6.1 に対して選択的な阻害薬が報告された。U-37883A (PNU-37883A) は以前から非スルフォニル尿素薬として開発されてきた薬剤である(4)。U-37883A は血管平滑筋における K_{ATP} チャンネルに対して $10 \mu M$ 以下の濃度投与によって完全に抑制されるにもかかわらず、膵臓 細胞や

心筋の K_{ATP} チャンネル活性に対しては、ほとんど何ら影響を及ぼさず従来より臓器選択性を有する非スルフォニル尿素薬として一般的に知られていた。近年, Surah-Narwal ら(5) は K_{ATP} チャンネル発現の実験を行い U-37883A ($10-100 \mu M$) は Kir6.2/SUR1 から形成された K_{ATP} 電流に対してなら効果は観察されないが、一方 Kir6.1/SUR1 からなる K_{ATP} 電流に対してはその電流活性を完全に抑制することを報告した。発現させたクローン K_{ATP} チャンネルの SUR 分子実体が同一であることから U-37883A の K_{ATP} チャンネル活性への選択的な抑制効果はその Kir6.X の相違と推定された。しかしこの2回膜貫通型チャンネルタンパクの Kir6.1 の具体的にどの領域 (あるいは部位) に作用しチャンネル抑制を引き起こすのかは未だ明らかになっておらず、今後、薬理学的研究が必須であると思われる。また一方で Kir6.1 あるいは Kir6.2 に対してそれぞれ選択的なチャンネルアゴニスト (活性化薬) の検索も臓器選択性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬の開発を導く新たな概念と考えられる。

(2) SUR に対する薬物選択性

従来開発されてきたほとんどの K_{ATP} チャンネル開口薬は、SUR を介して選択的に作用し K_{ATP} チャンネルを活性化させることが、近年分子生物学的レベルで K_{ATP} チャンネル発現系実験 (Kir6.2/SURX) を用いて明らかになってきた。diazoxide は SUR1 に選択的に作用し SUR2A に対しては

Fig. 2 Recording in a cell-attached configuration (symmetrical 140 mM K⁺ conditions) at a holding membrane potential of -50 mV. A. Examples of the currents. ZD6169 at different concentrations was cumulatively applied to the same membrane patch using the concentration-jump technique. The dashed line indicates the current when the channel is not open. B. Concentration-response curve for relative mean NP_o value $\pm$ s.d. ($n = 4$), demonstrating a bell-shaped curve. The relative mean NP_o value was obtained when the NP_o value of the 100 μM levromakalim-induced K⁺ channels was normalized as one. The line was drawn by eye.

ほとんど作用せずまた SUR2B には弱いながらも活性化があることが解明された。また一方, pinacidil は SUR1 にはほとんど作用を示さないが SUR2A と SUR2B に対して選択的に作用し K_{ATP} チャンネル活性があることが解明された。このように多少なりとも臓器特異性の可能性を有し薬理学的特性を有する既存の K_{ATP} チャンネル開口薬が存在することが示唆された(6)。そして diazoxide と pinacidil と両方の薬剤を用いながら種々臓器において SUR のサブタイプを薬理学的に推定することはある程度可能と考えられている。

近年, SUR のサブタイプに依存して K_{ATP} チャンネル活性を制御する薬剤, MCC-134 が新規合成されその薬理学的作用が報告された(7)。K_{ATP} チャンネル発現の実験系 (Kir6.2/SURX) においてこの MCC-134 は SUR1 を含む K_{ATP} チャンネルに対してはチャンネル活性をほとんど惹起させないが, 一方 SUR2A に対しては full agonist, SUR2B

に対して partial agonist として選択的に K_{ATP} チャンネル活性を示す。すなわち MCC-134 はその単独の薬物のみで薬理学的に SUR のサブタイプを類推することが可能であり今後, 臓器特異性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬の開発の糸口となると考えられる。

また新世代のスルフォニル尿素薬 (gliclazide, meglitinide 等) は SUR1 に対する選択的阻害薬として糖尿病治療に臨床応用されてきている。この新規スルフォニル尿素薬の薬理学的特徴としては低濃度領域では SUR1 に対して選択的抑制作用を示すが, 高濃度領域になると SUR1 以外にもチャンネルポア (Kir6.2) 自体を阻害する作用も出現し, 濃度によって異なった薬理学的作用を示すことが報告されている(8)。

3. 泌尿器領域での K_{ATP} チャンネル開口薬の動向

近年, 泌尿器科領域において, 尿失禁症に対する画期的

Fig. 3 Effects of ZD6169 (100 μM) on channel activity of Kir6.2 C36. A. Current trace of the effects of 100 μM ZD6169 on channel activity of Kir6.2 C36 in inside-out configuration at a holding potential of -50 mV. The arrow indicates the time when the inside-out patch was excised from the cell. The dashed line indicates the current when the channel is not open. B. Effects of 100 μM ZD6169, 100 μM cibenzoline, and 10 μM glibenclamide on channel activity of Kir6.2 C36 at -50 mV. To obtain the mean patch current, the integral of open channel currents during the 30 s before application of each drug was divided by the time for integration, measuring from the current level when the channel was not open. Each column shows the relative mean patch current (mean value + S.D.) when the mean patch current of Kir6.2 C36 was normalized as 1.0 ($n = 4$). * $P < 0.05$.

な臨床的治療薬として膀胱平滑筋に存在する K_{ATP} チャンネルに選択的に作用する K_{ATP} チャンネル開口薬が開発されてきた。すなわちこの K_{ATP} チャンネル開口薬を用いた薬理作用は、膀胱平滑筋細胞膜上に広汎に分布する K_{ATP} チャンネルに対して選択的に作用し、その K^+ チャンネルを活性化させチャンネル開口により K^+ イオンの透過性を選択的に亢進させ、それにより膀胱平滑筋細胞の脱分極反応を抑制し過分極反応を惹起させ、最終的には排尿筋弛緩を得ることにより膀胱内蓄尿量（膀胱蓄尿容積）を増加する臨床的目的を有する。

我々は、ゼネカ株式会社（現アストラゼネカ株式会社）および連合王国オックスフォード大学薬理学研究所と産学共同で膀胱平滑筋選択性 K_{ATP} チャンネル開口薬 ZD6169 を開発した。ZD6169 は当初、心血管系に及ぼす効果と比較

検討され cromakalim の結果と比較して膀胱平滑筋に対してはラットではおよそ 190 倍、イヌではおよそ 15 倍の膀胱選択性が存在することが報告された(9)。また in vitro 実験において ZD6169 投与により濃度依存的にヒト膀胱平滑筋の K^+ フラックスが増加すること(10) やモルモット膀胱平滑筋において glibenclamide 感受性 K^+ 電流を惹起させること(11) が報告された。

そこで次の開発段階として膀胱選択性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬を投与した場合、膀胱平滑筋のみならず尿道平滑筋における筋緊張の減退、それに伴う尿道平滑筋の弛緩反応は尿失禁症の治療に相反する作用を生じることが考えられた。膀胱選択性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬において心血管系に及ぼす効果のみならず尿道平滑筋に及ぼす効果を検討することは、その下部尿路系での臨床応用上極

Fig. 4 Schematic diagram illustrating possible mechanisms proposed in the two binding sites hypothesis of ZD 6169. Kir6.X, inwardly rectifying K^+ channel family 6.X; SUR, sulphonylurea receptor; H, high affinity site; L, low affinity site.

めて重要と考えられた(12)からである。そこで我々は、その電気生理学的および薬理学的特性が既に明らかになっていたブタ尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルを用いて ZD6169 の尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルに及ぼす効果をパッチクランプ法を用いて検討した(13)。その結果、ZD6169 は尿道平滑筋の K_{ATP} チャンネルに対して 2 相性反応(すなわち活性化と抑制反応)を有することを発見した(図 2)。ZD6169 の尿道平滑筋の K_{ATP} チャンネルに対する濃度反応関係はおよそ 10~30 μM 付近で最大活性を示した。しかしさらに高濃度側では逆にチャンネル活性を抑制してしまう、いわゆる“ベル型”濃度反応曲線を示すことを報告した。この 2 相性反応の結果は 2 つの大きな重要な意味を持つと考えられた。

- 1) 低濃度領域(1 μM -10 μM)では膀胱平滑筋および尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルを濃度依存的に活性化した。
- 2) 高濃度領域(30 μM -100 μM)では膀胱平滑筋 K_{ATP} チャンネルを濃度依存的に活性化するものの尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルは逆にその活性化が抑制された。

すなわち ZD6169 の尿道平滑筋の K_{ATP} チャンネルに対する 2 相性反応は、膀胱平滑筋 K_{ATP} チャンネルと尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルとを区別し、ZD6169 は膀胱選択性を有する K_{ATP} チャンネル開口薬開発の糸口になる可能性が強く示

唆された。しかし ZD6169 の膀胱平滑筋および尿道平滑筋 K_{ATP} チャンネルの相互の K_{ATP} チャンネル間でこの相反する作用が出現する濃度領域は極めて高濃度領域であり、その効果そのものが臨床的に膀胱選択性 K_{ATP} チャンネル開口薬として考えていくことは極めて困難であると考えられた。また一方で ZD6169 が K_{ATP} チャンネルのどの部位(Kir, SUR 等)に作用しているのか不明であった。そこで我々は高濃度領域 ZD6169 による抑制反応をさらに詳しく調べるために K_{ATP} チャンネルのイオンチャンネルの分子生物学的実体と考えられている内向き整流性 K^+ チャンネル Kir6.2 のアミノ酸配列 C 端 36 個のアミノ酸を切り取った Kir6.2 C36 を COS7 細胞に強制発現させ、スルフォニルウレア受容体非存在下での ZD6169 の抑制機序を検討した。Kir6.2 C26 や Kir6.2 C36 は SUR タンパク非存在下でもそのチャンネル活性が観察され、チャンネル孔を形成するタンパクに及ぼす薬物の効果を検討する際、広く用いられている実験方法である(14)。図 3 に示すように Kir6.2 C36 のチャンネルタンパクを強制発現させた COS7 細胞(保持電位 -50 mV, セルアタッチ法下, 細胞内外液とも 140 mM K^+ の実験条件)ではチャンネル開口はほとんど観察されなかった。しかしその後、セルアタッチ法からインサイドアウト

法に記録方法を変化させると直ちに内向きチャネル電流の開口が観察された。チャネル活性が安定した後、尿道平滑筋 K_{ATP} チャネルを完全に抑制した ZD6169 の濃度である $100 \mu M$ を投与してもチャネル活性には有為な変化は観察されなかった。しかしその後、Kir6.2 チャネルの強力なイオンチャネルポアブロッカーである cibenzone ($100 \mu M$) を投与すると Kir6.2 チャネル活性は直ちに抑制された。また cibenzone 除去後、チャネル活性が回復した後 glibenclamide ($100 \mu M$) を投与したがチャネル活性には有為な変化は観察されなかった。以上の結果より ZD6169 は K_{ATP} チャネルポア領域ではなく SUR に作用している可能性が強く示唆された。またこの結果は ZD6169 が glibenclamide 結合部位に結合するという binding 実験の結果とも一致していた。また高濃度の ZD6169 を除去した時、ZD6169 非存在下にも関わらず一過性の glibenclamide 感受性過分極、電流および K^+ チャネル開口が観察された (13)。我々はこの ZD6169 の K_{ATP} チャネルに及ぼす 2 相性反応について考える一つの仮説を立てた。すなわち尿道平滑筋 K_{ATP} チャネルの SUR には ZD6169 に対して高親和性結合部位と低親和性結合部位の 2 つの結合部位が存在する可能性である (two binding sites hypothesis, 図 4)。低濃度 ZD6169 投与時には、主に ZD6169 は、SUR の高親和性結合部位に結合し K_{ATP} チャネルの活性化を惹起した。一方 ZD6169 高濃度投与時には SUR の高親和性結合部位のみならず低親和性結合部位にまで ZD6169 が結合し始めその結果 K_{ATP} チャネルの活性化を抑制すると考えた。ZD6169 を除去すると初めに SUR の低親和性結合部位から ZD6169 が解離し始めその結果、高親和性結合部位に結合している ZD6169 の作用が再び発現し K_{ATP} チャネルの活性化を惹起する。しかし時間と共に ZD6169 は SUR の高親和性結合部位からも次第に解離し始め最終的には K_{ATP} チャネルの活性化は消失すると考えた。

しかし未だ分子生物学的に SUR における正確な ZD6169 の結合部位は同定されていない。今後 ZD6169 の SUR での具体的な結合部位に関する研究が必要と考えられる。また一方で ZD6169 の尿道平滑筋 K_{ATP} チャネルに対する 2 相性反応は、膀胱平滑筋と尿道平滑筋の K_{ATP} チャネルのそれぞれの SUR のサブタイプが違うのではという可能性も排除できない。mRNA の transcript の出現を示した RT-PCR 法の実験結果においてはヒトやブタの膀胱平滑筋では SUR1 と SUR2B の両方の SUR の出現が報告されている (15)。またブタ尿道平滑筋の K_{ATP} チャネルでも RT-PCR 法の実験結果では SUR1 と SUR2B の両方の SUR の出現が報告されている。しかし近年、ブタ尿道平滑筋の K_{ATP} チャネルは少量の SUR1 と多量の SUR2B

のヘテロで存在しそれぞれがホモテトラマー構造を構成しているのではという新しい概念も構築されつつある (16)。果たして ZD6169 の K_{ATP} チャネルに対する 2 相性反応は、既知の SUR における結合部位の違いによる理由であるのか、また SUR における splice variant 含めた新しいタイプの SUR の存在による理由であるか、今後、その研究の進展に非常に興味があるところである。

また一方で膀胱選択性を有する新たな K_{ATP} チャネル開口薬 (WAY-133537, AZD0947 等) が次々と開発・合成されてきている。しかしこれらの新規膀胱選択性 K_{ATP} チャネル開口薬は、基礎研究レベルで心血管系に比較し膀胱平滑筋に作用する薬物強度が高いと明らかになった段階であり、その詳細な薬理学的作用機序等は、未だ不明のままである。基礎研究から臨床応用へ向けての今後の新規膀胱選択性 K_{ATP} チャネル開口薬に関して更なる研究成果の進展に大いに期待したい。

4. 今後の泌尿器科領域における K_{ATP} チャネル開口薬の検討項目ならびに課題

1994 年に Wammack ら (17) が初めてヒト膀胱単離細胞を用いて cromakalim 惹起性 K_{ATP} 電流の存在を報告した時、ヒト、ラット、ウサギ、モルモットの各種動物における膀胱平滑筋における cromakalim 惹起性 K_{ATP} 電流を例に取りながらヒト膀胱平滑における cromakalim 惹起性 K_{ATP} 電流は他の動物における K_{ATP} 電流とその電気生理学的特性が異なり、また cromakalim による弛緩反応の大きさも異なることから K_{ATP} チャネル開口薬の効果を検討する時にはヒト膀胱平滑筋を用いた実験結果が不可欠であると強調している。ヒト組織の入手に伴う困難性や倫理問題から今まで解剖学的見地また神経支配の見地から極めてヒトに類似していると考えられてきたブタの排尿筋を用いた実験結果から主に新規 K_{ATP} チャネル開口薬の作用の検討が広く行われてきた。しかし現在、クローニングされた SUR ならびに Kir6.X の分子配列は、動物種間に明らかな相違箇所が存在することから今後、臨床応用に向けての K_{ATP} チャネル開口薬の基礎実験レベルでもヒトの組織を用いた実験結果ならびに知見が必要不可欠になるであろうと考えられる。そのためにも今後、ヒト膀胱平滑筋における K_{ATP} チャネルの電気生理学的ならびに薬理学的特性および分子実体の解明が、急務と考えられている。

また膀胱平滑筋の主な生理的機能は、蓄尿作用と排尿作用であり K_{ATP} チャネル開口薬投与によって排尿筋弛緩を得られ最終的に膀胱内蓄尿量が増加したとしても、随意排尿時に伴う排尿筋の最大排尿筋収縮はそのまま維持されることが望まれる。弛緩を惹起させながら収縮機能も残すと言うこの一見相反する 2 つの生理機能的現象を維持しなけ

ればならない困難性が K_{ATP} チャンネル開口薬の臨床応用には伴うと考えられる。また排尿機能の支配神経を含めた組織特異性も合わせて考慮しなければならない課題の一つと考えられる。泌尿器科領域では近年人口の老齢化に伴い前立腺肥大に伴う排尿障害も増加している。尿道圧排に伴う排尿障害改善にも尿道平滑筋の K_{ATP} チャンネルを選択的な標的とした局所的に作用する K_{ATP} チャンネル開口薬の開発が待たれる。

5. 最後に

今回の下部尿路に関する特集を主宰して頂いた戸田昇先生に深く感謝致します。また総説の発表の機会を与えて頂いた九州大学大学院医学研究院生体情報薬理学教授、伊東祐之先生にも深謝申し上げます。この研究はアストラゼネカ リサーチグラント 2001 中枢神経系部門（寺本憲功代表受賞）および文部科学省科学研究費（科学研究費番号 14570080 および科学研究費番号 14-研-108，それぞれ寺本憲功研究者代表）によって助成されました。

文 献

- 1) Noma A: ATP-regulated K^+ channels in cardiac muscle. *Nature* **305**, 147-148 (1983)
- 2) Inagaki N, Gonoi T, Clement JP 4th, Namba N, Inazawa J, Gonzalez G, Aguilar-Bryan L, Seino S and Bryan J: Reconstitution of IKATP: an inward rectifier subunit plus the sulfonylurea receptor. *Science* **270**, 1166-1170 (1995)
- 3) Babenko AP, Aguilar-Bryan L and Bryan J: A view of SUR/ $K_{IR}6.x$, K_{ATP} channels. *Annu Rev Physiol* **60**, 667-687 (1998)
- 4) Meisheri KD, Humphrey SJ, Khan SA, Cipkus-Dubray LA, Smith MP and Jones AW: 4-morpholinecarboximidine-N-1-adamantyl-N'-cyclohexylhydrochloride (U-37883A): pharmacological characterization of a novel antagonist of vascular ATP-sensitive K^+ channel openers. *J Pharmacol Exp Ther* **266**, 655-665 (1993)
- 5) Surah-Narwal S, Xu SZ, McHugh D, McDonald RL, Hough E, Cheong A, Partridge C, Sivaprasadarao A and Beech DJ: Block of human aorta Kir6.1 by the vascular K_{ATP} channel inhibitor U37883A. *Br J Pharmacol* **128**, 667-672 (1999)
- 6) Fujita A and Kurachi Y: Molecular aspects of ATP-sensitive K^+ channels in the cardiovascular system and K^+ channel openers. *Pharmacol Ther* **85**, 39-53 (2000)
- 7) Shindo T, Katayama Y, Horio Y and Kurachi Y: MCC-134, a novel vascular relaxing agent, is an inverse agonist for the pancreatic-type ATP-sensitive K^+ channel. *J Pharmacol Exp Ther* **292**, 131-135 (2000)
- 8) Ashcroft FM and Gribble FM: Tissue-specific effects of sulfonylureas: lessons from studies of cloned K_{ATP} channels. *J Diabetes Complications* **14**, 192-196 (2000)
- 9) Howe BB, Halterman TJ, Yochim CL, Do ML, Pettinger SJ, Stow RB, Ohnmacht CJ, Russell K, Empfield JR, Trainor DA, et al: ZENECA ZD6169: A novel K_{ATP} channel opener with in vivo selectivity for urinary bladder. *J Pharmacol Exp Ther* **274**, 884-890 (1995)
- 10) Trivedi S, Stetz SL, Potter-Lee L, McConville M, Li JH, Empfield JR, Ohnmacht CJ, Russell K, Brown FJ, Trainor DA, et al: K-channel opening activity of ZD6169 and its analogs: effect on ^{86}Rb efflux and 3H -P1075 binding in bladder smooth muscle. *Pharmacology* **50**, 388-397 (1995)
- 11) Li JH, Yasay GD, Zografos P, Kau ST, Ohnmacht CJ, Russell K, Empfield JR, Brown FJ, Trainor DA, Bonev AD, et al: Zeneca ZD6169 and its analogs from a novel series of anilide tertiary carbinols: in vitro K_{ATP} channel opening activity in bladder detrusor. *Pharmacology* **51**, 33-42 (1995)
- 12) Teramoto N, Creed KE and Brading AF: Activity of glibenclamide-sensitive K^+ channels under unstimulated conditions in smooth muscle cells of pig proximal urethra. *Naunyn-Schmiedeberg Arch Pharmacol* **356**, 418-424 (1997)
- 13) Teramoto N, Yunoki T, Takano M, Yonemitsu Y, Masaki I, Sueishi K, Brading AF and Ito Y: Dual action of ZD6169, a novel K^+ channel opener, on ATP-sensitive K^+ channels in pig urethral myocytes. *Br J Pharmacol* **133**, 154-164 (2001)
- 14) Tucker SJ, Gribble FM, Zhao C, Trapp S and Ashcroft FM: Truncation of Kir6.2 produces ATP-sensitive K^+ channels in the absence of the sulphonylurea receptor. *Nature* **387**, 179-183 (1997)
- 15) Buckner SA, Milicic I, Daza A, Davis-Taber R, Scott VE, Sullivan JP and Brioni JD: Pharmacological and molecular analysis of ATP-sensitive K^+ channels in the pig and human detrusor. *Eur J Pharmacol* **400**, 287-295 (2000)
- 16) Yunoki T, Teramoto N and Ito Y: Functional involvement of sulphonylurea receptor (SUR) type1 and 2B in the activity of pig urethral ATP-sensitive K^+ channel. *Br J Pharmacol*, in press (2003)
- 17) Wammack R, Jahn U, Nawrath H and Hohenfellner R: Mechanical and electrophysiological effects of cromakalim on the human urinary bladder. *Eur Urol* **26**, 176-181 (1994)

Abstract - Molecular and electrophysiological investigation of ATP-sensitive K^+ channels in lower urinary tract function: the aims for clinical treatment of unstable detrusor. Noriyoshi TERAMOTO (Department of Pharmacology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka 812-8582, Japan)
Folia Pharmacol. Jpn. (Nippon Yakurigaku Zasshi) **121**, 317 ~ 324 (2003)

It is a common sequelae of bladder outlet obstruction caused by benign prostatic hyperplasia in adult males and gives rise to significant bladder dysfunction such as frequency and urgency of micturition. The unstable detrusor contractions may lead to urge incontinence. Since it has been reported that experimentally-induced bladder instability can be abolished by ATP-sensitive K^+ channel (K_{ATP} channel) openers, various types of detrusor-selective K_{ATP} channels have been newly synthesized, targeting K_{ATP} channels in urinary bladder. Thus, the significant differences in molecular and pharmacological properties of K_{ATP} channels between urinary bladder and urethra hold out some hope for the development of tissue-selective K_{ATP} channel openers for urge urinary incontinence, and detrusor-selective K_{ATP} channel openers should be screened against urethral as well as vascular smooth muscle. In functional expression experiments, pharmacological and electrophysiological studies have reported that SUR1/Kir6.2 represents the pancreatic β -cell K_{ATP} channel and that SUR2A/Kir6.2 is thought to represent the cardiac K_{ATP} channel, whereas SUR2B/Kir6.1 represents the smooth muscle-type K_{ATP} channel. In general, the smooth muscle type- K_{ATP} channel is (i) of a relatively small conductance (about 20 pS under quasi-physiological conditions, approximately 40 pS in symmetrical 140 mM K^+ conditions), (ii) intracellular Ca^{2+} -insensitive, (iii) inhibited by intracellular ATP, (iv) abolished by glibenclamide at a submicromolar concentration, and (v) reactivated by intracellular nucleoside diphosphates (NDPs). There has been no report concerning the properties of K_{ATP} channels in human detrusor by use of single-channel recordings. We would like to introduce our recent evidence of novel synthesized detrusor-selective K_{ATP} channel openers and properties of K_{ATP} channels in the lower urinary tract.

Keyword: ATP-sensitive K^+ channels (K_{ATP} channels); K_{ATP} channel openers; tissue selectivity; unstable detrusor

著者プロフィール

寺本 憲功 (てらもと のりよし)

九州大学大学院医学研究院生体情報薬理学, 講師, 医学博士 (九州大学), D.Phil. (連合王国オックスフォード大学)

1993 年九州大学大学院医学系研究科修了, '93 年オックスフォード大学薬理学研究所研究員, '97 年オックスフォード大学大学院博士課程修了, 同年, 九州大学医学部助手 (臨床薬理学); 2001 年日本学術振興会特定国派遣研究員併任 (豪州メルボルン大学動物学研究所), '02 年九州大学大学院医学研究院講師 (生体情報薬理学), 同年, 文部科学省海外研究派遣研究員併任 (豪州メルボルン大学動物学研究所), 現在に至る.

研究テーマ: ヒト膀胱 K_{ATP} チャンネルの分子薬理学的研究, 消化管自動能の研究, 遺伝子治療.

趣味: ヨットイング (かつて昭和 61 年全日本学生大学選手権 3 位の腕前の “ はず ” だが現在は ! ?), スイミング, テニス, アンティーク集め (別名 “ がらくた集め ” と呼ばれてます).