摘出家兎子宮ノ自發運動并ニ藥物學的 反應ノ部位の差異ニ就テ

京都帝國大學醫學部藥物學教室(森島教授)

醫 學 士 品 川 實

目 次

緒 言

實驗材料並ニ實驗方法

實 驗

甲 自發運動ノ比較

乙 藥物學的反應ノ比較

1) 鹽酸「ピロカルピン」

2) 鹽化「アドレナリン」

3) 鹽化「バリウム」

4) 抱水「クロラール」

5) 鹽化「マグネシウム」

總 括 及 考 察

引 用 書 目

緒 言

家兎子宮ニ關スル生物學的并ニ藥物學的研究ハ日ヲ追フテ詳細ヲ極メ、其業績放擧ニ違非ズト雖モ、常ニ相異レル家兎子宮ノ比較研索ニ止マリ同一家兎子宮ノ相異レル部位ニ就テ其相互關係ヲ系統的ニ深ク檢覈シタル者ナシ。

由來生體ノ各臟器ハ其生理的使命ニ從ヒ同一動物ノ同一臟器ト雖モ、其複雑微妙ナル機能ヲ全ウセンガ爲メニ組成上幾分ノ部位の差異ヲ有ス可ク、從テ家兎子宮ニ於テモ各部位ニヨリテ、其自發運動并ニ藥物學的反應ニ幾分ノ差異ヲ認メ得可キハ、蓋シ想像スルニ難カラズ。

抑家兎子宮筋層ハみゆれる氏管ニ起源ヲ有スル眞筋層ト、後續的ニ添加セラレタル副筋層トニ分ツヲ得可シ、前者ハ粘膜直下ニ位シ、各筋纖維ハ寧ロ極メテ強キ螺旋狀ノ走行ヲ有シ、後者ハ漿膜直下ニ存シ更ニ分チテ、外筋層及ビ血管層ニ於ケル筋層ト爲ス。外筋層ハ血管層ヲ挾ンデ眞筋層ニ對シ畧ボ縱走スト雖モ、尙極メテ弱キ螺旋狀ノ走行ヲ有スル事ヲ否定

スルヲ得ズ、血管層ニ於ケル筋纖維ハ主トシテ斜走シ、眞筋層并ニ外筋層ニ比シ著シク筋細胞ニ乏シク、筋ノ運動ヲ「キモグラフィオン」上ニ描寫セシムルニ際シ重大ナル意義ヲ有セズ。而シテ是等各筋纖維ハ既ニ諸家ノ記載ニ見ルガ如ク、幼若、妊娠、産褥、成熟不妊等其狀態ヲ異ニスルニヨリテ筋細胞ノ大サ及ビ數ニ於テ其消長ヲ見ルノミナラズ、同一子宮ニ於テモ狀態ヲ異ニスルニヨリテ筋細胞數ノ部位ノ異動ヲ證明シ得ルガ如シ。(Shinagawa¹)

子宮ニ於ケル神経系ノ分布ニ關シテハふらんけんほいぜの精細ナル檢索アルモ未ダ闡明ノ境ニ達シタリト云フ可カラズ、大ニ今後ノ研究ニ待ツ可キモノナルモ今其ノ概略ヲ記述スレバ、子宮ハ交感系并ニ副交感系纖維ノ支配ヲ受ケ、兩纖維ノ一部ハ直接ニ大部分ハ子宮頸部ノ兩側ニ位スル「フランケンホイゼル」氏神経叢ヲ經テ汎ク子宮組織内ニ分布スルモノ、如シ、而シテ子宮内神経節細胞ニ關シテハ一般ニ其ノ存在ヲ疑ハル。

以上述べ來タリタルガ如ク、縦令家兎子宮筋細胞ハ同一ノ大サ并ニ組成ヨリナルトスルモ、其眞副兩筋層ニ於ケル發育上ノ相互關係、又ハ神経ノ分布狀態并ニ興奮性ノ差異、更ニ組織ノ藥物ニ對スル感受性ノ遲速銳鈍等各個ノ家兎ニヨリテ幾分ノ動搖ヲ示ス可キハ考慮シ得可キヲ以テ、本實驗ノ如ク同一家兎子宮ヲ用ヒ可及的同一條件ノ下ニ操作シタルモノト雖モ各成績ヲ綜合シ考察スルニ際シ、稍々多岐ナル結果ヲ可キハ蓋シ當然ノ歸結ナル可ク、從ツテ、大綱ヨリ見テ一貫セル何等カノ成果ヲ得レバ多幸トス可キモノナラント信ズ。

次ニ文献ヲ按ズルニ Kehler²⁾ ハ猫ノ子宮角ニ於テ不斷ノ強ク且ツ整調ナル振子運動ヲ認メ、尙ホ其ノ同一子宮角ニ於テモ、其ノ上半部ト下半部トニ於テハ、運動ノ整調度并ニ振幅ニ差異存在シ、之等ハ總テ子宮尖端ニ於テ優ルト云ヒ、又子宮頸部ニアリテハ其ノ運動緩慢ナルモ振幅大ニシテ收縮ノ間ニ殆ンド同一ノ長キ間歇時ヲ有スト述ベタリ。猶ホ犬、家兎、及ビ「モルモット」ノ子宮ニ於テモ猫子宮ト略ボ同様ノ自發運動ヲ認ムルモ、犬及ビ家兎ノ子宮角ハ猫子宮角ヨリモ稍々不規則且ツ緩慢ナル運動ヲ示シ、犬ノ子宮頸部ハ猫ノ該部ヨリモ不規則ニシテ長キ波ヲ畫キ、更ラニ人類子宮(慢性子宮實質炎及ビ筋腫子宮)ニ於テハ著シク長キ間歇ヲ伴フ緩慢ナルモ強キ自發運動ヲ示スト云ヘリ。而シテ一般ニ、子宮及ビ腔ニ於テ其ノ各上部ハ各下部ヨリモ活潑ニ振子運動ヲ營ムヲ以テ、子宮及ビ腔ノ上部ハ下部ヨリモ神経機ヲ豊富ニ有スルニ非ズヤト説ケリ。

Ogata³⁾ ハ幼若家兎子宮環狀筋ノ描寫ニ於テ、切片ノ卵巢端ハ腔端ヨリモ敏速ニ運動スルヲ見テ、蠕動運動ノ總テハ子宮角ノ上部ヨリ下部ニ傳ハルモノニ非ズトナシ、又經産家兎

ニ於ケル子宮角ノ 4.5 cm テ取りテ切半シ、一片ハ其ノ儘トナシ、他片ハ其ノ中央部ニ於テ更ニ 1.8 cm テ切り取りテ長軸ニ懸垂シ描畫セシメシニ、短キ者ハ長キ者ヨリ 2 倍ノ速度ヲ以テ運動セリト云ヘリ。

岡本⁴⁾ ハ同一家兎子宮角ニ於テモ其ノ尖端ト頸部ニ近キ部分トハ多少收縮ノ状態ヲ異ニスルヲ認メ、尙ホ毒液ニ對シテハ概シテ下部ハ上部ヨリ強ク反應スト記述セリ。

實驗材料並ニ實驗方法

家兎子宮各部ニ於ケル自發運動及ビ藥物學的反應ヲ比較センガ爲メ、子宮角最上部、子宮角中央部、子宮角最下部、及ビ子宮頸部中央ノ 4 部ニ於テ子宮ノ長軸ニ垂直ニ各長サ 1 cm テ横斷シ可驗材料トナス。

家兎子宮ハ主トシテ當日頸動脈ヨリ放血致死セシメタル成熟不妊、妊娠、產褥、及ビ未成熟子宮ヲ用ヒタルモ、時ニ「ロツク」氏液中ニテ冷蔵庫中ニ貯エタル前日ノモノヲモ材料ニ供シタリ。

凡テ可驗材料ハ「フューネル」氏法ニ從ヒ、長軸ニ沿フテ一端ヲ「クレンメ」ヲ以テ直接硝子棒ニ、他ノ一端ヲ絹糸ニヨリテ描畫槓杆ニ導カレタル「クレンメ」ニテ固定シ、39°Cニ保テル「ロツク」氏液(「クロールナトリウム」0.9、「クロールカルチウム」0.024、「クロールカリウム」0.042、重炭酸「ナトリウム」0.03、葡萄糖 0.1、蒸留水 100.0.) 50 ccm 中ニ漬シ、其ノ運動ヲ鄉原式「ヘーベル」ニヨリ「キモグラフィオン」上ニ約 6 倍大ニ描畫セシメタリ。本實驗ニ於テハ、殊ニ、總テノ操作ヲ同一條件ノ下ニ行フ必要アルヲ以テ常ニ一實驗列毎ニ同一裝置ヲ用ヒタルハ勿論、其ノ他、材料ノ長サ、「クレンメ」ニヨル材料ノ挟ミ方、可驗材料ノ實驗ニ供スル迄ノ時間、藥液ノ注入方法、溫度、送入スル空氣ノ量、及ビ「キモグラフィオン」ノ廻轉速度等ニ至大ノ注意ヲ拂ヒ可及的同一ナラン事ヲ期シタリ。即チ可驗材料ハ器械的及ビ溫熱の刺激ニ著シク敏感ナルヲ以テ、一度注意シツ、1 cmノ長サニ横斷シタルモノヲ更ニ「ロツク」氏液中ニテ 7 分間室温ニ放置シ再ビ計測訂正シテ用ヒタリ。妊娠及ビ產褥子宮ニテハ曲線ノ振幅過大ナルヲ顧慮シツ、適宜ニ其ノ長サヲ 1 cmヨリ短縮シ、又ハ稀レニ切半シテ用ヒタルモノアルモ、斯ル場合ニ於テハ一實驗列ニ用ヒタル材料ノ長サ——切半シタル時ハ長サ及ビ幅——ヲ總テ同一トナセリ。

「クレンメ」ノ挟ミ方ハ可驗材料ノ廣靱帶附着部ト反廣靱帶附着部ニ於テ一實驗例ヲ通

ジテ同一ノ廣サニ挾マン事ヲ期シタリ。

材料ノ實驗ニ供スル迄ノ時間的關係ニ就キテハ、摘出子宮細胞ノ機能ハ時間的關係ト全く無關係ナリト云フ可カラズ、理想トシテハ、同一裝置ノ下ニ同時ニ四ツノ材料ヲ實驗ニ供ス可キモノナルモ、事實不可能事ニ屬スルヲ以テ可及的引キ續キ實驗ヲ進メタルハ勿論、尙ホ一實驗例毎ニ逐次其ノ順序ヲ變動シツ、實驗セリ。

藥液ノ注入ニ際シテハ材料ニ器械的刺戟及ビ所定以上ノ藥液濃度ヲ與ヘザランコトヲ期シツ、營養瓶壁ニ沿フテ常ニ同様ノ方法ヲ以テ注入セリ、其ノ他温度、空氣ノ送入量及ビ、
「キモグラフィオン」ノ廻轉速度等ハ細心ノ注意ヲ以テ常ニ同一ナラン事ヲ心掛ケタリ。

曲線ハ可驗材料ノ自發運動ヲ初メテヨリ其ノ運動ノ略ボ一定トナルヲ待チテ描畫セシメタルハ勿論ナリ。

自發運動ノ強弱ハ其ノ頻度并ニ振幅ニヨリ、藥物反應ハ主トシテ曲線ニ現ハレタル緊張ノ強弱ニヨリシモ、亦其運動數及ビ振幅ヲモ顧慮シ便宜上 $> < \approx$ 等ノ符號ヲ以テ其ノ差異ヲ現ハス事トナセリ。蓋シ自發運動并ニ藥物ニ對スル反應ノ強弱ハ煤煙紙上ニ現ハレタル曲線ニヨリ例令數量的ニ表ハストスルモ既ニ種々ナル條件ニヨリ、實驗ノ際ニ生ズル幾分ノ誤差ハ避ク可カラザルヲ以テ、例令バ甲ハ乙ヨリモ何倍強ク反應セリ等ト現ハスハ却ツテ成績ヲ誤ラシム可ク、寧ロ $> < \approx$ ノ符號ヲ以テ表ハスヲ可トス可シ。

實 驗

甲 自發運動ノ比較

自發運動ニ於ケル實驗成績ヲ表ヲ以テ示セバ次ノ如シ (52 例)。

第 1 表

未成熟子宮	妊娠子宮	産褥子宮	成熟不妊子宮	
$\varepsilon \approx b \approx c > d$	$a \approx b \approx c \approx d$	$b \approx c > a > d$	$a \approx b \approx c > d$	$a \approx b \approx c \approx d$
$\varepsilon \approx b \approx c \approx d$	$a \approx b \approx c > d$	$a > b \approx c > d$	$a > b > c \approx d$	$a \approx b \approx c \approx d$
$\varepsilon \approx b > c > d$	$a \approx b \approx c \approx d$	$a > b > d > c$	$d > a \approx b > c$	$a \approx b > c \approx d$
$a > b \approx c > d$	$a \approx b \approx c \approx d$	$a \approx b \approx d > c$	$a > c \approx d > b$	$a \approx b \approx c \approx d$
$\varepsilon \approx b \approx c > d$	$a > b > c > d$	$a > b \approx c > d$	$a \approx b \approx c > d$	$b \approx c \approx d > a$
	$a > b > c > d$	$a \approx c > b \approx d$	$a \approx b \approx c > d$	$a > b > c \approx d$

未成熟子宮	妊娠子宮	産褥子宮	成熟不妊子宮
	$a \div b \div c \div d$		$a \div b \div c \div d$ $a \div c > b \div d$
	$a > b \div c > d$		$a \div b \div c > c$ $a \div b > c > d$
	$a \div b \div c \div d$		$a > b \div d > c$ $a \div b \div c > d$
			$b > c \div d > a$ $a > b > c \div d$
			$a \div b \div c \div d$ $a \div b > d > c$
			$a \div b \div c \div d$ $a > b > c > d$
			$a \div c > b \div d$ $c > b > a > d$
			$a > b \div c > d$ $a > b > d > c$
			$a \div b \div c \div d$ $b > c \div d > a$
			$a \div b \div c \div d$ $a \div b \div c \div d$

a ハ子宮角最上部, b ハ子宮角中央部, c ハ子宮角最下部, d ハ子宮頸部中央ヲ示ス。

(以後同様ノ表アルモ a, b, c, d, ハ同意義ニ用フルヲ以テ便宜上説明ヲ省略ス可シ, 又附圖ノ説明ニ於テモ a, b, c, d, ハ同様ノ意義ニ用ヒタリ。尙ホ家兎子宮ニ於ケル妊娠, 不妊ニ就テハ嚴密ノ意義ニ於テ種々論議セラルル點アルモ, 子宮ニ於ケル肉眼の所見ニヨリ, 確證アルモノヲ妊娠子宮ノ項ニ, 然ラザルモノヲ不妊ノ項ニ入レタリ。)

即チ a ハ 88,5% ニ於テ, b ハ 61,5% ニ於テ, c ハ 55,8% ニ於テ, d ハ 34,6% ニ於テ其ノ他ノ孰レヨリモ小ナラズ。又 a ハ 34,6% ニ於テ, b ハ 36,5% ニ於テ, c ハ 48% ニ於テ, d ハ 80,8% ニ於テ其ノ他ノ孰レヨリモ大ナラズ。

又 a, b, c, d, ナ順位ニヨリテ排列スレバ次表ノ如シ, 但シ I, II, III, IV, ナ以テ其ノ順位ヲ示シ例令バ $a > b > c > d$ ナレバ a ナ I, b ナ II, c ナ III, d ナ IV トシ, $a > b \div c > d$ ナレバ a ナ I, b 及ビ c ナ II, d ナ III トシ, $a > b \div c \div d$ ナレバ a ナ I, b, c, d ナ II トナシ, $a \div b \div c \div d$ ナレバ總テ I トナス。以後同様ノ表ヲ以テ示ス場合ハ總テ之レニ倣フヲ以テ説明ヲ省略ス可シ。

第 2 表

	a	b	c	d
I	46	32	29	18
II	3	19	12	17
III	3	1	9	13
IV	0	0	2	4

今若シ I, II, III, IV ニ夫々レ 4, 3, 2, 1, ノ價ヲ與フレバ (以後同様ノ表アルモ便宜上説明ヲ省略ス可シ.)

第 3 表

a	b	c	d
199	187	172	153

故ニ, 家兎子宮ノ自發運動ハ多數ノ場合ニアリテハ, a 部ニ於テ強盛ニシテ, b 及ビ c 部之レニ次ギ, d 部ニ於テ最モ劣ル.

尙, 概シテ子宮角部ハ頸部ヨリモ規則正シキ曲線ヲ示ス, 而シテ *Kehrer*¹⁾ ハ子宮角最上部ハ其他ノ孰レノ子宮角部ヨリモ規則正シキ曲線ヲ示スト云フモ, 余ノ比較ニヨレバ必ズシモ然カルニ非ズ, 寧ロ子宮角各部ニ於テハ略ボ同様ノ整調度ヲ有スルガ如シ.

(a)

(c)

(b)

(d)

第 I 圖

(成熟不妊家兎子宮)

更ラニ, 未成熟子宮, 妊娠, 産褥, 成熟不妊子宮ノ自發運動ニ就イテ各別ニ其ノ成績ヲ表示スレバ,

第 4 表 未成熟子宮 (5 例)

	a	b	c	d
I	5	4	3	1
II	0	1	2	2
III	0	0	0	2
IV	0	0	0	0

a	b	c	d
20	19	18	14

第 5 表 妊娠子宮 (9 例)

	a	b	c	d
I	9	6	6	5
II	0	3	1	1
III	0	0	2	1
IV	0	0	0	2

a	b	c	d
36	33	31	27

第 6 表 産褥子宮 (6 例)

	a	b	c	d
I	5	2	2	1
II	1	4	3	1
III	0	0	0	4
IV	0	0	1	0

a	b	c	d
23	20	18	15

第 7 表 成熟不妊子宮 (32 例)

	a	b	c	d
I	27	20	18	11
II	2	11	6	13
III	3	1	7	6
IV	0	0	1	2

a	b	c	d
120	115	105	97

即チ各々ノ例ニ於テモ自發運動ハ多數ノ場合ニ於テ $a > b > c > d$ ノ傾向ヲ有スル事ヲ看取シ得可シ。

乙 藥物學的反應ノ比較

1) 酸塩「ピロカルピン」

「ピロカルピン」ハ代表的副交感神經末梢毒ニシテ、子宮ニ對シテハ副交感神經ノ末端

ヲ刺戟シテ、常ニ收縮ヲ催進セシム。(Harnack u. Meyer,⁶⁾ Cushny,⁷⁾ Kehrer,⁸⁾ Sugimoto,⁹⁾ Adler,⁸⁾ 原,⁹⁾ Okamoto,¹⁰⁾ 長町,¹¹⁾).

今、實驗成績ヲ表示スレバ次ノ如シ。(8例)

即チ、a ハ 87.5%

第 8 表

ニ於テ、b ハ 50%ニ於
テ、c ハ 12.5%ニ於テ、
d ハ 12.5%ニ於テ其
他ノ孰レヨリモ小ナラ
ズ。又 a ハ 12.5%ニ於テ
b ハ 25%ニ於テ、c ハ
62.5%ニ於テ、d ハ 62.5
%ニ於テ、其ノ他ノ孰レ
ヨリモ大ナラズ。又

状 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ g 量	各 部 ノ 比 較
産 褥	0.0001	b>a≡c>d
ク	0.0002	a>d≡c>b
成 熟 不 妊	0.001	a≡b>d>c
産 褥	0.003	a>b>d>c
//	0.01	a>b>d≡c
成 熟 不 妊	0.03	a>b>c>d
未 成 熟	0.1	a≡b>c≡d
ク	0.2	a≡b≡c≡d

第 9 表

	a	b	c	d
I	7	4	1	1
II	1	3	3	3
III	0	1	3	3
IV	0	0	1	1

a	b	c	d
31	27	20	20

依ツテ鹽酸「ピロカルピン」ノ 0.0001—0.2g ニテハ多数ノ場合ニ於テ、子宮角最上部最
モ強く反應シ、子宮角中央部之レニ次ギ、子宮角最下部并ニ子宮頸部中央ニ於テ最モ弱シ。

(a)

(b)

(c)

(d)

第 2 圖

産褥家兎子宮 ↑鹽酸「ピロピルピン」0,003.

2) 鹽化「アドレナリン」

「アドレナリン」ハ代表的交感神經末梢毒ニシテ、交感神經ハ子宮ニ於テ催進并ニ抑制ノ二纖維ヲ有スルヲ以テ、動物ノ種類及ビ其ノ状態ヲ異ニスルニヨリテ、或ハ催進的ニ或ハ抑制的ニ作用ス。(Kusdinowsky,¹²⁾ Kusdinowsky,¹³⁾ Dahl,¹⁴⁾ Hochwart u. Fröhlich,¹⁵⁾ Falta u. Fleming,¹⁶⁾ Rübsamen u. Kligermann,¹⁷⁾ Sugimoto,⁵⁾ Adler,⁸⁾ 原,⁹⁾ Okamoto,¹⁰⁾ Hils,¹⁸⁾ A. Holste,¹⁹⁾).

本實驗ニ際シ鹽化「アドレナリン」ハ毎回新鮮ナルモノヲ用ヒ遮光低温ニ保チタルハ勿

論榮養液トシテハ「ロツク」氏液中ヨリ重曹ヲ除去セルモノヲ使用セリ。

本實驗 II 例中 5 例即チ 45.5 %ニ於テハ妊娠及ビ不妊子宮ニ亙リ、或ル部位ヲ限リ初メ暫時抑制シ後ニ催進スルモノアルヲ見タリ。摘出家兎子宮ニ就テハ既ニ略ボ諸家ノ成績一致シ、一般ニ催進的ニ作用ストセラル、而シテ唯僅カニ *Falta u. Fleming*¹⁵⁾ ガ其不妊ナルモノニ於テ「アドレナリン」ハ時ニ抑制シ時ニ催進スト述ブル所ナリ。

今實驗成績ヲ表ヲ以テ示セバ次ノ如シ。

1) 一實驗例ヲ通ジ總テ催進的ニノミ作用スルモノ。(6例)

即チ a ハ 66.7 %ニ

第 10 表

於テ、b ハ 33.3 %ニ於

テ、c ハ 50 %ニ於テ、d

ハ 50 %ニ於テ其ノ他ノ

孰レヨリモ小ナラズ。

又、a ハ 50 %ニ於テ、b

ハ 50 %ニ於テ、c ハ 50

%ニ於テ、d ハ 33.3 %

ニ於テ其ノ他ノ孰レヨリモ大ナラズ。又、

狀 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ g 量	各 部 ノ 比 較
妊 娠	0.00001	$a > d > c \approx b$
ク	0.00002	$a \approx b \approx c \approx d$
成熟不妊	0.00002	$b \approx c \approx d > a$
ク	0.00002	$c \approx d > b > a$
ク	0.00005	$a > c > b > d$
ク	0.00005	$a > d > b \approx c$

第 11 表

	a	b	c	d
I	4	2	3	3
II	1	1	1	2
III	1	3	2	0
IV	0	0	0	1

a	b	c	d
21	17	19	19

ニシテ略ボ同様ナル反應ヲ示スモ、尙ホ、子宮角最上部ニ於テ其ノ他ノ孰レノ部位ヨリモ、反應稍々大ナル可キ傾向アルヲ否定スルヲ得ズ。

(a)

(b)

(c)

(d)

第 3 圖

成熟不妊家兎子宮 ↑鹽化「アドレナリン」0.00005.

ロ) 一實驗例中初メ抑制のニ後催進のニ作用スルモノヲ含ム5例。本項ニ於テハ各例ヲ通ジ、抑制度ト共ニ催進度ヲモ表示ス可キモノナルモ、一實驗例即チ子宮角最上部、子宮角中央部、子宮角最下部、子宮頸部中央ノ4描寫曲線ニ於テ、其ノ各々ハ「アドレナリン」ニヨリテ常ニ初メ抑制シ後催進スルモノニ非ズ、或ル者ハ抑制後催進シ、或ル者ハ催進作用ノミヲ示スヲ以テ、之等ノ催進度ヲ相互ニ比較スルハ稍々難事ニ屬ス、依テ抑制度ノミヲ比較表示スル事トナセリ。

第 12 表

狀 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ g 量	各 部 ノ 比 較	備 考
成 熟 不 妊	0.00001	$a > b > c$	{ a, b, c.....抑制後催進 d.....催進ノミ
ク	0.00001	a	{ a.....抑制後催進 b, c, d.....催進ノミ
ク	0.000015	$a > b$	{ a, b.....抑制後催進 c, d.....催進ノミ
妊 娠	0.000015	a	{ a.....抑制後催進 b, c, d.....催進ノミ
成 熟 不 妊	0.00002	a	{ a.....抑制後催進 b, c, d.....催進ノミ

即チ抑制ハ子宮角最上部ニ於テ最モ多ク、子宮角中央部、子宮角最下部ノ順位ヲ以テ之レニ次ギ、子宮頸部中央ニ於テハ之レヲ缺グ、而シテ其ノ抑制度ハ $a > b > c$ ナリ、依テ、今全部ヲ總括シテ論ズレバ $0.00001 - 0.00005$ g 塩化「アドレナリン」ハ多數ノ場合、催進度ニ於テモ亦抑制度ニ於テモ、子宮角最上部ハ其他ノ孰レノ部位ヨリモ強盛ニ反應ス可キ傾向ヲ有ス。

(a)

(b)

(c)

(d)

第 4 圖

成熟不妊家兎子宮 ↑ 塩化「アドレナリン」 0.00002 .

3) 鹽化「バリウム」

代表的滑平筋毒ニシテ、子宮ニ於テハ直接筋細胞ニ作用シテ其ノ收縮ヲ催進セシム。
(Kehrer,²⁾ Sugimoto,⁵⁾ Adler,⁸⁾ 長町,¹⁰⁾)。

今實驗成績ヲ表ヲ以テ示セバ次ノ如シ。(16例)

即チ a ハ 56,3%ニ於テ
b ハ 81,3%ニ於テ, c ハ
62,5%ニ於テ, d ハ 37,5
%ニ於テ, 其ノ他ノ孰レ
ヨリモ小ナラズ。又, a
ハ 75%ニ於テ, b ハ 37,
5%ニ於テ, c ハ 50%ニ
於テ, d ハ 87,5%ニ於
テ, 其ノ他ノ孰レヨリモ
大ナラズ。又,

第 13 表

狀 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ g 量	各 部 ノ 熟 較
成 熟 不 妊	0.0005	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.0008	$a \approx c \approx d > b$
〃	0.001	$b > c > a \approx d$
〃	0.001	$b > c > a \approx d$
〃	0.001	$b \approx c > a \approx d$
〃	0.001	$b \approx c > a \approx d$
〃	0.0015	$a \approx b > c \approx d$
〃	0.002	$b > a \approx c \approx d$
〃	0.002	$c > b > a \approx d$
妊 娠	0.003	$a > b \approx c > d$
〃	0.004	$a \approx b \approx c \approx d$
成 熟 不 妊	0.005	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.005	$b > d > a \approx c$
〃	0.005	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.005	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.01	$a \approx b \approx c > d$

第 14 表

	a	b	c	d
I	9	13	10	6
II	3	3	5	6
III	4	0	1	4
IV	0	0	0	0

a	b	c	d
53	61	57	50

依テ多數ノ場合ニ於テ, 家兎子宮ハ 0,0005—0,01 g ノ鹽化「バリウム」ニ對シ, 其ノ反

應度ノ差異ハ著シカラズトハ云へ、子宮角中央部、子宮角最下部、子宮角最上部及び子宮頸部中央ノ順位ヲ示スヲ肯定シ得可シ。

(a)

(b)

(c)

(d)

第 5 圖

成熟不妊家兎子宮 ↑ 鹽化「バリウム」0.001.

4) 抱水「クロラル」

子宮ニ對スル抱水「クロラル」ノ作用ハ岡本²⁰⁾ニヨレバ0.1乃至0.25抱水「クロラル」ノ爲メニ惹起サレタル摘出家兎子宮ノ運動抑制ハ、「カンフル」0.005乃至0.02ニヨリテ影響サル、事ナキモ、少量ノ(例令バ0.02)抱水「クロラル」ニ由ル抑制ニ對シ「カンフル」ハ子宮ノ運動裝置ヲ刺戟シテ其ノ收縮ヲ促ス、而シテ「カンフル」ノ子宮ニ於ケル作用點ハ恐ラク筋自己ニ存スルモノナラント云ヒ、早川²¹⁾ハ濃厚ナル抱水「クロラル」ニヨリテ麻痺セラレ一定量ノ塩化「バリウム」ヲ以テシテモ刺戟シ得ザル摘出家兎子宮ニ對シ「アドレナリン」ハ猶且緊張ヲ高メ拮抗作用ヲ表ハシ得ルモ、「コカイン」ノ拮抗作用ハ稀薄ナル抱水「クロラル」ニヨリテ作用セラレタル場合ニ於テノミ其作用ヲ表ハスニ止マリ筋肉ノ著シキ麻痺ヲ來サザル以前ニ於テ其作用ヲ停止セラル、而シテ「コカイン」ニヨリテ惹起セラレタル興奮ハ抱水「クロラル」ニヨリテ容易ニ抑制セラレ、「アドレナリン」ニヨリテ來ル興奮ハ比較的強ク抱水「クロラル」ニ拮抗スト述べタリ。

今實驗成績ニ據リ抱水「クロラル」ノ麻痺作用ノ大小ヲ表示スレバ次ノ如シ。(7例)

即チ a ハ 42.9%ニ

第 15 表

於テ、b ハ 14.3%ニ於

テ、c ハ 42.9%ニ於テ、

d ハ 57.1%ニ於テ 其他

ノ孰レヨリモ小ナラズ。

又、a ハ 42.9%ニ於テ b

ハ 57.1%ニ於テ、c ハ 4

2.9%ニ於テ、d ハ 57.1

狀 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ g 量	各 部 ノ 比 較
妊 娠	0.1	$a \approx b \approx c \approx d$
ク	0.1	$d > c > a > b$
ク	0.15	$d \approx c > b \approx a$
成熟不妊	0.15	$a > b > c \approx d$
産 褥	0.2	$c > b > a > d$
成熟不妊	0.2	$a > b \approx c \approx d$
ク	0.2	$d > b > c > a$

%ニ於テ、其他ノ孰レヨリモ大ナラズ。又、

第 16 表

	a	b	c	d
I	3	1	3	4
II	1	5	2	1
III	2	0	2	1
IV	1	1	0	1

a	b	c	d
20	20	22	22

依テ 0.1 乃至 0.2 g 抱水「クロラール」ニ對シテ家兎子宮各部ハ種々ナル反應ヲ示スモ
各例ノ總和ニ於テ考察スル時ハ路ホ同様ナル反應ヲ呈スルモノナル可シ。

(a)

(c)

(b)

(d)

第 6 圖

妊娠家兎子宮 ↑抱水「クロラール」0.1.

5) 鹽化「マグネシウム」

鹽化「マグネシウム」ノ子宮ニ對スル作用ハ未ダ闡明ノ境ニ達シタリト云フ可カラズト
雖モ, $T_{0.22}$) ハ摘出家兎子宮ニ於テ, 0.1% 鹽化「マグネシウム」ハ漸時運動ヲ緩漫ナラシメ
緊張ヲ稍々低下セシム, 而シテ 0.3 乃至 0.5 %ニ於テハ直チニ緊張降下運動抑制ヲ認ムト云
ヘリ, 余ノ實驗ニ於テ
モ 常ニ子宮運動ヲ抑制
スルヲ認メ得タリ,

今, 實驗成績ヲ表ヲ
以テ示セバ次ノ如シ.
(10 例)

第 17 表

狀 態	營養液 100 ccm 中ニ 於ケル藥物ノ量	各 部 ノ 比 較
成 熟 不 妊	0.03	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.03	$a \approx b \approx c > d$
産 褥	0.03	$a > b \approx c \approx d$
成 熟 不 妊	0.05	$d > a \approx b \approx c$
産 褥	0.05	$c > b > a \approx d$
妊 娠	0.05	$a \approx b \approx c \approx d$
成 熟 不 妊	0.1	$a \approx b \approx c \approx d$
未 成 熟	0.1	$a \approx b \approx c \approx d$
成 熟 不 妊	0.1	$a \approx b \approx c \approx d$
〃	0.2	$a \approx b \approx c \approx d$

即チ a ハ 80%ニ於テ, b ハ 70%ニ於テ, c ハ 80%ニ於テ, d ハ 70%ニ於テ其他ノ孰レヨリモ小ナラズ. 又, a ハ 80%ニ於テ, b ハ 80%ニ於テ, c ハ 80%ニ於テ, d ハ 90%ニ於テ其他ノ孰レヨリモ大ナラズ. 又,

第 18 表

	a	b	c	d
I	8	7	8	7
II	1	3	2	2
III	1	0	0	1
IV	0	0	0	0

a	b	c	d
37	37	38	36

依而鹽化「マグネシウム」0.03 乃至 0.2 g ニ對シテ多數ノ場合家兎子宮各部ハ畧ボ同様ノ反應ヲ示ス.

(a)

(b)

(c)

(d)

第 7 圖

成熟不妊家兎子宮 ↑ 鹽化「マグネシウム」0.1.

總 括 並 ニ 考 察

- 1) 摘出家兎子宮ノ自發運動ハ、多數ノ場合ニ於テ、子宮角最上部最モ旺盛ニ、漸次、子宮角中央部、子宮角最下部、子宮頸部中央ノ順位ヲ以テ之ニ次グ。
- 2) 摘出家兎子宮角ハ一般ニ子宮頸部ニ比シテ規則正シキ曲線ヲ示ス。
- 3) 鹽酸「ピロカルピン」ノ一定量ハ摘出家兎子宮ニ對シ、多數ノ場合、子宮角最上部、子宮角中央部、子宮角最下部并ニ子宮頸部中央ノ順序ヲ以テ反應ス。
- 4) 鹽化「アドレナリン」ノ一定量ニ於テ催進作用ノミヲ示ス場合、子宮角最上部稍々強ク、子宮角中央部、子宮角最下部及ビ子宮頸部中央之ニ次グ。「アドレナリン」ノ摘出家兎子宮ニ對スル作用ハ從來一般ニ催進的ナリトセラレ唯僅ニ *Falta u. Fleming* ガ其不妊ナルモノニ於テ時ニ催進シ時ニ抑制スト述ブル所ナルモ、本實驗ニヨリ家兎子宮ノ妊、不妊、ニ關セズ時トシテ初メ抑制シ、後ニ催進スル事アルヲ確認シ得タリ。而シテ該抑制ハ子宮角最上部ノミニ現ハル、事多ク、時ニ子宮角中央部、稀ニ子宮角最下部ニ至ル迄之ヲ認ムルモ、子宮頸部中央ニ於テハ抑制セラル、事ナシ。且其抑制度ハ常ニ子宮角最上部、子宮角中央部、子宮角最下部ノ順位ヲ以テ現ル。
- 5) 鹽化「バリウム」ノ一定量ハ多數ノ場合、子宮角中央部ニ於テ最モ強ク、次デ子宮角最下部、子宮角最上部、子宮頸部中央ノ順位ヲ以テ反應ス。
- 6) 抱水「クロラール」ノ一定量ハ普遍的ニ多岐ナル反應ヲ示シ各部ノ優劣ヲ定ムルヲ得ズ。
- 7) 鹽化「マグネシウム」ノ一定量ハ多數ノ場合、各部ニ於テ略ボ同様ノ反應ヲ示ス。
- 8) 以上述べ來タリタル所ニヨリ、各部ニ於ケル差異ハ互ニ僅小ナルモノナリトハ云ヘ之レヲ綜合シ考按スル事ニヨリ次ノ假說ヲ想像シ得可シ。

イ) 家兎子宮筋層殊ニ外筋層ニ於ケル交感系并ニ副交感系ノ終末裝置ハ、多數ノ場合ニ於テ、子宮角最上部ハ他ノ部ヨリモ興奮性ニ於テ優ルカ、又ハ同一興奮性ヲ有スルモノトセバ其ノ量ニ於テ優レルモノナル可シ。

ロ) 家兎子宮筋層殊ニ外筋層ニ於ケル筋細胞數ハ、其ノ組成并ニ大サニ於テ同一ノモノナリトセバ、多數ノ場合ニ於テ、子宮角中央部、子宮角最下部、子宮角最上部、子宮頸部中央ノ順序ヲ以テ其ノ筋細胞數ニ大小アル事ヲ示スモノナラン。

引用書目

- 1) *Shinagawa*, 近日 *Folia Anatom. Jap.* ニ掲載ノ答
- 2) *Kehrer*, *Arch. f. Gyn.*, Bd. 81, S. 160, 1907.
- 3) *Ogata*, *Journ. of pharm. a. exp. therap.*, Vol. 18, P. 185, 1921.
- 4) 岡 本; 京都醫學雜誌, 第15卷, 第2號, 第88頁, 大正7年.
- 5) *Sugimoto*, *Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, Bd. 74, S. 27, 1913.
- 6) *Harnack u. Meyer*, ebenda Bd. 12, S. 366, 1880.
- 7) *Cushny*, *Journ. of phys.* Vol. 35, P. 1, 1906—7.
- 8) *Adler*, *Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, Bd. 83, S. 248, 1918.
- 9) 原, 近畿婦人科學會報, 第6號, 第188頁, 大正7年.
- 10) *Okamoto*, *Act. Schol. Med. Univ. Imp. in kioto*. Vol. 2, Fasc. 3, S. 307, 1918.
- 11) 長 町, 京都醫學雜誌, 第18卷, 第8. 9號, 第76頁, 大正10年.
- 12) *Kuridinowsky*, *Arch. f. Gyn.*, Bd. 73, S. 435, 1904.
- 13) *Kuridinowsky*, ebenda Bd. 78, S. 539, 1906.
- 14) *Dahl*, *Journ. of phys.*, Vol. 34, P. 187. 1906.
- 15) *Hochwart u. Fröhlich*, *Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, Bd. 63, S. 347, 1910.
- 16) *Falta u. Fleming*, *Münch. M. W.* Nr. 50, S. 2649, 1911.
- 17) *Rübsamen u. Kligermann*, *Zeitschr. f. Geb. u. Gyn.* Bd. 72, S. 272, 1912.
- 18) *Hilz*, *Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, Bd. 94, S. 129, 1922.
- 19) *A. Holte*, ebenda Bd. 101, S. 48, 1924.
- 20) 岡 本, 近畿婦人科學會報, 第5號, 第163頁, 大正6年.
- 21) 早 川, 京都醫學雜誌, 第21卷, 第4號, 第94頁, 大正13年.
- 22) *To*, *Act. Schol. Med. Univ. Imp. in Kioto*, Vol. 3, S. 441, 1920.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Kaiserlichen Universität zu Kyoto.

(Prof. Dr. K. Morishima.)

Es ist nicht schwer zu vermuten, dass das sogenannte oligodynamische Wasser, welches als allgemeines Zellgift gilt, auch auf die roten Blutkörperchen seine Schädlichkeit erstrecken, was dann wohl zur Hämolyse führt. Die Versuche des Verfassers wurden an 5%iger Erythrocytenaufschwemmung des Kaninchens, des Meerschweinchens, des Huhns und der Kröte in physiologischer Kochsalzlösung angestellt. Resultate:

1. Auf das Kaninchenblut übt das Kupfer oligodynamisch eine sehr starke hämolytische Wirkung aus, dagegen Silber und Eisen eine kaum erkennbare.
2. Durch Kupfer werden am stärksten die Kaninchen-, etwas schwächer die Meerschweinchen-, nur gering die Hühner- und kaum die Kröten-Erythrocyten hämolysiert.
3. Die Stärke der hämolytischen Wirkung ist der Grösse der Oberfläche des verwendeten Metalls proportional. Eine höhere Temperatur begünstigt das Auftreten der oligodynamischen Wirkung. Je länger das Metallstückchen mit dem Wasser in Berührung gewesen ist, desto stärker die Wirkung. Doch wird durch 8-tägiges Eintauchen die Maximalwirkung erreicht.
4. Durch Zuleitung von CO₂-freier Luft wird die hämolytische Wirkung etwas gehemmt, durch Sauerstoffzuleitung noch stärker und durch CO₂ auffallend verstärkt.

Vergleichende Untersuchung ueber die spontane Bewegung und die Wirkung der Pharmaka an verschiedenen Teilen des ausgeschnittenen Kaninchenuterus.

Von

Dr. Minoru Shinagawa.

Aus dem Pharmakolog. Institut der Kaiserl. Universität Kyoto.

(Prof. Dr. K. Morishima.)

Als Versuchsobjekte dienten je 1 cm lange Stücke Kaninchenuterus, welche aus dem obersten (A), dem mittleren (B) und dem untersten Teile (C) des Horns sowie aus dem mittleren Teile vom Cervix (D) hergestellt wurden. Es wurde beobachtet einerseits die spontane Bewegung, andererseits die Wirkung verschiedener Pharmaka auf dieselbe.

Stärke der spontanen Bewegung zeigte in den meisten Fällen folgende Reihenfolge: A, B, C, D. Das Horn gab im allgemeinen eine regelmässige Kurve als der Cervix.

Der Wirkungsgrad der Pharmaka auf die einzelnen Teile war etwa folgender:

Erregung durch Pilocarp. HCl: $A > B > C = D$.

Erregung durch Adrenalin. HCl: $A > B \approx D \approx C$.

Hemmung durch Adrenalin. HCl (in Fällen, wo vorübergehende Hemmung beobachtet wurde): $A > B > C$.

Erregung durch BaCl: $B > C > A > D$.

Hemmung durch Chloalhydrat: $A \approx B \approx C \approx D$.

Hemmung durch MgCl₂: $A \approx B \approx C \approx D$.

Man sieht daraus, dass die nervöse Erregung, sympathische wie parasympathische, am oberen Teile des Horns stark auftritt, dagegen die muskuläre an mittleren Teile. Unter den hemmenden Fällen trifft echte Lähmung durch Chloral und Magnesium gleichmässig alle 4 Teile, dagegen die Hemmung durch Sympathicuserregung (Adrenalin) stärker den obersten Teil. Man könnte somit wohl sagen, dass die nervöse Versorgung am oberen Teil und die Muskelentwicklung am mittleren Teil des Horns stärker ist als an den anderen Teilen. (Autoreferat.)

Ueber die Blutdruckwirkung des Adrenalins.

Von

Dr. Masaharu Ogawa.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Kaiserlichen Universität Kyoto.

(Prof. Dr. Y. Ozaki.)

Folgendes sind die Hauptergebnisse aus Verfassers Untersuchungen an Kaninchen: Adrenalin-hydrochlorid (z. B. 0,01 mg pro Kilo), in das Blut eingespritzt, verur-