Esmarch 驅血帶緊縛に関する實驗的研究

第 I 報告

驅血帶緊縛の生體に及ぼす影響並に緊縛後肢 灌流液の藥理學的作用に就て

醫學士 慎 兌 範

(京城帝國大學醫學部藥理學教室〔大澤教授〕)

(昭和十七年八月十五日受付〔特〕)

目 次

I. 緒 論 II. 家兎に對する <i>Esmarch</i> 驅血帶緊縛の影響 A 小 序 B 實驗方法 1. 實驗材料 2. 緊縛方法 3. 諸種検査術式 C 實驗成績 1. 緊縛條件と緊縛家兎の轉歸との關係 2. 血壓に及ぼす影響 3. 血糖量に及ぼす影響 4. 血液凝固時間に及ぼす影響 5. 赤血球數に及ぼす影響 6. 血色素量に及ぼす影響 7. 白血球に及ぼす影響 D 本章の小括 III. 藝に對する <i>Esmarch</i> 驅血帶緊縛の影響 特に其の緊縛組織を灌流せる液の藥理學的作用に就て A 小 序 B 實驗方法 1. 實驗材料 2. 緊縛並に灌流方法 C 實驗成績 1. 緊縛時間と緊縛藝の轉歸との關係 2. 緊縛藝の血液所見に就て	3. 灌流液の二三の性状に就て 4. 灌流液の循環器系統に及ぼす影響 a 血壓に對する作用 b 藝剔出心臟に對する作用 c 血管に對する作用 i 家兎耳殻血管に對する作用 ii 家兎冠狀血管に對する作用 iii 藝肺臟血管に對する作用 iv 藝腸間膜血管に對する作用 v 藝後肢血管に對する作用 d 灌流液の藝腎臟血管並に腎分泌に及ぼす影響 5. 灌流液の平滑筋臟器に及ぼす影響 a 剔出家兎腸管に對する作用 b 剔出家兎子宮に對する作用 c 剔出藝腸管に對する作用 d 剔出藝膀胱に對する作用 6. 種々なる要約の下に於ける灌流液の能動性の變化に就て a 加熱した場合 b 吸着劑を以て處置した場合 c 動物膜に對する透析狀態 7. 灌流液適用によりて生ずる家兎に於ける諸種變化に就て

a 血壓に及ぼす影響	e 白血球に及ぼす影響
b 血糖量に及ぼす影響	D 本章の小括
c 血液凝固時間に及ぼす影響	IV 總括並に考按
d 赤血球數及び血色素量に及ぼす影響	V 結 論
	引用書目

I. 緒 論

1873年 *F. Esmarch*¹⁾ が四肢の出血に對する止血處置として、ゴム管を以て四肢の基部を緊縛することを提唱して以來、之は *Esmarch* 驅血帶として知られ、一般外科醫によつて四肢切斷術の際の止血前處置として、或ひは傷害時の救急處置として廣く實用に供せられるに至つた。而て本處置實施に當つては緊縛局所組織に強度の壓迫を與へ、且つ緊縛末梢組織に著明な血流阻止を招來するので、比較的長時間に亙つて緊縛を施す時には、之等によつて局所の障碍、即ち神經麻痺、血栓形成、或ひは組織壞死等が惹起せられ、之による危險性に關しては、夙に多くの注意が拂はれて來た。然るに最近に至つて、*朴永勳*²⁾、*竹重*³⁾等は臨牀上の觀察から緊縛處置の局所に及ぼす變化と共に、緊縛解除後に著明な全身症狀が惹起せられることを認め、之を詳細に報告して其の重要性を強調した。而て此の全身症狀の主要徴候である體溫及び血壓の下降、呼吸の淺薄、脈搏の微弱促進等の症狀群は、既に古くから知られてゐる外傷性ショック症狀と符合し、しかも *Turk*⁴⁾、*廣瀬*⁵⁾、*山岡*⁶⁾、*伊藤*⁷⁾等の諸氏によつて、試みられた。驅血帶緊縛による實驗的外傷性ショックとも一致してゐることを知り得た。

抑々ショックに關しては古くから *Guthrie*⁸⁾、*Quénu*⁹⁾、*Kohlhaas*¹⁰⁾、*Siegmund*¹¹⁾、*Cowell*¹²⁾、*Guyot* u. *Jennenev*、*Crile*¹⁴⁾等の多數先進諸家の研究によつて、神經性ショック、外傷性ショック、中毒性ショック、及び過敏性ショック等到大別せられ、就中、外傷性ショックに關しては特に多數の傷害患者の發生を経験した第一次世界大戰以來、臨牀的に實驗的に詳細に研究せられ、其の業績は枚舉に遍なき状態である。即ち文献によると、外傷性ショックは1612年 *Peter Lowe*¹⁵⁾により銃創後に襲來する一定の症狀群に對して初めて命名せられたもので爾來 *James Latta*¹⁶⁾、*Piechaud*¹⁷⁾、*Pirogoff*、*v. Baldleben*、*Wieting*¹⁸⁾等によつて外傷性ショックに對する概念は後述の如く略々確立せられるに至つた。即ち一般に外傷性ショックとは、受傷後一定の時間を経過した後に、其の創傷からの出血、栓塞及び炎症等の實質的障害とは無關係に、全生體器官の機能不全即ち血壓降下、體溫低下、呼吸淺薄、心臟搏動の微弱促進等を招來し、重篤な場合に於いては死の轉歸を免れないもので、特異な點は全經過を通じて意識の濁濁を來さないことであると。斯の如く外傷性ショックの症狀に關しては、既に一定の見解が樹立せられてゐるが、之の本態に關しては猶多くの見解が主張せら

れ、諸説紛々として未だ歸一する處を知らない状態である。以下先進の所説を挙げ簡単に其の概要を述べようと思ふ。

Erlenmeyer, Savory ¹⁹⁾ は精神障碍による心臓麻痺に歸因すると稱し *Mummery* ²⁰⁾, *Hügelmann* ²¹⁾, *Erlanger* ²²⁾, *Wieting* ¹⁸⁾, *Guyot* u. *Janneney* ¹³⁾, *Atipov* ²³⁾ は神經中樞の衰頹によると唱へた。*Goltz* ²⁴⁾, *Mann* ²⁵⁾, *Cannon* ²⁶⁾, *Cowell* ¹²⁾, *Schenk* ²⁷⁾, *Malcolm* ²⁸⁾, *Fischer* ²⁹⁾, *Bueno* ³⁰⁾, *Schneider*, *Haerber* は末梢血管の麻痺によると論じ、*Henderson* ³¹⁾, *Crile* ¹⁴⁾, *Ewald* ³²⁾, *Kohlhaas* ¹⁰⁾ は血中の二酸化炭素含有量の減少に重點を置く所謂アカブニア説を *Bergmann* ³³⁾, *Porter* ³⁴⁾, *Siegmund* ¹¹⁾, *Beitzke*, *Gaendahl*, *Locke*, *Sutton* ³⁵⁾ 等は血栓説を唱道した。*Bainbridge*, *Treman*, *Belford*, *Cannon* ²⁶⁾, *Elliot*, *Jackson*, *Corbett* は副腎機能の消長と密接な關係があると稱し、*Wright* ³⁶⁾, *Walter* は亦アチドーシス説を主張す。其の後 *Mautner* ³⁷⁾, *Pick*, *Quénu* ⁹⁾, *Bayliss* ³⁸⁾, *Cannon* ²⁶⁾, *Delbet* ³⁹⁾, *Duval*, *Grigant*, *Leisterri*, *Puoluci*, *Valee*, *Bazy*, *Turk* ⁴⁾, *Naegeli* ⁴⁰⁾, *Lissowskaja*, *Lexer* ⁴¹⁾, *Keysser*, *Praxedes*, *Mc Cartney* 等は受傷組織に產生せられる蛋白質分解産物に依る中毒説を唱へ、特に *Bayliss*, *Cannon*, *Dale* ⁴²⁾, *Laidlaw*, *Richard* ⁴⁴⁾, *Pichardt*, *Abel-Kubota* ⁴⁸⁾, 三藤は Histamin による中毒であると謂ひ *Schmidt* ⁴⁶⁾, *Mühlheim*, *Fano* ⁴⁷⁾, 三田 ⁴⁹⁾, 伊藤 ⁷⁾, 上杉 ⁵⁰⁾ は Pepton による中毒であると主張してゐる。以上の所説を綜合検討すると蛋白質分解産物による中毒説最も優勢であつて、現在に於いては殆んど之に異説がない迄に到つてゐる。併し一步進んで、之が如何なる蛋白質分解産物であるかと云ふ點に關しては未だ定説がなく、Hitamin が夫であると謂ひ、或ひはそうでなくて前述のように Pepton が夫であると爲し、全く混沌たる状態を脱し得ないと云ふも過言でない。

曩に本教室に於いて諸種原因によるショック死の機轉並びに本態を闡明しようとして動物に實驗的にショック症状を惹起させるような處置を施して、之により直接に死の轉歸を招來する因子と目せられる物質を捕捉しようと企てた。即ち三浦 ⁵¹⁾ 安野は熱傷により、島田 ⁵²⁾ は凍傷により、夫々惹起せられるショックに關して實驗的研究を行ひ、以上の處置によつて招來せられるショック症状は、すべて障碍局所組織に於いて產生せられる一定の能動性物質の吸収による中毒症状であることを明白にし、且つ之は獨り前述の熱傷及び凍傷によつてのみでなく、安野、上原 ⁵³⁾ によれば、動物組織が濃厚な酸及び Alkali 等の腐蝕毒によつて障碍せられる場合、或ひは又、劉相奎 ⁵⁴⁾ 中橋 ⁵⁵⁾ によれば、組織が Röntgen 線紫外線によつて照射せられる場合にも、同様に障碍組織中に一定の能動性物質が產生せられることが闡明せられ、大澤教授は斯のように組織蛋白の崩潰によつて、產生せられた本能動性物質を Histotoxin と命名し、之は藥理學的性質及び二三理學的性質に於いて Histamin, Histidin, Pepton 等と全く異なるものであることを明にして、之がショック毒として重要な意義を有することを確認せられた。之によつて從來不明の域を脱し得なかつた、前記障碍の由來する處を闡明ならしめることを得た。

茲に於いて余は *Esmarch* 驅血帶緊縛が生體に 著明な變化を招來し、併も之が臨牀的に ショック症狀と一致することに鑑みて、動物に實驗的に驅血帶緊縛を施し、以て該動物に惹起せられる諸種變化を觀察し、進んで此等ショック症狀の本態を究明し、併せて之が本教室に於いてショック毒として重要な意義を有するものであると確認せられた *Histotoxin* と如何なる關係にあるかを窺知しようとして、下記の實驗を企て、若干の成績を得たので其の概要を報告する次第である。但し本論文の 要旨は昭和 15 年度日本藥理學總會に 於いて報告した。

II. 家兎に對する *Esmarch* 驅血帶緊縛の影響

A. 小 序

前述の如く *Turk.* 山岡、廣瀬、三藤、朴永勳、竹重等によると *Esmarch* 驅血帶緊縛を施せば緊縛せられた生體に、一定の變化を惹起せしめ得ることが明かであるので、余は先づ實驗動物として家兎を選んで *Esmarch* 驅血帶緊縛を施しその影響を觀察した。

B. 實 驗 方 法

1. 實 驗 材 料

實驗動物としては體重 2 kg 内外の白色家兎を用ひ、實驗の經過中は勿論、實驗の前後共に一般實驗動物取扱上の諸注意を嚴守した。

Esmarch 驅血帶としては、市販 6—8 號彈性ゴム管を使用し、常時此の弾性の保持に留意した。

其他各種の操作に際して使用した器具、藥品等に就いては夫々當該項目に於いて記載することにした。

2. 緊 縛 方 法

驅血帶緊縛を實施するには、緊縛側の臀部より大腿部に互つて、體毛を剪除した後に、該側の腸骨前上棘状突起と坐骨結節を據點として、伸展したゴム管を後肢根部に纏絡する。此の緊縛の強度は股動脈の脈搏消失を指標とする。此のようにすると緊縛末梢部への血流は完全に遮斷せられ、且つ所要時間中驅血帶の逸脱することもなく、緊縛は完全に繼續せられる。

緊縛時間は緊縛による動物の豫後及び觀察の便宜上から、一側後肢だけを 3 時間緊縛して解除後漸次處置前の状態に復する回復群と、兩側後肢を共に 3 時間緊縛して解除後間もなく斃死する斃死群の二者に分けて觀察した。以下單に前者を回復群、後者を斃死群と略稱することにする。

3. 諸 種 檢 査 術 式

血壓測定法：觀血的測定には型の如く一側總頸動脈に *Kanüle* を挿入し、之を水銀 *Manometer* に連結し、此の運動を *Kymographion* 煤紙上に描畫させ以て血壓曲線とした。非觀血的測定には、福田⁵⁹⁾

川口氏の考案になる血壓測定器を用ひ、中島⁵⁷⁾姜大元⁵⁸⁾の方法に倣つて耳殻端に1—2滴の Xylol を塗布することに依り耳殻中心動脈を擴張位に保持し、以て其の血壓を測定した。此の非觀血的血壓測定法に關しては、第二報告の血壓測定法の項に於いて更に詳細に記述しようと思ふ。

血糖量測定法：Hagedorn-Jensen 氏法に倣ひ、空腹時に於て、耳緣靜脈より採血し、此の血液の含有する血糖量を測定した。

血液凝固時間測定法：佐藤式血液凝固時間測定装置を用ひて、耳緣靜脈より採取した一定量の血液の25℃に保たれてゐる恒温空間内に於ける凝固に要する時間を觀察し以て其の凝固時間となした。

血液像：赤血球數及び白血球數の多少は耳緣靜脈の穿刺によつて自然に流出する血液を採取し、Thoma-Zeiss の血球計算板により算出した。血色素量は Sahli 氏血色素計を用ひて比色により測定し Sahli 値により表した。白血球の分類は同じく耳緣靜脈より採取した血液の塗抹標本を作製し、之を Giemsa 液で染色した後、鏡檢算出し百分率を以て表した。

C. 實驗成績

1. 緊縛條件と緊縛家兎の轉歸との關係

先づ緊縛の條件の變化が、緊縛家兎に異る變化を及ぼすかどうかを明かにしようとして、緊縛の時間及び部位と緊縛家兎の轉歸との關係を検した。第1表に示すように緊縛時間が長い程、部位が廣い程、解除後により多く死の轉歸を取るに至る。而て緊縛したまゝ解除せずに放置すると、解除後當然死亡すべき時間の數倍に及んでも、尙能く生命を保持する。即ち一側のみの場合は、緊縛時間が6h 以上に及んで初めて解除後死亡するに反して、

第1表. 緊縛家兎の轉歸.

番號	體 重 (g)	部位	時間	轉歸	生存 時間	番號	體 重 (g)	部位	時間	轉歸	生存 時間
1	2 200	1 側	緊縛	死	128	19	2 600	兩側	緊縛	死	45
2	2 100	"	縛放置	"	204	20	2 450	"	縛放置	"	57
3	2 400	"		"	108	21	2 300	"		"	62
4	2 400	"	2	生		22	2 100	"	2	生	
5	2 400	"	"	"		23	2 300	"	"	死	14
6	2 700	"	"	"		24	2 600	"	"	生	
7	2 350	"	3	生		25	1 950	"	3	死	12
8	2 100	"	"	"		26	2 600	"	"	"	8
9	2 500	"	"	"		27	2 100	"	"	"	18
10	2 600	"	4	生		28	2 300	"	4	死	23
11	2 300	"	"	"		29	2 100	"	"	"	12
12	1 950	"	"	"		30	2 500	"	6	死	13
13	2 300	"	6	死	24	31	2 100	"	"	"	16
14	2 200	"	"	"	34						
15	2 100	"	"	"	20						

兩側の場合は緊縛時間が3時間以上に及ぶとすべて死亡する。而て緊縛したまゝ解除せずに放置すれば、兩側の場合は45—62^h 一側の場合は優に128—204^h に涉つて生存する。之は緊縛の時間及び緊縛下組織の容積が大なれば大なる程、多量に能動性物質が產生せられ然かも緊縛が解除せられ血流が回復せられるに及んで初めて全身の血流に入り、中毒死を招來することを示唆してゐるものと思惟する。

2. 血壓に及ぼす影響

驅血帶緊縛によつて招來せられるショック症状の中、最も重要な症状である血壓の下降に就き先づ觀察した。第一に長期に亙る觀察に 便利な非觀血的測定法によつて之を觀ると、回復群は第2表に示すように緊縛中は却つて4—16 mm Hg 上昇するが、解除後は漸次下降し3^h に及べば最低値に達し、處置前より30—38 mm Hg 下降する。而て回復群は爾後漸次上昇を始め12—24^h で略々處置前の値に復する。

斃死群は第3表に示すように緊縛中は前者と同様6—14 mm Hg 上昇するが、解除後は漸次下降し1.5—3^h で最低値に及び60 mm Hg 以下となり、遂に非觀血的測定法を以ては測定不可能の程度に血壓は下降し、之から回復することなく斃死するに至る。因つて斃死群の解除後の血壓の下降状態を正確に觀察しようとして、觀血的血壓測定法によつて觀察

第2表. 血壓に及ぼす影響 (回復群).

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0.5h	1.5h	3h	6h	12h	24h
28	2450	92	98	94	98	84	72	62	84	94	102
29	2200	94	102	94	84	72	68	62	76	84	98
30	2300	102	104	104	112	92	88	64	76	106	104
31	2400	104	98	106	108	88	82	74	88	98	102
32	2700	94	100	102	104	86	78	76	92	100	102

第3表. 血壓に及ぼす影響 (斃死群).

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0.5h	1.5h	3h	6h	12h	24h
21	2150	102	100	102	102	78	70	68	測定不能	8 ^h 後 死 亡	18 ^h 後 死 亡
22	2000	92	98	102	100	78	68	64	”	”	
24	2200	94	100	106	104	64	60	測定不能	”	10 ^h 後 死 亡	
25	2250	92	90	98	92	68	62	”	”	9 ^h 後 死 亡	
26	2400	98	102	108	106	74	78	66	”	”	

すると第1圖のように血壓は時間の経過と共に階段的に下降し、遂に斃死するに至つた。

即ちショックに際して臨牀的に觀察せられる血壓の著明な下降は實驗的に緊縛家兎に於ても觀察することを得た。

第1圖. 緊縛家兎の血壓.

3. 血糖量に及ぼす影響

外傷と之に伴ふ過血糖とが密接な關係を有することは周知の事實であるので、緊縛が家兎血糖量に對して、如何なる影響を與へるかを觀察した。

回復群は第4表に示すように緊縛初期に於ては、殆んど變動が認められず、緊縛3^h目に16—42 mg/dl 増量するに過ぎないが、解除後は漸次増量し3—6^hに最高値に達し處置前

第4表. 血糖量に及ぼす影響 (回復群). (mg/dl)

家番 兎號	體重 (g)	緊縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
28	2450	106	108	115	138	165	222	247	210	132	108
29	2200	104	106	119	141	173	190	211	211	184	97
30	2300	90	97	111	132	186	222	199	260	136	102
31	2400	127	129	132	143	157	173	243	172	113	110
32	2750	117	117	122	159	209	230	209	373	193	129

第5表. 血糖量に及ぼす影響 (斃死群). (mg/dl)

家番 兎號	體重 (g)	緊縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
21	2150	111	106	125	152	175	215	333	採血不能	8 ^h 後 死 亡	18 ^h 後 死 亡
22	2000	93	99	120	148	188	253	308	373	採血不能	
24	2200	104	108	131	139		186	215	238	10 ^h 後 死 亡	
25	2250	108	115	124	148	228	323	採血不能	採血不能	9 ^h 後 死 亡	
26	2400	127	122	127	143	197	236	350	採血不能	採血不能	

の2—3倍に及び、爾後漸減し、24^hには略々舊値に復する。

斃死群は第5表に示すように緊縛中は前者と大差はないが、解除後は急激に増量し、3^hに三倍強に達し、此の状態を繼續したまゝ遂に斃死する。

即ち驅血帶緊縛により、緊縛家兎に顯著な過血糖が惹起せられることを知り得た。

4. 血液凝固時間に及ぼす影響

緊縛家兎の血液凝固性の變動を検した處、第6, 7, 表に示すように緊縛中僅かに1—2^m短縮せられるのみで、健常無處置家兎の血液凝固時間8—11^mに比して大差がない。然るに緊縛解除後は著明に短縮せられ3^h目に約1/3に達し回復群は爾後漸次回復し、斃死群は斯のような短縮状態を繼續して斃死する。即ち緊縛家兎の血液は特に其の解除後に於いて著明な凝固性の昂進を招來する。

第6表. 血液凝固時間に及ぼす影響 (回復群). (m)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
28	2450	10	9	9	9	5	4	4	6	8	11
29	2200	9	9	8	8	5	3	3	6	7	10
30	2300	11	10	10	9	6	5	4	7	9	10
31	2400	8	8	8	8	4	3	4	5	8	8
32	2700	9	8	8	8	5	4	3	4	9	8

第7表. 血液凝固時間に及ぼす影響 (斃死群). (m)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
21	2150	11	10	9	9	6	4	3	採血不能	8 ^h 後 死 亡	18 ^h 後 死 亡
22	2000	9	9	8	8	5	4	4	”	採血不能	
24	2200	9	8	8	8	6	3	3	”	10 ^h 後 死 亡	
25	2250	10	9	9	8	6	4	採血不能	”	9 ^h 後 死 亡	
26	2400	9	9	9	8	5	4	3	”	採血不能	

5. 家兎赤血球に及ぼす影響

緊縛の家兎血液像に及ぼす影響を窺はうとして、先づ赤血球數の變動を觀察した。第8, 9表に示すように兩群共に緊縛中は著變なく、回復群は解除後漸次増加して128—363萬増となつて最高値を示し、爾後漸減して舊値に復し、斃死群は最高値151—233萬増となり、

此の増加狀態を繼續したまゝ斃死する。

即ち赤血球數は緊縛中は著變を示さないが、解除後は著明に増加することを知り得た。

第8表. 赤血球數に及ぼす影響 (回復群). (萬)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
2	2150	585	618	617	635	662	665	713	580	568	579
6	2200	637	617	626	677	678	736	793	696	599	647
8	1800	518	541	529	581	602	704	714	645	632	533
10	2350	483	493	534	536	662	707	846	767	648	503
12	2650	517	567	589	556	687	685	738	691	639	629

第9表. 赤血球數に及ぼす影響 (斃死群). (萬)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
1	1950	669	719	691	609	828	857	902	869	9h後 死 亡	15h後 死 亡
3	3000	542	576	639	586	684	754	687	653	探血不能	
4	2200	602	679	692	693	694	648	679	753	10h後 死 亡	
7	1950	514	507	568	542	676	737	探血不能	6h後 死 亡		16h後 死 亡
14	2100	558	545	540	584	697	725	756	探血不能	探血不能	

6. 血色素量に及ぼす影響

血色素量は第10, 11表に示すように、回復群、斃死群共に全く赤血球數の増加と並行して増量する。

即ち緊縛によつて、家兎血色素量は赤血球と同じく増量することを知り得た。

第10表. 血色素量に及ぼす影響 (回復群). (%)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
2	2150	76	79	76	79	86	86	95	89	86	78
6	2200	76	77	77	72	84	85	93	94	79	77
8	1800	71	73	71	78	85	92	93	90	85	74
10	2360	76	77	83	82	84	101	99	101	94	89
12	2650	79	84	86	83	101	101	103	98	94	88

第 11 表. 血色素量に及ぼす影響 (斃死群). (%)

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
1	1950	82	82	83	82	93	96	106	105	9h後 死 亡	15h後 死 亡
3	3000	79	75	77	84	86	103	102	98	採血不能	
4	2200	76	81	80	89	93	98	104	101	10h後 死 亡	
7	1950	77	78	86	87	97	108	採血不能	6h後 死 亡		16h後 死 亡
14	2100	82	81	84	93	96	94	96	採血不能	採血不能	

7. 家兎白血球に及ぼす影響

白血球数は第 12, 13 表に示すように, 兩群共に緊縛中には著變なく, 解除後漸次増加して 3h 目前後に 3—5 倍に及んで最高値を示し, 回復群は爾後漸減して舊値に復し, 斃死群は斯の如き白血球増多症を保持したまゝ斃死する. 而て斯のような白血球増多症は第 14, 15 表に示すように, 共に假性エオジン嗜好性多核白血球の増加を主とするもので, 他の種類の白血球には著變を認めない.

第 12 表. 白血球數に及ぼす影響 (回復群).

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
2	2150	6 800	6 200	8 000	9 400	8 200	12 400	15 600	10 800	9 200	9 400
6	2200	6 200	7 800	7 600	8 200	12 400	14 400	18 400	13 400	11 000	7 000
8	1800	6 400	8 200	8 200	9 800	9 800	17 400	19 600	10 200	7 600	6 200
10	2350	7 400	8 800	9 000	9 400	10 200	15 400	19 800	9 800	7 200	6 400
12	2650	6 600	7 800	7 200	9 200	10 400	12 800	14 400	10 600	8 800	8 200

第 13 表. 白血球數に及ぼす影響 (斃死群).

家番 兎號	體 重 (g)	緊 縛 前	緊 縛 中			緊 縛 解 除 後					
			1h	2h	3h	0,5h	1,5h	3h	6h	12h	24h
1	1950	7 500	8 600	7 600	10 400	23 400	20 600	27 600	採血不能	9 ^h 後 死 亡	15 ^h 後 死 亡
3	3000	7 800	8 400	9 200	10 200	15 600	19 800	21 400	22 800	採血不能	
4	2200	9 800	9 800	10 600	10 800	21 400	20 000	採血不能	”	10 ^h 後 死 亡	
7	1950	6 600	7 400	8 600	9 200	18 400	19 800	”	6 ^h 後 死 亡		16 ^h 後 死 亡
14	2100	9 400	9 200	9 200	10 600	19 800	18 600	23 400	採血不能	”	

即ち緊縛家兎は緊縛解除後において、假性エオジン 嗜好性多核白血球の増加を主とする著明な白血球増多症を呈する。

第 14 表. 白血球百分率に及ぼす影響 (回復群).

		白血球數	假性「エオジン」嗜好性多核細胞 (%)	淋 巴 球 (%)	大 單 核 並 型 移 行 (%)	「エオジン」嗜好性細胞 (%)
緊 縛 前		6 800	38	57	5	0
緊 縛 中	1h	6 200	45	50	4	1
	2	8 000	54	43	3	0
	3	9 400	53	44	3	0
緊 縛 解 除 後	0,5	8 200	63	32	4	1
	1,5	12 100	75	20	4	1
	3	15 600	75	22	3	0
	6	10 700	60	36	3	1
	12	9 100	57	40	3	0
	24	9 400	49	47	4	0

第 15 表. 白血球百分率に及ぼす影響 (斃死群).

		白血球數	假性「エオジン」嗜好性多核細胞 (%)	淋 巴 球 (%)	大 單 核 並 型 移 行 (%)	「エオジン」嗜好性細胞 (%)
緊 縛 前		7 800	32	63	4	1
緊 縛 中	1h	8 400	37	61	2	0
	2	9 200	42	57	0	1
	3	10 200	44	51	4	1
緊 縛 解 除 後	0,5	15 600	62	36	2	0
	1,5	19 800	59	37	0	1
	3	21 400	66	30	4	0
	6	22 800	63	34	3	0
	12	採血不能				
	24	死 亡				

D. 本 章 の 小 括

以上の實驗成績を通覽すると *Esmarch* 驅血帶緊縛は實驗動物家兎に諸種の著明な生物學的變化即ち血壓の下降、血糖量の増加、血液凝固時間の短縮、及び赤血球、血色素量並びに白血球の増加等を惹起させ、之等は臨牀的に觀察せられる、外傷性ショック症狀に髣髴たるものがあり、然も特に之等の變化は緊縛解除後に初めて出現するか、或ひはより顯著に惹起せられる點、及び第 3 節第 1 項に於て明かなように緊縛の時間及び部位が大なる程、緊

縛家兎により強度の變化を惹起して死に至らしめ、尙解除せずに放置すると解除後當然死亡すべき時間より遙かに長時間に涉つて生存する點とを併せ考へると、家兎に於て觀察せられる之等諸種の生物學的變化は、緊縛組織内に產生せられる一定の能動性物質が、緊縛の解除せられると共に全身に及んで惹起せられるものであると推測するに難くない。

III. 蟄に對する *Esmarch* 驅血帶緊縛の影響特に其の 緊縛組織を灌流せる液の藥理學的作用に就て

A. 小 序

前章に於て溫血動物家兎に對する *Esmarch* 驅血帶緊縛の影響を觀察し、該緊縛組織内に於て一定の能動性物質が產生せられ、本物質が家兎に著明な諸種の生物學的變化を惹起せしめることを知り得た。依つて余は灌流實驗に好適な冷血動物蟄を用ひて、上述の如き變化が惹起せられるかどうかを検し、次いで緊縛蟄後肢を灌流して得た液に就いて、其の藥理學的作用を検索し、以て直接に本能動性物質を捕捉しようと試み、以下の實驗を行つた。

B. 實 驗 方 法

1. 實 驗 材 料

實驗動物としては、内地産並に朝鮮産の蟄、(*Bufo vulgaris*) 體重 200 g 内外、雌雄を選ぶことなく使用した。其他各種實驗に供した動物標本及び試藥に關しては、夫々當該項目に於て記載することにした。而て各項ともすべて 5 例以上の同一實驗を行つて、然る後に其の成績を判定した。

2. 緊縛並に灌流方法

蟄後肢を腎縛するには市販 6 號のゴム管を伸展し、出来る限り後肢の起始部に於て、緊縛部の皮膚が緊縛してゐない皮膚表面より陷凹し、緊縛に用ひたゴム管の外表が、緊縛部外の皮膚表面と同じ高さにあるような程度に纏絡した。

緊縛蟄後肢を灌流するには、緊縛後冬眠期に於ては 48h 活動期に於ては 24h 経過したものを、斷頭脊髓破壞を行つて *Lüwen-Trendelenburg* 法により後肢血管灌流標本を作製し、次いでゴム管を除去して緊縛を解除し、榮養液としては通常 *Ringer*-液を以て、時に要すれば *Locke*-液を以て行つた。然る時は腹部大動脈に挿入してある動脈-Kanüle より流入する榮養液は緊縛せられた後肢組織を灌流した上、腹壁靜脈から、該組織中に含有せられてゐるべき生物學的能動性物質と共に流出することになる。而て此の場合の灌流液壓は 15—20 cm *Ringer*-液壓とし、1—2h 後 *Sulfosalizyl*-酸に對する蛋白反應陰性となるに及んで、初めて之を採集し實驗に供した。以下單に灌流液と稱するものは斯の如き方法に依つて得た液を意味する。余の使用した *Ringer*-液並に *Locke*-液の組成は次の如く、共に pH は 7.2—7.3 である。

<i>Ringer</i> -液		<i>Locke</i> -液	
NaCl	0.65 %	NaCl	0.9 %

NaHCO ₃	0,03 %	NaHCO ₃	0,02 %
KCl	0,03 %	KCl	0,042 %
CaCl ₂	0,02 %	CaCl ₂	0,024 %
Glukose	0,1 %	Glukose	0,1 %

C. 實驗成績

1. 緊縛時間と緊縛墓の轉歸との關係

緊縛時間の長短が緊縛墓の轉歸と如何なる關係を有するかを検した處、家兎の場合と同様に緊縛時間が長い程墓は斃死し、解除せずに放置すると解除すれば當然死亡すべき時間以上に生命を保持する。即ち活動期の墓は 6^h 以下の緊縛では死亡せず 6^h 以上の緊縛によつて初めて 24^h 以内に悉く死亡し、冬眠期の墓は 48^h 以上の緊縛によつて初めて死亡するに至る。然るに解除せずに放置すると、活動期に於ては、約 2 週間、冬眠期に於ては約 8 週間生存する。此の關係を簡単に表記すれば第 16 表の如くである。

此の事實から考へると、墓の緊縛組織に於ても、家兎と同じく、一定の能動性物質が產生せられ、之が解除と共に全身に及んで、墓を死に至らしめるものであることを知り得た。

第 16 表. 緊縛墓の轉歸.

番 號	體 重	時 間	轉 歸	生期 存間	備 考	番 號	體 重	時 間	轉 歸	生期 存間	備 考
1	420g	緊 縛 放 置	死	14日	活動期	6	250g	6	生		冬眠期
2	380		"	13	"	7	230	"	"		"
3	270		"	13	"	8	260	"	"		"
4	230		"	19	冬眠期	15	330	12	"		"
5	240		"	25	"	16	340	"	"		"
9	310	6	生		活動期	17	210	"	"		"
10	240	"	"		"	21	360	24	"		"
11	230	"	"		"	22	320	"	"		"
12	420	12	死	16 ^h	"	23	270	"	"		"
13	370	"	"	13	"	24	320	48	"		"
14	270	"	"	22	"	25	270	"	死	18	"
18	320	24	死	9	"	26	410	"	"	16	"
19	270	"	"	12	"	27	340	72	"	13	"
20	240	"	"	13	"	28	290	"	"	12	"

2. 緊縛の墓血液像に及ぼす影響

以上の如く驅血帶緊縛が墓に著明な生物學的變化を惹起せしめることに鑑みて、全身症狀の著明な徴候の一である血液像の變化を検した。即ち墓の兩側後肢を 12^h 緊縛し、緊

縛前及び緊縛中に1回、緊縛解除後に3回血液検査を実施した。採血部位としては腹壁静脈を用いた。

第17表に示すように、赤血球、白血球、共に緊縛中には大差ないが、解除後著明に増加するのを認めた。之は緊縛家兎に於ける血液像の變化とも一致し、且つ緊縛解除後に於て初めて血液像の著明な變化を招來する點、及び前項に於て明かにせられたように緊縛を解除すれば當然死亡すべき時間より遙かに長く、解除しないものが生存すると云ふ點とを併はせ考へると、家兎の場合と同様に墓の組織内に於ても明かに一定の能動性物質が產生せられるものと推測するに難くない。據つて墓の緊縛後肢より得られる灌流液中には本能動性物質が確實に含有せられるであらうと考へられるので、此の灌流液の藥理學的作用を検索することにした。

第17表. 緊縛の墓血液像に及ぼす影響.

墓 番 號	體 重 (g)	緊 縛 前		緊 縛 中		緊 縛 解 除 後					
				1h		6h		12h		24h	
		赤血球	白血球	赤血球	白血球	赤血球	白血球	赤血球	白血球	赤血球	白血球
1	310	380 000	3 150	470 000	3 432	1 220 000	8 932	1 540 000	9 747	1 200 000	10 800
2	320	590 000	5 096	530 000	5 104	1 740 000	14 500	1 630 000	11 404	1 190 000	8 316
3	320	410 000	3 676	460 000	5 049	2 090 000	14 616	1 820 000	14 544	死 亡	
4	360	520 000	3 672	570 000	5 140	1 750 000	13 992	1 730 000	12 096	”	
5	280	480 000	4 960	510 000	5 950	1 420 000	12 298	1 070 000	8 900	850 000	8 207

3. 灌流液の二三の性狀に就いて

墓緊縛後肢より得られた灌流液は、前記灌流方法の記載に明かなように Sulfosalizyl-酸による蛋白反應陰性で無色透明な液である。

灌流液の pH 値は灌流に使用した榮養液である Ringer-液及び Locke-液の夫と全く異なる處なく、常に 7.3 前後を保つてゐる。

此の灌流液の Pauly 氏試薬に對する反應を検した處 Methylorange-水溶液の如き淡黃色を呈し Histamin-Ringer-液の示す櫻實紅色とは異り、之は安野、島田等によつて、明かにせられた Histotoxin の示す色調と一致するものであることを認めた。

4. 灌流液の循環器系統に及ぼす影響

a. 血壓に對する作用

灌流液の家兎血壓に對する作用を觀血的に觀察しようとして、白色雄性家兎體重 2 kg 内外のものを用ひ、之を 24h 絶食せしめた後、後述の如き操作の下に實驗に供した。即ち Urethan-麻醉 (25% Urethan-溶液體重每 kg 4 cc) を施し約 30—60m 後充分に麻醉狀態に陥

つた家兎を靜な室内に於て固定臺に背位に固定し、頸部皮膚を切開して一側總頸動脈を露出し、之に動脈-Kanüle を挿入固定し、水銀-Manometer に連結して、その浮動子の動きを Kymographion 煤紙上に描畫せしめて血壓の變化を觀察した。即ち灌流液を體重每貳 5 cc の割に耳靜脈内に徐々に注射した處、多く輕度の血壓の下降を來し、間もなく注射前の夫に復するのを觀た。(第 2 圖、參照)。

即ち灌流液は家兎血壓に對し輕度の下降作用を有することを知り得た。

第 2 圖. 灌流液の家兎血壓に及ぼす影響。

b. 墓剔出心臟に對する作用

灌流液を鹽谷⁵⁰⁾第三法により剔出墓心臟に作用せしめて其の作用を觀察した處、第 3 圖の如く何れも常に急激な收縮高の増大による心運動の旺盛を招來し、之を Ringer-液に轉換する時は、收縮高は漸次減弱し、灌流液投與前の夫に復歸する。而て尙之を Ringer-液に轉換することなく放置しても、15 分内外で第 4 圖に示すように次第に Ringer-液に轉換した場合と同様に、略々灌流液投與前の状態に復する。

第 3 圖. 灌流液の墓心臟に對する作用(鹽谷第 3 法)。

第4圖. 蕞剔出心臟に對する作用 (據谷第3法).

c. 血管に對する作用

i. 家兎耳殼血管に對する作用

剔出後約 24h 電氣冷蔵庫内に保存した家兎耳殼を用ひて, *Krakow-Pissemiski* 法により, 家兎耳殼血管灌流標本を作製し, 灌流液の家兎耳殼血管に及ぼす影響を, 上田, 韓改良の Tambour を介して觀察した處, 第5圖の如く家兎耳殼血管は灌流液によつて著しい收縮を來すことを知り得た.

第5圖. 家兎耳殼血管に對する作用.

ii. 家兎冠狀血管に對する作用

剔出後 24 時間氷室に保存した家兎心臟を用ひて *Langendorff* 法により家兎冠狀血管灌流標本を作製し之に對する灌流液の作用を検した處第6圖のように輕度の收縮作用を呈した.

第6圖. 家兔冠狀血管に對する作用.

iii. 羣肺臟血管に對する作用

斷頭脊髓破壞を行つた羣の肺動脈に動脈-Kanüleを肺靜脈に靜脈-Kanüleを夫々挿入して、肺臟血管灌流標本を作製し、之に對する灌流液の作用を観た處第7圖のように著明な收縮作用を招來した。

第7圖. 羣肺臟血管に對する作用.

iv. 羣腸間膜血管に對する作用

第8圖. 羣腸間膜血管に對する作用.

斷頭脊髓破壞を行つた羣の腹部大動脈起始部に動脈-Kanüleを、肝門脈に靜脈-Kanüleを夫々挿入して、腸間膜血管灌流標本を作製し、之に對する灌流液の作用を検した處、第8圖のように輕度の擴張作用を認めた。

v. 羣後肢血管に對する作用

Lüwen-Trendelenburg 法により羣後肢血管灌流標本を作製し、之に對する灌流液の影響を検した處、第9圖のように極く輕度の收縮作用を呈した。

第9圖. 莖後肢血管に對する作用.

C. 灌流液の莖腎臓血管並に腎分泌に及ぼす影響

Bainbridge 法に倣つて, 大動脈及び一側腎門靜脈に Kanüle を挿入し Barkan-液を以て該側腎臓を灌流し, 輸尿管に挿入した Kanüle から滴下する人工尿の滴数の消長を觀察した. 斯のように作製した腎臓血管標本に對する, 灌流液の作用を検した處, 第10圖に示すように腎臓血管は動靜脈共に輕度の擴張作用を呈し, 人工尿形成の昂進を招來した.

第10圖. 莖腎臓血管人工尿分泌に及ぼす影響.

5. 灌流液の平滑筋臓器に及ぼす影響

a. 別出家兔腸管に對する作用

正常家兔別出小腸片を Magnus 法により 40°C に保つた Locke-液中に懸垂し Gebläse を以て絶へず空氣を通じて其の自發運動を Hebel に依り Kymographion 煤紙上に描畫せしめて該小腸片の緊張及び運動の略々一定となつた時に, 豫め 40°C に加温しておいた, Locke-液で捕集した灌流液に轉換すると, 第17圖に示すように緊張が上昇すると共に運動が活潑になるのを認めた.

第11圖. 家兎小腸片に對する作用.

b. 剔出家兎子宮に對する作用

成熟雌性家兎を瀉血死に陥らしめて、直ちに開腹し妊娠して居ないことを確めた後、此の子宮を剔出し、之を前記家兎腸管と同じく *Magnus* 法により其の變化を觀察した處、第12圖に示すように著明な緊張の上昇、運動の促進を認めた。

第12圖. 家兎剔出子宮片に對する作用.

c. 剔出臺腸管に對する作用

冬眠期墓の腸管を剔出し *Magnus* 法により、室溫の *Ringer*-液中に懸垂し、型の如く其の緊張及び運動の状態を觀察した處、第13圖に示すように緊張の上昇、運動の促進を認めた。

第13圖. 墓腸管に對する作用.

d. 剔出墓膀胱に對する作用

本教室に於ける李世珪, 重田等の業績により, 墓膀胱は他の器官に比して, 特異的に且つ鋭敏に諸種藥物に反應することを知り得た. 因つて余は斯のような墓膀胱に對して灌流液が如何なる作用を及ぼすかを明かにしようとして, 墓の膀胱を細心の注意の下に障害することなく, 其の基底部より剔出し其の一半側を *Magnus* 法に倣つて, 室温の *Ringer*-液中に懸垂し, 其の變化を觀察した處, 第14圖のように灌流液によつて極めて著明な緊張の上昇及び運動の活潑化を招來した.

第14圖. 墓膀胱に對する作用.

6. 種々なる要約の下に於ける灌流液の能動性の變化に就いて

以上の如き藥理學的作用を有する本能動性物質の性狀を, 更に精細に檢索しようとして, 熱及び吸着劑に對する態度並びに動物膜に對する透析狀態を最も著明な藥理學的作用の一である剔出墓心臟に對する運動增強作用を指標として觀察した.

a. 加熱した場合

本能動性物質の熱に對する抵抗を檢しようとして, 灌流液を 100°C 30^m 間加熱し, 其の間に失はれた水分を補充したものを, 墓剔出心臟に作用させた處, 第15圖のように心運動に對する增強作用に差異のないことを認めた. 即ち本能動性物質は耐熱性であることを知り得た.

第15圖. 加熱實驗 (100°C 30m 加熱せる灌流液).

b. 吸着剤を以て處置した場合

本能動性物質が吸着剤により吸着せられるかどうかを検しようとして、獸炭末を以て處置した灌流液（數回蒸溜水を以て洗滌乾燥した、三共製獸炭末を、5%の割合に灌流液に混入攪拌し 60m 間放置した後、濾過使用した）を、別出墓心臟に作用させた處、第16圖のように心運動に對する促進作用が殆んど消失してゐるのを認めた。即ち本能動性物質は吸着剤獸炭末によつて略々完全に吸着せられることを知り得た。

第16圖. 吸着實驗 (獸炭末により處理せる灌流液).

c. 動物膜に對する透析狀態

本能動性物質の動物膜に對する透析狀態を検しようとして、充分に洗滌した墓膀胱囊中に一定量の灌流液を容れ、之と等量の Ringer-液を有する Becher 中に浸し、氷室内 (略 4°C) に 24h 放置した後 Becher 中の Ringer-液を、別出墓心臟に作用させた處、第17圖のように依然として促進作用を呈した。即ち本能動性物質は良く動物膜を透析し得ることを知り得た。

第17圖. 透析實驗 (墓膀胱外に透析せる灌流液).

7. 灌流液適用によりて生ずる家兎に於ける諸種生物學的變化に就いて

a. 血壓に及ぼす影響

第三章第四項第一目の記載参照.

b. 血糖量に及ぼす影響

體重 2 kg 内外の家兎に灌流液を體重毎 5 cc の割に耳靜脈内に注射し, 其の後の血糖量の變化を *Hagedorn-Jensen* 法により檢した處, 第 18 表に示すように 18—46 mg/dl の増加を觀た. 即ち本能動性物質は輕度乍ら家兎血糖量を増加せしめる作用を有する.

第 18 表. 灌流液の家兎血糖量に及ぼす影響. (mg/dl)

家番 兎號	體 重 (g)	注 射 前	注 射 後 (灌流液體重毎 5cc 靜脈内注射)							
			0,5h	1h	2h	3h	4h	6h	12h	24h
15	1950	104	115	115	119	120	122	120	117	115
16	1850	97	101	102	108	122	102	97	106	101
17	2650	102	106	102	102	148	132	104	104	106
18	2050	101	104	102	120	146	143	127	111	108
20	2100	99	102	108	119	138	134	122	115	104

c. 家兎血液凝固時間に及ぼす影響

體重 2 kg 内外の家兎に灌流液を體重毎 5 cc の割に, 耳靜脈内に注射し, 其の後の血液凝固時間の變化を檢した處, 第 19 表に示すように約 1/2 に短縮せられるのを觀た. 即ち本能動性物質は家兎血液の凝固性を増強する作用を有する.

第 19 表. 灌流液の家兎血液凝固時間に及ぼす影響. (m)

家番 兎號	體 重 (g)	注 射 前	注 射 後 (灌流液體重毎 5cc 靜脈内注射)							
			0,5h	1h	2h	3h	4h	6h	12h	24h
15	1950	8	7	6	7	7	8	8	8	9
16	1850	8	6	8	8	7	7	8	8	8
17	2650	9	7	6	6	8	8	8	9	9
18	2050	10	8	7	7	9	8	9	9	9
20	2100	8	7	7	6	8	8	9	8	9

d. 家兎赤血球及び血色素量に及ぼす影響

體重 2 kg 内外の家兎に, 灌流液を體重毎 5 cc の割に耳靜脈内に注射し, 赤血球數及び血色素量の變化を檢した處, 第 20, 21 表に示すように何等認むべき程度の變化はなかつた. 即ち本能動性物質は赤血球數及び血色素量に對しては著明な作用を呈しない.

第20表. 灌流液の家兎赤血球數に及ぼす影響.(萬)

家番 兎號	體 重 (g)	注 射 前	注 射 後 (灌流液體重毎兎 5cc 靜脈内注射)							
			0,5h	1h	2h	3h	4h	6h	12h	24h
15	1950	621	623	629	590	632	614	627	612	604
16	1850	561	563	611	599	555	565	556	567	575
17	2650	649	673	665	639	699	709	631	672	656
18	2050	675	654	706	652	676	661	674	683	705
20	2100	641	590	650	661	658	676	631	654	615

第21表. 灌流液の家兎血色素量.(%)

家番 兎號	體 重 (g)	注 射 前	注 射 後 (灌流液體重毎兎 5cc 靜脈内注射)							
			0,5h	1h	2h	3h	4h	6h	12h	24h
15	1950	84	84	85	81	79	81	82	84	78
16	1850	82	79	83	80	78	79	78	79	84
17	2650	87	84	88	82	87	82	88	84	86
18	2050	82	81	84	86	83	85	82	83	88
20	2100	80	80	82	83	82	85	81	80	89

e. 家兎白血球に及ぼす影響

體重 2 kg 内外の家兎に、灌流液を體重毎兎 5 cc の割に耳靜脈内に注射し、其の白血球に對する影響を観察した處、第 22, 23 表に示すように白血球數は注射直後は却つて一時的に正常値の $1/2-2/3$ に減少し、間もなく時間の経過と共に著明に増加し、注射後 3h 前後に最高値を示して、正常値の 2—2.5 倍に及び、爾後漸次減少して、24h 後には殆んど注射前の値に復する。而て此の白血球數の變動は主として假性エオジン嗜好性多核白血球の増減によるもので淋巴球は之に反し、他の白血球には著變は認められない。

第22表. 灌流液の白血球數に及ぼす影響.

家番 兎號	體 重 (g)	注 射 前	注 射 後 (灌流液體重毎兎 5cc 靜脈内注射)							
			0,5h	1h	2h	3h	4h	6h	12h	24h
15	1950	7 200	7 900	5 200	12 900	10 200	7 800	8 100	6 700	7 900
16	1850	7 600	8 900	4 200	13 800	13 200	10 200	9 100	9 400	8 100
17	2650	6 400	5 800	3 400	6 200	11 200	8 600	6 800	8 400	7 400
18	2050	8 100	7 200	4 600	7 300	17 200	12 500	9 600	8 700	7 900
20	2100	7 500	6 200	4 900	9 500	14 600	18 900	9 600	8 500	8 100

第23表灌流液の家兎白血球百分率に及ぼす影響。

		白血球數	假性「エオジン」嗜好性多核細胞 (%)	淋 巴 球 (%)	大單核並型移行 (%)	「エオジン」嗜好細胞 (%)
注 射 前		7 600	46	48	6	0
注 射 後 (五 流 液 靜 脈 重 注 射)	0,5h	8 900	54	38	7	1
	1 "	4 200	33	62	4	1
	2 "	13 800	74	21	5	0
	3 "	13 200	67	29	4	0
	4 "	10 200	61	35	3	1
	6 "	9 100	54	42	4	0
	12 "	9 400	55	40	4	0
	24 "	8 100	43	53	3	1

D. 本章の小括

以上の實驗成績を總括すると *Esmarch* 驅血帶緊縛は 冷血動物蟄に對しても、著明な生物學的變化を惹起する。而て蟄に於て觀察せられる之等の變化は、家兎に於けると同様に緊縛組織内に產生せられる、一定の能動性物質の循環系への移行によると云ふことが、明かになつたので、蟄緊縛後肢を灌流して得た灌流液の性状を検索した處、本灌流液は諸種の藥理學的能動性を有し、且つ本灌流液の適用によつて家兎に、緊縛家兎に於て觀察せられる症狀と略々一致する生物學的變化が惹起せられることを知り得た。即ち蟄緊縛組織に於ても家兎に於けると同様に一定の能動性物質が產生せられ、此の兩者間には何等本質的の差異は認められず、更に進んで蟄緊縛組織を灌流することによつて、直接に本能動性物質を捕捉し、其の藥理學的性状を闡明にすることが出来た。

IV. 總括並に考按

本編の實驗成績を總括し之に對する考按を試みると次の如くである。*Esmarch* 驅血帶緊縛は II. C 諸項に記載してあるように、實驗動物家兎に、臨牀的並に實驗的に觀察せられる外傷性ショック症狀と相似する著明な生物學的變化を惹起する。即ち一定時間以上緊縛を實施すれば、解除後家兎は斃死し、其の際著明な血壓の下降、血糖量の増量、血液凝固性の昂進及び、赤血球、血色素、並に白血球の増加を招來する。然かも之等の諸種變化が緊縛解除後に初めて出現するか、或ひはより顯著に惹起せられる點及び、緊縛の時間並に部位が大なる程、より強度の變化を招來し、且つ解除せずに放置すると解除後當然死亡すべき時間以上に生存する點とから、之等の諸種生物學的變化は家兎の緊縛組織に於て產生せられる一定の能動性物質が、緊縛解除と同時に循環系中に侵入することにより惹起せられる

ものであると思惟せられる。更に Esmarch 驅血帶緊縛は III. C. 1. 2. に明かにせられたように、冷血動物墓に對しても、著明な生物學的變化を惹起する。即ち一定時間以上緊縛を實施すれば解除後墓は斃死し、其の際、赤血球、白血球の著明な増加を來し、這般の事情は家兎に於ける所見と全く一致することを知り得た。此の事實から之等の變化は墓緊縛組織に於て產生せられる能動性物質の作用に依るものであることが考へられるので、直接に本能動性物質を捕捉しようとして墓緊縛後肢を灌流した液に就いて、藥理學的性質を検索し果して III. C 諸項に記載してあるように、著明な藥理學的能動性を有することを闡明ならしめることが出來た。即ち本灌流液は Sulfosalizyl-酸による蛋白反應陰性で、Pouly 反應に對して橙黃色を呈し、耐熱性で、吸着劑にはよく吸着せられ、動物膜を透析する性質を有し更に墓剔出心臓に對する促進作用、家兎耳殻血管、家兎冠狀血管、墓肺臓血管、並に墓後肢血管に對する收縮作用、墓腸間膜血管並に墓腎臓血管に對する擴張作用、人工尿分泌に對する促進作用及び家兎腸管、家兎子宮、墓膀胱並に墓腸管等平滑筋臓器の緊張及び運動に對する昂進作用を有する。然かも本灌流液を家兎に與へると血壓の下降、血糖量の増量、血液凝固時間の短縮及び白血球增多症を惹起し、之等の變化は緊縛家兎に於て觀察せられる生物學的變化と符合する。之に據つて考へると家兎緊縛組織に於て產生せられる能動性物質と墓緊縛組織に於て產生せられる能動性物質は、同一の作用を有し、本質的には差異を認め得ないものであることが明かである。

次いで緊縛組織に於て產生せられる本能動性物質の性状を、本教室安野、島田等によりショック毒として重要な意義を有するもので、併かも從來 Proteotoxikose に關係のある物質と思はれてゐた Histamin と明かに區別し得るものであると確認せられた Histotoxin と比較すると、第 24 表に示すように本能動性物質と Histotoxin とは全く一致するものであることを知り得た。

第 24 表. 本能動性物質と「ヒストキシシン」との比較.

	血 壓	赤血球	血色素	白血球	墓剔出 心 臓	家兎耳 殻血管	家兎冠 狀血管	墓肺臓 血 管	墓後肢 血 管	墓腸間 膜血管
灌 流 液 ヒ ス ト キ シ ン	下 降	變化なし	變化なし	増	促 進	收 縮	收 縮	收 縮	輕度收縮	輕度擴張
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	墓腎臓 血 管	人工分泌	家兎腸管	家兎子宮	墓膀胱	墓腸管	Pouly 反 應	加 熱	吸着劑 吸 着	動物膜
灌 流 液 ヒ ス ト キ シ ン	擴 張	促 進	促 進	促 進	促 進	促 進	淡黃色	不 變	吸 着 せらる	透 析 す
	"	"	著 明 ならず	著 明 ならず	"	著 明 ならず	"	"	"	"

即ち家兎及び墓に試みた余の實驗成績によつて Esmarch 驅血帶緊縛により動物に實驗的にショック症狀を惹起せしめ得ること、更に此のショック症狀は緊縛組織に於て一定の能動性物質が產生せられ、之が一般循環系に移入せられることによつて惹起せられるもの

であること然かも本能動性物質は本教室の幾多の業績によつて闡明せられるに至つた Histotoxin と一致することが、明かにせられたものと思惟する。従つて之を簡明に述べれば、Esmarch 驅血帶緊縛によるショック症状は Histotoxin の作用により惹起せられるものであると云ふことが出来る。

V. 結 論

1. Esmarch 驅血帶緊縛は家兎及び墓に著明な、生物學的變化を惹起せしめ、之が重篤なる場合には緊縛動物は死の轉歸を攝るに至る。

2. Esmarch 驅血帶緊縛により惹起せられる諸種の生物學的變化は臨牀的並びに實驗的に觀察せられる外傷性ショック症状に一致することを知り得た。

3. 緊縛動物に惹起せられる生物學的變化は緊縛組織内に產生せられる、一定の能動性物質の作用による中毒現象であることが闡明せられた。

4. 墓緊縛組織を灌流することによつて緊縛組織内に產生せられる本能動性物質を直接に捕捉し、且つ之を家兎に與へて招來せられる變化を觀察することによつて之は家兎緊縛組織内に於て產生せられる能動性物質と同一のものであることを明かにし得た。

5. 本能動性物質は著明な藥理學的能動性を有することを知り得た。

6. 本能動性物質は藥理學的並に二三理學的性狀に於て Histotoxin と一致することを知り得た。故に Esmarch 驅血帶緊縛によつて惹起せられる症状は、Histotoxin の作用によるものであると云ひ得るし、更に翻つて Histotoxin は外傷性ショック症状の發現に對して重要な意義を有するものであると云ひ得る。

7. Esmarch 驅血帶使用に際しては、從來重要視せられて來た出血阻止以外に、斯の如き能動性物質の產生に對しても顧慮を拂はなければならないものであると思惟する。

擧筆に臨んで御懇篤な御指導と御校閲を賜はつた恩師大澤教授に謹んで満腔の謝意を捧げ、且つ種々御教示を忝ふした上田助教授に深謝す。

引 用 書 目

- 1) F. Esmarch: Arch f. klin. Chirurgie. **17**, 292 (1874).
- 2) 朴永勳: 第 14 回 日本整形外科學會記事 (昭和 14 年).
- 3) 竹 重: 第 4 回 鮮滿聯合醫學會記事 (昭和 15 年).
- 4) Turk: M. Rec. 89 (June), 90 (March), (1919).
- 5) 廣 瀬: 軍醫團雜誌 **139—150**, 565, 729, 876, 997 (大正 14 年).
- 6) 山 岡: 軍醫團雜誌 **259**, 2075 (昭和 9 年).
- 7) 伊 藤: 社會醫學雜誌 **505**, 61 (昭和 4 年).
- 8) Guthrie: Journ. of Amer. Med. Assoc. **68**, 1394 (1917).
- 9) Quenu: Journ. of Amer. med. Assoc. **73**, 153 (1919).
- 10) Kohlhaas: Münch. med. Wschr. Nr. **9**, 233 (1918).

- 11) *Siegmund*: Münch. med. Wschr. Nr. **39**, 1076 (1918).
- 12) *Cowell*: Journ. of Amer. med. Assoc. **73**, 149 (1921).
- 13) *Guyot* u. *Jonneney*: Journ. of Amer. med. Assoc. **77**, 1288 (1921), 16 (1288).
- 14) *Orile*: Journ. of Amer. med. Assoc. **76**, 149 (1921).
- 15) *Peter Lowe*: (廣瀬による).
- 16) *James Latta*: (同上).
- 17) *Pichaud*: (同上).
- 18) *Wieting*: Ergebnisse d. Chir. u. Orthop. **14**, 617.
- 19) *Erlenmeyer*: Münch. med. Wschr. **27**, 986 (1916).
- 20) *Mummery*: Lancet 1905, **1**, 696.
- 21) *Hügelmann*: Münch. med. Wschr. **1918**, 233.
- 22) *Erlanger*: Amer. Journ. of Physiol. **54**, 1 (1920).
- 23) *Alipov*: Deutschr Zeitschr. f. Chirurgie. **228**, (1930).
- 24) *Goltz*: *Virchows Archiv*. **29**, (1917).
- 25) *Mann*: Amer. Journ. of Physiol. **50**, 86 (1919).
- 26) *Cannon*: Arch. of Surgery. **4**, 1 (1922).
- 27) *Schenk*: Arch. f. exp. path. u. Pharm. **89**, 332 (1921).
- 28) *Malcolm*: Edinburgh med. Journ. **27**, 249 (1921).
- 29) *Fischer*: Biochemie. **86**, (1920).
- 30) *Bueno*: Journ. of Amer. med. Assoc. **78**, 533 (1918).
- 31) *Henderson*: Amer. Journ. of physiol. **46**, 533 (1918).
- 32) *Ewald*: Münch. med. Wschr. (1917).
- 33) *Bergmann*: Berl. klin. Wschr. (1920).
- 34) *Porter*: Münch. med. Wschr. 365 (1917).
- 35) *Sutton*: Brit. med. Journ. 365 (1918).
- 36) *Wright*: Infektion u. Immunitat. (1924).
- 37) *Mautner* u. *Piek*: Münch. med. Wschr. **34**, 1141 (1915).
- 38) *Bayliss*: Brit. med. Journ. 553 (1918).
- 39) *Delbet*: Journ. of Amer. med. Assoc. **73** (1919).
- 40) *Naegeli*: Zentbl. f. Chirurgie, **49**, (1919).
- 41) *Lexer* u. *Keysser*: *Langenbecks Arch. f. klin. Chir.* **121**, 315.
- 42) *Mc Cartney*: Journ. of Amer. med. Assoc. **73**, 1246 (1919).
- 43) *Dale & Laidlaw*: Journ. of Physiol. **52**, 355 (1918).
- 44) *Richard*: *Richard*: Journ. of Physiol. **52**, 110 (1918).
- 45) *Abel-Kubota*: Journ. of Pharm. and exp. Therap. **10**, 243 (1919).
- 46) *Schmidt*: Ausführl. Lehrbuch d. pharm. Chemie. 2299 (1923).
- 47) *Fano*: Arch. f. Anat. u. Physiol. 1887.
- 48) 三 藤: 東京醫學會雜誌 **38**, 817 (大正 13 年).
- 49) 三 田: 日新醫學 **2**, 465, **3**, 305, **4**, 627, **9**, (大正 10 年).
- 50) 上 杉: 社會醫學雜誌 **503**, 1151 (昭和 3 年).
- 51) 三 浦: 東京醫學會雜誌 **46**, 413 (昭和 7 年).
- 52) 島 田: 東京醫學會雜誌 **49**, 1130 (昭和 10 年).
- 53) 上 原: 朝鮮醫學會雜誌 **29**, 1601 (昭和 14 年).
- 54) 劉相奎: 日本レントゲン學會雜誌 **16**, (昭和 13 年).
- 55) 中 橋: 近日發表
- 56) 福田, 川口: 千葉醫學會雜誌 **9**, 293 (昭和 6 年).
- 57) 中 島: 東京醫學會雜誌 **49**, 9 (昭和 10 年).
- 58) 姜大元: 東京醫學會雜誌 **54**, 641 (昭和 15 年).
- 59) 樋 谷: 朝鮮醫學會雜誌 **70**, 1020 (大正 15 年).

Studien über die Schockerscheinungen, die bei der
experimentellen Abschnürung mit dem sogenannten
Esmarchschen Schlauch auftreten.
(I. Mitteilung)

Von

Dahan Sin.

Pharmakologisches Institut der Kaiserlichen Universität Keijo.

(Vorstand. Prof. Dr. M. Osawa).

Eingegangen am 26. August 1942. (Sp.)

Die Abschnürung mit dem *Esmarchschen Schlauch* ist bekanntlich eine zweckmässige Blutstillungsmethode, die praktisch von vielen Chirurgen angewandt wird. Die lokalen Symptome bei der Kompression sind bereits eingehend beobachtet worden, dagegen sind die Angaben über die allgemeinen Symptome während und nach der Abschnürung, die etwa Schockerscheinung entsprechen, noch recht lückenhaft. Aus diesem Grunde habe ich Studien in dieser Richtung angestellt. (I) Die Einflüsse der Abschnürung auf Blutdruck, Blutzuckergehalt, Blutgerinnungszeit und Blutbild des Kaninchens. Methodisches: In der vorliegenden Arbeit habe ich männliche Kaninchen von ca. 2 kg Körpergewicht als Versuchstiere gebraucht, und zum Abschnüren der Beine wurde ein Gummirohr (Handelsnummer 6-8) als *Esmarchsche Binde* angewandt. Die Abschnürung wurde 3 Stunden lang unilateral bzw., bilateral derart ausgeführt, dass man den Femoralpuls gerade nicht mehr fühlen konnte. Der Blutdruck wurde konservativ nach der Methode von *Fukuda-Kawaguti* am Kaninchenohr gemessen. Zur Bestimmung des Blutzuckergehaltes benutzte ich die *Hagedorn-Jensensche* Methode. Die Gerinnungszeit des Blutes wurde nach *Sato* in einem Wasserbehälter (bei ca. 25°C) gemessen. Die Untersuchung des Blutbildes wurde nach der allgemeinen üblichen Methode vorgenommen. Versuchsergebnisse: 1) Während beim Abschnüren keine bemerkbare Schwankung des Blutdrucks auftritt, kommt im Anschluss an die Lösung eine auffallende Blutdrucksenkung (20-30 mm Hg) zum Vorschein. 6 Stunden nach der Lösung beginnt der Blutdruck allmählich wieder anzusteigen, um schliesslich zur Norm zurückzukehren. 2) Der Blutzucker zeigt während der Abschnürung nur eine schwache Vermehrung, in den ersten 3 Stunden nach der Lösung dagegen tritt eine bedeutende Hyperglykämie ein. 3) Die Gerinnungszeit des Blutes zeigt schon während der Abschnürung eine allmähliche Verkürzung, und diese Erscheinung kann nach der Lösung noch deutlicher beobachtet werden. 4) Nach der Lösung ist auch eine Vermehrung der Erythro- und Leukozyten zu beobachten, und es tritt damit auch eine Zunahme des Hb-Gehaltes ein. (II) Ueber die pharmakologischen Eigenschaften des Perfusates, welches das mit dem *Esmarchschen Schlauch* abgeschnürte Bein durchströmt. In der Erwartung, dass in dem

abgeschnürten Bein eine bestimmte Substanz erzeugt wird, wurden an Kröten entsprechende Perfusionsversuche angestellt. Dabei konnte im Perfusat des abgeschnürten Hinterbeins der Kröte eine pharmakoaktive Substanz gefunden werden. Methodisches: Nach 24–48 stündiger Abschnürung beider Beine wurde nach der *Laewen-Trendelenburg*schen Methode mit Ringerscher bzw., Lockescher Lösung perfundiert. Nach 1–2 Stunden, wenn das ausströmende Perfusat eiweissfrei geworden war, wurde es zu den Versuchen verwendet. Versuchsergebnisse: 1) Das Perfusat zeigt keine Sulfosalizylsäurereaktion, aber es reagiert mit orangeroter Färbung auf die *Paulysche* Reaktion. Durch die Perfusion verändert sich pH-Wert der Flüssigkeit nicht. 2) Das Perfusat wirkt fördernd auf das isolierte Krötenherz, aber diese fördernde Wirkung nimmt mit der Zeit ab. 3) Es wirkt auf die Ohrgefäße des Kaninchens, sowie die Lungengefäße und Hinterbeingefäße der Kröte kontrahierend, auf die Mesenterialgefäße und Nierengefäße der Kröte dagegen dilatierend. 4) Auf den Blutdruck des Kaninchens übt es meistens eine leichte senkende Wirkung aus. 5) Auf die Nierenfunktion der Kröte wirkt es immer fördernd. 6) Der Tonus im Darm und Uterus des Kaninchens, sowie in der Krötenblase werden durch das Perfusat gesteigert. 7) Die wirksame Substanz im Perfusat ist thermostabil und leicht dialysabel, wird aber durch Tierkohle adsorbiert. 8) Durch Injektion des Perfusates (5,0 ccm pro kg) werden bei Kaninchen die verschiedenen auch schon bei der Abschnürung zu beobachtenden Veränderungen (d. h. Blutdrucksenkung, Blutzuckerzunahme, Verkürzung der Blutgerinnungszeit und auffallende Leukozytose nach vorübergehender Leukopenie) hervorgerufen. Aus diesen Resultaten geht klar hervor, dass in dem abgeschnürten Gewebe eine bestimmte biologisch aktive Substanz produziert wird, und ausserdem ergibt sich, dass das Wesen der verschiedenen Symptome, welche während, sowie nach der Abschnürung zum Vorschein kommen, auf die Wirkung dieser aktiven Substanz zurückzuführen ist. Die oben erwähnten Eigenschaften dieses Wirkstoffes sind also identisch mit denen des Histotoxins, welches bereits in früheren Arbeiten unseres Institutes als ein Schockgift bezeichnet worden ist. [Vgl. *Original (japanisch.)* S. 285.]

(Autoreferat)

Studien über die Wirkung des Bariumchlorids auf das Herz des Hühnerembryos.

Von

Dr. Z. Umetu u. Dahan Sin.

Pharmakologisches Institut der Kaiserlichen Universität Keijo.

(Vorstand: Prof. Dr. M. Osawa)

Eingegangen am 27. August 1942 (Sp.)