合成抗痙攣薬に関する研究

第2報 諸種 Phenol-類 Glucosideの薬理作用について

大 味 谷 輝 男

(京都大学医学部薬理学教室)

(昭和二十七年八月十日受付)

緒 言

第1報¹⁾においては *o*-Tolyl glycerol ether 並びに Guaiacol glycerol ether について、筋弛緩作用及び抗痙攣作用をしらべ、それらが量的のみならず質的關係においてもかなり相違のあることを認めた。今度 Glyceryl 基を Glucoside で置換した化合物が約30種京大薬学科刈米教室の高橋助教授によつて合成されたので検討したところ、これらの Phenol-類 Glucoside にも、その程度の差こそあれ Myanesin 様の筋弛緩作用のあることがわかつたので²⁾抗痙攣作用をもちしているかどうかをしらべようと思い、その中から(1)筋弛緩作用がかなり著しく、(2) Safety margin がかなり大きく、且つ(3)水に可溶性のもの4種を選んでそれらについて以下の実験を行つたので報告する。

実験方法

検討した化合物は次の4種である。

(1) *o*-Tolyl- α -glucoside, (2) *o*-Tolyl- β -glucoside, (3) Guaiacol- α -glucoside, (4) Guaiacol- β -glucoside.

R	α -Type	β -Type
	(1) <i>o</i> -Tolyl- α -glucoside	(2) <i>o</i> -Tolyl- β -glucoside
	(3) Guaiacol- α -glucoside	(4) Guaiacol- β -glucoside

又、痙攣毒としてはあきらかに侵襲部位を異にすると思われる。Strychnine, Metrazol 及び Picrotoxin を用いた。実験動物としては12~15g 前後の成熟健康雌雄マウスを用い、薬物はすべて蒸留水で溶解稀釋してこれを腹腔内に注射した。ところがすでに報告したごとく²⁾、これらの配糖體はいずれも投與時より作用を現すまでにかなりの時間を要する。それで今度は投與方法を全く變えて、豫め一定量の Glucoside 化合物を與えておき、5~10^m 後に痙攣毒の確實致死量を注射しその後においてどの程度に痙攣の發現を抑制せしめるか、あるいはど

の程度まで痙攣による斃死を救いうるかについて観察した。その他のこまかい點についてはすべて第1報¹⁾と同様である。

實 驗 成 績

A. 筋弛緩作用

上述の4種の Glucoside 化合物について、今一應その筋弛緩作用をしらべた。その成績は第1表の通りである。

第 1 表. 筋 弛 緩 作 用 比 較.

化合物 投與量 (mg/10g)	<i>o</i> -Tolyl- α - glucoside	<i>o</i> -Tolyl- β - glucoside	Guaiacol- α - glucoside	Guaiacol- β - glucoside
2.0	%	%		
2.5	1/2	1/2		
3.5	1/2	1/2		
4.0	1/2			
5.0			%	
7.0			1/2	
10.0			1/2	%
12.0				%
14.0			1/2	1/2
18.0				1/2
20.0				1/2
PD50 (mg/10g)	3.12	2.4	10.1	16.6
LD50 (mg/10g)	11.2	8.5	27.0	25.0
LD50/PD50	3.6	3.5	2.7	1.5
PD100 投與時における 作用持続時間 (分)	42	28	39	42
PD 100 投與時における 作用潜伏時間 (分)	8	6	<5	5

1. *o*-Tolyl- α -glucoside

o-Tolyl- α -glucoside の最小筋弛緩發現量は 2.2mg/10g であり、4.0mg/10g を投與すると全例かなりの筋弛緩が起る。Behrens-Kärber 法によつて50%有效量 (PD50) を求めてみると、3.12mg/10g であり、LD50は 11.2mg/10g であつた。即ちその筋弛緩度は Myanesin に較べるとかなり劣るけれども、初期興奮や回復期の興奮等は全く認められず、筋弛緩の性質は、やはりこの種のもののの中では最もすぐれているようである。しかし *o*-Tolyl- α -glucoside においても他の Glucoside 化合物の例と同様にやはり注射時より筋弛緩作用が現れるまでに、いずれもかなりの時間、例えば PD100 の投與の場合では平均8^mを要する。なかには12^mを要したものもあつた。又筋弛緩度及び麻痺持続時間は必ずしも投與量と一致せず、一程度まではそれらは投與量と比例して増強且つ延長するが、それ以上はいくら投與量を増加しても筋弛緩度は増強されず、又持続時間は延長されなかつた。これらの點については、Myanesin が投與量を増加すればする程その筋弛緩度が増強され、又作用持続時間も投與量と共に延長されるのに較べると著しい相違である。

2. *o*-Tolyl- β -glucoside

o-Tolyl- β -glucoside 3.5mg/10g を注射すると、平均約8^m後に全例きわめて軽度な筋弛緩が起る。その程度は *o*-Tolyl- α -glucoside に較べればもつと微弱である。しかもある例においては初期興奮状態を示し、著しく知覚過敏になつたり容器中を走りまわつたりするものもあり、又回復期において震顫、立毛等の症状を示したものもあつた。5.0mg/10g 以上を投與すると全例数分以内に一旦麻痺状態におちいるが、そのうちにある例では立毛呼吸促進を現してくるものもあり、又かなりの興奮症状を伴っているものもあつた。それらの例では運動が著しく減弱し踴躍しているけれども、四肢筋は弛緩を示さずかえつて筋の緊張は高くなり、全身性の震顫を伴つて

歩行は蹣跚となつた。PD50 を求めてみると 2.4mg/10g であり、LD50 は 8.5mg/10g であつた。そして、又 *o*-Tolyl- β -glucoside においても筋弛緩度は一程度までは投與量と並行して増強されるが、それ以上は投與量を増加してもそれに比例して筋弛緩度は少しも増強されることはなかつた。

3. Guaiacol- α -glucoside

Guaiacol- α -glucoside 14.0mg/10g を投與すると全例 5^m 以内にかなりの筋弛緩をひきおこす。そして初期乃至回復期興奮は認められない。筋弛緩の性状は略々 *o*-Tolyl- α -glucoside に匹敵し、かなりすぐれている。又 Guaiacol- α -glucoside においても一程度量以上では筋弛緩度と投與量とは必ずしも並行しないが、立毛、震顫等の症状は認められなかつた。PD50, LD50 はそれぞれ 10.1mg/10g 27.0mg/10g であつた。*o*-Tolyl- α -glucoside に較べるとその量的関係においては、Guaiacol- α -glucoside はかなり大量を要するので、その點では前者に劣るけれども筋弛緩の状態は良好で且つ有効度 (LD50/PD50) は 2.7 であつて、かなり大きいから、やはりすぐれているものと云いうる。

4. Guaiacol- β -glucoside

Guaiacol- β -glucoside の筋弛緩作用は Guaiacol- α -glucoside に較べて弱く、小量ではかえつて四肢筋の緊張が増加して来るものもあつた。そして又この例でも一程度までは投與量に比例して筋弛緩度は増強されるが、それ以上に増量しても筋弛緩度は増強されなかつた。PD50 は 16.6mg/10g であり、LD50 は 25.0mg/10g であつたが、20.0mg/10g 以上を投與するとなかには回復期に立毛及びかすかな震顫を現してくるものもあつた。

B. 抗痙攣作用

1. Strychnine に對する抗痙攣作用

單に Strychnine 0.01mg/10g のみを腹腔内に投與すると 90% において激しい強直性痙攣の下に斃死する¹⁾。今可檢藥たるいづれの Glucoside を豫め投與しておいても Strychnine 痙攣による斃死率に對しては殆んど抑制効果が認められなかつた。

第 2 表. Strychnine 0.01mg/10g に對する抗痙攣作用。

	mg/10g	動物數	痙攣抑制數	痙攣發現數	生存數	斃死數
<i>o</i> -Tolyl- α -glucoside	4.0	10	1	9	1	9
"	8.0	10	1	9	3	7
<i>o</i> -Tolyl- β -glucoside	3.0	5	1	4	1	4
Guaiacol- α -glucoside	20.0	8	0	8	0	8
Guaiacol- β -glucoside	20.0	8	0	8	0	8

2. Metrazol に對する抗痙攣作用

Metrazol 1.0mg/10g のみを腹腔内に注射すると全例激しい搐搦性痙攣をおこして、全例 20^m 以内に強直性痙攣の下に斃死するに至る¹⁾。

そこで豫め *o*-Tolyl- α -glucoside 2.0mg/10g を與えておいた場合には全くその効果が認められなかつたが、4.0mg/10g の場合には、10 例中 2 例において痙攣による斃死より救うことが出来た。それでもつと増量して略々最小致死量に近い大量であるが 8.0mg/10g を投與しておいた場合には痙攣發現率は約 30% であり、約 40% の割においてその斃死を救うことが出来た。

o-Tolyl- β -glucoside には全く Metrazol に對する抗痙攣作用も認められなかつた。

Guaiacol- α -glucoside の最大筋弛緩量 15.0mg/10g (PD100) を豫め投與しておくとも痙攣發現は全く抑制出来ないけれども約半数例において痙攣死より救うことが出来た。

Guaiacol- β -glucoside の Metrazol に對する抗痙攣作用は全く認められなかつた。

3. Picrotoxin に對する抗痙攣作用

Picrotoxin 單獨 0.075mg/10g の腹腔内注射では 30^m 以内に全例激しい痙攣を發現し斃死する¹⁾。そこで豫め諸種の可檢 Glucoside の略々最小致死量に近い大量を投與しておいても痙攣の發現及び致死率に對しては全く効果がなかつた。

第 3 表. Metrazol 1.0mg/10g に對する抗痙攣作用.

	mg/10g	動物數	痙攣抑制數	痙攣發現數	生存數	斃死數
<i>o</i> -Tolyl- α -glucoside	2.0	10	0	10	0	10
〃	4.0	10	0	10	2	8
〃	8.0	12	4	8	5	7
<i>o</i> -Tolyl- β -glucoside	3.0	8	0	8	0	8
Guaiacol- α -glucoside	15.0	10	1	9	5	5
Guaiacol- β -glucoside	20.0	10	0	10	0	10

第 4 表. Picrotoxin 0.075mg/10g に對する抗痙攣作用.

	mg/10g	動物數	痙攣抑制數	痙攣發現數	生存數	斃死數
<i>o</i> -Tolyl- α -glucoside	8.0	10	0	10	1	9
<i>o</i> -Tolyl- β -glucoside	5.0	5	0	5	0	5
Guaiacol- α -glucoside	20.0	5	0	5	0	5
Guaiacol- β -glucoside	20.0	5	0	5	0	5

總 括 と 考 察

1) 私は *o*-Tolyl- α -glucoside, *o*-Tolyl- β -glucoside, Guaiacol- α -glucoside 及び Guaiacol- β -glucoside について、先ずその筋弛緩作用をしらべた。 *o*-Tolyl- α -glucoside の PD50 は 3.12mg/10g, LD50 は 11.2mg/10g, 有効係數たる LD50/PD50 は 3.6であり, *o*-Tolyl- β -glucoside の PD50 は 2.4mg/10g, LD50 は 8.5mg/10g, LD50/PD50 は 3.8 であつた。一方 Guaiacol-glucoside について云うと Guaiacol- α -glucoside の PD50 は 10.1mg/10g, LD50 は 27.0mg/10g, LD50/PD50 は 2.7であり, Guaiacol- β -glucoside の PD50 は 16.6mg/10g, LD50 は 25.0mg/10g, LD50/PD50 は 1.5 であつた。そしてこれら 4 種の Guaiacol- α -glucoside 中、最も筋弛緩力が強くしかも筋弛緩の性状がすぐれているものはやはり (1) *o*-Tolyl- α -glucoside である。

Guaiacol- α -glucoside は、成程筋弛緩の状態は、*o*-Tolyl- α -glucoside に較べて劣るとは云えないが後者に比して、はなはだ大量を要する。しかも安全度たる LD50/PD50 の比率も後者に比して小さい。今、比較のために Myanesin 及び Guaiacol glycerol ether (Hustosil) について、それらの數字をあげてみると、Myanesin の PD50 は 0.98mg/10g, LD50 は 4.85mg/10g, LD50/PD50 は 4.9 であり, Hustosil の PD50 は 2.54mg/10g, LD50 は 11.7mg/10g, LD50/PD50 は 4.7であつたから *o*-Tolyl- α -glucoside と云えども、これら兩 Glycerol ether に較べるとその効力は微弱である。そして又いずれの Glucoside 化合物においても α -Glucoside は β -Glucoside に較べてその筋弛緩の性質はすぐれていると云いうる。何となれば、 β -Glucoside 類では運動麻痺に先行する興奮症狀や恢復期に立毛、震顫が現れたり、四肢筋がかえつて緊張増加して歩行蹣跚する例がしばしば認められたが、 α -Glucoside 類ではそう云う例は認められなかつたからである。又すべての Glucoside において投與してから筋弛緩が現れるまでに一定の時間を要すること、筋弛緩の強度が投與量と平行しないことなどは、Glycerol ether 化合物に較べて注目すべき相違點である。

2) Strychnine に對する抗痙攣作用についてみるといずれの化合物も Strychnine 痙攣に對する抑制作用は認められない。

3) Metrazol に對する抗痙攣作用についてみると *o*-Tolyl- α -glucoside 及び Guaiacol- α -glucoside の大量を投與しておく約半数例において、Metrazol 1.0mg/10g による痙攣死を救いえたから、上述の二つの Glucoside には微弱であるが、Metrazol 痙攣に對する抑制作用も認めたと云えるが、二つの β -Glucoside 化合物にはかかる作用は認められない。

4) Picrotoxin に對する抗痙攣作用はいずれの化合物においても全く認められない。

5) 初め Berger³⁾は Glycerol ether 化合物の筋弛緩作用を現す重要な一つの要素として、Glycerol の

[$\text{O}-\text{CH}_2-\text{CR}_1\text{OH}-\text{CR}_2\text{OH}$] の形を重視し β , γ の OH の置換はかえつてその力を弱め、あるいは消失せしめることを強調したが、最近 California 大学の C. H. Hine たちは⁴⁾に反対し、[$\text{R}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CR}_1\text{OH}-\text{CR}_2\text{OH}$] の形の OH-基の置換は全く作用を減弱しないどころか、かえつて Myanesin と同等の筋弛緩力を獲得すると云っている。だからと云つて Glycerol の形そのものを全く不要としているわけではないが、あまり Glycerol の側鎖には重点をおいていないような論調である。

さて私の検討した Glycerol ether に代えるに Glucoside を用いた多くの Phenol-類 Glucoside についてその筋弛緩作用をみると、その作用の最も著明な *o*-Tolyl-glucoside, Guaiacol-Glucoside においても、Myanesin や Guaiacol glycerol ether (Hustosil) と較べるとかなり劣る。そして又抗痙攣作用においても Myanesin が Strychnine に、Guaiacol glycerol ether (Hustosil) が Metrazol に對して著明な抗痙攣作用を有しているにも拘らず、これら4化合物中わずかに *o*-Tolyl- α -glucoside, Guaiacol- α -glucoside が、Metrazol 痙攣に對してのみ弱い抑制効果を有しているだけで、他はいずれも抗痙攣作用を有しない。今四つの Glucoside 化合物が Myanesin や Hustosil と共通的にそれぞれ *o*-Tolyl 又は Guaiacol を有しており、しかも Ether 結合 [$-\text{O}-$] を有しているにも拘らず、Glycerol ether に較べて筋弛緩作用においても、抗痙攣作用においても劣っていることは、興味のあることである。

成程、*o*-Tolyl (*o*-Methyl phenyl) も Guaiacol (*o*-Methoxy phenyl) も、[$-\text{O}-$] の形もともに筋弛緩作用や抗痙攣作用を現す上に、化学構造上必要な要素であろうが、Phenol-類 Glucoside にはもつと必要な要素が缺けているように考えられる。即ち Glycerol 自身もやはり筋弛緩作用や抗痙攣作用を發現する上にあって、きわめて重要な役割を有していると思われるのである。

本研究は文部省科學科學研究費の補助を得て行つた。

引用書目

- 1) 大味谷：日藥理誌 49, 112 (1953).
- 2) 大味谷, 藤竹：日藥理誌 47, 78§ (1951) : 49, 84 (1953).
- 3) Berger: J. Pharmacol. & Exper. Therap. 93, 470 (1948).
- 4) Hine たち：同誌 97, 414 (1949).

14. **OMIYA, Teruo.** Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto *Studies on the synthetic anticonvulsants (2) Pharmacological properties of phenyl-glucosides* (pp. 119-123) Tables 4

The muscle-relaxing and anticonvulsant properties of *o*-tolyl- α -glucoside (1), *o*-tolyl- β -glucoside (2), guaiacol- α -glucoside (3) and guaiacol- β -glucoside (4) have been comparatively studied with the same method as in the previous report (see No. 13 of this Breviaria). Result: All of these compounds possessed no anticonvulsant effect on the convulsions induced by strychnine, picrotoxin and metrazol, except that (1) and (3) revealed only a weaker antagonistic effect against the metrazol action than Myanesin or Hustosil.

Author

15. **YAMASAKI, Hidemasa, MAN-NAMI, Chuzaburo and TAKAOKA, Tateo.** Department of Pharmacology, Okayama University Medical School *Studies on the combined actions of alkylresorcinols as an anthelmintic. III. Combination of 4-n-octyl-6-chlororesorcinol and 4-n-octyl-resorcinol* (pp. 124-132) Graphs 2 Tables 9

On the combination of 4-*n*-octyl-6-chlororesorcinol (O.C.R.) and 4-*n*-octyl-resorcinol (O.R.), marked potentiation was observed as to the ascaricidal power *in vitro* (1:1000) as well as to the clinical anthelmintic efficacy. The most efficient ratio of the mixture was 70 parts of O.C.R. to 30 parts of O.R. (equivalent to O.C.R. *ca.* 2 mol: O.R. *ca.* 1 mol.), and its efficacy was

obviously more excellent than hexyl-resorcinol. As to the oral toxicity to mice and the irritant action to the mucous membrane (on the conjunctiva of rabbits and human tongues), this mixture lay between O.R. and O.C.R., and was far weaker than hexylresorcinol. A 0.2 g per kg dose was almost harmless to the dog's gastric mucosa. Possible relationship between the potentiation of the ascaricidal property and some physical changes observed such as a lowering of interfacial tension of solution and a fall of melting point of the mixtures was discussed.

Author

16. **YAMASAKI, Hidemasa, MAN-NAMI, Chuzaburo and TAKAOKA, Tateo.** Department of Pharmacology, Okayama University Medical School *On the substance increasing anthelmintic efficacy, produced in the synthesis of 4-n-octyl-6-chlororesorcinol* (pp. 133-137) Graphs 1 Tables 3

Two samples obtained by distillation of the chlorinated product of 4-*n*-octylresorcinol (O.R.) under the higher temperature with lower reduced pressure than is ordinarily used were both proved to be superior in the anthelmintic efficacy against ascaris in man than pure 4-*n*-octyl-6-chlororesorcinol (O.C.R.). These samples were (1) lower in melting point, (2) more distinctly colored by the diazo-reaction, (3) stronger in interfacial activity of the solution, (4) more efficacious in ascaricidal action *in vitro*, (5) slightly more toxic and irritant and (6) contained less chlorine than pure crystal of O.C.R.. If we assume that all this chlorine depends upon O.C.R., then these samples must contain 23.8 and 27% impurities which