臓器水解産物に関する研究

其 1 胃粘膜水解産物の薬理に就て 前篇 実験的暴急性胃潰瘍に及ぼす影響

鍋 木 暲 應

(大澤實驗治療學研究所 (所長 大澤 勝博士))

(昭和29年1月25日受付)

緒 言

胃潰瘍が19世紀中葉 Cruveilhier¹⁾により初めて獨立の疾患として報告されて以來、其の病因並びに治療に關しては幾多の研究が爲されて來た。Rivers²⁾が十二指腸粘膜及び其の粘膜下組織エキスを消化性潰瘍に經口投與して著効を認め、又 Horsters³⁾が小腸粘膜より可溶性粉末蛋白體を精製し、之を重症の潰瘍性結腸炎患者に適用して其の効果を確認して以來、臓器、組織よりの抽出物、蛋白質及び其の水解物、更に單獨又は綜合 Amino-酸等が近年に消化性潰瘍の治療に用いられる様になつた。

最近 Ehrlich⁴⁾は胃粘膜乾燥成分を特發性大腸炎患者に適用し、對照の他蛋白體より明かに有効であると報じている。野村⁵⁾は胃粘膜乾燥粉末を胃潰瘍犬に用い、又岡田教授⁶⁾の Stimulin-M を土井⁷⁾は胃潰瘍家兎に、岩味⁸⁾は胃潰瘍犬に夫々適用して治癒作用の存する事を認めている。Tsu^{9,10)}は蛋白の加水分解による Amino-酸と dextrin-maltose とを胃潰瘍患者に用いて有効であると述べているが、他方 Wilkinson¹¹⁾は蛋白水解物及び Amino-酸は潰瘍治癒に對して直接作用を有せず、瀉腹或は食思不振に用いてのみ効果があると駁している。

理學的或は化學的處置によつて組織の障礙が惹起せられた場合、其の局所に於て蛋白の崩壊産物として生物學的能動性物質が形成せられ、該物質が藥理學的乃至治療學的に特殊な作用を示す事は三浦¹²⁾、吳¹³⁾等によつて明かにされた處である。横内¹⁴⁾は斯かる觀點より人工的暴急性胃潰瘍の居所 Ringer-液灌流液を以て胃潰瘍家兎の治療實驗を行い、其の治癒効果を確認している。

最近 R. Abderhalden¹⁵⁾は從來明かにされて來た一定の腺組織に於て形成せられる幾多の Hormone の他に、體固有であつて少量で特異的な作用をその臓器若くは隣接の臓器に於て發揮すると云う組織細胞に於ける“Gewebs hormone または aglanduläre Hormone”の存在する事を示唆している。

從來の研究によつて胃粘膜成分が消化性潰瘍に對して何等かの意味を有する事は明かではあるが、其の抽出方法に關しては再吟味の必要なしとしない。生體組織が新陳代謝の過程に於て自己の機能を促進若くは調整する作用を有する物質を産生する機轉は未だ明かにされてはいないが恐らく酵素作用による加水分解もその1であろうと解される。然らば斯くの如き物質は必ずしも生體によらずとも化學的に試験管内に於て模倣し得ないであろうか。從來用いられて來た胃粘膜製劑は乾燥粉末若くは有機溶媒を用いて處理したものであつて加水分解のみを行つたものは未だ見られない。茲に於て私は豚胃粘膜を種々の條件で加水分解を行つて得た物質と、二三既知の有効と目されている物質とを用い實驗的胃潰瘍に及ぼす影響を觀察し多少の知見を得たので茲に報告する。

實驗材料

1) 豚胃粘膜低濃度硫酸短時間加水分解液(S)

屠殺後2〜3^h以内の新鮮な豚胃の粘膜を剥離した後細切し、此の1分(g)に20%硫酸1分(cc)及びRinger-液1分(cc)を加えて充分混和振盪し24^h氷室に放置する。翌日100°C、1^h加水分解を施し、之に局方汎降炭酸石灰を加えてpHを7.0に調整した後濾過を行い、更に活性炭を加えて脱色を行つた。斯くして得た溶液の濃度を一定する爲にその標準を含有 Amino-N 量に置き Sørensen の Formalin 滴定法¹⁶⁾を適用して210 mg/dl とした。

2) 豚胃粘膜高濃度硫酸長時間加水分解液 (SH)

豚胃粘膜1分に30%硫酸3分を加えて24^h氷室に放置後、100°C、8^h加水分解を施した。爾後の操作は總て1)と同様に行つた。Amino-N 量は210 mg/dl である。

3) 豚胃粘膜水浸液 (SR)

豚胃粘膜1分に Ringer-液1分を加え24^h氷室に放置後、100°C、1^h水浸を行つた後濾過し pH を7.0、Amino-N 量を70 mg/dl に補正した。

4) 豚空腸粘膜低濃度硫酸短時間加水分解液 (D)

1) の胃粘膜の代りに空腸粘膜を用いたものであつて操作は總て1)と同様である。Amino-N 量は210 mg/dl である。

5) 潰瘍嚢胃灌流液 (GP)

嚢に潰瘍を造設する方法及び其の胃の灌流方法は横内のそれに據つた。即ち體重200 g 前後の雄性嚢の胃粘膜下に5%鹽酸0.1ccを注入し、7日目に Fröhlich- 森田法¹⁷⁾により灌流を行い、門脈より流出する灌流液の Sulfosalicyl- 酸反應が陰性となるのを待つて採取したものを用ひ供した。

6) 正常嚢胃灌流液 (NP)

正常嚢胃より5)と同様な方法で灌流液を採取した。

7) Ringer-液 (R)

8) 1% Histidine 水溶液 (Hist)

實 驗 方 法

冬眠中の體重100 g 前後の雄性嚢 (Bufo Vulgaris var. Japonica) を使用し實驗期間中は食餌を與えなかつた。胃潰瘍の造設は横内に倣ひ、 $\frac{1}{4}$ 注射針を以て胃筋層を穿通し、大彎側粘膜下に0.3%鹽酸0.1ccを注入し逆流しない事を確認した後閉腹した。斯かる操作後2日にして局所粘膜は變性壊死の傾向を示し、5〜7日にして0.6×1.0 cm 大不正圓形の實質缺損を伴う潰瘍が形成せられた(第1圖A)。此際潰瘍底は粘膜筋層又は粘膜下組織迄達していた(第1圖B)。

A. 肉眼的所見

B. 組織學的所見

第1圖. 術後1週に於ける胃潰瘍.

上記8種の檢體の注射群を夫々10匹宛とし、注射開始は潰瘍造設の翌日よりとした。毎日體重を測定しつゝ0.5 cc/100 g の檢體を胸部淋巴嚢内に注射した。斯くして潰瘍造設後の生存日數及び體重の推移に就いて検討し、更に斃死又は撲殺嚢胃の肉眼的、病理組織學的所見を觀察した。

實 驗 成 績

A) 生存期間並びに體重の増減

各群斃死嚢の平均生存期間及び2週間以上生存した例數並びに手術前の體重に對する術後1及び2週目に於ける増減を平均百分率で示すと第1表の如くである。

B) 潰瘍所見

斃死又は屠殺したもののから潰瘍の肉眼的所見を觀察し、併せて各例

第1表. 各群に於ける生存日数及び体重の増減.

群 別	例 数	平 均 生存日数	2週間以上 生存例数	術 後 各 週 の 体 重			
				1		2	
				例 数	平均(%)	例 数	平均(%)
S	10	14.5	7	10	-1.7	7	+1.9
SH	10	12.5	3	10	+1.1	3	-2.3
SR	10	11.8	3	9	-1.0	3	-6.7
D	10	12.7	3	10	-3.7	3	-1.3
GP	8	14.9	6	9	-4.1	6	-10.0
NP	10	10.6	0	10	-7.7	0	0
R	10	9.6	3	9	-15.0	3	-3.0
Hist	7	16.4	6	10	-3.6	7	-10.9

に就き10% Formalin 溶液で固定後 Paraffin 包埋の下に切片を作製し, Hematoxylin-Eosin 重複染色を施して組織學的所見を検索した.

1) S群所見

10例中5例は0.3×0.6 cm 大不正圓形の癒痕性隆起を來し, 周囲との境界は比較的不鮮明であつた. 底は清淨滑澤で且弾力性を有して居り, 他群に比し治癒傾向が甚だ顯著であつた. 他の3例は0.4×0.8 cm 大の癒痕像を呈して居た. 此等の8例は周囲健常粘膜面も充血性でありR群に於ける様な菲薄像を示さなかつた. 5例に於ては癒痕内部に向い周囲より血管の新生が透見された. 残りの2例は0.6×1.0 cm 大の陥凹菲薄像であつて治癒像が明かでなかつた(第2圖A).

第2圖 A. S群に於ける潰瘍所見. 肉眼的所見.

第2圖 B. 同前. 組織學的所見.

2週目の組織學的所見を觀ると, 結締組織の増殖は他群に比し著明であり小癒痕竈は健常粘膜面と同程度迄に至り, 實質缺損の爲の陥凹像は認めなかつた. 該部は所によりかなり著明な縦維芽細胞の増殖を認めたが, 又1部は少々浮腫性であつた. 所により潰瘍周囲又は癒痕部に腺細胞の新生が認められた. 尙周囲粘膜の變性, 萎縮は認め難い(第2圖B).

2) SH群所見

S群に於ける如き0.3×0.6 cm 大の治癒傾向顯著な例は2例であつた. 6例は0.6×0.8 cm 大不正圓形の癒痕像を呈し, 底は清淨滑澤で潰瘍周囲より5例に於て血管の新生が認められた. 他の2例は0.6×1.0 cm 大の實質缺損を伴う潰瘍面を残していた. 癒痕部縮小像の度合に於てS群に及ばないが他群に比し明かに治癒傾向を示していた(第3圖A).

第3圖 A. SH群に於ける潰瘍所見. 肉眼的所見.

第3圖 B. 同前. 組織學的所見.

組織學的には術後15日目の例に就いて観ると肉芽の増殖は顯著であり、少々浮腫性を帯びていた。纖維芽細胞の増殖もかなり著明であつた。尙周囲粘膜の變性部も小範圍に止まり殆んど萎縮像は認められなかつた(第3圖B)。

3) SR 群所見

1例は 0.3×0.6 cm 大の癰瘍像を示した。6例は何れも 0.6×0.8 cm 大い正圓形の陥凹非潰瘍像を呈したが底は比較的清潔であつた。殘餘の3例は 0.6×1.0 cm 大の實質缺損を伴う潰瘍面を残し治癒傾向は認められなかつた(第4圖A)。

第4圖 A. SR群に於ける潰瘍所見. 肉眼的所見.

第4圖 B. 同前. 組織學的所見.

13日目の組織學的所見に於ては潰瘍面は比較的大きく且腺細胞及び固有層は消失し、肉芽組織の増殖は明かではなかつた。然し乍ら潰瘍底は粘膜下組織より深部に達せず薄い變性組織で覆われていた。周囲健康粘膜に著變を認めなかつた(第4圖B)。

4) D 群所見

R群に基だ類似した所見であつた。即ち 0.3×0.6 cm 大の治癒傾向顯著な1例を除き、他は何れも 0.6×1.0 cm 大不正圓形の實質缺損を伴う潰瘍面を残して深く、底は汚穢褐色を呈していた。一部に肉芽組織の新生を認めた例も存在したが、増殖傾向は殆ど認められなかつた(第5圖A)。

第5圖 A. D群に於ける潰瘍所見. 肉眼的所見.

第5圖 B. 同前. 組織學的所見.

14日目の組織學的所見では固有層、粘膜筋層は消失し粘膜下組織迄に至つている。肉芽組織の増殖は認められず且斯かる變化は廣範圍に及んでいた(第5圖B)。

5) GP 群所見

0.3×0.8 cm 大の治癒傾向顯著な潰瘍の2例の外は何れも 0.5×1.0 cm 大不正圓形の底の比較的清潔な陥凹像を呈した。即ち所により肉芽組織及び3例に血管の新生等を認めたが、又一部は菲薄であつた。然し乍ら全般に癰瘍形成の傾向を示していた(第6圖A)。

底組織學的には18日目の例に就いて観ると、潰瘍底は粘膜筋層以下に達せず表面の一部には顯著な肉芽組織の増殖部が存在し、該部にはかなり著明な小圓形細胞浸潤が認められた。又他部には小範圍の比較的厚い固有層の變性部が存在した(第6圖B)。

6) NP 群所見

0.3×0.6 cm 大の治癒傾向顯著な2例を除いて、他は 0.6×1.0 cm 大不正圓形の陥凹非潰瘍像を呈し、甚だ

第6圖 A. GP群に於ける潰瘍所見。肉眼的所見。

第6圖 B. 同前。組織學的所見。

R群所見に類似したものであつた(第7圖A)。

10日目の組織學的所見では潰瘍面は廣く腺細胞及び固有層は變性し且浮腫性であつた。肉芽組織の増殖は不鮮明で治癒傾向は認め難かつた(第7圖B)。

7) R群所見

10例中8例は 0.6×1.0 cm 大不正圓形の實質缺損を伴う潰瘍面を残し底は糜爛破壊され汚穢褐色の壊死組織で充されていた。此の中2例は一部に僅かに肉芽の新生が認められた。残餘の2例は 0.4×0.7 cm 大であつて癒痕形成は一部に認められたが全般に陥凹してい

第7圖 A. NP群に於ける潰瘍所見。肉眼的所見。

第7圖 B. 同前。組織學的所見。

た。周圍健常粘膜面も非薄であり貧血性であつた(第8圖A)。

組織學的には潰瘍は他群に比して大きく且深い。1週目斃死例に於ては廣範圍にわたつて腺細胞及び固有層が消失し、且粘膜下組織も消失して潰瘍底が筋層に達しているものも見られた。2週目の最良の例に於ても周圍粘膜は變性、萎縮の像を呈し、潰瘍底は粘膜下組織に及び肉芽の増殖は甚だ不鮮明であつた(第8圖B)。

8) Hist 群所見

0.3×0.8 cm 及び 0.5×0.8 cm 大の肉芽増殖著明な2例の外は何れも 0.5×1.0 cm 大不正圓形の潰瘍底が比較的淺く且清淨な潰瘍

第8圖 A. R群に於ける潰瘍所見。肉眼的所見。

第8圖 B. 同前。組織學的所見。

面を残していた。此等の8例は所により肉芽組織の増殖を認め2例に血管の新生を透視し得た(第9圖A)。

16日目の組織學的所見によれば、腺細胞及び固有層に相當する部は變性萎縮の像を呈して健常粘膜面より稍々陥凹していたが、他部の肉芽組織の増殖はかなり著明であつた(第9圖B)。

總 括

蕁胃粘膜下に鹽酸を注入する事により明かに潰瘍の造設される事を確認した後、潰瘍造設の翌日より蕁の胸部淋巴囊内に、豚胃粘膜の

第9圖 A. Hist 群に於ける潰瘍所見。肉眼的所見。

第9圖 B. 同前。組織學的所見。

低濃度硫酸短時間加水分解液 (S), 豚胃粘膜の高濃度硫酸長時間加水分解液 (SH), 豚胃粘膜水浸液 (SR), 豚空腸粘膜低濃度硫酸短時間加水分解液 (D), 潰瘍藁胃灌流液 (GP), 正常藁胃灌流液 (NP), Ringer 液 (R) 及び 1% Histidine 液 (Hist) の 8 種類の検體を注射し, 各注射群に於ける生存日數, 體重の推移並びに潰瘍の肉眼的及び組織學的所見に就いて比較検討した。

先づ平均生存日數をみると, R 及び NP 群は手術後 10 日前後で斃死した。之に對し S, GP 及び Hist 群に於ては何れも 2 週間以上の生存例が半数を越え, 其他の群に於ては 12 日前後に斃死した。

術前體重に對する術後 1 週目の増減を平均%で示せば, R 及び NP 群は 7.7~15% の減少を示したのに對し, S, SH 及び SR 群に於ては $\pm 1 \sim 1.7\%$ の範圍に止まり, 他群では 4% 前後の減少であつた。2 週目に於ては S 群は 1.9% の増加を示したのに反し, GP 及び Hist 群では 10~10.9% の減少を見, 他群は何れも減少し, 兩者の中間の成績であつた。

潰瘍の肉眼的並びに組織學的所見を各群の 2 週目斃死例に就いて觀ると, S, SH, GP 及び Hist 群就中 S 群に於ける潰瘍の縮小, 癒復化は顯著であり殆ど陷凹は認められなかつた。尙該部は浮腫性であつたが一部には粘膜の不全再生が認められた。之に對し R 及び D 群に於ては壞死組織は尙殘存し, 癒復形成は不活潑であり, 尙廣範圍にわたり腺細胞及び固有層が消失して居り潰瘍底の筋層に迄達しているものも認められた。SR 及び NP 群の所見は R 及び D 群のそれに類似するものであつたが稍々之より良好と思われる。尙 GP 及び Hist 群に於ける諸所見は横内の成績に類似するものであつた。

結 論

1. 藁胃粘膜下に鹽酸を注入する事により急性胃潰瘍を造設せしめ得た。
2. 豚胃粘膜の低濃度硫酸短時間加水分解液は最も顯著に藁胃潰瘍の發生を阻止し, 且治癒促進的に作用した。
3. 豚胃粘膜の高濃度硫酸長時間加水分解液, 潰瘍藁胃灌流液及び 1% Histidine 液は藁胃潰瘍に對し治癒的に作用した。
4. Ringer 液及び豚空腸粘膜の低濃度硫酸短時間加水分解液は治癒作用が明かでなかつた。
5. 豚胃粘膜水浸液及び正常藁胃灌流液の作用は Ringer 液及び豚空腸粘膜加水分解液の成績に類似するものであつた。

本論文の要旨は昭和 24 年 4 月第 22 回日本藥理學會に於て發表した。

御校閱を賜つた大澤勝所長, 御指導を賜つた現大阪市立醫大上田重郎教授, 及び病理組織學的檢索に關して御教示を賜つた東京都監察醫務院水野禮司院長に深甚の謝意を表する。

引 用 書 目

- 1) Cruveilhier: 横田: 日藥理誌 40, 167 (1944) より引用。
- 2) Rivers: Am. J. digest. Dis. 2, 189 (1935).
- 3) Horsters: Dtsch. med. Wchnschr. 62, 19 (1936).

- 4) *Ehrlich*: Am. J. digest. Dis. **14**, 294 (1947).
- 5) 野村: 消化器病學 **7**, 419 (1942).
- 6) 岡田: 同誌 **1**, 589 (1936).
- 7) 土井: 同誌 **3**, 481 (1938).
- 8) 岩味: 同誌 **7**, 543 (1942).
- 9) *Tui*: JAMA **129**, 954 (1945).
- 10) *Tui*: Gastroenterology **5**, 5 (1945).
- 11) *Wilkinson*: JAMA **137**, 805 (1948).
- 12) 三浦: 東京醫會誌 **46**, 3 (1932).
- 13) 吳: 同誌 **54**, 6 (1940).
- 14) 横内: 日藥物誌 **40**, 167 (1944).
- 15) *Abderhalden*: Die Hormone **3** (1952).
- 16) 藤井: 生化學實驗法定量篇 **53** (1949) より引用.
- 17) 森田: 朝鮮醫會誌 **21**, 458 (1931).

BREVIARIA

concerning the brain wave of cats by the administration of several kinds of anesthetic. 1) By ether, chloroform, and morphine hydrochloride, the α wave decreased, the β wave appeared clearly, and the amplitude of the brain wave became small, resulting in the flat wave on the whole. In the case of chloroform, in addition, the slow wave with large amplitude came to appearance. 2) Phenobarbital brought about the slowing of the brain wave, together with the induced large amplitude. 3) The slow wave with large amplitude appeared and the α wave disappeared immediately after the injection of amytal and seconal. 4) Magnesium sulfate made the remarkable β wave appear and the amplitude small. 5) By paraldehyde the amplitude of the brain wave became small and the α wave disappeared, resulting in the flat wave. The effects upon the brain wave differed in phenobarbital, seconal, and amytal, and ether, chloroform, morphine, paraldehyde, and magnesium ions. Difference in the site of action of each drug should be responsible for this fact.

Author

51 and 52. **KABURAKI, Akio.** Osawa Institute for Experimental Therapeutics, Tokyo *Studies on the organ hydrolysate (Report I) Studies on the hydrolysate of mucous membrane of stomach* (pp. 457-477) Tables 10 Graphs 3 Illus. 24

The hydrolysate of the mucous membrane of hog stomach treated by the diluted sulphuric acid has the most remarkable effect on the experimental ulcer of the rabbit and the toad in comparison with the hydrolysate of the muscular part of the stomach or intestine. The healing of the ulcer has been accelerated by the continuous administration of the hydrolysate; consequently such treated toads survived longer than

the control animals. The hydrolysate restrained the gastric juice secretion. Likewise the total acidity and content of free hydrochloric acid in the juice decreased. Furthermore, the hydrolysate showed the haematopoietic action. The increase of erythrocytes and reticulocytes was observed in the rabbits which were given the hydrolysate injections. The chemical structure of the active principle in the hydrolyse is still unknown; but through the paperpartition chromatography the active principle seems to be a peptide like substance which is attendant on some amino acid.

Author

53. **NAKAI, Mutsuhiko.** Department of Pharmacology, Kyushu University Faculty of Medicine, Fukuoka *On the absorption of drugs from the lumbar canal* (pp. 478-480) Illus. 2

In his previous paper the author reached the conclusion, that intraluminally applied percaine (dibucaine) is rapidly absorbed in almost half the amount of the dose into the circulation; and the circulatory as well as the respiratory depression induced by the lumbar injection of the drug is caused halfly by that part of percaine which escaped toward the blood. The present experiment is to test the rapid absorption of drugs out of the lumbar canal. Methylene blue was injected into the lumbar canal of rabbits. Venous vessels nearby, Vena cava inferior, etc., lungs and heart were found blue colored by the dye within five minutes. Adrenalin applied in the same way increased, if slowly, the blood pressure (Fig. 1). Acetylcholine decreased it when given intraluminally as rapidly as given intravenously (Fig. 2). The drugs must have been absorbed into the blood and fixed at the peripheral blood vessels, where they are held to display the