糖質代謝面より觀たる Adrenaline 並びに鹽化アンモンの作用

今 泉 康 哉

(大阪大學醫學部藥理學教室 (主任 今泉教授))

(昭和30年5月11日受付)

先きに我々の教室より本態性高血壓症患者血液所見と NH_4Cl -Acidosis 家兎のそれとは、非常に多くの類似性のあることを發表した¹⁾。又一方、該症患者血中には血管收縮性物質が増量し、且つ該物質はアンチピリン法沃度酸値陽性物質、即ち Adrenaline 様物質であることが實驗證明せられた。

之等の事實より NH_4Cl の作用と Adrenaline の作用との間に直接或いは間接に何等かの因果關係が存在するのではないかと考え、この關係を明白にする爲に糖代謝及び Energie 代謝の面より若干の實驗を施行した。

I. 家兎血中無機磷酸及び ATP 様物質に及ぼす Adrenaline 並びに NH_4Cl の影響

Adrenaline 及び NH_4Cl の單獨注射、更に又 Glucose 負荷による家兎血中の無機磷酸及び ATP 様物質の消長を検索する爲に下記の實驗を行った。

A. 實驗材料並びに實驗方法

實驗動物としては體重 2~3 kg の健康雄性家兎を使用し、家兎に Acidosis²⁾ を惹起させる爲には連日に亘り午前中に 2M- NH_4Cl 水溶液 2 cc を耳靜脈より注入、午後 1 時に 0.6M- NH_4Cl 水溶液 30 cc を皮下に注入し、約 2 週間後 Acidosis の起つたことを確認し實驗を施行した。

Adrenaline 連續注射家兎に就ては、致死量以下の鹽酸 Adrenaline、即ち 5 萬倍鹽酸 Adrenaline 0.2 cc 靜脈注射及び 2 cc 皮下注射を連日行い、1 週間目毎に靜脈注射 0.2 cc、皮下注射 1.5 cc をそれぞれ増量し、約 3 週間後に實驗に使用した。

正常家兎、Adrenaline 注射後家兎及び NH_4Cl -Acidosis 惹起前後家兎に於いては、標準食餌として毎日一定量の豆腐粕及び野菜を以て飼育し、實驗前 24 時間空腹に保ち、且つ實驗に際しては極力興奮状態を避け、血液採取は心臟穿刺によつた。

1) 無機磷酸定量法

無機磷酸定量法は Allen³⁾ 法によつた。即ち血液 2 cc を迅速に 10% 三鹽化酢酸 10 cc に混じ、除蛋白し上清 3 cc を被檢液として用い、25 cc 目盛付共栓試験管にとり HClO_4 水溶液 2 cc、Amidol 液 2 cc、次ぎにモリブデン酸液 1 cc を順次に加え、20~25°C の水浴に保ち 5~30 分の間に光電比色計で 660 m μ の波長にて比色定量する。

2) ATP 様物質定量法

1) 同様の操作により除蛋白された被檢上清を用いて次の如く算出した。

A.....直ちに上述 Allen 法により無機磷酸を定量した値

B.....Lohmann^{4,5)} の方法に従い 1N-HCl 中で 100°C 7 分加熱後無機磷酸を定量した値

C.....Lepage⁶⁾ の方法により除蛋白被檢上清に 25% 酢酸バリウムを加え、0~5°C、10 分間放置後遠心分離した上清について無機磷酸を定量した値

D.....上記同様酢酸バリウム添加後遠心分離した上清を 1N-HCl 中で 100°C 7 分加熱後の無機磷酸を定量し

た値

(B-A) は 1N-HCl 中で100°C 7^m加熱することにより遊離する酸溶性燐凡ての値である。

(D-C) は 1N-HCl 中で100°C 7^m加熱することにより遊離し、酢酸バリウムで沈澱しない Glucose-1-P, その他の燐の値である。

著者は (B-A)-(D-C) を ATP 様物質の P の値とした。

B. 実験成績

1) Adrenaline 及び NH₄Cl の1回注射によつて家兎血中無機燐酸量及びATP様物質量が如何に變化するかを観察した (鹽酸 Adrenaline 5000倍溶液 1 cc/kg 皮下注射, NH₄Cl M/6 水溶液10cc/kg 皮下注射, 第1表及び第2表参照)。

第1表. Adrenaline 注射後に於ける家兎血中無機燐酸量と ATP 様物質量の消長 (5例平均値)。

	無機燐酸量 (mg/dl)	増減率 (%)	ATP 様 物質 量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	3.6	—	3.41	—
注射後30 ^m	3.4	-6	3.52	+2
注射後1 ^h	4.84	+34	2.42	-30
注射後2 ^h	6.25	+73	0.77	-78
注射後3 ^h	7.05	+95	0.55	-84

第2表. NH₄Cl 注射後に於ける家兎血中無機燐酸量と ATP 様物質量の消長 (5例平均値)。

	無機燐酸量 (mg/dl)	増減率 (%)	ATP 様 物質 量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	5.95	—	4.47	—
注射後30 ^m	6.6	+10	3.19	-29
注射後1 ^h	8.63	+45	2.68	-41
注射後2 ^h	9.99	+67	0.34	-93
注射後3 ^h	10.35	+74	0.25	-95

2) Glucose 負荷による家兎血中無機燐酸及び ATP 様物質の變化を Adrenaline 及び NH₄Cl 連續注射前後に於いて比較観察した (Glucose 50%溶液 1 cc/kg 靜脈注射, 第3表及び第4表参照)。

第3表. Adrenaline 連續注射後に於ける Glucose 負荷に依る家兎血中無機燐酸及び ATP 様物質の消長 (5例平均値)。

		無機燐 酸 量 (mg/dl)	増減率 (%)	ATP 様 物質 量 (mg/dl)	増減率 (%)
連 續 注 射 前	Glucose 負荷前	4.15	—	2.20	—
	負荷後30 ^m	3.30	-22	3.38	+54
	負荷後1 ^h	3.25	-23	3.19	+44
	負荷後2 ^h	3.95	-5	2.75	+25
	負荷後3 ^h	4.15	0	2.17	-2
連 續 注 射 後	Glucose 負荷前	3.85	—	2.16	—
	負荷後30 ^m	3.45	-11	2.12	-2
	負荷後1 ^h	3.46	-10	2.14	-1
	負荷後2 ^h	3.70	-4	2.22	+3
	負荷後3 ^h	3.88	-1	2.20	+2

第4表. NH₄Cl-Acidosis 惹起後に於ける Glucose 負荷に依る家兎血中無機燐酸及び ATP 様物質の消長 (5例平均値)。

		無機燐 酸 量 (mg/dl)	増減率 (%)	ATP 様 物質 量 (mg/dl)	増減率 (%)
Acidosis 惹起 前	Glucose 負荷前	3.40	—	2.64	—
	負荷後30 ^m	2.28	-27	4.27	+58
	負荷後1 ^h	3.15	-8	3.40	+29
	負荷後2 ^h	3.25	-5	3.30	+25
	負荷後3 ^h	3.38	-1	2.67	+1
Acidosis 時	Glucose 負荷前	3.65	—	2.85	—
	負荷後30 ^m	3.35	-9	2.77	-3
	負荷後1 ^h	3.40	-7	2.80	-2
	負荷後2 ^h	3.50	-5	2.80	-2
	負荷後3 ^h	3.67	+0.5	2.88	+1

C. 小 括

以上実験成績を小括すると, Adrenaline 及び NH₄Cl 1回注射家兎はいずれも注射前に比較し, 時間の経過と共に血中無機燐酸量は増加し, 之に反しATP様物質量は減少する。

又 Glucose 負荷に依る血中無機燐酸量及び ATP 様物質量は Adrenaline 連續注射家兎並びに NH₄Cl-Acidosis 家兎はいずれも注射前に比較し, 血中無機燐酸の減少率は著明に減じ, 同時に ATP 様物質の増加率も著明に減じる。

此の様な事實から Adrenaline 及び NH_4Cl の注射によつて Glucose を基質とした高 Energie 磷酸結合生成の抑制を含む種々の機作で ATP 様物質の減少及び無機磷酸の増加が見られたものと考え、かくの如く磷酸代謝面から觀ても Adrenaline 及び NH_4Cl の作用が類似している事實は本態性高血壓症患者及び NH_4Cl -Acidosis 家兎血液所見の類似する點とを合わせ考えると甚だ興味を感じる點である。

II. Adrenaline 及び NH_4Cl に依る家兎血中クエン酸及び α -ケトグルタル酸の消長

I の實驗成績に於て示した如く Glucose 單獨投與の際には無機磷酸の減少及び ATP 様物質形成の増加を見るが、Adrenaline 及び NH_4Cl 注射の際には Glucose 投與後の ATP 様物質形成は阻害せられる成績から Adrenaline 及び NH_4Cl 投與に依つて解糖作用機轉に何等かの障害が起るのではないかと云うことは想像に難くない。そこで著者は Adrenaline 及び NH_4Cl 注射による Glycolysis 障害部位、兩物質の生體に及ぼす作用上の差異並びに類似性を確めんとし上列物質注入後に於ける Glycolysis の中間物質及び TCA Cycle の二、三の Member を定量せんとした。

Adrenaline による過血糖は既に衆知の事實であり、又同様に NH_4Cl 注射後に過血糖を來たすことは教室喜多⁷⁾等により明らかにされた。

又一方 Adrenaline 及び NH_4Cl 注射により家兎血中焦性葡萄糖並びに性酸の増量を來たすことは Adrenaline と同様であることも既に著者等^{8,9)}が發表したが、嫌氣的解糖作用に對する兩物質は甚だ相酷似することが知られる。

そこで著者は更に Adrenaline 及び NH_4Cl の注射に依り好氣的解糖作用中に生成せられる家兎血中クエン酸量並びに α -ケトグルタル酸量が兩物質に依つて如何に影響せられるかを知る爲に下記の實驗を行つた。

A. 實驗材料並びに實驗方法

1) 實驗材料

實驗材料については I に準ずる。

2) クエン酸定量法

Tausky & Ephraim¹⁰⁾氏法によつた。即ち血液 1.5cc を迅速に 10% 三鹽化酢酸 11cc に混じ、除蛋白し上清 10cc をとり、之に 27N-硫酸 5cc を加え、更に暗覆の下で 2N ブローム・ブローム酸ナトリウム溶液 1cc を加え室温の下で約 30^m間放置する。次ぎに 0.2cc 硫酸ヒドラチン溶液を加え、毛管より空氣を送入し 3^m間攪拌後 2 層に完全に分離し、下層の 15cc を他の試験管に移し 18°C の水中にて冷却する。次いで 1cc の硫酸マンガン、1cc のブローム・ブローム酸ナトリウム溶液、2cc の過マンガン酸カリ溶液をこの順に加えてよく振盪し、18°C の水中で 30^m間放置する。次いで褐色の色が完全に消失する迄ヒドラチンを滴下する。次ぎに 11cc の n-ヘプタンを加え毛管より空氣を送入し 6^m間攪拌する。その後 2 層に完全に分離し、水層は捨てヘプタン層を遊離ブロームが存在せない迄水洗する。そして 30^m放置後水層を除き、水洗したヘプタンの層に 10% ヨードソーダアルコール溶液 3cc を加えて約 70^m間暗所に放置し、光電比色計で 430m μ の波長にて比色定量する。

3) α -ケトグルタル酸定量法

Friedmann 氏變法たる清水氏¹¹⁾法によつた。

血液 2cc を可及的迅速に 10% 三鹽化酢酸 10cc に注ぎ、遠心分離し除蛋白を行い上清 8cc を 25°C の水浴中で 2,4-Dinitrophenylhydrazine 0.7cc を添加し 5^m間作用せしめ、Xylol 8cc を加え毛管にて空氣を送入し 3^m間はげしく攪拌した後遠心洗滌し 2 層に分離せしめこの下層を取り、2mg/dl Aminoantipyrine 1cc を添加し 37°C に 15^m間放置した後 25°C の水浴で 2,4-Dinitrophenylhydrazine 0.2cc を添加し、25^m間反應後 Xylol 3cc を加え空氣を送入し 1^m間攪拌遠心分離し下層に酢酸エチル 10cc を加え空氣を送入し攪拌後 2 層に分離した後下層に水 3cc を加え洗滌し、更に水 3cc を加えて 18^m放置し水層を除去し、10% 炭酸ソーダ 6cc を加え振盪し水層 5cc をとり、これに飽和苛性ソーダ 2cc を加え發色度を光電比色計で 470m μ の波長にて比色定量する。

B. 實驗成績

1) Adrenaline 及び NH_4Cl 注射に依る家色血中クエン酸の消長

Adrenaline 及び NH_4Cl の 1 回注射の場合の家兎血中クエン酸量の時間的消長を先ず追及した (第 5 表及び第 1 圖参照)。

第 5 表. Adrenaline 1 回注射後に於ける家兎血中クエン酸の時間的消長 (5 例平均値)。

	クエン酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	3.66	—
注射後 30m	4.76	+31
注射後 1h	4.32	+28
注射後 2h	2.77	+3
注射後 3h	2.46	-33
注射後 4h	2.64	-28
注射後 5h	3.30	-10

第 6 表. NH_4Cl 1 回注射後に於ける家兎血中クエン酸の時間的消長 (5 例平均値)。

	クエン酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	3.82	—
注射後 30m	4.13	+8
注射後 1h	3.93	+3
注射後 2h	3.44	-10
注射後 3h	2.37	-38
注射後 4h	2.67	-30
注射後 5h	3.29	-14

2) Adrenaline 連続注射及び NH_4Cl -Acidosis 惹起に依る家兎血中クエン酸の消長

Adrenaline 連続注射及び NH_4Cl -Acidosis に依る家兎血中クエン酸量が如何に變化するかを調べた (第 7 表参照)。

3) Adrenaline 及び NH_4Cl 注射に依る家兎血中 α -ケトグルタル酸の消長

Adrenaline 及び NH_4Cl の 1 回注射に依る家兎血中 α -ケトグルカル酸量の時間的消長を追及してみた (第 9 表及び第 3 圖参照)。

4) Adrenaline 連続注射及び NH_4Cl -Acidosis に依る家兎血中 α -ケトグルタル酸の消長

第 1 圖. Adrenaline 1 回注射後に於ける家兎血中クエン酸の時間的消長 (5 例平均値)。

..... 正常クエン酸量のレベル
— Adrenaline 注射後のクエン酸量のレベル

第 2 圖. NH_4Cl 1 回注射後に於ける家兎血中クエン酸の時間的消長 (5 例平均値)。

..... 正常クエン酸量のレベル
— NH_4Cl 注射後のクエン酸量のレベル

第7表. Adrenaline 連續注射後に於ける
家兎血中クエン酸の消長.

兎番號	Adrenaline 注 射前クエン酸量 (mg/dl)	Adrenaline 連續 注射後クエン酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
1	2.50	1.30	-48
2	2.05	1.55	-25
3	2.00	1.12	-44
4	3.65	2.21	-40
5	3.30	2.16	-32
平均値	2.70	1.67	-38

第8表. NH_4Cl -Acidosis に於ける家兎血中
クエン酸の消長.

兎番號	Acidosis 惹起前 クエン酸量 (mg/dl)	Acidosis 時ク エン酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
1	3.35	2.18	-35
2	2.00	1.05	-47
3	4.25	2.75	-36
4	2.85	1.82	-36
5	2.63	1.50	-43
平均値	3.02	1.86	-39

第9表. Adrenaline 1回注射に
依る家兎血中 α -ケトグル
タル酸の時間的消長
(5例平均値).

	α -ケトグル タル酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	0.78	—
注射後30 ^m	1.01	+30
注射後1 ^h	1.08	+38
注射後2 ^h	0.72	-8
注射後3 ^h	0.42	-42
注射後4 ^h	0.55	-30
注射後5 ^h	0.69	-12

第10表. NH_4Cl 1回注射に依
る家兎血中 α -ケトグル
タル酸の時間的消長
(5例平均値).

	α -ケトグル タル酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
注射前	0.80	—
注射後30 ^m	0.89	+11
注射後1 ^h	0.74	-8
注射後2 ^h	0.59	-26
注射後3 ^h	0.38	-52
注射後4 ^h	0.50	-38
注射後5 ^h	0.65	-19

第3圖. Adrenaline 1回注射による家兎血中 α -ケトグル
タル酸の時間的消長 (5例平均値)...... 正常 α -Ketoglutarate レベル—— Adrenaline 注射後の α -Ketoglutarate レベル

Adrenaline 連續注射及び NH_4Cl -Acidosis 惹起後に於いて家兎血中 α -ケトグルタル酸量が如何に變化するかを調べた (第11表及び第12表参照).

C. 小 括

1) Adrenaline 1回注射の場合の家兎血中クエン酸量は減少を認め、注射後3^hに於いて最低値 (約33%減) を示し、 NH_4Cl の1回注射の場合の家兎血中クエン酸量も同様減少を示し、注射後3^hに於いて最低値 (約38%減) を示す。注射後30^mに於けるクエン酸量の一時的増量は焦性葡萄糖の増量の結果ではなからうか。いずれにしても Adrenaline 及び NH_4Cl の1回注射による家兎血中クエン酸量の變動は酷似している。

2) Adrenaline 連續注射後の家兎血中クエン酸量は注射前に比し約38%の減少を認め、 NH_4Cl -Acidosis 家兎は Acidosis 惹起前に比し約39%の減少を認めた。Adrenaline 連續注射及び NH_4Cl -Acidosis に依る家兎血中クエン酸量の變動も亦酷似している。

3) Adrenaline の1回注射の場合の家兎血中 α -ケトグルタル酸量は減少を示し、注射後3^hに於て最低値

第4圖. NH_4Cl 1回注射に依る家兎血中 α -ケトグルタル酸の時間的消長 (5例平均値).

..... 正常 α -Ketoglutarate レベル
 — NH_4Cl 注射後の α -Ketoglutarate レベル

(約52%減)を示す。注射後30分にはける α -ケトグルタル酸量の一時的増量はクエン酸の場合と同様焦性葡萄糖量の増加の結果ではなかろうか。いずれにしても Adrenaline 及び NH_4Cl の1回注射による家兎血中 α -ケトグルタル酸量の變動も亦甚だ酷似している。

4) Adrenaline 連続注射後の家兎血中 α -ケトグルタル酸量も注射前に比し約39%の減少を認め、 NH_4Cl -Acidosis 家兎は Acidosis 惹起前に比し約42%の減少を認めた。

以上の實驗結果より Adrenaline 及び NH_4Cl が Glycolysis 及び TCA Cycle の廻轉に何等かの影響を及ぼすことが窺い知れると同時に Adrenaline と NH_4Cl 注射の影響が相酷似することを知り得た。

第11表. Adrenalin 連続注射に依る家兎血中 α -ケトグルタル酸量の消長.

兎番號	Adrenaline 注射前 α -ケトグルタル酸量 (mg/dl)	Adrenaline 連續注射後 α -ケトグルタル酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
1	0.77	0.34	-56
2	0.84	0.38	-55
3	0.96	0.46	-53
4	0.93	0.57	-39
5	0.89	0.77	-14
平均値	0.88	0.54	-39

第12表. NH_4Cl -Acidosis に依る家兎血中 α -ケトグルタル酸量の消長.

兎番號	NH_4Cl -Acidosis 惹起前 α -ケトグルタル酸量 (mg/dl)	NH_4Cl -Acidosis 時 α -ケトグルタル酸量 (mg/dl)	増減率 (%)
1	0.86	0.64	-26
2	0.96	0.46	-54
3	0.95	0.50	-50
4	0.95	0.40	-58
5	0.85	0.66	-23
平均値	0.91	0.53	-42

III. Hexokinase の活性度に及ぼす NH_4Cl の影響

上述 I, II の成績より Adrenaline 及び NH_4Cl を家兎に注入した際には全く類似の作用を呈することが知られた。然らば當然 *in vitro* に於ても類似の作用を示すことが豫想される。Adrenaline 及び NH_4Cl は共に過血糖を來すことは既に述べた所であり、Adrenaline が Hexokinase を阻害することも教室中野、瀬尾¹³⁾等の實驗成績で明らかである。そこで著者は NH_4Cl の Hexokinase に對する作用を検せんとして以下の如き實驗を行った。

A. 實驗材料並びに實驗方法

1) 實驗材料

Hexokinase は Cori¹³⁾の方法により健常白鼠の筋肉を乳鉢で粥状にし、1.5倍の蒸留水を加えて5分間混合し、次いでこのエキスをガーゼで濾過し、この濾液を7000回転遠心洗滌し、その上清を N/10-HCl で pH6.0 に合わせ、アセトンを加えて30%アセトン・フラクションを作り、これを用いた。

2) 炭酸ガス發生量測定

		終濃度
主室	Hexokinase	1.3cc使用
	MgCl ₂	0.008M
	CH ₂ I·COOK	0.002M
	KF	0.053M
	KHCO ₃	0.027M
	Glucose	0.01M
	NH ₄ Cl	0.001M
側室	ATP	0.004M

實驗方法はワールブルグ氏裝置を使用し、ゲフェース内腔に CO₂-N₂ 混合ガスを 5:95 の割合に満し、pH7.5 に於いて H.A. Lardy¹⁴ 氏等の方法により施行した。

3) ATP 定量

S.P. Colowick 氏¹⁵等の方法により、Warburg 終末反應液 2.0 cc に 10% 三鹽化酢酸 5 cc を加え、氷中に 15 分間冷却し、遠心分離後上清 2 cc を採取し、之に 2.5N-HCl 3 cc を加え 100°C 10 分間煮沸し冷却後その 1 cc をとり、Allen 法により無機磷酸測定を行い反應殘存 ATP 量を算出した。

B. 實驗成績

第13表. Hexokinase 活性度に及ぼす NH₄Cl の影響 (5 例平均値)。

	對 照	NH ₄ Cl
殘餘 ATP (mg/dl)	4.63	4.65

C. 小 括

Adrenaline は *in vitro* に於て Hexokinase の活性度を抑制するに反し、同様に *in vivo* に注入した場合に過血糖を來たすが、NH₄Cl は *in vitro* に於て Hexokinase の活性度を抑制しなかつた。

このことより兩物質の過血糖招來の機作には何等かの相違のあることが推定される。

總括並びに考按

以上の實驗結果より Adrenaline 及び NH₄Cl が Glycolysis 並びに TCA Cycle のその回轉に何等かの影響を及ぼすことは、之等の單獨注射及び Glucose と共に與えた際の家兎血中無機磷酸量及び ATP 様物質の消長より容易に想像される所であるが、更に Adrenaline 及び NH₄Cl の注射により家兎血糖値の上昇、家兎血中焦性葡萄糖酸及び乳酸量の増加、並びに

第5圖. Hexokinase 活性度に及ぼす NH₄Cl の影響 (5 例平均値)。

I 對照
II NH₄Cl

家兎血中クエン酸量及びα-ケトグルタル酸量の減少は明らかに上述の想像を裏書きする様に考えられる。而も Adrenaline 及び NH₄Cl を家兎に注入した際に見られる Glycolysis 及び TCA Cycle への影響は程度の差はあるとはいえ、兩物質の作用は全く同一と考えられる。然るに *in vitro* に於ける實驗、即ち Hexokinase 活性度に對し Adrenaline 添加は阻害を示すが、NH₄Cl 添加は何等の影響を與えない。この一例に示される如く *in vitro* での作用の相異に拘らず、*in vivo* で同一の態度を示すことは NH₄Cl 注入により何等かの變化が生体内に起り Adrenaline と同様な作用を起すものであると考えられる。

先きに著者は高岡¹⁶等との共同研究に於て NH₄Cl-Acidosis 家兎血漿について、正常家兎に比し Adrenaline 破壞能力の低下及び Adrenaline 添加による溶血血球の Adrenaline 様物質合成能力の上昇を認めた。

この觀點から NH₄Cl を注射することにより生体内に於て Adrenaline 様物質が過剰に生産され、二次的にそれが Glycolysis 及び TCA Cycle の回轉に影響を及ぼすのではないだろうかと思ふ次第である。

又、教室佐藤¹⁷⁾は NH_4Cl -Acidosis 家兎の Jod 酸値は正常家兎に比し高値を示すことを報告し、喜多¹⁸⁾は NH_4Cl -Acidosis 家兎では血球内血管收縮性物質が正常家兎に比し増量していることを報告している。

之等を総合してみると糖代謝及び Energie 代謝の面より觀て Adrenaline と NH_4Cl との *in vitro* に於ける作用の相異に拘らず *in vivo* に於ける作用の類似性の存するのは NH_4Cl 注入で生體が Acidosis に傾くことにより生體内 Adrenaline 量が増し、その結果 Adrenaline と NH_4Cl の作用が酷似して來ると考えるのが妥當であらう。

さて先きに發表された教室今泉教授の報告によると本態性高血壓症患者と NH_4Cl -Acidosis 家兎の血液所見は種々の點に於て極めて多くの類似性を有している。今著者の實驗により NH_4Cl 注射による變化は、注射により生じた過量の Adrenaline の作用である事が明らかになれば、本態性高血壓症とは Acidosis による Adrenaline 過剰症であるとの今泉教授の考え方を裏付ける一根據ともなると思う。

結 論

1. Adrenaline 及び NH_4Cl 1 回注射家兎は何れも注射前に比し血中無機磷酸量は増加し、ATP 様物質量は減少する。

2. Glucose 負荷試験による血中無機磷酸量及び ATP 様物質量は Adrenaline 連續注射家兎並びに NH_4Cl -Acidosis 家兎はいずれも注射前に比し血中無機磷酸の減少率は著明に減じ、ATP 様物質の増加率も著明に減じる。

3. Adrenaline 1 回注射の場合の家兎血中クエン酸量は一時増加し次第に減少し、注射後 3 h に於て最低値(約33%減)を示し、 NH_4Cl の 1 回注射の場合の家兎血中クエン酸量も一時増加次に減少を示し、注射後 3 h に於て最低値(約38%減)を示す。

4. Adrenaline 連續注射後の家兎血中クエン酸量は注射前に比し約38%の減少を認め、 NH_4Cl -Acidosis 家兎は Acidosis 惹起前に比し約39%の減少を認めた。

5. Adrenaline 1 回注射の場合の家兎血中 α -ケトグルタル酸量は一時増加し次第に減少し、注射後 3 h に於て最低値(約52%減)を示し、 NH_4Cl の 1 回注射の場合の血中 α -ケトグルタル酸量も同様一時増加し次第に減少し、注射後 3 h に於て最低値(約52%減)を示す。

6. Adrenaline 連續注射後の家兎血中 α -ケトグルタル酸量も注射前に比し約39%の減少を認め、 NH_4Cl -Acidosis 家兎は Acidosis 惹起前に比し約42%の減少を認めた。

7. NH_4Cl は *in vitro* に於て Hexokinase の活性度を抑制しなかつた。

以上の實驗結果より NH_4Cl を注射することにより生體が Acidosis に傾き、この結果 Adrenaline 様物質の増量を來たすのではないかとの感を深めた。

拙筆するに臨み終始御懇篤な御指導と御鞭撻を賜わつた今泉教授に衷心より深甚の謝意を捧げ、又實驗施行に際し有益なる御助言を賜わつた吉田助教授並びに高岡助手に對し謹みて満腔の謝意を捧げ、又實驗施行に御援助下さつた齒學部藥學教室野田助手に厚く感謝致します。

引 用 書 目

- 1) Imaizumi, R. and H. Yoshida: Med. J. Osaka Univ. 5, 4 號, 489 (1954).
- 2) Mackler, B., H. Lichtenstein and M. George: Am. J. Physiol. 166, 191 (1951).
- 3) Russell, James, Laurence, Allen: Biochem. J. 34, 858 (1940).
- 4) Lohmann, K.: Biochem. Z. 254, 381 (1932).
- 5) Lohmann, K.: 同誌 233, 460 (1931).
- 6) 野末等: 標準生化學實驗 136 (1953).
- 7) 柏木等: 阪大醫誌 7, 1~2 號, 109 (1955).
- 8) 今泉, 高岡: 同誌 7, 1~2 號, 59 (1955).
- 9) 今泉等: 未發表.

- 10) *Tausky, H.H. and Ephraim Shorr*: J. biol. Chem. **169**, 103 (1947).
- 11) 清水: 醫學と生物學 **17**, 2 號, 102 (1950).
- 12) 中野, 瀬尾: 未發表.
- 13) *Stein, M.W., C.T. Cori and C.T. Cori*: J. biol. Chem. **186**, 763 (1950).
- 14) *Lardy, H.A., V.D. Wieberhaus and K.M. Mann*: 同誌 **187**, 325 (1950).
- 15) *Colowick, S.P., C.T. Cori and M.W. Stein*: 同誌 **168**, 583 (1947).
- 16) 今泉等: 阪大醫誌 **7**, 1~2 號, 101 (1955).
- 17) 佐藤: 阪大醫誌 **7**, 1~2 號, 71 (1955).
- 18) 喜多: 阪大醫誌 **7**, 1~2 號, 79 (1955).

56. YAMAGUCHI, Katsutoshi. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Osaka City University, Osaka *Studies on metabolic fate and pharmacological action of isonicotinic acid hydrazide* (pp. 631-656) Tables 17 Graphs 15 Illus. 6

Investigating the metabolism of isonicotinic acid hydrazide (INAH) *in vivo*, the author obtained the following results: 1) In the urine of the rabbit, to which INAH was administered, INAH, INAH-glucose hydrazine (INAH-G) and acetyl INAH (INAH-Ac) were detected. 2) A new method of quantitative determination of INAH with dinitrofluorobenzene was devised. With this method, free INAH and bound INAH were measured quantitatively. Unstable bound type and stable bound type were measured separately for the bound INAH. 3) The elimination rate of INAH, INAH pyruvate (INAH-pA), INAH-G and INAH-Ac in urine was about 30-70% of administered dose. The elimination rate of free INAH was observed to decrease in the following order: INAH, INAH-pA, and INAH-G administered group. With the INAH-Ac administered group only stable bound type was observed. 4) The pre-treatment with pyruvic acid or glucose did not affect the total elimination rate of INAH and the elimination of bound type. 5) Pyruvic acid and glucose in the blood were observed to increase with the injection of INAH. 6) LD₅₀ of INAH was 190 mg/kg, that of INAH-pA 5560 mg/kg and those of INAH-G and INAH-Ac were 10 g/kg and 20 g/kg respectively for mice with subcutaneous injection. 7) INAH was observed to have dilatating effect on the auricular vessel of rabbit and inhibitory

one on the movement of the isolated intestine of rabbit and the isolated uterus of rat. However with the other 3 bound types, no appreciable effects were observed. 8) Spasm was observed after some latent period with the intravenous injection of INAH in rabbit and the rabbit died with 250 mg/kg. Moderate action was observed with 836 mg/kg of INAH (equivalent to 500 mg/kg INAH), but the rabbit did not die. No action was observed either with 1220 mg/kg of INAH-G or with 652 mg/kg of INAH-Ac (each equivalent to 500 mg/kg INAH respectively). 9) Pre-treatment with pyruvic acid or glucose did not influence the toxic effect of INAH. 10) With tests *in vitro*, INAH-pA was observed to have a similar degree of inhibitory action as INAH on the growth of tubercle bacillus. The action of INAH-Ac was weaker. 11) The degree of *in vivo* action of INAH-pA, INAH-G and INAH-Ac was observed to parallel the degree of liberation of INAH to a considerable extent.

Author

57. IMAIZUMI, Yasuya. Department of Pharmacology, Osaka University Medical School, Osaka *The effects of adrenalin and NH₄Cl on carbohydrate metabolism* (pp. 657-665) Tables 13 Graphs 5

It was proved that the effect of adrenalin on carbohydrate and energetic metabolism *in vitro* differed from that of NH₄Cl in spite of its similarity *in vivo*. It is suggested from above that the injections of NH₄Cl cause acidosis, which increase adrenalin-like substances, and show the adrenalin-like actions *in vivo*.

Author