心臓機能の生理学的及び薬理学的研究

第 2 報

心臓機能の生理的要因の代謝に及ぼす影響

橋本虎六 重井達朗 森田淑子 松山俊介

(東京大学医学部薬理学教室)

(薬理研究会研究所)

(昭和31年2月27日受付)

緒 言

心臓の酸素消費を規定するのは心臓のなす仕事量か、拡張期心室容積かと言う問題は永く且今も尚論争されて居る問題の一つである。Weizsäcker¹⁾ (1911) は蛙心室に就ての実験で、心室の内圧を30mmHg迄増して行けば、仕事量も増加し代謝も亢進する事を報告したが、この実験では拡張期容積と仕事量とを分離して夫々の代謝に対する影響は見て居なかつた。引続いて Bodenheimer²⁾ (1916), Lüscher³⁾ (1919, 1930, 1921), Eismayer and Quincke⁴⁾ (1930) は心臓の仕事量が代謝に影響すると報告したのに対し Clark and White⁵⁾ (1928) は蛙心房を用い、容積が代謝に主として影響し、動脈抵抗は代謝に影響を及ぼさぬ事を報告した。更に Stella⁶⁾ (1931) は亀心室を用い心室容積を一定に保つた場合、動脈抵抗増加は代謝の増加を来すと報じ、これに対して Decherd and Visscher⁷⁾ (1933) は同じく亀心室を用い、酸素消費は拡張期の容積のみによつて規定され、拡張期心室容積を一定に保てば、酸素消費の増加はないと報告して居る。Clark⁸⁾ はこれらの報告を通覧して、心室の拡張期容積の代謝に対する影響は大きく、心筋が抵抗に抗してなす仕事量は代謝にそれ程著しい影響を示さぬとしたが、この様に同じ材料を用いながら錯雑な成績の起る原因は心筋の酸素化が不十分なためと考えなければ理解出来ぬ。又亀心室は筋肉質が厚く酸素化不十分な点を指摘してこの問題を解決するに適当な材料でないと論じて居る。

温血動物に就ては犬心肺標本を用いて、Evans and Matsuoka⁹⁾ (1914~1915) が心室容積と代謝との直接の関係があり、動脈抵抗は代謝の亢進を来さぬから、心室容積増大によつて能率は極めて良くなる事を報告して以来、Starling and Visscher¹⁰⁾ (1926~1927), 更に Visscher 等^{11, 12)} の実験 (1938, 1940), Daly and Thorpe¹³⁾ (1933), Gollwitzer-Meier and Krüger¹⁴⁾ (1936), Gremels¹⁵⁾ (1933) 等は心不全の際心室容積を一定にして置けば、同じ酸素消費で仕事量が減るとなし、Katz^{16~18)} (1938, 1941, 1946), Rühl¹⁹⁾ (1933, 1937) 等は心不全の際、心室容積を一定にして置けば、酸素消費と仕事量とが同時に低下するとして反対し、以来両者の間に激しい論争が繰返されたが、Moe and Visscher²⁰⁾ (1939) によつて犬心肺標本に於て Spirometer による方法と冠狀動脈流量及び酸素の動静脈血飽和度差から測定する方法とによる測定上の差が指摘されて以来、問題解決の困難が明らかになった。最近に至るも論争は激しく続いて居り、Katz, Bing²¹⁾ 等の Starling の法則に対する疑義が有力の如くに見える。

筆者等は食用蛙心臓を選び、同じ動物のヘパリン血を高い酸素分圧の下で環流させ、心臓機能の要因をなす静脈圧、動脈末梢抵抗、心搏数及び温度の酸素消費に対する影響を観察し、各条件の変化の下に於てこの問題を追究した。食用蛙心臓は亀心臓と略々同じ大きさであり、且冠狀動脈のない点か、この問題を解決するに便であ

ると信ずる。

実験方法

1) 実験装置は第1報^{22,23)}に詳述したが、循環血液の酸素化を完全ならしめるために装置内は酸素と空気との等量混合気体で充たした。斯くすれば、種々の状態に於ても循環血液は完全に飽和して居る

2) 心臓の仕事量を算出するに必要な平均流速を知るには血液の駆出される時間を測定すれば良い。動脈カニューレの出口に電極を置いて微小電流が血液の駆出される間だけ通ずる様に装置して電磁オシログラフで測定した。

3) 末梢抵抗を変えるためには次の様にした。第1報の新陳代謝測定装置の主室(a)の説明中に出て来る磨合せの尖端に注射針をつけ、これに細い銅線の一端を捲きつけ、他端を動脈カニューレのゴム管の部分に固定する。磨合せを回転する事によつてゴム管をしばらく末梢抵抗を変化させたが、この様にすれば、酸素消費測定を中断する事なく末梢抵抗変化の心臓機能に及ぼす影響を観察する事が出来る。

4) 心臓のなす仕事量の算出 筆者等は排出血液量(Q)を静脈カニューレの水位(Pv)から動脈カニューレの圧に相当する水位(Pa)迄、Vなる平均流速で運ぶ仕事(W)として算出した。血液1Lの重量をmとすれば

$$W = Q(P_A - P_V) + \frac{mV^2}{2g}$$

単位は P_A, P_V は米 (M), Wは廷米 (kg M), Qは立 (L), Vは秒速-米 (M/sec) の如く M, L, kgで現わす。この式の第2項は冷血動物に於ては全体の高々10%に達するに過ぎない。

釣り下げた摘出心臓の収縮による重心の移動は問題にならぬ程小さい仕事量なのでこの式より除いた。

5) 酸素1ccが2.07 kg Mの仕事量に相応する事にして能率の算出をした [RQによつて相応する値を用うべきである²¹⁾].

尚平均動脈圧を算出する場合に単に最大血圧と最小血圧との算術平均で良いか否かか問題にした。Membrane manometer を用いて動脈血圧を描記すると、曲線の型は末梢抵抗のかけ方、心搏数、循環血液量との条件で多少変つて来るが、略々三角形に近く、最高最低の算術平均で平均血圧を表現しても宜敷い事が判つた (第1図)。少くとも末梢抵抗が心臓に無理な過重にならぬ範囲であれば、甚だしい誤差にはなるまい。

Membrane manometer と水銀 manometer と比較すると末梢抵抗低く且心搏数少い場合は水銀 manometer での測定値から算出した平均血圧はやゝ低過ぎるが正常圧では略々同じである (第2図)。

実験成績

1) 静脈圧

第1図. Hamilton 型 Membrane manometer によつて記録された大動脈圧脈搏曲線。

A : Heart Rate 30/min,
B : Heart Rate 50/min.

第2図. 平均大動脈圧。

A : 低位末梢抵抗, B : 中等位末梢抵抗, C : 高位末梢抵抗。

温度20°C, 心搏数毎分20回に一定し, 静脈圧を変化させる為に循環血液量を0.5cc宛増加せしめて観察した例である。この場合末梢抵抗は調節せずに置いた。従つて静脈圧を上昇せしめれば, 拡張期心室容積は増加し搏

第1表. 静脈圧の影響. (温度20°C, 心搏数毎分20回)

実験番号 425 ♂ 体重 250g 心臓重量 0.467g								
静脈圧 (mmHg)	酸素消費 (cc/g/hr)	CO ₂ 排泄 (cc/g/hr)	RQ	搏出量 (cc/hr)	平均 大動脈圧 (mmHg)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率 (%)
6.0	1.125	0.773	0.69	620	15.3	50.6	0.134	12.6
8.0	1.334	0.868	0.65	797	18.5	48.9	0.204	15.8
10.7	1.773	1.140	0.64	923	21.8	51.4	0.276	16.1
13.3	1.948	1.280	0.66	1063	26.3	49.7	0.380	20.2
16.0	2.352	1.638	0.70	1171	28.0	51.8	0.442	19.4
17.5	2.457	1.748	0.71	1236	29.5	52.9	0.490	20.6
20.0	2.457	1.914	0.78	1292	30.5	52.8	0.528	22.2

実験番号 375 ♀ 体重 180g 心臓重量 0.409g								
静脈圧 (mmHg)	酸素消費 (cc/g/hr)	CO ₂ 排泄 (cc/g/hr)	RQ	搏出量 (cc/hr)	平均 大動脈圧 (mmHg)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率 (%)
8.5	1.202	1.096	0.91	434	12.0	36.4	0.069	6.8
11.5	1.426	1.291	0.91	541	14.5	33.3	0.103	8.5
14.3	1.691	1.428	0.85	631	17.0	34.8	0.143	10.0
16.3	1.833	1.467	0.80	689	19.5	32.0	0.175	11.3
20.0	1.935	1.496	0.77	859	21.5	38.4	0.235	14.6

実験番号 374 ♂ 体重 210g 心臓重量 0.423g								
静脈圧 (mmHg)	酸素消費 (cc/g/hr)	CO ₂ 排泄 (cc/g/hr)	RQ	搏出量 (cc/hr)	平均 大動脈圧 (mmHg)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率 (%)
7.0	0.950	0.498	0.52	572	16.0	48.0	0.123	14.9
10.0	1.385	1.038	0.75	697	19.0	43.0	0.180	15.0
12.0	1.585	1.434	0.91	791	20.0	43.8	0.213	15.4
14.0	1.860	1.562	0.84	880	22.5	41.0	0.262	16.2
17.0	1.979	1.947	0.98	932	23.0	41.5	0.283	16.5
18.0	2.019	1.431	0.71	998	23.5	41.8	0.308	17.6

出量も増大する結果動脈圧も上昇する。実測値は第1表及び第3図(a)であり, 増加率を図示したのが第3図(b)である。

環流血液量が多量に過ぎれば房室弁の閉鎖不全から収縮期に血液の一部は心房に逆流し正常の心臓機能は失われる。正常状態を保つ範囲では実測値から一見して判る如く, 心臓の機械的機能を表現する仕事量は拡張期心室容積の増大につれ直線的に増加し, 或る程度に達すれば, これ以上心室容積は増えぬから, 仕事量の増加は鈍る。この事は酸素消費にも云う事が出来る。搏出量の増加率は酸素消費の増加率と略々同じく, 心臓の仕事量の増加率は動脈圧の増加の結果, 酸素消費の増加率より大きい。従つて能率の増加が起つて来る。

2) 動脈抵抗

第 3 図

温度を20°C, 心搏数を毎分20回, 循環血液量を2 ccとして動脈末梢抵抗を増加した例である。実測値は第2表, 第4図(a)であり, 酸素消費量, 仕事量の経過を百分率で示したのが第4図(b)である。末梢抵抗を増加しても拡張期心室の容積は増さぬが, 収縮期末に残留する血液は次第に増す。この増し方は平均大動脈圧が30 mmHg或はこれよりやや上迄は顕著でないが, 40 mmHg に近づくに従って著増し, 搏出量も著しく減じて来る。仕事量の経過を見ても分る如く正常圧, 即ち30 mmHg 程度迄は大動脈圧の上昇による要素が搏出量低下による要素を補つて仕事量の増加を示すが, 高抵抗では大動脈圧上昇による影響は搏出量低下の影響より少なくなつて, 仕事量は減少するに到る。酸素消費は高抵抗による仕事量の減少が極端にならぬ限り殆んど一定であり, 又極端に仕事量の低下した場合(実験番号369, 371)でも, 酸素消費の低下はこれに比して僅かである。能率に就いて云えば正常の範囲では酸素消費が略々一定であるから, 大動脈圧上昇と搏出量低下の相殺によつて結果する仕事量の変化に能率が左右されるが多くの場合能率の増加を見, 場合によつて能率にさしたる変化を見ない事もある。

併し高抵抗下に於て仕事量減少に転じた際は能率の急速な低下に代る。30 mmHg 以上の異常な高抵抗の下では心室は円滑な収縮を営む事が出来ず, 心室の疲労も激しく, 高い大動脈圧を長時間維持する事は出来ない。殆んど搏出の止る位の最高圧は60 mmHg 程度であるが, その場合末梢抵抗を変えずに置けば, 数回の搏動の後には, 殆んど搏出の止つた状態で動脈圧は低下して行く。心室は高抵抗に打ち勝つために心室容積も増し, 又

第2表. 末梢抵抗の影響。(温度20°C, 心搏数毎分20回, 循環血液量2cc)

実験番号 368 ♂ 体重 140g 心臓重量 0.263g								
平均大動脈圧 (mmHg)	酸素消費 (cc/g/hr)	CO ₂ 排泄 (cc/g/hr)	RQ	搏出量 (cc/hr)	静脈圧 (mmHg)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率 (%)
20.0	1.569	0.969	0.62	646	13	33.8	0.170	19.7
25.5	1.470	0.878	0.60	575	12	30.3	0.200	24.7
31.0	1.550	0.893	0.58	537	12	22.4	0.210	24.6
36.0	1.589	0.959	0.60	463	11	16.2	0.221	25.3
実験番号 369 ♀ 体重 220g 心臓重量 0.490g								
20.5	1.001	0.803	0.80	472	14	24.7	0.126	13.7
25.5	1.042	0.802	0.77	441	14	23.1	0.148	14.0
30.0	1.063	0.826	0.78	384	13.5	16.1	0.152	14.1
44.0	0.965	0.815	0.85	92	10	3.2	0.054	5.5
実験番号 370 ♀ 体重 200g 心臓重量 0.478g								
19.5	1.240	1.183	0.95	752	13	39.4	0.195	15.8
24.5	1.251	1.102	0.88	719	13	37.6	0.234	18.9
31.0	1.217	1.110	0.91	640	12	26.8	0.263	21.9
40.0	1.263	1.150	0.91	370	10.5	12.9	0.178	14.2
実験番号 371 ♂ 体重 204g 心臓重量 0.431g								
20.5	1.304	1.213	0.93	601	10	31.5	0.164	15.5
26.5	1.341	1.205	0.89	574	10	30.0	0.203	16.9
31.5	1.403	1.254	0.89	447	10	18.7	0.187	15.0
39.0	1.180	1.280	1.08	75	9	2.6	0.039	3.7
搏出量を一定に保つた場合								
実験番号 457 ♂ 体重 190g 心臓重量 0.449g								
19.5	1.616	—	—	869	17	21.4	0.208	13.9
25.0	1.736	—	—	869	17.5	21.4	0.270	16.7
29.7	1.928	—	—	877	21	17.1	0.323	18.0

第 4 図

食用蛙心室の如く心室筋層の薄く、スポンジ状をなしているものでは収縮時心室表面から漏出する液体が殖えて還流量が低下し静脈圧も低下する。

正常血圧の範囲で、末梢抵抗を増した際の搏出量の低下を静脈圧を増して補った場合は静脈圧の項で述べたと同じく、仕事量増加の方が酸素消費増加より大きく、能率の上昇が起る。

3) 心 搏 数

心搏数は心臓機能に複雑な影響を与える。その程度は温度によつて異なるが、傾向は共通している。循環血液を 3 cc として、20°C, 25°C, 30°C, で心搏数の影響を観察した実測値が第 3

表, 第 5 図 (A) で変化を百分率で現わしたのが第 5 図 (B) である。

一般的に云つて心搏数の心臓機能に与える影響は三つの相に分ける事が出来る。

心搏数の少い範囲では心搏数の変化は心室の収縮拡張の期間に大きな影響を与えないから、拡張期末の心室

第 3 表. 心 搏 数 の 影 響.

I) 温度 20°C 循環血液量 3cc

実験番号 409 ♀ 体重 200g 心臓重量 0.445g

分時心搏数	酸素消費 (cc/g/hr)	搏 出 量 (cc/hr)	平均大動脈圧 (mmHg)	静 脈 圧 (mmHg)	平均流速 (cm/sec)	仕 事 量 (kgM/hr)	能率(%)
5	1.450	286	30.0	17	34.0	0.084	6.5
10	1.525	578	31.5	17	32.4	0.178	12.9
15	1.770	764	31.5	17	29.6	0.235	14.6
20	1.833	840	30.0	17.5	28.0	0.245	14.7
30	1.864	862	23.0	18.5	24.9	0.188	11.1
40	1.657	786	19.0	19	24.9	0.139	9.2
50	1.262	576	20.0	20	18.2	0.092	8.0

実験番号 426 ♂ 体重 255g 心臓重量 0.521g

10	1.082	494	26.5	14	41.5	0.175	15.0
15	1.524	757	27.0	14	41.8	0.273	16.2
20	1.524	889	24.3	14	42.3	0.287	17.1
30	1.539	977	20.5	14	37.2	0.265	16.0
40	1.509	996	18.0	14	37.3	0.236	14.5
50	1.448	871	15.3	14	33.2	0.171	11.0
60	1.143	465	13.5	15	17.7	0.087	7.0

I) 温度 25°C 循環血液量 3cc

実験番号 415 ♂ 体重 180g 心臓重量 0.403g

分時心搏数	酸素消費 (cc/g/hr)	搏出量 (cc/hr)	平均大動脈圧 (mmHg)	静脈圧 (mmH ₂ O)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率(%)
20	2.031	630	24.5	18	26.7	0.188	11.1
30	2.168	830	25.0	18	32.8	0.271	14.9
40	2.004	843	20.0	16	33.3	0.220	13.2
40	1.894	747	17.0	15	30.7	0.165	10.4
60	1.866	700	14.5	15	31.9	0.131	8.4
70	1.743	492	10.5	14	24.0	0.066	4.6
80	1.441	394	9.5	14	21.1	0.043	3.6

実験番号 419 ♀ 体重 230g 心臓重量 0.500g

10	0.619	204	17.3	13	32.8	0.046	7.2
20	1.248	625	24.3	13	42.1	0.204	15.8
30	1.792	949	29.3	13	4.33	0.372	20.1
40	1.899	972	25.3	12	40.7	0.330	16.8
50	1.632	890	21.3	12	35.2	0.246	14.6
60	1.387	729	16.5	13	29.9	0.158	11.0
70	1.131	525	13.6	13	26.2	0.092	7.7

II) 温度 30°C 循環血液量 3cc

実験番号 420 ♂ 体重 180g 心臓重量 0.416g

分時心搏数	酸素消費 (cc/g/hr)	搏出量 (cc/hr)	平均大動脈圧 (mmHg)	静脈圧 (mmH ₂ O)	平均流速 (cm/sec)	仕事量 (kgM/hr)	能率(%)
20	2.419	644	35.1	13	46.7	0.306	14.6
30	3.043	858	31.7	11	46.0	0.369	14.0
40	2.854	911	28.6	10	28.5	0.348	14.0
50	2.514	982	23.1	10	23.6	0.301	13.8
60	2.457	919	19.5	10	19.5	0.235	11.1
70	2.230	895	18.3	10	22.0	0.216	11.2
80	2.041	777	16.0	10	29.4	0.176	9.8
90	1.833	498	16.0	11	38.6	0.110	7.0

実験番号 423 ♂ 体重 165g 心臓重量 0.680g

50	2.674	907	16.0	13	21.7	0.197	9.4
60	3.027	971	18.0	13	20.6	0.216	9.1
70	2.550	936	16.0	13	24.0	0.185	9.2
80	2.260	882	13.0	13	33.4	0.138	7.8
90	1.824	625	10.5	13	30.0	0.077	5.4
100	1.679	281	8.0	13	30.0	0.026	1.9

容積にも著しい変化がなく、従つて1回の搏出量も変化を受けない。この場合断続した脈波を描いているから、1回の搏出量の多寡が平均大動脈圧に直接影響を与える。1回搏出量に大きな変化がない限り大動脈圧は変らない。この範囲で心搏数を増して行けば、分時搏出量は心搏数に応じて増加し、仕事量も又増加する。酸素消費を測定すると、これも又増加している。併し酸素消費の増加に比して仕事量の増加が多いから能率は増加する。この心搏数の範囲は20°Cでは毎分20回迄、25°Cでは毎分30回迄、30°Cでは毎分40回迄である。第5回(B)の各温度に於ける実験例の左側のグラフがこの相に於ける増加の百分率を示している。多くの場合心房心室標本の自発

第 5 図 A

第 5 図 B

的搏動は20°Cでは毎分7～8回、25°Cでは毎分20～30回、30°Cでは40～50回であるから、20°Cで毎分5回、25°Cで毎分10回、30°Cで毎分20回の心搏数で実験出来る事は寧ろ稀であるからこの相で心搏数の影響を実験出来る範囲は狭いのが普通である。

次の相では心搏数が直接心室の拡張期の時間を制限する為に、拡張期末の心室容積は減少し1回の搏出量は減ずる。断続した脈波はこの相では連続した脈波に変わる。これにつれて大動脈圧は減少する。分時搏出量はこの

相では尚心搏数増加につれて増加を示しているが前の相の如くに心搏数に応じて、直線的に増加せず、その増加率は鈍くなる。仕事量は大動脈圧の低下と、分時搏出量の増加が相殺する為にやや低下の傾向を示している。酸素消費の実測値は多くの場合鈍いが尚増加の傾向を見せている。20°Cでは心搏数毎分20~30回の間、25°Cでは毎分30~40回の間、30°Cでは30~50回の間が大体この相である（第5図(B)参照）。能率は仕事量の減少の結果低下に転ずるが、心臓は尚高い能率で機能を営んでいる。

第3の相は心搏数によつて拡張期の時間的制限がより一層著明になつて心搏数増加につれて拡張期末の心室容積は更に減少し、1回の搏出量が減ずる許りでなく、分時搏出量が減少する。この相では大動脈圧を規定するのは分時搏出量であるからこれも減少し、従つて仕事量の減少は著明になる。酸素消費を実測すると、これも又減少を示している。第5図Bの右側のグラフは、各温度に於ける実験例のこの相に於いて心搏数の変化が、心臓機能に及ぼす影響を百分率で現わしている。一見して分る如く酸素消費の減少率は分時搏出量のそれと略々一致しており、仕事量の減少はこれ等より著しい。従つて能率は心搏数が増せば増す程低下する。20°Cでは心搏数毎分30回以上、25°Cでは毎分40回以上、30°Cでは毎分50回以上がこの相に入る。極端に心搏数が多くなると拡張期末の心室容積極度に減じて搏出が殆んど止るに到る。この時の酸素消費量は静止時代謝に近い値を示している。

4) 温度

食用蛙が略々正常に活動し得るのは15°C~30°Cの範囲である。摘出心房心室標本に就いて見ると、心房及び心室の自律搏動は温度が昇れば数が殖える。30°Cでは毎分20回以下である事は極めて稀である。温度が昇れば心臓機能の亢進が起る。参考として東京大学生理学教室山田氏の考察になる重複刺激装置を用いて絶対不応期を、刺激電極を心房及び心室に置き心室よりEKGを描記して刺激伝導の時間を（刺激波—R棘）並びに駆出時間を15°C~30°Cの間で測定した結果はその何れも温度上昇に従つて著しく短縮している（第4表）。

第4表. 温度による絶対不応期、刺激伝導、駆出時間の変化。

分 時 心 搏 数	温度	絶対不応期		刺激伝導の経過 (秒)		駆出期 (秒)
		心 房	心 室	房室間	心室内	
20	15°	1.25	>1.50	1.02	0.38	1.39
20	20°	0.71	1.01	0.34	0.28	1.07
20	25°	0.45	0.57	0.25	0.20	0.65
30	15°	>1.00	>1.00	0.76	0.30	0.97
30	20°	0.73	0.72	0.35	0.29	0.89
30	30°	0.31	0.61	0.37	0.20	0.75

る。30°Cでは自然搏動が25回以下の事は稀であるが、搏動数を毎分25回に保ち15°C、20°C、30°Cで比較観察出来た実測値を第5表、第6図(a)で示した。変化を百分率で現わしたのが第6図(b)である。

循環血液量及び心搏数を一定に保つた場合各温度の測定を通じ、搏出量は略々同じであるが、温度が高ければ、収縮が急速であり、従つて平均大動脈圧も高く、平均流速も速いから仕事量は多い。併し大動脈圧の平常値の最高は略々30mmHgであつて、低温から温度を上昇させて行けば、25°C迄は直線的に大動脈圧は増加し、25°C

第5表. 温度の影響。

実験番号(429)雄、体重 200g、心臓重量 0.434g

実験条件 心搏数毎分 25回、循環血液量 3cc

温度(°C)	酸素消費量 (cc/g/hr)	搏 出 量 (cc/hr)	平均動脈圧 (mmHg)	平均流速 (m/sec)	仕 事 量 (kg/m/hr)	能率(%)
30°	2.287	703	27.0	0.315	0.245	11.9
25°	1.912	748	26.8	0.220	0.255	14.8
20°	1.594	760	22.3	0.210	0.213	14.9
15°	1.212	772	18.5	0.191	0.179	16.4

前述の如く酸素消費に対して拡張期末心室容積は著しい影響を与えるが、末梢抵抗は著しい影響を与えない。従つて温度の酸素消費に対する影響を見る為には拡張期末心室容積を出来るだけ同じに保つ必要がある。然るに心搏数に就いて行つた実験から判る如く、心搏数が或る程度以上になると心搏数が増せば増す程、拡張期心室容積が小さくなるが、温度によつて心搏数の拡張期末心室容積に対する影響が異なる。心搏数が毎分25回以下であれば15°Cでも充分に拡張する時間的余裕がある。

第 6 図

問題である酸素消費を規定する要素の本体を論じたいと思う。

筆者等の実験条件の下では食用蛙の心房心室標本の収縮は甚だよい。条件を定めれば、過重な条件の下でない限り長時間に渉つて定常な状態を保つて居る。この標本に就いて、心臓機能を規定する各要素相互の関係を述べれば、「大動脈圧」は動脈末梢抵抗、心搏数少なければ一回の搏出量、心搏数多い時は分時搏出量、及び収縮の時間的経過（収縮の速さ）に、「1回の搏出量」は拡張期末心室容積、及び動脈末梢抵抗に、「拡張期末心室容積」は静脈圧、心搏数及び拡張の時間間経過に、「収縮及び拡張の時間的経過」は温度に左右される。分時搏出量は1回の搏出量と心搏数から、仕事量は分時搏出量、平均大動脈圧、平均流速から算出される。ただ吾々の標本では心室容積を直接に測定する事は出来ないが、静脈圧、心搏数、温度が一定であれば、数時間に渉つて搏出量変動しないから、かゝる場合心室容積は一定であると言う事が出来、又搏出量の経過をもつて、拡張期末心室容積を推定しては間違いない。これらの生理的要因の中で本質的なものは静脈圧、動脈末梢抵抗、心搏数及び温度である。

筆者等の用いた摘出心臓標本が良好な auxotonic contraction を営む事の出来る条件下の成果から結論すると

1) 心搏数及び温度を一定に保つた場合、酸素消費は拡張期末心室容積（この場合搏出量）に対応して居る。拡張期末心室容積（搏出量）、温度、心搏数が一定に保たれた場合、大動脈圧の変化は酸素消費に影響を与えない。何れの場合でも仕事量の変動は酸素消費の変動と別個であつて、酸素消費の増加は拡張期末心室容積の増加に左右され、これが変らぬ場合は酸素消費も変らない。この成績は Clark 及び Visscher の成績に一致して居る。

2) 心搏数が拡張期末心室容積に制限を加えぬ範囲では、心搏数を増せばこれに応じて分時搏出量も増加し酸素消費が増加する。従つて酸素消費は拡張期末心室容積が変らぬ場合、心搏数に対応して変動する。換言すれば仕事量の変動に対応しているという事が出来る。

3) 温度によつて心臓機能は大きな影響を受けるが、拡張期末心室容積、心搏数を同じに保つて温度の影響を見た結果は、酸素消費は温度上昇するに従つて直線的に増加し、仕事量も又増加する。仕事量の増加と酸素消費の増加とは平行して居るが、仕事量の増加は大動脈圧の上昇によるものであり、前述の如く動脈圧の変化は酸素消費に影響を及ぼさぬから、温度による酸素消費の増加は仕事量とは関係がないと云うべきである。

以上を総括すると生理的な条件の下で、酸素消費を直接左右する要因は拡張期末心室容積、心搏数及び温度

で既に 30 mmHg に達しているのに、更に温度を 30°C に上昇させても大動脈圧は、これ以上に昇らぬから仕事量も略々変らぬ。これに対し酸素消費は温度を上昇させれば、直線的に増加し、その増加の百分率は仕事量のそれより多い。従つて能率は 15°C の低温で一番高く 20°C、25°C は略々同じく、30°C でやや低い。云い換えると正常機能を営み得る温度範囲では低温で心室の収縮は能率よく行われ高温では能率が悪い。

討 論

食用蛙の心臓は亀心臓程度の大きさを持ち、且その解剖学的構造は冠状動脈がなく心室内壁はスポンジ状である点金線蛙と同じである。同じ個体のヘパリン血を以て環流し、酸素空気混合気体中（酸素含有量 60%）での実験では正常に心臓が動いて居る限り酸素不足の憂はないから Clark が指摘した実験材料の上での欠点はなく、又冠状動脈のない点は心臓の機能の分析に適して居る。

食用蛙摘出心臓の酸素消費は心臓機能の一環として種々の条件に影響を受ける。心室容積、動脈末梢抵抗、心搏数、温度及び酸素消費相互の関係を観察した結果から従来

であつて、動脈抵抗、或は血圧の関与する仕事量は直接に酸素消費に関係がない。たゞ拡張期末心室容積の変らぬ心搏数の少い範囲では仕事量が酸素消費に直接関係があるが、心搏数が増して拡張期末心室容積に影響を与える様になれば拡張期末心室容積が酸素消費に直接関与して来る。

次に心臓に負担が加わつた場合を論じてみたい。

1) 心室容積が過大になると筆者等の用いた食用蛙の心房心室標本では房室弁の不全を来し、搏出量の測定が出来なくなるが、拡張期末心室容積が限度に近く迄拡張すると酸素消費の増加も目立つて減つて来る。この時搏出量の増加も同様に減ずる。拡張期末心室容積(搏出量)と酸素消費の増加率の変化は凡そ同じである。

2) 末梢抵抗を増して搏出量が減じ収縮期心室内残留血液が著しく増加して来ると(auxotonic contraction が isometric contraction に近づいて来る)、拡張期末に於ける心室容積は増すとも減ずる事はないが酸素消費は減退する。この場合仕事量の減少は酸素消費の減少より著しい。従つて能率の減少が起つて来る。斯る状態に於ては生理的状态とは異つて拡張期末心室容積と酸素消費とは別々に変動する。*Stella* の云う如く *Fenn* 効果が心筋に於ても起ると見做してよく、*Visscher* の云う様に酸素消費が拡張期末心室容積と如何なる時でも同じ消長を示すとは云えない。この状態では時間が経つと共に心筋が疲労して来るから、筋自体の代謝に大きな変化が推測され、酸素消費がエネルギー発生の状態を示しているか疑問である。

3) 心搏数の過度に多い場合 心搏数が増すにつれて心室の拡張の制限が起り心室容積は減少し遂には搏出量も極度に減少、拡張期に於ても心室が僅かに薄桃色になる程度に至る。酸素消費は搏出量の減少に対応して減少し、所謂静止時酸素消費の値に相応した値を示して居る。心搏数増加と心室容積の減少とは相反する影響を酸素消費に与えるが、心搏数増加の影響は心室容積減少の影響に比して僅少である。この様な状態の酸素消費は静止時酸素消費と略々同じ値を示して居る。併し心筋内への酸素の滲透が充分であるか否かに就いては大きな疑問があり、酸素消費がエネルギー発生を忠実に示して居るか不明である。

4) 最後に温度の問題に触れるが、温度上昇すれば能率は低下し、温度上昇が30°Cを越すと心臓機能は低下するばかりでなく速に疲労する。温度上昇によつて心筋の基礎的な代謝が亢進する為であつて、その酸素消費増加はエネルギー発生の増加を示して居るだけでエネルギー利用は高温で寧ろ低下していると見るべきである。

筆者等の得た成績から云えば、良好な auxotonic contraction を営む状態、換言すれば生理的条件の下では *Starling* の法則が成立する点は *Visscher*, *Clark* の得た所に一致して居るが、isometric contraction に近づいて来ると *Visscher* の成績と一致せず *Stella* の成績に近い。併し *Stella* のやつた様な isotonic contraction に近い状態は筆者等はやつてないので拡張期末心室容積を一定に保つて isotonic contraction から auxotonic contraction へ移行するに従つて酸素消費が増加するや否や何とも云えない。何れにせよ動脈末梢抵抗が酸素消費に大きな影響を与えないで、酸素消費に最大の影響を与えるのは拡張期末心室容積であると言う生理的範囲は相当に幅が広いと云う事が出来よう。

尚食用蛙の如き冷血動物の心臓では、解糖の過程が発達していて、酸素の心筋内への補給が不充分であれば、直ちに必要なエネルギーの補給を解糖の中に求める。したがつてこの時は酸素消費の消長がエネルギー発生の状態を忠実に現わして居ない。過剰の負荷の加わつて居る場合には相当問題になると思う。

結 論

食用蛙摘出心房心室標本を同じ個体のヘパリン血を以て環流させ、充分な酸素化の下に心臓機能を分析した。

1. Auxotonic contraction を営ましめる為めの最も良い条件は静脈圧10~20mm H₂O、動脈圧20~30mm Hg、温度20~25°C、心搏数は20°Cでは毎分20~30回、25°Cでは毎分30~40回(30°Cでならば毎分30~50回)である。

2. 上の条件の範囲では酸素消費を左右する要因は心室容積、心搏数及び温度であつて仕事量が酸素消費に直接関与するのは心搏数の要因のみであつて、心室容積、温度の要因には仕事量と酸素消費との間には直接の関連が認められない。

3. 過剰の負担が心臓に加わる場合

a) 過度の静脈圧が加われば、酸素消費は次第に限度に達する、

b) 過度の動脈圧の加わる場合心室容積の増す傾向があつても酸素消費は減退する。

c) 過度に速い心搏数の場合心室容積縮少と共に酸素消費減退し、遂に仕事量極小になつた時は静止時酸素消費に近い値を示す。

これらの場合に於ける酸素消費は忠実に心筋のエネルギー代謝を示しているが疑わしい。

4. 心搏数の心臓機能に及ぼす影響はやゝ複雑であつて1回の搏出量に影響を及ぼさぬ心搏数少い相、1回搏出量減しても分時搏出量は増し、能率の最もよい相及び分時搏出量も減じ能率も低下する心搏数の多い相に分ける事が出来る。

5. 心臓機能に就いてそれと規定する要因の間の関係を論じた。

稿を終るに臨み終始関心を持つて研究の進行を見守つて下さつている小林芳人教授、仕事量算出に當つて助言を与えられた工学部白倉助教授に感謝します。

文 献

- 1) *Weiszäcker, V.*: *Pflügers Arch.* **141**, 457 (1911).
- 2) *Bodenheimer, W.*: *Arch. exp. Path. Pharmac.* **80**, 77 (1917).
- 3) *Lüscher, E.*: *Z. Biol.* **70**, 245 (1919); **72**, 107 (1920); **73**, 67 (1921).
- 4) *Eismayer, G. and H. Quincke*: *Z. Biol.* **89**, 523 (1930).
- 5) *Clark, A. J. and A. C. White*: *J. Physiol.* **66**, 185, 203 (1928).
- 6) *Stella, C.*: *J. Physiol.* **72**, 247 (1931).
- 7) *Decherd, G. and M. B. Visscher*: *Am. J. Physiol.* **103**, 400 (1933).
- 8) *Clark, A. J.*: *Metabolism of the Frog's Heart* (1938).
- 9) *Evans, C. L. and Y. P. Matsuoka*: *J. Physiol.* **86**, 306 (1936).
- 10) *Starling, E. H. and M. B. Visscher*: *J. Physiol.* **61**, 243 (1925~26).
- 11) *Visscher, M. B.*: *Arch. exp. Path. Pharmac.* **191**, 266 (1938).
- 12) *Visscher, M. B.*: *Publication 13 of Am. Assoc. Adv. Sci. (Washington)* **176** (1940).
- 13) *Daly, I. D. and W. V. Thorpe*: *J. Physiol.* **79**, 199 (1933).
- 14) *Gollwitzer-Meier, K. and E. Krüger*: *Pflügers Arch.* **238**, 251 (1936).
- 15) *Gremels, H.*: *Arch. exp. Path. Pharmac.* **169**, 689 (1933).
- 16) *Katz, L. N. and M. Mendlowitz*: *Am. J. Physiol.* **122**, 262 (1938).
- 17) *Katz, L. N., K. Jochim, E. Lindner and M. Landowne*: *Am. J. Physiol.* **134**, 636 (1941).
- 18) *Wise, W., J. Meyer, L. N. Katz, B. Lendrum and K. Jochim*: *Am. J. Physiol.* **147**, 28 (1946).
- 19) *Rühl, A.*: *Arch. exp. Path. Pharmac.* **172**, 568 (1933); **174**, 96 (1933); **175**, 665 (1934); **187**, 22 (1937).
- 20) *Moe, G. K. and M. B. Visscher*: *Am. J. Physiol.* **125**, 461 (1939).
- 21) *Katz, L. N.*: *Physiol. Reviews* **35**, 91 (1955).
- 22) *Hashimoto, K. and H. Nukada*: *Jap. J. Physiol.* **1**, 333 (1950).
- 23) 橋本, 額田, 森田: *日薬理誌* **50**, 137 (1954).