Labetalol の循環器系に及ぼす作用についての 実験的研究

門間 芳夫, 奥岡ゆか子, 亀田 治子, 田辺 恒義

東日本学園大学薬学部薬理学教室*

安 孫 子 保, 市 原 和 夫

旭川医科大学薬理学教室**

(昭和55年2月18日〔特〕)

要約: α および β の両受容体を遮断する作用を持つ labetalol の循環器系に及ぼす作用を検討した. labetalol は麻酔イヌの心拍数, 動脈血圧および心収縮力を減少させ, 頸動脈洞反射を抑制した. labetalol のこれらの作用は用量依存性であった. またこの薬物は動脈血の pO_2 , pH および腎機能に対し何等の影響も及ぼさなかった. モルモットおよびラットの摘出心房標本, ウサギ摘出心臓灌流標本および食用ガエルの摘出心臓灌流標本を用い, labetalol の単独作用ならびに isoproterenol, epinephrine, norepinephrine, phenylephrine, propranolol および phentolamine の作用に対する labetalol の拮抗作用を検討した. さらに, 食用ガエル後肢血管とウサギ耳介血管の灌流実験を行ない, 末梢血管作用を検討した. これらの実験結果から, labetalol の α および β 受容体遮断作用は, 灌流液を正常の液にもどした後も暫時持続することが証明された. labetalol の高濃度投与によって血管平滑筋は強い弛緩(または拡張)を起したが, 薬物の除去によってこの弛緩作用は直ちに消失した. しかし, アドレナリン受容体遮断作用は洗浄後も持続した. 従って, labetalol による末梢血管の拡張には α -受容体遮断のみならず, 他の機序も加わっている可能性が考えられ, 血管平滑筋に対する直接作用の存在が推察される.

緒 言

labetalol は英国の Allen & Hanburys 社の研究陣によって開発された薬物であり, その薬理作用は α - および β -アドレナリン受容体の刺激効果を遮断する特徴を有することが, 同研究所の Farmer ら¹⁾および Kennedy and Levy²⁾ によって報告された. 次いで, Brittain and Levy³⁾ は labetalol の薬理作用に関する同研究所内の研究業績の全貌とその薬理学的意義付けを公表した. この薬理学的根拠に基いて, 多くの臨床薬理学者は labetalol が高血圧治療薬として優れた薬物となることを証明した⁴⁾. 本邦においても, 1975年頃から研究グループを組織し, labetalol の毒性ならびに一般薬理作用について検討をして来た. その成果の一部は既に, 新保ら⁵⁾, Kameda ら^{6,7)}, Tanabe ら⁸⁾および片野ら⁹⁾によって公表された. われわれは, 主として labetalol の循環器系に及ぼす薬理作用について研究の経過中に, アドレナリン受容体遮断作用のみでは完全に説明し得ない部分のある点に気付いたので, ここに報告し今後の解明に資せんとする.

実験方法

I. イヌの血液循環に及ぼす一般作用

1. 循環動態: pentobarbital sodium (30 mg/kg, i.v.) で麻酔したイヌを人工呼吸下に開胸し, 左心室壁に strain gauge arch を装着して心収縮力を記録した. 上行大動脈起始部に電磁流量計のプロープを装着し, 大動脈血流量を測定した. 左頸動脈にカニューレを入れて動脈血圧を記録した. さらに, 第II肢誘導心電図で同時に

* 061-02 北海道石狩郡当別町

** 071-01 旭川市神楽岡8条5丁目

記録した。

2. 頸動脈洞反射: 動脈血圧測定には左大腿動脈を用いた。両側総頸動脈をクレンメで閉塞すると大腿動脈圧が上昇した。この動脈圧の上昇を頸動脈洞反射の指標とした。

3. アドレナリン受容体遮断効果の評価: Arunlakshana and Schild¹⁰⁾ に従って, labetalol のアドレナリン受容体遮断作用の評価を行なった。pentobarbital 麻酔イヌを用い, 前出 1 の方法に準じて, 頸動脈血圧, 心電図, 心収縮力の記録を行なった。agonist としては, isoproterenol を, labetalol の対照薬としては propranolol を用いた。まず isoproterenol の dose-response curve を作り, labetalol および propranolol を 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 mg/kg と cumulative に静注した後に, 再び isoproterenol の dose-response curve を作成した。

いま, a なる濃度の agonist が受容体に結合することにある大きさの反応がおき, これと同じ大きさの反応が antagonist の存在下において A なる濃度の agonist によって惹起されたとすると, agonist と antagonist が競合的に受容体に結合する場合には, 次の式が成り立つ。

$$\log (X-1)=\log B_X+\log K_B \quad (1)$$

但し, $X=A/a$ (dose ratio), B_X は dose ratio が X なる時の antagonist の濃度, K_B は antagonist が受容体に結合する場合の親和力恒数 (affinity constant) である。また, $\log (1/B_X)=pA_X$ と定義すると, (1) 式は次の如くなる。

$$\log (X-1)=-pA_X+\log K_B \quad (2)$$

$\log (X-1)$ を y 軸にとり, pA_X を x 軸にとると, $\log (X-1)$ と pA_X との関係は, $\log K_B$ を切片とし, 勾配が -1 の直線となる。この直線と x との交点は $X=2$ の時の pA_X の値であり, これを pA_2 と定義する。すなわち dose ratio が 2 である時の antagonist の濃度の逆数の対数が pA_2 である。このようにして labetalol および propranolol の pA_2 を計算した。

4. 循環動態と腎からの電解質排泄: Pentobarbital 麻酔イヌの両側輸尿管にポリエチレン管を入れ, 20 分間毎の尿量と Na^+ および K^+ の排泄量を測定した。 Na^+ と K^+ の定量は炎光光度計法によった。なお, イヌには手術後約 1 時間 0.9% 食塩水の点滴注入 (4.0 ml/分) を行なった後に点滴注入を続けながら, 尿を集める実験に入った。この実験の経過中の心拍数と血圧を記録し, 循環動態と腎機能とに及ぼす作用の相関性を同時に知らんとした。

II. 摘出心臓の実験

1. 心房標本: モルモットおよびラット (雄と雌) を用い, 軽いエーテル麻酔下に, 手早く胸郭を開いて全心臓を切り取り, 約 $33^\circ C$ の栄養液を充たした底の浅い容器内にて, 型の如く心房全体を取り出し, $33 \pm 1^\circ C$ の organ bath 中に懸吊した。心房の等張性収縮をヘーベルを介して記録し, 同時に拍動数の測定を行なった。栄養液としては, Locke-Ringer 氏液および Krebs-Henseleit 氏液の両方を用い, 液中には混合ガス ($95\% O_2 + 5\% CO_2$) を常時通気した。

2. Langendorff 法: ウサギを頭部殴打による失神中手早く心臓を全摘出して Langendorff 法により灌流を行なった。栄養液は, Locke-Ringer 氏液とし, 温度 $31^\circ C$, 大動脈弁から灌流液面までの高さ約 1.5 m とした。心室壁に糸をかけて, この糸をヘーベルに連絡することによって心室運動を記録した。また, 心室に取付けた strain gauge arch で等尺性収縮を記録した。

3. 八木式心臓灌流法: 食用ガエルの摘出心臓を用いて八木式心臓灌流法により心臓を灌流した。灌流液にはカエル用 Ringer 液を用いた。

III. 末梢血管についての実験

1. カエルについての実験: トノサマガエルをウレタン麻酔し, 水かきの血管または腸管膜血管を顕微鏡下に置き, 血流観察と, ミクロメーターによる血管径の計測を行なった。labetalol を皮下リンパ腔内に注射し, それによってひきおこされる末梢血管および血流の変化を調べた。

2. ウサギ耳介血管の灌流: Krawkow-Pissemiski 法に準じて実験を行なった。灌流液としては, 混合ガス ($95\% O_2 + 5\% CO_2$) を十分に通気した Locke-Ringer 氏液にウサギ血清を約 1% の割合で加えたものを用いた。灌流液

に血清を加えて血管トーンを高く置かなければ薬物による血管拡張は現われ難いからである¹¹⁾。薬物の適用は灌流路への注射によるか、または一定濃度の薬物を含んだ灌流液との交換による方法をとった。

3. 食用ガエルの後肢灌流法: Lwen-Trendelenburg に準じて、食用ガエルの腹部大動脈にカニューレを入れ、Ringer 氏液で後肢血管の灌流を行なった。

実験成績

I. labetalol の循環系に対する一般的作用

1. イヌの循環動態に及ぼす影響:

実験方法 I の 1. に記載した条件下のイヌに静脈内に labetalol を 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 および 10.0 mg/kg と cumulative に注射した時の循環動態は Fig. 1 に示す如き変化を示した。Fig. 1 の縦軸は、上から下に向って

Fig. 1. Hemodynamic effects of labetalol in anesthetized dogs. Values are expressed as mean $\pm$ SE (vertical bars). Logarithmic dose.

順次、動脈および静脈血の pO_2 , pH ならびに動脈血のヘマトクリット、心拍数、動脈血圧（収縮期および拡張期の血圧）、心臓収縮力および大動脈血流量を示し、横軸には labetalol の上記用量を示してある。この図から明らかな如く、labetalol は血液の pO_2 , pH, ヘマトクリット値には変化を起きなかったが、心拍数、動脈血圧（収縮期および拡張期血圧）、心収縮力および大動脈血流量を減少させた。labetalol の循環器系に対する抑制的作用は、0.1 mg/kg の如き少量で現われ始め、0.3, 1.0 mg/kg では、その抑制作用は順次強まる傾向を示し、3.0 および 10.0 mg/kg では有意な抑制を示した。すなわち、この結果は labetalol の循環系に対する抑制作用が用量に依存して強まることを示している。

2. labetalol の頸動脈洞反射に及ぼす影響：

麻酔イヌの大動脈平均血圧は 134.6 ± 8.4 mmHg（平均標準誤差）であったが、両側頸動脈を閉塞すると、血圧は 42.4 ± 5.1 mmHg（平均標準誤差）の上昇を示した。labetalol を 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 および 10.0 mg/kg と cumulative に静注した後に、前記同様に両側頸動脈閉塞を行ない、平均血圧上昇を計測した結果は Fig. 2 に示してある。labetalol の用量を順次上げるにつれて、平均血圧は下降するが、頸動脈洞反射もまた用量に依存して抑制されることが明らかとなった。特に、labetalol を 1.0, 3.0 および 10.0 mg/kg 投与した場合においては、頸動脈閉塞による血圧上昇は対照に比し有意に低かった。

Fig. 2. Inhibition of carotid sinus reflex with cumulative doses. Values are expressed as mean $\pm$ SE (vertical bars).

3. イヌにおける labetalol の β 受容体遮断作用：

1) 心拍数；agonist である isoproterenol を与えると、心拍数は用量依存的に増加した。この用量反応関数は labetalol の投与後にはその用量に応じて右へ移動した (Fig. 3)。この図から、実験方法 I の 3 によって dose ratio X を求め、 $\log Bx$ を求めることが出来るので、これらを (2) 式に従ってプロットすると Fig. 4. の如き直線となった。dose ratio が 2 の時は y 軸の値は 0 となり、その時の x 軸の値は pA_2 である。このようにして求めた pA_2 は 7.25 となった。また、勾配は 0.88 (負号略) となり、labetalol は isoproterenol と競合しているものと思われた。

対照薬 propranolol についても、同様の実験を行ない、Fig. 5 の如き結果を得た。Fig. 5 と Fig. 3 を比較すると、両者は本質的には非常によく似ていた。propranolol の pA_2 は 7.10 であり、勾配は 1.01 となり (Fig. 4), propranolol と isoproterenol との競合は、labetalol の場合よりもはっきりとあらわれていた。

2) 平均動脈圧；isoproterenol の動脈圧降下作用についての dose response curve も、labetalol の用量に依存して右方へ平行移動した。その様相は propranolol の場合と極めて類似していた。比較のために、labetalol と propranolol とについて得られたデータから、それぞれ $\log (X-1)$ と $-\log Bx$ を求めて図示したのが Fig.

Fig. 3. Dose-response curves of isoproterenol (heart rate) in the absence (control) and presence of labetalol in anesthetized dogs. Abscissa: Dose of isoproterenol expressed as logarithmic doses.

Fig. 4. Dose ratio plots of labetalol and propranolol against isoproterenol. Effects of labetalol and propranolol on the response of heart rate to isoproterenol as observed in anesthetized dogs. Results from Figs. 3 and 5 were plotted using the equation; $\log(x-1) = -\text{pA}_X + \log K_B$.

Fig. 5. Parallel shift of the dose-response curves of isoproterenol for the heart rate in anesthetized dogs.

Fig. 6. Effects of labetalol and propranolol on blood pressure response to isoproterenol in anesthetized dogs. Dose ratio plots of labetalol and propranolol against isoproterenol.

6 である。図中の二つの回帰直線は殆んど平行しているが、その勾配は propranolol の場合が labetalol の場合より、より 1 に近い値となった。

3) 心収縮力; isoproterenol の心収縮力増強作用に関する dose response curve は, labetalol 投与後にはその用量に依存して順次右方へと平行に移動した。その平行移動の程度は propranolol の場合と殆んど似たものであった。これらのデータからそれぞれ、 $\log (X-1)$ と $-\log B_x$ を求めて作った値線が Fig. 7 である。この場

Fig. 7. Effects of labetalol and propranolol on myocardial contractile force response to isoproterenol in anesthetized dogs. Dose ratio plots of labetalol and propranolol against isoproterenol.

Table 1. Comparison of the slopes of regression lines and pA_2 values for various parameters between labetalol and propranolol

Animals and experimental designs	Agonist	Parameter	Slopes of regression lines		pA_2 values		Activity ratio* Labetalol: Propranolol
			Labetalol	Propranolol	Labetalol	Propranolol	
Anesthetized dogs, <i>in vivo</i> and i.v. administration of agonist and antagonist	Isoproterenol	Heart rate	0.88	1.01	7.25	7.10	1.4 : 1
		Mean arterial pressure	0.88	0.95	6.92	7.33	0.38 : 1
		Contractile force	0.93	0.82	6.86	6.97	0.76 : 1
Atrial preparations	Guinea pigs	Isoproterenol Atrial rate	0.93	0.96	7.90	8.43	0.3 : 1
		Epinephrine Atrial rate	0.90	0.93	7.66	7.85	0.7 : 1
	Rats	Epinephrine Atrial rate	1.04	0.90	7.33	7.94	0.24 : 1

* Activity ratio is expressed in terms of reciprocal of the dose or of the concentration in moles required to produce an equivalent response.

合も labetalol と propranolol は殆んど平行な直線となった。但し、この場合には labetalol の勾配の方が propranolol の勾配よりも 1 に近い値となった。

4) 活性率 activity ratio; 以上 3 つのパラメーターについて、labetalol と propranolol の β 受容体遮断作用強度を isoproterenol に対する拮抗効果の上から検討した。上述のデータを整理すると Table 1 の如くになった。いま labetalol の β 受容体遮断作用を propranolol のそれと比較するために、 pA_2 値から活性率 activity ratio を計算すると、Table 1 の右端の数字の如くになった。すなわち、isoproterenol の心拍数増加作用を抑制する labetalol の作用は、propranolol それらの 1.4 倍であり、isoproterenol の動脈降下作用を抑制する力の比は、labetalol : propranolol = 0.38 : 1, isoproterenol の心収縮力増強作用を抑制する力の比は、labetalol : propranolol

Fig. 8. Dose response curves of norepinephrine for mean arterial pressure in anesthetized dogs. Pretreatment with labetalol or phentolamine shifted the response curves to the right.

=0.76:1 となった。

4. イヌにおける labetalol の α 受容体遮断作用：

麻酔イヌを用い、norepinephrine の動脈血圧上昇作用に対する labetalol の抑制効果から α 受容体遮断作用を調べた。labetalol を 1.0, 3.0 および 10.0 mg/kg と cumulative に静脈内注射した後は norepinephrine の dose response curve は labetalol の用量増加に応じて順次右方へ移動した (Fig. 8, 下図)。これは labetalol が α 受容体遮断作用を呈したことを意味するが、その平行移動は対照薬 phentolamine の場合ほど典型的な移動ではなかった (Fig. 8, 上図)。Table 2 に示す如く、回帰直線の勾配は、phentolamine の場合には 0.83 であったのに対し、labetalol の場合には 0.51 となった。従って、血圧をパラメータとしてみた場合、labetalol と norepinephrine

Table 2. Slopes of regression lines and pA_2 values of labetalol and phentolamine for noradrenaline antagonism in anesthetized dogs

	Slopes of regression lines		pA_2 values		Activity ratio (labetalol/phentolamine)
	Labetalol	Phentolamine	Labetalol	Phentolamine	
Mean arterial blood pressure	0.51	0.83	5.61	6.61	1/10

Fig. 9. Effects of labetalol on cardiovascular and renal functions anesthetized in dogs. HR=heart rate, ABP=arterial blood pressure.

との拮抗は競合的拮抗といえるかどうか問題があるかも知れない。しかし、若し norepinephrine の昇圧作用を抑制する作用が labetalol の α 受容体遮断によるものとすれば、labetalol の α 遮断作用は phentolamine の 1/10 となる (Table 2)。

5. 循環動態と腎からの電解質排泄との関係：

実験方法 I の 4. に記載した方法により、イヌの輸尿管尿の排泄量、 Na^+ 、および K^+ 排泄量と循環動態との関係を調べた。その結果は Fig. 9 に示してある。すなわち、labetalol の 1 mg/kg をイヌ静脈に注射すると明らかに心拍数の低下と血圧の低下が起っているのに、尿排泄量には影響を与えず、また Na^+ および K^+ の排泄に対しても全く影響を及ぼさなかった。なお、図に示す如く対照薬 furosemide の利尿作用、 Na^+ および K^+ 排泄作用は極めて典型的にあらわれているので、このイヌは、無理のない条件下で実験されたものと判断された。

II. labetalol の摘出心臓に対する作用

1. 心房標本についての検討：

1) Locke-Ringer 氏液を栄養液とした場合の成績；Fig. 10 に示す如く、モルモット心房標本において、labetalol の濃度が 10^{-8} g/ml から上昇するにつれて dose-dependent な陰性変時作用が見られた。収縮力は 10^{-7} g/ml の濃度から減少し始めた。labetalol の心房標本運動抑制は、量を増すにつれてその程度を増し、 10^{-4} g/ml においては拍動数は大略半分に減り、収縮力は labetalol 適用前の 20% になった。labetalol による心房運動抑制は比較的徐々に進行し、その抑制作用は propranolol による抑制よりも弱かった。ラット心房標本についても同様に、labetalol 10^{-8} g/ml 以上の濃度で陰性変時作用が見られた。ラットの場合にも labetalol よりは、propranolol の心房収縮力抑制効果の方が大であった。但し、拍動数抑制に関しては labetalol と propranolol との差は認められなかった。

2) Krebs-Henseleit 氏液を栄養液とした場合の成績；栄養液を Krebs-Henseleit 氏液とした場合には、モルモット心房筋に対する labetalol の拍動数抑制作用は、Fig. 10 に示す如く、 10^{-5} g/ml 以下の濃度では現われず却って僅かに拍動数増加を起す傾向が見られた。 10^{-5} g/ml 以上の濃度においては、急激に拍動数が減じた。すなわち心房運動に対して labetalol が低濃度でやや促進傾向を示し高濃度に於て抑制を起すという結果となった。

Fig. 10. Alteration of chronotropic response of guinea pig atria to labetalol and propranolol by replacing Locke-Ringer's solution with Krebs-Henseleit solution.

かかる2相性を思わせる如き影響は propranolol の場合には見られなかった。

3) 心房の β 受容体遮断作用；モルモット心房標本について、isoproterenol の拍動数増加作用に関する用量作用曲線が labetalol 前処置によって右方平行移動をすることを確かめ、propranolol による右方移動との比較検討を行なった。その結果をまとめたのが Fig. 11 である。回帰直線の勾配は labetalol は 0.98, propranolol は 0.96 となり、何れも isoproterenol と競合的拮抗をしていると見做してよいであろう。pA₂ は labetalol 7.90, propranolol 8.43 となり、活性率は labetalol : propranolol = 0.3 : 1 となった。

Fig. 11. Regression lines showing competitive antagonism of labetalol and of propranolol against isoproterenol in isolated guinea pig atria suspended in Krebs-Henseleit solution. Results from Fig. 10 are plotted.

epinephrine の拍動数増加に対して、同様の実験を行なったところ、モルモット心房では labetalol の pA₂=7.66, 勾配=0.90, propranolol の pA₂=7.85, 勾配=0.93 となり、活性率は labetalol : propranolol = 0.7 : 1 となった。epinephrine 作用を用いた場合には isoproterenol の場合に比し、labetalol と propranolol との活性率がより低い値となったのは、前者は α 受容体刺激作用が強いことと関係があるかも知れない。これに対して、ラットの心房標本を用いた実験では、活性率は labetalol : propranolol = 0.24 : 1 であった (Table 1)。

2. 心室収縮に対する作用の検討：

1) Langendorff 氏法心室灌流法；ウサギ摘出心臓灌流実験において、灌流路に labetalol を注射し心室収縮力抑制作用を調べた。収縮力は 0.25 mg の投与では変化なかったが、1 mg 投与によってやや抑制され、2.5 mg 投与によって約 50% 抑制、5 mg 投与によって約 75% 抑制された。他方、0.1 mg の epinephrine によって起る収縮力増加は 0.25 mg の labetalol によって明らかに抑制された。このことは、labetalol が心室の収縮力抑制を起さないような小量によって、 β 受容体を遮断することを示している。

2) 八木式心臓灌流法；食用ガエルの摘出心臓を灌流した。一定濃度に labetalol を加えた灌流液を labetalol を加えてない正常の灌流液と交換して灌流する方法で labetalol の作用を調べた。その結果によると、labetalol の心収縮抑制作用は 10^{-6} ~ 10^{-5} g/ml 以上の濃度によって現われ、 10^{-4} g/ml によって心停止に陥った。但し、一旦停止した心臓も、正常リングルに交換するとその収縮能は回復した。 10^{-8} g/ml の epinephrine によるカエ

ル心収縮力増加は, labetalol の 10^{-8} g/ml によって抑制され始め, 10^{-7} g/ml 以上の labetalol によって明らかに抑制されることが確かめられた. すなわち, カエル心臓においても, labetalol の β 受容体遮断作用は心収縮力の減少を起さない小量で現われることが明らかとなった.

Ⅲ. 末梢血管に対する作用

1. カエルの末梢血管に対する作用: 予備実験として, ウレタン麻酔を行なったトノサマカエルの皮下リンパ腔に labetalol を注射し, みずかき血管および腸間膜血管の血流を観察し, かつ血管径をマイクロメーターで計測した. 25 mg/10 g の大量投与の場合には, 2分後から血流速度が急に遅くなり, 腸間膜血管径も $29 \pm 0.05\%$ (平均標準誤差) の増加となった. 断頭カエルを用いた実験においても類似の作用が認められた. このことは, labetalol は吸収作用として末梢血管を直接拡張したことを示唆している. 血流速度の遅延は心臓抑制および血圧低下と関係が深い, 末梢血管の拡張は血圧低下の原因となり血流速度を遅らせる大きな要因をなすものと考えられ, 次の実験を行なった.

食用カエルを用い, Låwen-Trendelenburg 法によって後肢血管灌流実験を行なった. 室温にて, リンゲル氏灌流液から labetalol の 10^{-5} g/ml を含むリンゲル氏液に交換し, epinephrine を灌流路に注射してその反応を調べた. epinephrine $1 \mu\text{g}$ による末梢血管収縮は, 10^{-5} g/ml の labetalol 液の灌流により完全に抑制され, 次いで灌流液を正常組成の液に切り換えても epinephrine に対する反応は直ちに回復して来なかった. この結果は, labetalol による α -受容体遮断作用は一旦現われると回復に時間を要することを示している.

2. ウサギ耳介血管に対する作用: Krawkow-Pissemski 法に準じて, ウサギ耳介血管灌流実験を行なった. この場合灌流液としては, Locke-Ringer 氏液にウサギ血清を約 1% の割に加えたものを使用した. 灌流液に血清を加えることにより, 末梢血管の緊張度を高め, 薬物による血管拡張作用を容易ならしめることが出来るからである.

灌流路に epinephrine, norepinephrine, phenylephrine および isoproterenol を注射してその反応を記録し

Fig. 12. Dilatation of rabbit ear vessels induced by labetalol after blockade of α -adrenoceptors.

た結果は次の如くであった。先づ epinephrine による血管収縮作用は、 10^{-6} g/ml の濃度の labetalol 加液の灌流中には著明に弱かった。また、この場合、正常灌流液から labetalol 加灌流液に交換して灌流しても血管を流れ出た液量に大きな変化が見られなかったの、この濃度 (10^{-6} g/ml) の labetalol はそれ自身では血管拡張を起さないものと判断された。灌流液中の labetalol 濃度を 10^{-5} g/ml に上げた場合には、epinephrine の血管収縮作用が殆んど完全に抑制されたばかりでなく、灌流液量そのものが著明に増大した。さらに、再び正常 Locke-Ringer に交換した時には、灌流液量は速やかに labetalol 灌流前の値に向って回復したが、epinephrine 反応はなお抑制されたままであった。次に, norepinephrine の血管収縮作用については Fig. 12 に示す如く、epinephrine の場合と全く同じ濃度の labetalol によって明らかに norepinephrine の収縮作用が抑制された。 10^{-5} g/ml labetalol による灌流では灌流量は増加し、その後、灌流液を正常灌流液にもどすと灌流液量は元のレベルにまでもどってきたが、norepinephrine による血管収縮反応はかなり後まで抑制された。phenylephrine 反応についても全く同様な結果が得られた。これらの結果は、labetalol の α -受容体遮断作用は一旦起こると labetalol を取り除いてもなお、かなり長く持続することを意味し、また labetalol はやや高濃度において血管拡張を起すが、この作用は labetalol を除くと速やかに消失することを示唆している。

Fig. 13. Blockade of β -adrenoceptors induced by labetalol and marked dilatation of ear vessels with labetalol administration after blockade of β -adrenoceptors.

labetalol の血管拡張作用が β -受容体と如何なる関係にあるかを知る目的で、isoproterenol に対する反応について実験した。その結果は Fig. 13 に示す如く、labetalol は 10^{-6} g/ml の濃度では灌流液量増加（血管拡張作用）を示さないが isoproterenol の作用を完全に遮断し、しかも正常灌流液に交換しても β -遮断作用はかなり長く残っていた。また labetalol の濃度を 10^{-5} g/ml に上げて起こった血管拡張は正常灌流液に交換後直ちに消失したのに β -遮断作用のみは残存していた。

以上の研究から、labetalol の血管に対する作用は、確かに β -受容体と α -受容体の両方を遮断するし、一旦起こった受容体遮断は labetalol が灌流液中から消失してもなおかなり長時間残存するものと思われる。さらに、labetalol は、 α -および β -受容体に対する作用の外に、やや高濃度においては血管自身に働いて拡張作用を

現われ、しかもこの拡張作用は labetalol を灌流液から取除くと直ちに消失することが確かめられた。

考 察

イヌについて、labetalol の循環動態に及ぼす影響を研究した結果をまとめると次の如くなる。labetalol は、心拍数の減少、動脈血圧の降下、心収縮力の低下、分時拍出量の減少など、循環動態全般に対して抑制的に働く作用を有するものと判断された。循環動態に対する抑制作用は labetalol の 0.1 mg/kg によって現われ、用量増加に伴ってその抑制の程度は強まっていたが、動静脈血の pO_2 , pH およびヘマトクリット値は、1.0 mg/kg あるいはそれ以上の用量によっても影響を受けないことから labetalol の循環動態に及ぼす影響が心筋代謝とは直接結び付いていないだろうと考えられる。次に、平均血圧を指標として labetalol と頸動脈洞反射との関係を調べ、labetalol の血圧下降作用と頸動脈洞反射の間には密接な関係のあることが推察された。このことは、labetalol の循環動態に及ぼす影響が自律神経系を介して起っていることを意味するものとして注目したい。特に頸動脈洞反射が 1.0 mg/kg およびそれ以上の用量によって著明に抑制されたことは、labetalol の血圧降下作用機序を考える上に重要な意味を持つものと考えられる。

labetalol の α - および β -アドレナリン受容体遮断作用に関しては、既に Farmer ら¹⁾, Kennedy and Levy²⁾ および Brittain and Levy³⁾ によって報告されているが、われわれもこの点を確認する目的で麻酔イヌを用いて心拍数、動脈圧、心収縮力の三つのパラメーターについて追試実験を行なった。isoproterenol の陽性変時作用、陽性変力作用および血圧下降作用に関する用量作用曲線は、labetalol 前処置後には明らかに右方（高用量側）へ平行に移動し、しかも isoproterenol の作用曲線は labetalol の用量に依存してより多く右方へ移動した。その平行移動の様相は propranolol 前処置の場合と本質的に変わりはない。すなわち、これらの三つのパラメーターの上からは、labetalol は propranolol 同様に、 β -アドレナリン受容体において isoproterenol と競合的に拮抗していることは確かである。拮抗に関する propranolol に対する labetalol の活性率 (activity ratio) を求めた結果によると、心拍数の上からは 1.4 倍となり、血圧の上からは 1/2.5 となり、心収縮力の上からは 1/1.3 となった。Brittain ら³⁾ は *in situ* のイヌについて心拍数に関して求めた isoproterenol に拮抗する labetalol と propranolol の出力比は 1/4 と記載しているが、これはわれわれの活性率と一致しなかった。その理由は実験動物の条件と算出方式の相違によるのかも知れない。何れにせよ、*in situ* の実験成績から 2 つの異なった拮抗薬の効力比較は必ずしも正確には行ない得ないことは論を俟たない。

次に、麻酔イヌを用いて、norepinephrine の昇圧作用が labetalol で如何に拮抗されるかを調べた。その結果から labetalol は、phenolamine ほど典型的ではないにしろ、norepinephrine 作用に概ね競合的拮抗を示すことが確認され、その α -受容体遮断効力は、phenolamine の約 1/10 であった。Brittain and Levy³⁾ は phenylephrine の昇圧反応を用いて実験し、labetalol の α -受容体遮断効果は phenolamine の効力の 1/7 としているが、この値はわれわれの値に概ね近いものと見做される。

循環動態は腎臓機能と密接な関係があることを考慮し、腎からの水分ならびに電解質排泄について研究した。その結果によると、labetalol によって血圧が低下しても、腎臓における水分、 Na^+ および K^+ の排泄には全く影響を与えないことが明らかとなった。labetalol の水分電解質代謝に及ぼす影響については、未だ詳細な報告はないが、少なくともこの実験から、中等量の labetalol は腎臓機能に無影響であろうと推察される。

次に、labetalol の循環動態に対する作用をさらに詳細に知るために、心臓および血管の両方から検討を加えて見た。モルモットおよびラットの心房標本を Locke-Ringer 氏液中で実験した結果によると、labetalol の陰性変時作用は 10^{-8} g/ml の濃度から始まり、陰性変力作用は 10^{-7} g/ml の濃度から出現していた。しかし同じ心房標本を Krebs-Henseleit 氏液中にて養った場合には、labetalol の陰性変時作用は 10^{-5} g/ml 以上の濃度において出現し、それより小濃度においては陽性変時作用を示す傾向が認められた。片野ら⁹⁾はこの陽性変時作用を重視し、labetalol は β -receptor に対して intrinsic な刺激作用を有するのではないかとさえ疑っている。しかし、この作用には有意性は認められず、栄養液を Locke-Ringer とした場合にはこの作用が全く出現しないので intrinsic な作用に関しては、なお検討の余地がある。なお、陰性変時作用に関しては、labetalol は propranolol より遥かに弱かった。特に Krebs-Henseleit 氏液中で実験すると、その効力差は著しかった。ここで疑問になる

のは, labetalol の心房に対する作用が栄養液の相違によって著しく違った効力を示すことである. 両栄養液の組成で最も大きな違いは NaHCO_3 の含量にある点から灌流液の緩衝能が labetalol の作用に何等かの影響を与える可能性が考えられる. しかし, 両栄養液の何れに labetalol を溶かし込んでも, この実験に使う濃度では栄養液の pH に変化は起らなかったのて, 理由は単純ではないであろう. それはとにかく, labetalol の作用機序は単一ではないにしても心房の β -アドレナリン受容体において isoproterenol と競合的に拮抗することは確かであり, その効力は propranolol より弱いものと判断される (Table 1).

次に, labetalol の心臓収縮性に及ぼす影響について考察する必要がある. 心房標本において, labetalol の陰性変時作用を表わす最小濃度は, 陰性変力作用を起す最小濃度よりも概ね 1 桁低い値となった. さらに, 心室の収縮力と拍動数との関係を知る目的で, Langendorff 氏法または八木式法による灌流実験を行なった. ウサギ摘出心臓灌流実験では, 収縮力は灌流路への labetalol の注射量が 0.25 mg では抑制されず, 1 mg ではやや抑制されたが, これに反して 0.1 mg の epinephrine による陽性変力および陽性変時の効果は 0.25 mg の labetalol によって完全に抑制された. このことは labetalol の β -受容体遮断作用は 0.25 mg によって表われたことを意味し, labetalol の陰性変力作用は 1 mg になって表われたこととなる. カエル摘出心臓灌流実験においては, labetalol の収縮力抑制効果は 10^{-6} ~ 10^{-5} g/ml から表われたが, 10^{-8} g/ml の epinephrine による陽性変力作用は 10^{-8} ~ 10^{-7} g/ml の labetalol によって完全に抑制された. このことは, カエルにおいても labetalol は陰性変力作用を起さない程度の低濃度で β -受容体を遮断したものと考えられる. labetalol の濃度 (または用量) が増大すると心筋収縮力は用量依存的に減るが, 薬物を除去すれば回復可能である. 収縮力抑制機序としては β -受容体遮断のみならず心筋自身に対する抑制効果の関与も考えられる.

labetalol の末梢血管作用に関する実験成績は, 冷血動物 (カエル) および温血動物 (ウサギ) の何れについても, 同様な結果となった. 10^{-5} ~ 10^{-6} g/ml の濃度に溶かした labetalol 灌流液で灌流した末梢血管は, epinephrine および norepinephrine によって収縮しなくなった. これは labetalol によって血管の α -アドレナリン受容体が遮断されたことを示唆している. ウサギ耳介血管灌流実験において labetalol の 10^{-5} g/ml 液灌流時には血管が著明に拡張し, norepinephrine には反応せず, さらにこれを正常灌流液に切り替えると再び血管は正常緊張度に復帰したが, norepinephrine には依然反応を示さなかった. すなわち, labetalol の α -アドレナリン受容体遮断作用は 10^{-6} g/ml の濃度で起っており, 10^{-5} g/ml の濃度によってはこれに加えて血管の拡張が起ったものと考えられる. β -アドレナリン受容体をめぐる isoproterenol との競り合いについても同様の関係が認められた.

要するに, labetalol は末梢血管においても α - および β -アドレナリン受容体の両方を遮断することが証明された. また, この遮断作用は薬物を除去した後もかなり長い間続いており, 他方高濃度の labetalol による血管拡張は薬物除去によって直ちに消失した. この事実から, labetalol の末梢血管拡張作用には 2 つの機序が関与しているものと判断され, その一つは α -受容体の遮断であり, 他の一つは血管平滑筋自身に対する弛緩作用であると考えられる. 前者の作用は薬物除去後もかなり長く残存しているので, α -受容体に結合した labetalol は容易に離れないものと想像され, 後者は labetalol が血管から流出されると直ちに消失することから labetalol の血管平滑筋自身への結合 (あるいは単なる接触かも知れないが) は極めて不安定なものと言わざるを得ないであろう. 若しこの考えが正しいとすれば labetalol の高用量によって起る高度の血圧下降はアドレナリン受容体の遮断以外に血管に対する直接的拡張作用も関与しているものと推察される.

文 献

- 1) FARMER, J. B., KENNEDY, I., LEVY, G. P. and MARSHALL, R. J.: *Brit. J. Pharmacol.* **45**, 660 (1972)
- 2) KENNEDY, I. and LEVY, G. P.: *Brit. J. Pharmacol.* **53**, 585 (1975)
- 3) BRITTAİN, R. T. and LEVY, G. P.: *Brit. J. clin. Pharmacol.* **3**, supp. 681 (1976)
- 4) DOLLERY, C. T.: *Brit. J. clin. Pharmacol.* **3**, supp. 823 (1976)
- 5) 新保幸太郎, 富樫広子, 横井裕子, 藤原早苗, 堅田治子, 田辺恒義: *北海道医誌* **53**, 15 (1978)
- 6) KAMEDA, H., YOKOI, Y., OKUOKA, Y., MONMA, Y. and TANABE, T.: *Japan. J. Pharmacol.* **27**, 70P (1977)
- 7) KAMEDA, H., MONMA, Y., OKUOKA, Y. and TANABE, T.: *Japan. J. Pharmacol.* **28**, 78P (1978)
- 8) TANABE, T., KAMEDA, H. and MONMA, Y.: *Abstract of 7th International Congress of Pharmacology*, Paris,

p. 425 (1978)

- 9) 片野由美, 武田敬介, 仲川義人, 橋本豊三, 仲沢幹雄, 今井昭一: 日薬理誌 **74**, 819 (1978)
- 10) ARUNLAKSHANA, O. and SCHILD, H. O.: *Brit. J. Pharmacol.* **14**, 48 (1959)
- 11) 井田敏雄: 北海道医誌 **11**, 897 (1933)

Abstract—Yoshio MONMA, Yukako OKUOKA, Haruko KAMEDA, Kazuo ICHIHARA*, Yasushi ABIKO* and Tsuneyoshi TANABE (Faculty of Pharmaceutical Sciences, Higashi-Nippon Gakuen University Ishikari-Tobetsu, Hokkaido 061-02, and *Department of Pharmacology, Asahikawa Medical College, Asahikawa 078-11, Japan). Effects of labetalol on the circulatory system. *Folia pharmacol. japon.* **76**, 239~254 (1980).

Effects of labetalol on the cardiovascular system were studied in dogs, guinea pigs, rats, rabbits, and bullfrogs. In dogs anesthetized with pentobarbital, labetalol decreased heart rate, arterial blood pressure, and myocardial contractile force, and inhibited carotid sinus reflex, without affecting pO_2 and pH of circulating blood, urine volume, and urinary excretion of sodium and potassium. Alpha- and beta-adrenergic blocking action of labetalol was demonstrated in dog hearts, arterial preparations of guinea pigs and rats, isolated rabbit hearts, and bullfrog hind limb and rabbit ear preparations. In bullfrog hind limb and rabbit ear preparations, labetalol dilated blood vessels in concentrations larger than those which produced alpha- and beta-adrenergic blockade. The dilatation of blood vessels was observed only when labetalol was added to the perfusate, whereas alpha- and beta-adrenergic blockade continued even after removal of labetalol from the perfusate. It is concluded that labetalol blocks alpha- and beta-adrenergic receptors in the heart and blood vessels of the species used herein, and that this compound inhibits carotid sinus reflex in dogs. In addition, the dilatation of the blood vessels of the bullfrog hind limb and rabbit ear as evoked by labetalol probably involves a mechanism different from that of adrenergic blockade.